




BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele II
XXX
F
19
NAPOLI

XXX
7
19





D. N.

LEON. FVCHSII,
MEDICI ILLVMINATI,
SCHOLÆ TVBINGENSIS
PROFESSORIS PVBLICI, NEC
NON PRINCIPVM WIRTEN-
bergenſium Protophyſici,

Operum Didacticorum Pars III. & IV.

CONTINENS CVM MEDELAM SINGVLORVM
humani corporis partium a ſummo capite ad imos vſque pedes vi-
tiorum, tum Paradoxorum medicinæ ſynopſin.

*Ab Auctore ipſo paulo ante mortem, reſectis mendis & erroribus pernicioſis, reco-
gnita, aucta & locupletata, luculentisſimisq; annotationi-
bus illuſtrata,*

CVM MEDICIS TVM PHARMACOPOEIS LONGE
vtiliſſima, & ſumme neceſſaria,

Indice Rerum & Verborum ſatis locuplete donata.



PRODIT E COLLEGIO
Paltheniano, Quod eſt in nobili Francofurto.

M. DC. II.

1895
1896
1897
1898
1899
1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

AD TYPOGRAPHOS.



QUAM tanto hodie quorundam Typographorum sit improbitas & impudentia, ut vo-
 strum lucubrastulens haud secus quam inercei suae mellificio infiduciantur, & ea solum
 vix praelum egressus, magno mihi herile corum, qui has privum impresserunt, derimento
 denovo excudent, duntius mihi esse silendum non putavi, nisi horum temeritati &
 audacia me non opponerem, sed sibi quodam iure licere, & impune etiam deprecis quociens vel-
 lens, se resarpare posse sibi omnia persuaderent. Atvari autem principio subit, cur legiti natura, quo
 praecepis, ne alteri faciamus, qua fieri nobis volumus, prorsus inmemores, ito omnem laumantum esse-
 ctum exuerint, ut iis, a quibus nulla unquam afflicti sunt iniuria, nocere tamen audent. Ita vero ut
 faciant stimulis avaritiae agitantur, & nullo prorsus proximi ratione habito, eo feruntur, quo for-
 didi lucri cupiditas ipsos rapit. Detestandum profecto hominum genus, ut quos Christiana caritas, &
 os propria fama & existimationis penitus oblitus, utriusque sacrae famae, tanquam cathenis ligatus, quo
 velis ducas, aequo vi suo comodo alius incommodum impellat. Verum praeter hoc, quod aliis hoc ratio-
 ne nocent, in eo citam vehementer delinquunt, quod ea, qua ab aliis primum eleganter, & accurata
 diligentia excusa sunt, perversa sua & scelerata imitatione ita contumeliant atque conspurcane, ut
 nulla sit pagina, qua non multis erroribus redundet. Quae sane de causis odio ornatum dignisunt,
 quod non solum antioribus librorum, sed & ipsi lectoribus plurimum obliant. Ad floribus quidem,
 quod eos alienis gravant erroribus. Lectoribus autem, quod illi scriptos inveniunt, ubi alius nullus fa-
 ctus erat. Verum nec hoc nocendi ratione contenti sunt, sed eo impudentia progrediuntur, ut ea qua
 non sine consilio per auctores adiecta sunt, prorsus omittant. Quale certe flagitium nuper deservit
 Lugdunensis ille Typographus, qui omnes scire in medicina conscriptos libros, o nani & fidialis Ger-
 mania Typographus, elegantissimo charactere, & ample forma, multum impensis primum impressit,
 minutissimo, & visui humano parum convenienti forma, nec etiam integros, sed compluribus refe-
 ctis, recudere ausus est. Signum idem praeter epistolam nuncupatoriam, in qua omnem consilii mei ratio-
 nem, quod in exarandis libris secutus sum, & quod cognoscere lectorem necesse est, accurate expo-
 sua, multo etiam illa prorsus omisit, praesertim ubi Monachos illos etiosos, ac probe saginatos patres,
 omni tamen doctrina & pietate destitutos me acerbius perstrinxisse, animadvertitis. Metuit forte ne
 qui totas viduariae des deplacite possunt, & ipsum deurent. Sed qua has est impudentia, lucrum spe in
 alieno opere qua placere adere, alio vera qua displicet, metu periculi rescire? Imo bani viri officium
 erat, aut eo formo, quo ab auctore scriptum est, & primo publicatum, recudere, aut anarast manus ab
 eo prorsus abstinere. Quod si igitur lucrum, quod ex mutilo & misere decurtato opere sentis, gratum
 & suave est, facias ut periculum quoque, quod ex integri operis editione impedire sibi putat, non per-
 simulet. Proinde ut tandem Lugdunensis illius peruersam imitationem omnium e manibus excuse-
 rem, & illius subinde exempla munitos ceteros quoque Typographos ab eiusmodi imitationibus ab-
 stererem, denovo excudendos meos in medicina conscriptos libros, correctos & omnes, maximeque
 accessione non solum compositionum, sed & aliarum rerum occasione locupletatos, atque ab omnibus
 erroribus repurgatos, cum aliis quamplurimis meis scriptis, fratribus Palatinis, tanquam legitimis
 horum impressaribus, tradere volui. Quod reliquum est, ceteras omnes Typographos rogo, monco, &
 horro, ut deinceps ea potius, qua sua fidei ab auctoribus librorum commissa sunt adere, quam mea
 ab aliis prius recte excusa, recudere velint, & ne deinceps hac perversa ac fraudulenta imitatione,
 sui or divini hominibus incommodare pereant. Quod mihi fecerint, non est cur aliud expectent, quam
 quod ipsos, tanquam falsarios & reipublica nocentissimas pestes sum traducturus, omnesque horratu-
 ras, ut ab eorumdem impressionibus, veluti adulterinis sibi caveant. Valde Typographi, &
 nostra admisioni patulas aures pro bene, ne opus sit ut vestram
 impudentiam ac fardidam avaritiam toti or-
 bi producam.

ELENCHVS LIBRORVM SIN-
GVLORVM TERTIÆ ET QVARTÆ
PARTIS OPERVM LEONHAR-
di Fuchii.

- Lib. I. De morbis vitijsue capitis pag. 1.*
Lib. II. De morbis siue adfectibus thoracis 76.
Lib. III. De medijs ventris & intestinorum adfectibus 99.
Lib. IV. De Febribus & earum differentiis. 180.
Lib. V. De medendis tumoribus præter naturam 214.
Lib. VI. De medendu vulneribus. 239.
Lib. VII. De medendis ulceribus. 266.
Lib. VIII. De medendis fracturis & luxationibus 283.

*Hec omnia sequitur Quarta Pars continens tres libros
Paradoxorum Medicinæ. 295.*

LEON.

AL EONHARTI FVCHSII DE MEDENDIS SINGVLARVM HVMANI CORPORIS

partium a summo capite ad imos vsq; pedes vitii.

LIBER PRIMVS.

De Alopecia & Ophiali. CAP. I.



Alopecia Græcis capitis est vitium, in quo areas deciduas capillos efficit. Vel est Alopecia vitium, quo capillis fluentibus caput nudatur & glabrescat. Sic vero a vulpe appellatum est, quod idipsum vulpibus crebro accidat. Quippe *αλώπηξ* Græcis vulpem significat. Latini peculiari ac propria destituti appellatione, communi cum Græcis *Alopeciam* vocant. Barbari nostræ ætatis Medici, vt crebro alias faciunt, immutatione vnius literæ nomen deprauantes, *Alopecon* nuncupant. *Ophiasin* autem Græcorum Medicis *Ophiasis*

virium existit, quod capitis partem latam serpentis instat, quæ in Græcis dicitur, glabram ac capillis nudam ostendit. Latini pariter atq; Græci *Ophiasin* nominant. Barbari Medici Arabicam sectantes Medicinam, *Tyram* appellât. Tyrum enim illi omnem *tyria* penrem, potissimû *viperam*, vocant. Sunt tamen qui *Ophiasin* in capite perpetuo habere dicant, & infantibus ad elephantiâ dispositis solum accidere. Alopeciam vero barbam,

C reliquasq; corporis partes pilis a natura conuestitas non minus occupare, quam caput, nec minus etiâ alias ætates, quam infantiam infestare. Verum nos, perinde atq; alii omnes, vitia in reliquis corporis extra caput partibus pilis veltitis accidentiâ, ad pilorum defluuium referre volumus. Ceterum vtrunq; viti genus a vitiatæ radicesq; pilorum erodentibus humoribus; aut ob alimentu, quod illos auget, penuriam; aut propter meatuum amplitudinem prouenit. Quæmadmodum enim nonnullæ stirpes humoris inopia & defectu deficiat; & cortumpuntur; aliquæ vero ob alieni naturæ ipsarum humoris occursum; sicut etiâ capilli vel propter humorum ex quibus nutriti consueverunt inopiam; aut propter eorundem prauitatem cortumpuntur. Et ob humorum quidem inopiam, caluities fit, quæmadmodum sequenti mox capite latius dicemus: propter vero humorum prauitatem, alopecia & ophialis. Nam, vt *Tradit* *Trallianus auctor est*, tum ex pituita calefacta, ac in falsam qualitatem conuersa, tum ex flaua bile, & humore melancholico nascuntur. Quapropter efficiens viti causâ considerari & agnosci, atq; ita tandem curationi tenari debet. Porro quales sint vitiatæ humores, ex cutis capitis colore cognoscet. Nonnullis enim murata albidior apparet, aliquibus pallidior, aut nigrior. Candida cutis, pituitosâ; pallida flauave, bilosâ humorum vitiositatem; nigra, melancholicam significat. Ad vitiosi præterea humoris speciem certius discernendam, non leue adiumentum præcedens victus ratio adferri: præsertim intelligenti quinam ciborum pituitæ, & quinam melancholiz flauæq; bilis succum coaceruerunt. Quum autem vitium hoc ex prauis humoribus procreetur, vt victus ratio, quæ in eo obseruari debet, ex his constat.

D **E** cibis ac potibus, qui bonos succos gignunt. Horum autem cognitio, ne hic præter necessitatem longiores simus, ex libris Galeni de alimentis facul. inscriptis, & libello de cibis bonis & malis succi petenda erit. Quod vero ad curandâ rationem attiner, si adit plethora: quod cognoscitur ex cutis colore rubeo: sanguis educendus a vena cephalica primo loco, postea tundere venam frontis oportet. Quod si id non liceat, sanguisq; in occipito, vel capitis circuitu, aut cucurbitulæ cum scarificatione eodem in loco admoveere commodissimum est. Sin vniuersum corpus vitiosis humoribus refertû fuerit, Græci *αλωπεκον* nominant, totius corporis in primis purgatio molienda erit, medicamento aut pituitam ducente, aut flauam bilem, aut melancholicum succum exhibitio, comedura humoris, vt paulo ante ostendimus, ex cutis colore facta. Si enim candidior quam pro naturæ habitu sit, pituitosi humoris purgationem adhibebis: sin pallidior, flauæ bilis: haud secus quam si nigrior conspicitur, quæ melancholicum succum detrahent, offeres. Pituitosos autem humores, præsertim a capite, *Hiera ex colocynthide* purgare consuevit, quæ describitur a Nicolao Myrepso *lib. 23. capite 12.* sub nomine *Hieræ* magnæ. *Hiera* quoque amara, quæ a Galeno *lib. 7. storac. metho. & lib. 2. de compo. medica. local. cap. 1.* describitur, iunice confert: nigræ solisct interdum elleboro, vt idem Galenus suadet,

2 Operum Leonhardi Fuchsi Pars III.

Catapotia
ex colocy-
thide & a-
loe.

aut epithymo adiecto, ubi melancholicum humorem purgare volueris: interim etiam
scilicet monia, si flaua bilis purganda erit. Si vero pituita, nihil adiciendum erit. Quia
etiam exaloe catapotia commode sic laborantes purgare solent. Habent vero, *Galenus*
libro primo de compo. medica. local. cap. 2. auilore, pulpa co. cyth. deo. vinctum vnam. Aloe. sic-
monia, utriusque vinctus duas. Succ. abissi hij, vinctum vnam. Prædicta vero sigillatim contri-
ta, & permixta, abissi in succo excipiuntur, inq; catapotia rediguntur. Ex drachma vna
conficiuntur catapotia vndecim, & vna vice omnia deuorantur. Ceterum, ut id obiter
dicamus, Hic et piceæ triplex vsus hodie existit. Sūt enim quæ species vocas eius. Hic
et in vino, aut iure gallinæ co, aut alio conuenienti liquore propinant. Atqui pauci ad-
modum sunt, amantudinem immensam abhorrentes, quibus lumere possunt. Quæ-
propter præstat caldem cum casia fistulari miscere, & adiecto saccharo boli forma assu-
mere. Vltra drachmam vnam de speciebus illis vna vice non exhibetur. Alii sub specie
catapotiorū, q̄ passim in officinis medicorū prostant, exhibent. Antidon forma liquidi
in cyllister adhibetur. Cauendū vero vnice interea erit, ne multo cibo corpus onere-
tur, donec habitus corporis diligenter expurgatus fuerit, ne si alimenu copiam illud ex-
pleatur, excrementa tantum communia egerantur, humor autem vinosus at trahendus
remaneat. Porro post totius corporis purgationem apophlegmatismū, in fistularia bar-
bari Medici appellant, pituita in capite per os educere oportet. Conficiuntur autem
ex sinapi, hyssopo, flaphyde agria, pipere, origano, radice pyrethri, cubebis vniq; appellatis, asaro,
& similibus, quemadmodum lib. 4. de compo. medica. cap. 27. ostendimus. Valet autem inter
alia hoc ponissimum, quod accipit: Piperis longi, nucis mæschata singulorum drachmam vna,
Semis. 2. laphydis agria, pyrethri, utriusque scrup. ules duas. Sinapi, origani, utriusque scrupulum.
vni. Trita excipiunt mastiche, aut melle, aut alba cera, vel vtriusq; singulū urq; pastilli lu-
pinotū forma & quantitate maniles: quotū vnus ad horæ fore vnus medietatem com-
manducetur. Possunt etiam prædicta, postquam trita sunt, in linteum pannum tenuem
acratum reposita ac deligita commanducari, ut loco paulo ante ostenso fusius monstrauimus.
Quoniam hec minus probanda sunt. Trahunt vero etiam pituitam diu in ore retenta
gargarismata confecta ex decocto fructuum dulcium, ut ficuum, passulorum, & aliorum
herbarum calidarum, quales sunt hyssopus, flaphas, eriganum, pulegium, & similes, in quarum
decocto mel rosarum dissoluitur, si medicamentum minus esse oporteat. Si vero fortius,
in sine decoquantur cubeba, piper, pyrethrum. & id genus similia. Adiciuntur etiam com-
positiones, quæ pituitam trahunt, ut est diaphenicon. His peractis, hoc est, toto prius cor-
pore, & etiam capite ipso vacuato, ad localia vocata medicamenta veniendum erit quib-
us atrenuandi, attrahendi, discutiendi que vires insunt. Oportet enim velut in aliis,
sic etiam in his affectui siue morbo mederi, cuius symptoma est capillorum vitium. Si
igitur vitiatum humor circa vnum locum collectus fuerit, scopus medendi erit, ut is quā
celerrime vacuetur, priusquam ab ipso cutis in quandam malum habitum deducatur
ita ut etiam quis vitiatum ipsius humorem vacuet, & boni sanguinis influxum præparet,
is etiam a malo in ipsa habitu prius confirmato corrumpatur. Vacuantia igitur esse lo-
calia illa medicamenta oportet, adeoque discutiendi vi prædicta, citra tamen vehemē-
tem calefactionem. Quæ enim eiuiusmodi sunt, vel cutem exurent, vel cutem capitis ni-
mium excicabunt, adeoque humorem, vnde pili nutriuntur, absumunt. Nec est quod
moderate calidum sit medicamentum, id enim vacuare & discutere noxium in capite
humorem haud poterit. Tenuium quoque partium sit, ut in altum penetrare, & radi-
ces capillorum attingere possit. Quum enim cutis capitis crassa admodum sit & dura,
ideo nisi sit tenuium partium medicamentum, ad radices capillorum penetrare nequit.
Ad quam rem profecto plurimum conducit, si ante omnium medicamentorum vsum
capillos nouacula sustuleris, ac deinde laborante in cutem per linteolum neque sperū,
neque nimis molle confrueris. Sunt tamen, qui variis in locis capur quoque punge-
dum velint, postquam fuerit fricatum, & a punctura oleo calido dulci irrigandum, ne
tam cito foramina illa coalescant, vel adipe aserino, vel porcino, vel vrūno, aut agnino
vigendum. Obseruandum quoque erit, quantum ruboris ex huiusmodi frictione cuti
accedat. Si enim per modicam frictionē statim hæc rubescat, morbus sanatu facilis erit.
Sin vix post longam atq; multam frictionem rubescat, difficile tum vitium, tū curationē
ipsam minime leuam ominaberis. Vt autē in omnibus aliis medicamentis nō solum quod
cale-

Apophle-
gmatismū

Pituitam
maniliū.

Localia

Gargari-
smata.

E

F

- A** calefaciant operæ pretium est cognoscere, sed & quo ordine & excessu id præstent: ita quoque in iis quæ alopeciam conferunt, quod altero calidius sit nosse oportet, ita enim expedire ex illis medicamentis compones. Calidissimum igitur ex eis est *Euphorbium*. Eligendum vero quod mediocri sit ætate. Nam recens acutus est, vetus autem vites amittit. Eo autem minus calidum est thapsia, post hanc veto linapi, & nasturtium. His succedunt sulphur, nitri spuma, nitrum molle visum, aphronitrumque candidum, leue ac laxum, quod nullam in se terræam crassitiem habet. Deinde uterque ellæbory, erua semina, oleumque laurinum. Quinetiam pice liquida, & murium sterces, anserinum adeps, sed magis visum: licet amygdala amara tota visa, erinacei terrestrius cutis acerrimo aceto subactum. Ricini oleum, rutæ enim, iuniperinum, & ijs similia. Alexander Trallianus *Aphroditi radicem, & abrotanum, seminum caprarum, carumque vngues crematos, & ex aceto in laeuorem detritas*, in Alopecie quæ non longo tempore durauit plurimum commendat. Herbam quoque *verbena*cam probe ex aceto tantam illitam, ubi partem prius intro bene infricuens, & linteolo abstersis. *Marrubium* viride tritum illine. *Parietaria* tria cum foliis, assidue locum perfricato. *Equinus dentes crematos*, ex aceto illine. *Murium insuper sterem* aceto laugatum pilos cito producit. Præstat autem locum irritare, cui remedia imponentur raphani radicibus, & cepis transuersim incisus. Statim Alopecie vitio medetur *Erinacei terrestrius cutis, pice liquida exceptus, illitusque*. Pari modo facit *ranarum cinis*, itidem pice exceptus & illitus. *Nyctes aethiæ* integre combustæ, & ex oleo leuigatæ illitæ plurimum conferunt. Atque hæcenus simplicia recensuimus. Ex ijs igitur tria remediis genera parari debent, imbecilla, mediocria, & fortia. Imbecilla, vt recenti alopecie medeantur: idque in regionibus calidis, & corporibus mollioribus delicatiusque. Mediocria, in mediocribus: & fortioribus in robustis, & vetusta alopecia. Hæc vero distinctio diligenter obseruanda est, vt duo qui passim committuntur errores vitentur, cutis scilicet exulceratio ab acerbis medicamentis: & naturæ partis humiditatis a siccoribus absumtio. Nunc composita commemorabimus, quorum hoc primum exiit, quod accipit: *Semini erua, nasturtij, nitri, singulorum drachmas unam & dimidiam. Thuris in aceto acri & valido macerati, drach. unam. Sulphuris viui, drachmam unam & dimidiam. Adipis anserini, vnguis vtriusque, drach. unam. Olei laurini, vnc. tres. Tritis terrenas, & commixtis omnibus formetur linimentum* hodie nominatum. Alterum, paulo validius, quod habet *enferby, thapsia radice, vtriusque drach. unam. Ellæbory vtriusque singulorum drach. dimidiam. Seminum nasturtij & erua, amygdalarum amararum cum corticibus visum, singulorum scrup. unum. Simpti scrup. dimidiam. Oleorum nasturtij, laurini, vtriusque vnc. duas. Cera quod satis est. Fingatur vnguentum, quo caput assidue inungatur. Sunt autem hæc & alia prædicia us similia in aere & loco aliquo calido adhibenda, & maxime, si fieri potest in loco insolato, auraque frigida destituito. Hyberno tempore in hypocausto, aut balneo medicamentis iis vsu satis est. In validorum autem medicamentorum vsu vnicæ cauendum erit, ne cutis vitra quam conuenit, concaleat: id quod tum ex colore ipsius, tum digitorum tactu deprehendes. Color namque in ea rufus magis apparebit, digitorumque contactu ipsam satis esse calidam cognosces. Horum itaque animaduersione habere oportet, periculum enim est iterum atque iterum repente eorundem vsu, cutem exuri. Quare cum ad molliora minusque fortia trāsleundum est, culus generis sunt *abrotanum cum aceto laugatum. Item sterces caprarum, caprarumque vngula cremata, si cum aceto illinantur. Rosmarinum insuper plumbi dictus cum aceto maceratum*. Ne igitur immedicabilem alopeciam inducamus, præstat, vt sæpe locus inspicitur laborans, vt cognoscamus, ne medicamentum, quod est admotum, debilius, vel acrius sit. Atque hæc in præsentia nos commemorasse satis sit. Qui plura desiderat is Galenum adeat, & syluam illorum auxiliorum inueniet.*

De defluuiis capillorum. C. A. P. II.

- F** Capillorum defluuium penuriam substantiæ pilos generantis consequitur, vt capite *Caudæ præcedens dictum est. Item, vt Trallianum attestatur, meatibus cutis denatis & rarefactis, & ex prauorum recrementorum purgatione idipsum interdum accidit. Denitas enim meatuum cutis efficit, quo minus materia, quæ crassitiem magnam habet ad pilos peruenire, & ne capilli per cutem nimium adstrictam egredi queant. Raritas autem eorundem causa est, quod pili firmiter herere non possint. Præuæ excrementa, radices*

4 Operum Leonhardi Fuchſii Pars III.

ſigna.
Curatio.

Si a penuria
ſubſtantie
nutrientis
capillos.

Ladanum.

Deſectus ex
excrementis
vitæ recu-
ratur.

Vitæ
vicio.

arro dunt, eodemque excidere efficiunt. Notis nullis ad vitii huius agnitionem nullis opus eſt, quod primo itatim obtutu deprehendi ab omnibus poſſit. Curandi ratio eorum qui deſluſio capillorum laborant, non eundem quem alopecia ſcopum habet. In alopecia enim vt vitia tus humor conſumatur, primarius eſt ſcopus. In deſluſio autem capillorum, vt capitis habitus roboretur, & boni ſucci præſentia procuretur, cuiuſq; ad denſitatem ac raritatem moderatam reuocetur. His enim tribus efficitur vt capiti boni ſucci copia adit vnde capilli enaſci poſſint, & mediocritas temperamenti cutis capitis conſeruetur. Vt autem ordine & perſpicue curandi ratio, pro cauſarum diuerſitate, a nobis tradatur, principio eius deſluſii capillorum, quod a ſiccitate ſive penuria ſubſtantie pilos nutriendis accidit, curationem prolequemur. In eo quidem deſluſio cibis humectantibus, & boni ſucci coctionis que nihil aduertantibus, & ab omni ſaltugine & acrimonia alienis & qui promte in corpus diſtribui poſſint, vtendum eſt. Frequentius etiam æger lauari debet. Balneum autem eiſo temperatum, quod non valde calidum vel ærem vel ſolum habeat. Aqua igitur temperate calida pro balneo vitatur æger, caput multo hydrelæo, id eſt, aqua & oleo, vngat, non autem ſapore, aut nitro caput abitergat. Ceterum medicamentis humectantibus aliquid mediocriter adſtringens miſcere oportet, quale eſt Ladanum, quod vtraque in ſe moderata complectitur, que huic lymphomati conueniunt, calorem videlicet mediocrem ſeu temperatum, & adſtrictionem ei proportionem reſpondentem. Subſtantia præterea tenui prædictum eſt, atque concoquit. Quamobrem oleo miſtum, quo illi ni poſſit, deſluentis capilli ſymptoma ſiſtit. At cuius conſtat ante medicamentum vium, capitis friktionem præmittendam fore, & pilorum multitudinis præfectionem: aut ſi anni tempus permittit, etiam perfectam ablationem. Sic enim obfriktiones & illius, robuſta & calida cutis redierit, & moderatam denſitatem, eam ſcilicet quæ ſecundum naturam eſt, acquirat. Ceterum conſuevit hoc vitium magna ex parte iſ qui antea ægotarunt, accidere: raro autem citra morbum, ideoque magis lubrem & vires reſcientem victus rationem requirit. Multique citra medicamentum perfecte ſanati ſunt, atq; id breui. Compoſuerunt tamen nihilominus Medici eius gratia medicamenta mediocrem cuti denſitatem indolentia, ita tamen vt ne ſimul eam refrigerent: vehementer enim adſtringentia, omnino etiam refrigerant, & aſſuxum nutrimenti repellunt, quo minus quam par eſt ſuppeditato, capilli deſluunt. Huc itaq; medicamentorum ratio dirigenda, vt ſanguinem qui aſſuit, non ſolum non prohibeant, ſed etiam alliciant, ſenſim autem & leuiter contrahant, laxatamque & reſectam cutem conſtringant. Tale autem, vt diximus, ſuapte natura eſt Ladanum, quod quia ceræ ſimilem conſiſtentiam obtinet, liquorem quandam deſiderat conuenientem & largum, vt capiti illi poſſit. Præſtat autem huiuſmodi liquorem ſimilem eſſe Ladanum, hoc eſt, ex contrariis facultatibus mixtum, attractoria inimirum, & contrahente. Eius generis eſt oleum lentifcinum, ſuapte naturæ tale exiſtens, quale eſt ipſum Ladanum. Nullum itaque medicamentum, Galenus etiam teſtante, in fluentibus capillis præſtantius eo quod ex ladanum & lentifcino mixtum conſtat. Maniſeſtum autem cuius eſſe arbitror raſis craſſius eſſe medicamentum ad mouendum: conſos autem & perfectos capillos habentibus liquidius. Quod enim comam nutrire non conueniat, donec aliquis curetur, euidenter eſſe omnibus puto. Quod ſi vero ex meatuum raritate, & propter humores, qui diſcutiuntur, & excrementa quæ ipſos nutriunt, extra cutem elabentia, capilli largius deſluunt, non alienum erit tunc vt remediis quæ refrigerant, & adſtringunt libetalis, ſimilique victu, qui nihil acre in ſe contineat dilandis apertendis que meatibus efficaci. Læſa igitur, Tralliano auctore, malua, oua, panis ſiliginem temperata, aut frigida aqua irrigantur, pepores, cucumeres, piſces dura carne prædicti, niſiſa caro non pinguis, & maxime bubula, pedes bubuli prædicti conueniunt. Vno autem hi, & poſſimum veteri abſtineant. Balneum veto ingreſſi, aqua frigida caput perſundant, ac enſius in frigida ſolium deſcendentes, ex fluente canali aquam frigidam copioſe capite recipient, roſaceo ipſam, aut quod ex oliuis immatutis expreſſum, aut melino, aut myrteo perungant. Galenus quoque myrtinum in vicem lentifcini ladanum in hoc calu permiſcendum eſſe tradit. Eſt autem ladani dimidia pars, cum integra olei myrtini parte commiſcenda. Licebit etiam aliquando in ætate frigida, atque adeo temperamento capitis natura frigida, & hyberno tempore, calefactionis facultatis adhibere oleum, quale

De Medendis Morbis Lib. I.

3

- A** quale est nardinum. Laudanum autem in duplici vase liquefaciendum, & vbi liquefactum fuerit, cum nardino oleo permiscendum. Verbenaca quoque recta virens cum radicibus in omphacinum oleum coniicienda, atque vbi per plures dies infusa fuerit, oleum excolato, eoque singulis diebus vtore. Quod si virens defuerit, aridam vna cum radicibus contundito, & per angustissimum cribrum concernito, dein oleo commixto vt strigmenti crassitudinem accipiat, in vas xreum reponito, atque vbi compotuerit, pro oleo similiter vtitor, nulli enim remedio cedit. Porro si ob meatuum densitatem pilorum generatio prohibeatur, tunc iis potius vti conuenit, quæ rarefacere possunt, & inmoderate calefacere. At quia rarefacientia materiam quidem euocant, non sinunt autem ipsam inhzere, & pilos nutrire ac generare, miscere igitur conuenit tum quæ cñtem roborare, cum quæ densare sensum queant, vt mista in remedio facultas esse deprehendatur, nempe attractrix simul & alitrix retentrixque: ex præsentī quidem caliditate, attractoria: ex frigiditate vero retentrix. Multa igitur sunt medicamenta; quæ vires ex vitiis naturis conlatas habent, quæ iam attractoriam, vt thapsia, sinapi, euphorbium, cæpæ, & similia. Quædam adstringentem, vt oleum myrtinum, omphacinum, lentiscinum. Ex his igitur simul mistis, prout affectus postulat, medicamenta componenda erunt. Laudantur inter alia, quæ sequuntur. Laudani partes duas, adstanti partem vnam vni myrtinoque oleo excipi, & vbi mellis consistentiam consecutum fuerit, caput ouis balneum, & post illud ita ungito. Aliud. Laudani & absynthy partes æquales, hascæ iamper decem linculo illigato, & in oleo ad dies quinque macerato, ex eoque caput illinito, & neque capilli defluunt, neque sursum habebunt. Est Archigenis remedium. Nigella vlla, aqua que sub illa & illito plurimum commendatur. Huius namque vsum ad efficiendos pilos, siue capiti, siue in mento, inprimis autem si superciliis adhibeatur, mirifice confert.

Densitas
meatuum
curatio.

De tincturis capillorum. CA. P. III.

- E**t si veteres etiam Medici, Galenus potissimum, tincturæ capillorum parum æqui fuerunt, quod non tam ad ornatum honestum, quam ad malitiam hac plerique vii sint: tamen quum interdum regis ac principes honestæ mulieres vt maritis suis gratificetur illam Medici expectant, operæ pretium metasturum consilio, si pauca quædam eius generis, & parati facilia subiiciam medicamenta. Primum autem ea, quæ capillos denigrant commemorabo. Denigrant itaque capillos, corticis Salicis faciem cum oleo affricato. Summe autem denigrat. Aliud Galieno, acuto, squama ferri, chaichanti, aluminis a quales partes in vino pueri vixerem non experti diem vnum macerato: deinde pila detestabili nito, & caput linculo ad triduum ligato. Aliud. Vini nigri vetustissimi uncias tres in plumbum vas coquito: & scabis seu rosura plumbi uncias duas in eo dies quindecim macerari sinito: deinde oleum primi honoris supersunde, & subigens illinito. Aliud. Gallæ cellas irritas capillis nocte ac die illinito. Allecto autem surgens aqua frigida abluito. Aliud. Nucum vernarum corticis, uncias tres. Radici corticis, illicis uncias sex, alias tres. Vini nigri, sextarios tres. Decoquito ad tertias, exprimito, & quod reliquum est cum olei myrtini sextario vino subigito. Vtitor quotidie. Aliud Retrementum ferri, ac plumbum in aceto cocto ad tertias, illi ne cetera oleum. Aliud. Radicem capparitis irritam cum muliebri lacte ad tertias coquito, & ad noctem illinito. Flammæ capillis rediunt qua sequuntur. Lupinos crude ex aqua illinito. Aliud. Lupinorum cortices, ac parum nitre in aqua ad quadriduum macerato, ac vtitor. Aliud. Myrrha partem vnam salicis floribus tantandem, diligenter lauuato, & redigito ad strimenti crassitudinem: ac caput vbi exterseris medicamento illinito, sinitoque noctem & diem, & deinde abluito. Aliud. Luthargii, drachmam vnam. Terra cretica, drachmas quatuor. Cileis vina, drachmam vnam. A qua ad stringentorum redigantur crassitudinem, & illinantur, opponanturque Beta solis ad dies tres vel quatuor, deinde medicamento abluito. Vt capilli nigri fluascent, recipe vini fecem, in balneo sordis mæstito, & in cerati spissitudinem redacta, vbi dormire volueris illinito, & mane capilli fluascent. Vt autem auri colorem referant. Accipe, aluminis, drachmas sex. Sandaracha drachmas totidem. Herba rubia, drachmas octo. Croci, drachmas duas. Lixiuu plectery sextarios quatuor. Lixiuu rubi & rubiam contusam ad dimidius coquito, & liquorem exprimito, & cum hoc alumine, sandracham, & crocum diluito, & in vas vitreum mistito. Vtus autem temporis præscripti illi nito. Vbi vero combiberis ex sanguine, hordei, ac cuminis decocto abluito, ita vt aqua tepida sufficienti saponis addito prius ablueris. Aliud. Saponem gallicum cum aqua singulis

Quibus pil
nigrescunt.

Quibus ca
pilli flau
scent.

Quomodo
capilli au
rei fiant.

6 Operum Leonhard. Fuchſii Pars III.

balneo affricet. Aliud valde præſtans Rhœi rubri, viniam vnam. Gallorum, drachmas duas. Stercoris muris, drachmam vnam. Adianti, Manipulos duas. Abſinthij, Manipulum vnam. Lupinorum decorticatorum, drachmas duas. Aquaſcensaries tres. Omnia in vas vitreum coniecta ad duos nouem macerari ſunt per diem biu agitando. Vñ vero poſtulant, quod ſatis eſt excolato, & in hoc ſpongiam imbutam capilli affricato, & humectatos combibere ſunt. Vbi vero reſiccatoſuerint, ſaponem in calida aqua diſſoluto abluo. Vt capilli albi reddantur, Verbaſci albi ſorem comburiſſe, & aceto maceratam ſubigito, coque pilos abſtergito. Aliud Verbaſci ſeminis, & luminis rotundi, corticis raphani, ſingularum vnciam vnam. Centundis, miſcetque glutinis ramuris drachmas quatuor, ac viſitor. Ceterum hic ſubueniendum nobis erat caput de medicamentis pilos corumpentibus. Verum quia eorundem noſtra ætate vſus rarus admodum eſt, & Galenus libro primo de compo. medicamentorum localium cap. 27. copioſiſſime eadem deſcripſit, eorundemque triplicem differentiam enarrauit, ac quorum vſus periculofus, quorum vero minime diligentiffime iudicauit, ideo lectorem ad illum ablegare maluius.

De portigine. Cap. IV.

Portigo vitium eſt, in quo tenues ac ſuſurſus aequamula ex capitiſſi cure, nullareſiſſa exulceratione decidit: vnde etiã Grecis *τρυπάνιον* appellat, qualiſi ſuſurſus ſignificat, vñ illis ſuſurſus ſignificat. Qñi barbaram ſectantur Medicinam *μυρσους* vocant. Naſcitur hoc ſymptoma a vitiatis ſeroſis humoribus, hoc eſt, vt *Trallianum* interpretatur ex Galeno, a prauo humore pituitæ ſaliæ, aut biliſo, & melancholico ſanguine ſurſum in caput elato. No-
tæ ex iſis, quæ in vitii deſcriptione diximus, manifeſtæ ſunt. Viſus ratio talis ſit, quæ nec craſſos, nec vitiatos alios humores procreet. Sint itaque bonam aluum facientia, quibus veſcutur ægrotantes. Coctioſis quoque inprimis cura habenda eſt. Deambulationes lenes plurimæ mane & veſperi optimæ ſunt. Vinum prodeſt album & tenue. Ira, indignatio, mora in ſole, & vehemens refrigeratio, omnia denique quæ caput impleere vitanda. Quod ad curandi rationem attinet, ſi vniuerſum corpus vitiatis humoribus plenum fuerit, initio illi anteaquam capiti medicamenta adhibentur, medicamentis purgantibus, maxime pituitam ducentibus, vacuandum erit. Purgandi itaque iſi, qui hoc vitio laborant, eodem quo in alopecia modo. Quod ſi vero nullum in vniuerſo corpore recrementum conſpicitur, ſola medicamenta diſcuſſoria & exreſoria capiti vitiatis humoribus reſerto adhibenda erunt, vt ſcilicet hoſiſſos abſumant. Sunt tamen, qui prædictis medicamentis quædam adſtringentia admilcenda eſſe putant, vt per ea pars laborans roboretur, ne facile in ſeipſam influentes ſeroſos ac vitiaſos humores recipiat, ſed teſiſtat, eoſque repellat. Abitergent autem a capite portiginem, amygdalæ amaræ decorticate, cum aqua aut aceto aſtrictæ: quumque exatuerint, capilli calida abluendi ſunt. Aliud. *Atalæum ſylueſtre*, quam alio nomine *Altheam* vocant, in aqua marina, donec decima pars reſiſſa fuerit, coctam terito, & affricato. Detergebitur etiam caput, ſi intro aſpergatur, & fricetur vel ſale, vel lixiuio parato ex cineribus cum aliqua quantitate vel mellis, vel ſucci betæ, vel porri. Aliud. *Nitri ſpumam*, & aramentum ſuſorium, aquis paribus cum vino ter antea quater in meſe affricato. Hoc adeo vehemens eſt, vt neque in poſterum portigo regeneretur. Aliud. *Cimolia* & ſulphuris vini, aquas partes contritas illine, tum lupinorum decocto, vel ſaburum, vel lixiuio extradiſſi betæ & brœſſicæ parato, leniſſo. Aliud. *Lathargijs*, olei ruſci, aceti partes aquæ iungito. Radicis cucumeris ſylueſtris decocto vtere. Aliud. *Scillam affuſo*, & vniſſeſſeſſe caperis ſuccum exprimito, & oleo comixtum illine. *Sylueſtre ſpida oleo eliquato* illinito. Aliud. *Cimoliam aqua pramadeſallam ad Betæ ſuccum admilce*, illine, & donec reſiceſcat ſine, deinde abluo, & itum cum vino ac oleo tere ac illine: poſtridie vero ſpaphidem ſylueſtre cum oleo illine. Aliud. *Nitri, facis vini ruſci, puniceis, pariſſione cum vino aut aqua calida affricato capiti*. Aliud. *Foham vna cum cortice molito*, & cum Betæ ſucco viſitor. Aliud. *Cimolia, vnciam vnam. Nitri, radicis bryonia, corticis radicis cucumeris ſylueſtris ſucci farina ſaburum, ſingularum vnciam dimidiem. Farina hordeacea ac lupinorum, vñſque drachmas tres. Singulis ſcorſum leuiſſime tritis, ac vñſis in balneo viſitor*. Ad humidiores autem portigines muria, aut lupinorum decocto ad abluendum vitior. Eſt enim hoc medicamentum experimentis & vſu comprobaturum.

A *De phthiriasi. CAP. V.*

Capitulum non est nisi pediculorum in capite, vel in toto corpore, potissimum in locis calidis, & humidis, ut sub alis, circa collum, & aliis eiusdem partibus frequentibus pilis vestitis, acuatim facta procreatio. Latinis *pediculatio*, & *morbis pedicularis* nominatur. Fir hoc vitium ex multis moderate calidis humoribus nec ad tantam caliditatem progressis, ad quantam acres serosi humores perveniunt, in profundo cutis collectis. Quapropter manifestum hinc fit, pediculationis affectum in profundo cutis fieri, ubi etiam pediculos generari contingit, haud in superficie cutis, in qua porrigi consistit. Notis ad eius vitii agnitionem nullis opus est, quod pediculi affatis in capite alis-que corporis partibus procreari, satis quale hoc sit vitium indicent. Ceterum quum in profundo eius vitii & symptomatis causa hzreat, ut iam commemoratum est, medicamenta quae hanc sanent requirit desiccantia, & quae meatus cutis relaxare, & ex alto trahere ac vacuare possunt, magis utique quam ea, quae porrigini conveniunt, quo facilius qui geniti sunt, simul cum materia eorum exeant, & medicamenta promius in internam partem penetrant, qualia sunt quae a nobis subiiciuntur. Ante tamen eorundem usum, medicamentum quod vitiaros corporis aut capitis humores vacuare possit proponendum esse, notius est, quam ut a nobis pluribus dici debeat. A purgatione autem ad localia confestim veniendum erit, inter quae pediculationi laborantibus id maxime confert, quod *Staphidis sylvestris habet vinciam unam. Sandaracha, hoc est, ut hodie officina vocant, arsenici rubri, misri utriusque drachmas duas, cum aceto & oleo veters capiti illinito.* Aliud. *Oxyloparbis radicem cum oleo eodem modo illinito.* Aliud. *Ellaborum album, staphida sylvestrem, & nitrum pari pondere, cum oleo in balneo utitur.* Aut cum aqua marina, aut micracamuria cum aceto persunditur. Quod si nuditas pilorum adsit, quod accidit ubi tanta pediculorum copia in capite procreatur, ut laborantes caluescant, depalsti nimirum a pediculis humoribus unde pili nascuntur, sylvestrem staphidem cum oleo & aceto tritam imposito, hacque se quod voluit semper esse affectum Paulus scribit. Aut alumen tritum cum oleo illinito. Confert etiam caput lavare lupinorum, aut tamaricis aut florum stachadis, aristolochiae rorunda vel longa radice decocto, aut aqua tepida cum aceto. Aliud. *Hederae succum melle mixtum illinito.* Aut *Perdicij, parietariam alio nomine vocant, succum dermisuris illinire praedest.* Aliud. *Lignis florum cum vino tritum, capitis ac totius corporis affricato, ubi cabitis ire volueris.* Oleum quoque laurinum, aut raphaninum inunctum auxiliatur. Lupinorum in super & baccharum lauri decoctum pediculationis medetur, si quis caput detergeat. Prodest etiam ipsis potius. *Ally drachm. duarum, cum Origani trisi drachma una ex aqua mulla.* Ad omnia vero genera pediculorum occidenda nullum est praestantius remedium, quam argentum vivum in quacunque parte fuerint. Quare eius vnguenti quod lib. 2. de compo. medica. descriptissimus numero 29. vltus optimus erit.

Nota.

Causa.

Leesli.

D *De achore & fauo. CAP. VI.*

Achor Græcis vitium est, quod in capitis extrema cute oboritur, nempe vlcusculum tenuibus admodum foraminibus perforans, per quae modice glutinosa erumpit ac ferit tenuis humiditas. Plinius manens capitis vlcus appellat. Nostræ ætatis Medici a tinearum in vestibus similitudine, tineam capitis appellant. Siquidem ut hæc multo, eoque tenui inorsu & erosione vestes perforant: sic capitis cutem ut dictum est, achores. Simile autem huic vitium est, quod Græcis *emim*, Latinis vero *Fauus* dicitur, in eo a priore vitio differens, quod maiora & ampliora foramina habeat, per quae humor mellis, quod in fauo est, similis erit. Generatio ipsius ex humore mixto est, qui partim tenuem saniem & mordacem, partim vero crassum succum in se habent. Tenuis itaque humor, utpote mordax, primum quidem cutim vellicat ipsamque ad scalpendum ægros cogit, progressu vero temporis ad pruritum tum tumor augetur, tum foramina circa ipsum constitunt, unde disrumpitur cutis, & vlcera prodeunt. Paulus Ægineta vitium hoc ex nigra sa salsaque pituita nasci tradit. Alexander Trallianus excremento interim bilioso, aut putuoso, interim etiam melancholico creati affirmat. Quod si igitur ea, quae excernuntur & emanant, tenuia admodum consistentia fuerint, & colore subpallida, a biliosa sanie procreari vitium indicio sunt. Sin tenuia non sint, sed crassa potius ac glutinosa, pituitosus superat sanies, & ab illis vitium nasci indicant. Quod si nihil horum fuerit,

Achoi.

Maceris capitis vlcus. Tinea capitis. Empion. Fauus. Causa.

Nota.

8 Operum Leonhardi Fuchsi Pars III.

Vitium.

Curatio.

loca vero, vnde humor manat, dura magis, cutisque superficiem eminentia & angustiora appareant, vt nihil, aut saltem exiguum ab eis effluat, melancholicum subesse, quo vitium hoc oritur excrementum purgato. Præterea amarorem sentiunt, quibus causæ est biliosa: saltem vero qualitatem, quibus pituitosa: acidam autem, quibus melancholica. Iam eandem ex tactu etiam internoscere poteris. Calidior enim tibi apparet, in quibus est biliosa sanies. Frigidior autem, in quibus pituitosa: minus vero frigidus, vbi melancholica fuerit. Victus ratio in hoc vitio ex cibis boni succi constare debet, quo recrementorum prouentus tollendus venit. Omnia quoque acris & salsa vitanda, periade atque crassa & glutinosa. Curandi ratio in vitroque vitio a vacuatione auspicienda venit. Si enim corpus vniuersum humoribus abundauerit, adeoque plethoricum fuerit, sanguis initio mittendus erit. Sin caeochymum & vitiosius repletum humoribus fuerit, purgare id prius oportet, postea ad particularia medicamenta transeundum. Non enim solum corpus frequenter & fortiter, sed & caput purgandum peres, quæ naribus induntur, & quæ per os pituitam extrahunt, vt in alopecia etiam curauone dictum est. Quod si exiguum est vitium, sola localia & particularia nominata remedia, citra totius corporis vacuationem sufficerint. Conueniunt autem ipsi propter crassitatem & lentorem humoris eos generantis, medicamenta quæ hunc incidunt, quæque facultatem discutienti & reprimendi necessario habent. Incipientes tamen achoros, vbi corpus vniuersum excrementis caruerit, cum adstringentibus reprimentibusque tantum curare licebit, vt sunt myrti bacca, rubi folia illita, plantago, polygonum, salicis folia, & similia. Nec otiosum est, quod diximus, vbi corpus vniuersum excrementis caruerit. Hac namque ratione errori quorundam occurrere volui, qui in caeochymis corporibus, in vitii huius initio humorem vitiosum adhuc influentem repellendum esse censent, quod certe tutum nequaquam est. Siquidem periculum, ne humor prauus inrus repulsus, parotidas, vel alios periculosiores tumores in alia parte excitet. His igitur quæ mixtas facultates habent, atque adeo affluentis humores reprimunt, eos vero, qui in laborante parte continentur, concoquunt & discutunt, in morbi augmento potissimum vtendum erit. Acetum itaque, quod ex incidentium & attenuantium ordine existens, vltra hoc, quod discutit, præcipuum quiddam in se habet, quo reprimat, ac quod influit depellit, vt pote quod substantia sua modice calidum est, plurimum vero frigidum, & partium tenuium, quemadmodum Galenus libro primo de simpl. medica. facul. capite decimonono & duobus mox sequentibus capitulis admodum demonstrauit. Sit autem acetum exquisitè acre, in quo nulla penitus vini qualitas appareat. Hoc ipso quidem medicamenta metallica nominata, vt sunt adama, liubar gyrum, pampulyx & similia, alias aliud imbuens atque diluens, moderata vtique, in quibus incipit & adhuc exiguum est vitium: fortia vero in maioribus & diuturnioribus, fortissima autem in iam inueteratis, & iis quæ ægerime curantur. Tollendi vero prius capilli sunt, antequam medicamenta localia adhibeantur, & a leuioribus semper incipiendum, præsertim si dolor simul cum achoribus adsit. Supra caput autem non adstringentia frigida & humida, sed ea potius, quæ multum siccant, & humores viuos coaceruatos absumunt, densando corroborant. Derasis igitur capillis, caput bis terue, aut etiam sæpius die fouendum aqua calida, in qua Myrtili bacca sint decolla, vel rubus, vel bryonia, vel lenticula, vel amari lupini, vel asparagi radix. Quum vero plus saniei emanat, salicis folia cum aqua rectè illinuntur, vel lenticula cum melle. Vnguenta vero parabis & lenia terra, spodia, pampulyx, liubar gyro, cadmia, adamas, & resacio. Prodest quoque senegraci decoctum affricatum. Malua item cum vino & farina subacta herodeacea. Aristolium denique cum farina senegraci & vino impostum: Quod si neque ex iis vitium quiescat, medicamentum ex charta cum aceto dilutum illinendum. Est autem eius descriptio li. 5. de compo. medica. general. cap. ultimo de aridis cicatricem inducentibus, apud Galenum. Siccum autem dicitur, quia vlceribus inspergitur. Additur autem acetum, vt non solum siccandi, verum etiam repellendi facultatem obtineat. Galenus sola charta exulta, & aceto diluta locum laborantem illinens, eoque vno & item altero medicamento vsus, non nullus perfectè sanitati restituit. Conuenit autem hoc medicamentum iis maxime, qui duræ sunt carnes: Ceterum sunt medicamenta viribus omnino robustissima, adeo vt etiam achoras ex crassis & lentis humoribus abortus, cõtumaciterque cum infarctis vacare queant.

atq;

- A** atque id ita valide, ut etiam si scirrhusum quid habeant, id ipsum vacuare valeant: licet ipsum cutis habitum in eiusmodi prauitatem ducant, ut id quod influit, corrumpant, licet benignum sit. Talia sunt *sal, vini fax vlla, sendaracha sine arsenicum rubrum, calx visma, sal calidorum & siccorum animantium, & id genus alia*. Prudenti igitur viro opus, & qui curandorum morborum substantiam, & agri naturam probe norit. Hoc vero efficacissimum est, quod accipit, *auripigmenti rubei, calci vna lota quinquies, ana vnam vnam & dimidiam. Foliginis furni, vinctam dimidiam. Vitrioli, aluminis, ana drachmas duas. Aly tenuissime tritis anisundem. Tartari vocati, drachmas tres. Cum melle & aceto subigantur femulque miscantur, & ad firmam lintimenti reducantur*. Præterea qui medicamentorum facultates non tantum iuxta genus, sed & iuxta quantitatem cognoscat, quo singulis diebus quali præsidio opus sit, coniecer. In augenda namque aut imminuenda medicamenti quod prioribus diebus ad motum fuit facultate, quantum affectus ipse indicat, congrua curatio consistit. Porro qui optime discunt sunt *hij radix affricta, refinari- num cum vino & aqua, & lupinorum amarorum, aut sylvestris encumeris radices decoctum affric- tum, rusa folia, serena feno-graci cum melle, thus ex aceto illitum, malicorum cum oleo laurino illitum*. Quæ hætenus ad A. horas dicta sunt, ea quoque fauo conueniunt, neque enim inter se, nisi ratione maioris & minoris differunt. Quod si vero quis plura iam commemora- tis remediis scire cupit, is librum Galeni primum *de compo. medica. local.* adeat, & voti sui haud dubie compos erit. In summa, quæcunque ad alopeciam scripta sunt, ex adassatis & fortiter discutientibus vlcera capitis manantia sanare possunt. *Sulphur per se, vel cum alio appositum, in corporibus robustioribus efficacissimum est remedium. Turtior vero eius vius est, si vel bolo armeno, vel calcenonies aut decies lota, aut terra lena- ma cum aceto permisceatur.*

De dolore capitis. CA P. VII.

- V**ix vlla pars corporis humani æque doloribus oportuna, ut caput est. huc enim facile aliquid ex infernis corporis partibus exhalat. Ipsa quoque pars, propriæ constitutionis atque temperamenti occasione inualida, non difficulter doloris causas in se admittit, ac gignit. Doloris vero capitis Græcorum Medicis tres sunt differentiæ, tribus distinctis nominibus appellatur, prima *supra-nazalis*, altera *supra-nasalis*, & tertia *intra-nazalis*. Dicitur. De quibus ordine disiletemus, a *supra-nazalis* exoritur, quæ non est *intra-nazalis* totius capitis laboriosus sensus, non curando an per se accidat, aut alterius affectus symptoma & comes sit. Adiecta vero vox est recens, ut differat a cephalga, quæ capitis est diuurnus, & difficulter solubilis, Galeno libro tertio de labo. locis auctore, dolor, *visus loco laurino dicemus*. Quum vero additum est *totius capitis*, hemi-crania excluditur. Dil gèter autem considerandum erit, nunquid intra caluariam affectus consistat, vel extra. Dignosces vero id ipsum hoc modo, Galeno loco iam citato teste, si dolor ad oculorum fundamenta extendatur, intra caluariam affectus hærebit. Quippe ab ipso cerebro, & ab vtraque eius membra- na, atque a valis quæ in ipsis continentur, veluti germina quædam ad oculos deducun- tur, ut prompte ea de causa vsque ad ipsos dolor exieundi queat. Sin eouique dolor non extendatur, extra caluariam affectus erit. Huius causæ complures sunt. Nunc enim ex sola simplici intemperie citra humores accidit, iam vero ex horum qualitate. Inter- dum etiam ob plenitudinem humorum, quæ *intra-nazalis* Græcis dicitur, quæ distentionem creat, contingit: præterea quum humores liquorum & vaporum transitus obstitue- runt. Adhæc fit, ubi ob imbecillitatem in quibusdam capitis partibus flatuolus spiri- tus innascitur. Interim quoque propter aliquam causam externam, quam *trans-nazalis* vocant, id est, *præincipientem*, Græci appellant, nempe ardore solis, frigore, ebrietate, & ictu capitis dolor procreatur. Alexander Trallianus has omnes causas in duas contraxit: *trans-nazalis* nimirum & *intra-nazalis*, externam & continentem. Recte autem dolori capitis, vt pote qui per se symptoma est, causas continentes assignat, quod is affe- ctus, vnde oritur, ita connexus sit, vtilis præsentibus ipse etiam addit, iidem vero subla- tus, ille vna tollatur. Quo autem pacto singula iam commemoratæ causæ dignosci valeant, iam dicemus. Si ex simplici & nuda intemperie capitis dolor excitatur calida, vel frigida, dolor ipse vehementissimus est, propterea quod a maxime actius qualita- tibus generentur. Verum si calida fuerint intemperies, propter vehementissimū dolorem,

Dileuicilia

Pauencia-
dia.Doloris ca-
pitis tres
differentes q.
supra-naz-
alis.Nunquid
intra cal-
uariam vel
extra caput
infectio.

Causa.

Signa
intempe-
rie calida.

10 Operum Leonhard. Fuchſii Pars III.

capitis etiam calor aderit, quem admota statim manu primoque attactu percipies ac deprehendes, ac oculotum rubor: frigidis præterea asperginibus siue perfusionibus ægri delectantur, exque illis maximum sentiunt adiumentum: præcessitque magna ex parte causa aliqua externa calefaciens. At si ex frigida intemperie dolor excitetur, contrariis notis & signis gignoscitur. Nam licet vehementissimus quoque sit dolor, tamen caput tactu calidum non sentitur, neque facies, neque oculi rubescunt, nec arida, & collapsa apparet, sed contra plena & pallida: præcessitque externa quædam refrigerans causa, & frigidis læduntur ægri, neque illis oblectantur. Sin ex siccitate ortus fuerit, moderatus erit capitis dolor, propterea quod siccitatis vis in agendo tardior & imbecillior sit: aridior quoque deprehenderetur capitis cutis, & aliqua desiccans causa præcessit. A siccis quoque præsidis non modo non iuuatur æger, sed noxam suscipiunt. Humidam autem intemperiem, quod humiditatis actio sit debilissima, nec tanta vis, ut dolorem ex se excitare possit. Quare hanc per se nullus consequitur dolor, nisi calori, aut frigori, aut humorum plenitudini, aut acrimoniæ coniuncta fuerit. Quod si vero non ex simplici sit nuda tatum intemperie capitis dolor excitetur, sed cum humoris affluxu, itidem suas notas habebit, quas singulas suis indicabimus locis. Qui ob causam quampiam externam proritantur capitis dolores, proinde ex ægri, seu astantium relatione percipi possunt. Ceterum quod attinet ad doloris capitis prognostica, non esse opus arbitror ut ea ordine persequamur, quod illa quiuis ex aphorismorum sectionib. Hippocratis colligere possit. Quam quidem ob causam neque in reliquis morbis ea persequemur. Quum vero hæc generatim de dolore capitis a nobis dictum sit, reliquum est, ut ordine de singulorum affectuum dolores capitis excitantium curationibus, initio a calida intemperie sumpta, agamus.

De dolore capitis ex calida intemperie nato. CA. P. VIII.

Capitis dolor ex calida intemperie natus qualitatis genitus, sit a solis ardore, flamma vicinitate, motu immodico, balneis, ira, furore, odorematis, & alijs calidis affectibus. Omnes qui hoc modo laborant, domum, in qua decumbunt, natura frigidam postulant, aut eam, quæ nostra industria sic præparata est ex floribus & germinibus frigida facultate præditis per aream domus sparsis, & humi fufis, rosas videlicet, violas, nymphaeas, vitium capreolis, rubi ramis, & id genus alijs. Refrigerabitur etiam, si humi aqua frigida proiecta sit, & de vasis in vase transfundatur. Euitandus contra aer calidus, qui quæ nulum perflatum recipit, calidisque vaporibus refertus est. Cibus sit exiguus & natura frigidus, qualis est lactuca, portulaca, myrsum. Panis ex aqua frigida læuus, psisana succus. Carnes pullorum, gallinarum, ac pullos columbarum cum omphacio siue agreſta unguis dicta coctis, gallinarum testes, & ala. Pisces petrosi, & teneris carnibus præditi. Malum puniceum, vicia passa, pyra, & mala quæ apia dicuntur. Abstinendum vero ab his, quæ proprietatem quandam habent capitis inducendi dolorem, ut sunt palmula, olina nigra, & lactis usu. Pro potu vero aqua omnino vitandus est, a vino vero abstinendum. Quod si vero ex eius potu ventriculus subuertatur, in ea parum cinamomi decoquatur, aut seminum coriandrorum præparatorum: vel misceatur cum aqua succus malorum puniceorum acidorum, seu acidum ferapium, vel oxyſaccharum. Quod si nec his bene habebit, & aquam bibere non possit, permittendus ei erit ex aquoſis vinis aquoſus potus, Galeno etiam auctore. Ceterum somni & quietis cura in primis habenda, quæ propter si consuetudo etiam longiores sint non nocent. Contra vigilæ, præsertim immodicæ, penitus vitandæ. Alius excrementa, si natura non excernantur, lenibus clysteriis ptoritanda sunt: ex eorum enim retentione capitis dolor vaporibus prauis sursum elatis, augetur. Pari ratione lotium nequaquam diu retinendum erit, sed ab eo confestim a somno se exonerare debet æger. Exercitationes, frictions, solem, balneaque fugiat. Animi perturbationes, iram potissimum, & furorem vitet. Proinde clamor, contentio, omnique mentis perculſio fugienda erit, & in bona animi firmitate degendum. Porro dolorem capitis a nuda calida intemperie ortum curant, quæcunque citra vehementem adstringentem facultatem refrigerant, tenuiumque partium substantia prædita sunt. Adhibenda vero sunt repellentia in hoc capitis dolore & alijs liquida maxime, tum quia facilius ob tenuitatem penetrant, tum quod minus quam vnguenta, vel linimenta, vel emplastra & ca.

- A** & cataplasmata, quæ tenacius adhaerent, suo contactu caput calefaciunt. Igitur initio nihil præstantius, quam si *torrefacto probe apparato caput persundere atque erigere vel tui-
genda linteas rarasve pannos in hoc oleo vehementer ag-
tates apponere.* Ex æstiuo quidem rem-
pore frigido existente. Quod si ille i parum aceti adiectum fuerit, longe maiorem, &
penitus penetrandi, *Tralliano teste*, vim induet medicamentum. Locus autem persu-
sionis seu irrigationis, illitionisque est iuxta frontem, ubi pilosum caput esse desinit, vt
hodie facere consuevere Medici. Occiput autem medicamentum hoc non tangat,
quod refrigerantia citra molestiam, quod isthinc spinalis medulla initium sumat, ter-
re non possit. Inter omnes autem capitis partes, ea quæ in synypite iuxta coronalem
futuram existit, ob articulationis laxitatem, & ossium tenuitatem & raritatem, sunt
eaim inter suas squamas fistulosa & cauernosa, medicamentis imponendis maxime
idonea, quod illic facile ruin caliditas, tum frigiditas medicamentorum omnium, quæ
adhibentur intro diffundatur. Quare siue refrigerare aliquando ex solis æstu, aliusque
ex causis calorem contractum: inue calefacere frigiditatem oporteat, apertissimus erit
capitis iuxta synypitæ locus: Conferunt etiam *succiplantaginis, solani, solorum vitis, so-
lariarum salicis, vallis summitatum rubi, vel pyra syluestris, sicum aceto permixti apponantur.* In de-
fectu autem succorum liqiores stillatini refrigerantes cum rosaceo mixti, vel oxyrho-
dino adhiben-
h sunt. Proximum a rosaceo chamæmelinum locum habet, in his ma-
xime corporibus, quæ vehementi refrigeratione non indigent, qualia sunt mulierum
eunuchorum, puerorum, & eorum, qui molli carne præditi sunt, albumque colorem
obtrineant. Si vero vehementi refrigeratione opus erit, *semperniat, aut lactuca, aut por-
tulaca, aut polygani, aut vna acerbis & immixta, aut capreolarum vitis, aut solani, aut sirsidis,*
aut psylli succum adhibere conuenit. Atque hic silentio transire non possum, quin Tral-
liani locum mitissime deprauiatum emendem. Nani libro primo capite decimo inter alia sic
scriptum legitur. *Quod si eadem amplius sperare videamur, etiam refrigerantium vim intende-
re conemus, admixtum de semperniati succum, & vna, id est, serpylli &c.* Nemo autem est facul-
tatis scriptum adeo ignarus, vt non animaduertat, Serpyllum falso inter refrigerantia
medicamenta recenseri, quum in calefaciendo tertium attingat ordinem. Quod
igitur pro *serpylli* sit legendum *solani*, fictionum affinitas in primis hortatur. Idem etiam
Galeni locus, qui est in libro secundo de compositione medicamentorum locali, capite tertio & a
Tralliano ad verbum transcriptus, clarissime euincit. Nimirum ibidem inter alia sic inquit
seris. & vna, id est, solani, & vna, id est, solani, & vna, id est, solani. Alexander vero
Trallianus ita loco supra ostenso ait: *et vna, id est, solani, & vna, id est, solani, & vna, id est, solani.*
Qui locus quum ad verbum Galeni trans-
scriptus sit, dubium non est, quin in eo falso *serpylli* ab imperito rerum Medicarum libra-
rio pro *solani* scriptum sit. Prædicta vero medicamenta, capiti ad mouenda, ad eum pa-
rari possunt modum. Accipe olei rosacei, vncias duas. Liqoris stillatitij rosacei, vnciam vnam
& dimidiam. Aceti optimi semunciam. Aut recipe liquoris stillatitij semperniati, lactuca, solani,
singulorum vncias duas. Liquoris stillatitij chamæmeli, vnciam vnam cum dimidia. Aceti, vnciam
vnam. Immiscuantur inter se singula, & salsicij sibi imbuta & modeste fronte aut synypitæ
imponantur. Ceterum refrigerabis, æstiuo potissimum tempore, quæcunque adhibere
voles medicamenta, aqua summe frigida illa mergens: aut si huius copia non derur, ni-
uem aut glaciem vasculo circumponens, quemadmodum Galenus libro 2. de simpl. medica-
ment. facultat. capite septimo. Et libro octauo medendi methodo, & loco paulo ante citato. Iam
dicta igitur medicamenta etiam si humorum aut vaporum copia ad caput impetum
fecit, præclare auxiliantur. Licebit etiam aliis oleis refrigerandi vi prætitis vi, qualo
est violaceum, ex acerbis, & nymphæ, & cum illis alia quædam refrigerantia medica-
menta permisceat, exque illis linimenta vel vnguenta componere ad hunc modum.
Accipe lani crerum, mangelinæ Medici hoc ite vocant, seminis cotiniorum, mela, psylli, sin-
gularum drachmas tres. Succo portulacæ, & sibi vna & dimidiam. Succo solani, drachmâ dimidiâ.
Olei rosacei, vnciam vnam. Conmixta omnia bene forme tur linimenta. Potens etiam adiecta cera,
& accensione aliorum medicamentorum hincere vnguentum in hunc modum. Vnguenti popu-
leæ, drach. duas. Olei vni. rosæ, & vni. vni. drach. tres. Florum nymphæ aridarum, rosarum rubearum,
vni. vni. vni. scrupulum vnum. Cera quod iuu est, forme tur vnguentum, quod fronti &

Qui petri
capitis mibi
dicantur
admodum

Trallianus
locus emen-
datus

Linimentum

Vnguentum

12 Operum Leonhard. Fuchſii Pars III.

Sacculi. temporibus illinatur. Sacculi item parari poterunt ex *roſis, violis, nympha floribus, bordei, portulaca & plantaginis ſeminebus, ac lentibus.* Neq; alienum ab inſtituto erit ſi embrochis e *roſis, violis, floribus nymphae, folijs ſalicijs, portulaca & bordei compoſitis* utaris. A ſtupefaciētib; autem, utpote quæ non citra offenſam refrigerant, & ab ijs, quæ cum eo, quod refrigerant, manifeſte etiam adſtringunt, abſtinendum, niſi diſpſum neceſſitas exigat, & eis uti ptopter multas vigilas coacti fuerimus. Quare ſi quando neceſſitas poſtulet, parum quiddam ex eiſ refrigerantibus miſcendum eſt. *A papaveris autem & mandragora ſuccis* abſtinendum erit, quod non citra damnum refrigerent. *Solani* etiam ſuccum aut neutiquam viſcemos, aut proſum exiguum, quod nos feciſſe in linimento paulo ante adducto vident ſtudioſi. Pari modo & *maligranati acidi, cotoneij, & meſſili ſucci*, quod nimium adſtringant; cauendi erunt. Haecenus medicamenta, quæ in erit initia vitii cōueniunt, commemoravi nuſ. Quam igitur per ea perfecerimus, quod reſpoſtular, hoc eſt, in fluxum ſedaverimus, mox deinde mitigantia concoquentiaque ac diſcutientia medicamenta reprimenſibus admiſcere oportet. Quapropter tum cuiſmodi embrocha uti licebit, quæ accipit *ſlorum roſarum, violarum, virorumq; manipulum dimidium. Foliorum ſilicijs, chamamelis, meliſſi, ſingularum manipulum unum. Seminum malva, ſenigeraci, utriuſque drachmas duas. Hordei decorticati, unciam unam.* Coquantur ſingula in aquæ fontanæ libris duabus, donec tertia eorandem pars abſumatur, & capiti ex alto inſtilletur. *Ægro* etiam liquor ſtillatitius roſaceus cum permiſtione exigui aceti, naribus ad odorandum adhiberi poteſt. Proderit quoque, ut æger duabus vel tribus horis ante cibum mane *Zalupium roſaceum, aut violaceum, item eorandem Conſervat,* & alia eius generis, quæ corpus refrigerare poſſunt adlubeat. Eadem curandi ratio etiam uſurpanda erit, ubi ab exercitijs, ira, & alijs calidis cauſſis ortus eſt dolor capitis.

De dolore capitis ex frigida intemperie procreato. Cap. IX.

Cauſa. **D**olor capitis ex frigida intemperie nudæ qualitatis natus, ab ambiente nos aere frigido, maxime ubi quis nudo & aperto capite, in eo diutius verſetur, & ab improvida aliarum rerum frigidarum admoſione. Signa eorum, qui caput propter frigiditatem dolent, omnino contraria ſunt ijs, qui ex calida intemperie laborant. Quippe tum in capite nullus ſentitur calor, facies quoq; ipſorum nequaquam contraſta, minimeque arida, decolor tamen exiſtit. Oculi denique non rubent, ſed contra tumido pallore deformantur. Frigidis nec gaudent, nec iuvantur. Qui ſic dolent, aerem caveant frigidum, in calido autem morentur. Lactis, piſcium, & aliorum omnium ciborum, qui refrigerare poſſunt, uſum deſitent. Ovis forſilibus gallinarum, pullorum, petidicum, & phasianorum, aliarumque auicularum carnem. Pro potu dandum illis vinum tenuium partium, quod mediocriter extenuare, ac calefacere poteſt. Motu corporis viantur, geſtatione in equo, & deambulatione. Somnuſ iſis conſert moderatus, non tamen ſolito longior. Plas enim eis vigilandum, quam dormiendum erit. Balnea ſeu lauacra calida illis proſunt. Aluum perpetuo apertam habeant, ut ſingulis diebus excrementa corporis deiciat. Triftitiam, graves cogitationes, aliasque eius generis animi perturbationes fugiant. Curare igitur generatim, qui ex frigida intemperie caput dolent calefacientibus oportet: verum pto intemperie magnitudine remedium quoq; variandum erit. Natiuum quoq; cerebri temperamentum vnice conſiderandum venit, quod tale eſt, ut neq; vehementer calida, neq; etiam admodum frigida, ferer medicamenta. Rutaceum autem oleum, ut auſtor eſt lib. 2. de compo. medica. local. *Galenus*, calidum ſyncypiti ſuperfuſum, perfecte hominem liberare poteſt. Licebit etiam uti, *Tralliano teſte*, iſirino, aut nardino oleo, aut pro eis chamamelino, & anethino. Sin vehementiore opus ſit calefactione, frontem ipſorum & tempora medicamentiſ excipere & euphorbio compoſitis oleoſinectis illinire conuenit: aut aliquid olei e piperitibus, aut oleum euphorbii numrutaceo permiſcendum. Prædictis medicamentiſ natium & aurium meatuſ illinendi ſunt. Quidam etiam, ut *iſidem teſtatur Galenus*, pedum plantas, ac ſedem ex eiſ illinunt. Proderit haud leuiter vnguentum hoc quod habet: *Oleum iſirini & ruſiaci, utro- rumque unciam dimidiam. Maiorana, piperis, betonica, ſingularum ſcrupulum unum. Florum paſchadi, drachmam dimidiam. Cera quod ſatis eſt.* Hoc vnguentum vehementius, aut minus, pro aſſectus diuerſitate Medicuſ efficiet. Mitius quidē cum oleo chamamelino, vche-

A vehementius autem cum adiectione castorei, aut euphorbii. Licebit etiam parare Sacculus.
 facculos, in eum modum paratos. *Foliorum hyssopi, serpylli, verbenae, maioranae, singula-*
rum manipulum dimidiam. Florum rosmarini, betonicae, vitrorumque pugillum unum. Ruta,
pulegii, calamintae, singulorum drachmam unam & dimidiam. Triia indantur infusaturve
in fericum rubrum, formeturque sacculus, qui in modum palei formetur, ac nocte & interdum per
aliquot septimanas capiti impositus gestetur, aut si molestum id agro fuerit, ex linteis tenuissimis
fiat, qui calefactus, acetoque prius irrigatus capiti admoveatur. Haud inutile ter etiam adhi-
bebuntur embrochae ex floribus chamamelis, melilotis, sanigraci, maioranae, origano, be-
tonica, salvia, stichade, & similibus in aqua decoctis paratae. Ex illis quoque & limilibus va-
 potem per nares agiti attrahere possunt, aut sequentibus orbiculis odoriferis, poma

B vulgus medicorum ambrae nominat, vti, quae habent *Styracis siccioris, drachmas duas. Orbiculi*
Caryophyllorum, maceris, ligni aloes, singulorum drachmam dimidiam. Florum laurandulae,
drachmas duas. Gallia mischata, drachmam unam & dimidiam. Styracis liquidioris, lada-
mi, utriusque drachmam unam. Moschi, ambrae, utriusque grana tria aut quatuor. Tritis
 & cribatis omnibus cum stillaricio maioranae liquore, & cremore lento tri-
 ganthae quantum satis erit formentur orbiculi odorati. Lauri insuper folia tene-
 ra cum vino oleo citra, capiti illini possunt. Conueniunt etiam si incensia interim
 per spongas calida imbutas, & expressas, maxime si lauri folia tenera aqua incocta
 fuerint.

De dolore capitis ex intemperie secca, vel humida orto.

C A P. X.

C **N**EUTRA quidem intemperies per se sola, nisi ei coniungatur vel caliditas vel Siccitas &
 frigiditas, capitis dolorem excitare potest. Quod utriusque, grauissimus auctor, humiditas
 Galenus *lib. de sympt. causis cap.* confirmat, in eum scribens modum. *Porro vehemen-*
ter, inquit, in talia a naturali habitu transmutationes, ob violentum calidi, frigidi, & occurrunt,
atque ob eas res quae contumdere, secare, extendere, aut credere possunt. Nam siccitas a humiditate
quae, nisi caloris frigorisque coniungantur, occursum suum inferre non consuevit. Haec Galenus.
 Ratio vero eius quod diximus haec est. *Quum nulla res nisi eius occursum sit ve-*
 hementi ac repentinus dolorem excitare possit, humiditas autem & siccitas nullam violentiam aut
 molestiam sentientem in corporibus sensu praeditis efficere possint: imbecillior enim eorumdem est,

D alteratio, atque adeo sensum irreperis quod pati potius quam agere nata sit, ideoque dolorem nul-
 lum capiti inferre possunt. Atque hinc est quod nec Galenus, nec alii veteres Medici
 Graeci ullam doloris e siccitate & humiditate orti mentionem faciant. Nos tamen
 hie earundem intemperierum memini nimis, non certe quod per se excitare posse do-
 lores capitis putemus: sed vt potius medicinae initiati tum etiam vbi calori aut fri-
 gori iunctae sunt humiditas & siccitas dolorem capitis excitantes, quibus hunc
 ipsum pellerent medicamentis non destituerentur. Ceterum dolorem a siccita- Causa.
 te creat aet nos ambiens siccus, medicamenta exsiccantia, fames, exercitia immo-
 dica, coitus immoderatus, & animi perturbationes, tristitia potissimum & maesti-
 cia. Ab humiditate autem dolor nascitur propter aerem ambientem humidum,

E medicamenta eiusdem naturae, balnea, aquas calidas, & alias res supra modum hume-
 stantes. Deprehenditur siccitas, si pauca, aut nulla penitus e naribus excremen- Signa.
 tis, aut humida profluxerint: si praeterea oculi concaui fuerint, multaeque praecesserint
 vigilae. Contra humiditas aderit, vbi multus ex naribus mucus emanarit, si oculi
 tumidi fuerint, & xgri plurimum dormiant. Qui ob siccitatem dolent, ii in aere
 versentur humido, vel canturque cibis humectantibus & bonis succi, vitellis ouorum,
 testibus gallorum, ac eorundem iusculis, phasianis, perdicibus, & aliis quae pluri-
 mum nutrire, atque adeo humectare possunt. Vinum bibant tenue, aquosum ta-
 men. Somno vtantur quoad fieri potest largiore. Fugiant motum corporis, ac quies-
 cent potius, otioque vtantur xgri. Coitus, fames, sitis, & omnia quae exsiccant nata sunt,

F uitanda. Lauacra quae humectare possunt, vt sunt dulcium aquarum calefacta-
 rum, *Galeno libro tertio de tuen. san. cap. 3. teste,* si tepidiores fuerint, non parum com-
 moditatis xgrotanti afferent. Latentur denique xgri, & omnes alias animi per-
 turbationes vitent. Sin propter humiditatem dolor accidat, contrariam victus
 rationem insinutare oportet, exsiccantem scilicet, quae cuius ex his quae iam dicta

14 Operum Leonhard. Fuchſii Pars III.

Curaſio. ſunt, quod contrariorum eadem ſit doctrina, nota eſſe poteſt. Non eſt igitur vt de illa priuatim agamus, ſed ſatis erit obiter dixiſſe, in dolore capitis a ſiccitate nato, adhibendum oleum violaceum, amygdalinum & dulcibus confectum amygdalis. Non ſolum autem iis ſyncypuſinungendum eſt, ſed & naribus etiam illinenda erunt. ſam vero dictis oleis rectiſſime commiſcentur pinguedines, ad hunc quidem, vel ſimilem modum. *Oleum violacei, & amygdalini & dulcis amygdali expreſſi, vtriuſque drachmas tres. Pinguedinis vitulina, gallina, vtriuſque drachmas duas. Baſyri reſentiſ ſalis expertiſ, drachmam vnam & dimidiam.* Commiſtis omnibus ſingatur linimentum. Proderit non parum embrochas & violis, maluis, aliſque herbis humectandi vi prædictis confectas capiti adhibere. In capitis autem dolore ab humiditate nato, contraria prioria remedia adimouenda erunt. Quæ etiam variabuntur prout vel calor, vel frigiditas conſeſſa fuerit. Remediorum itaque copiam partim ea, quæ dicta ſunt, partim deinceps tradentur, ſuppeditant.

De dolore capitis ex plenitudine. C A P. XI.

HA CTENVS de curandis doloribus capitis, qui ex nuda qualitatum alteratione proueniunt, egimus: nunc de eo, qui ex plenitudine oritur diſcrimimus. Plenitudinem autem vocamus in præſentia, id quod Græci πλενιτις nominantur: quæ ſit, *Galenus lib. 2. De compoſ. medi. ſecundum locos, cap. 1. teſte*, quatuor humoribus proportionem adauctis: aut ſolo ſanguine. Idem enim eſt, quum exquisitè ſincerus ſanguis in venis, vt aſſeſſatur *Galenus lib. De plenitudine*, nunquam reperitur, quin ſemper aliquid bilis, vel pituitæ, aut ſeroſi humoris illi commixtum ſit. Hoc itaque aucto, reliquos quoque omnes humores increſcere, pro ſua quemque portione neceſſe eſt. Proinde nihil prohibet dolorem hunc capitis, de quo nunc nobis ſermo eſt, vocare ſanguine eum capitis dolorem. Proportione itaque, quæ *Galenus loco iam citato androgon & alibi inſinuat vocat*, humores quatuor in plethora ſeu plenitudine augentur, adeo vt ſanguis, quantum quem comua ſua reliquos humores in venis vincat, ſemper in ea magnopere præcellat, vt *ſuſius lib. 2. Inſtitu. noſtrarum ſect. 5. cap. 1. diximus*. Doloris capitis ſit ab omnibus, quæ plenitudinem in corpore procreeare poſſunt, vt ſunt cibi & potus boni ſucci vtiutius aſſumti: exercitiorum, balnei, ſudoris, & aliarum vacuationum naturalium & artificialium neglectus. Facies & oculi rubent, venæ tenduntur, adeo vt non ſolum maiores, verum etiam minores, & quæ prius ſenſum effugebant, & ob paruitatem latebant, nunc viſu comprehendantur. Pulſus magnus & vehemens redditur. Urina ſubruſa & craſſa. Venæ temporum pulſant. Dolor ſubſequitur capitis grauatiuus. Urina ſlaua & craſſa. Verſetur æger in aere frigido & ſicco. Quod ſi talis non ſit arte paretur, aere frigidiore per fenestras immiſſo, & floribus violatum, roſarum, ſoliſque ſalicis, & vitis per cubiculi aream ſparſis. Accertur in de hominum turba, ne ſuo halitu, & tranſpiratu aetern caleſciant. Viter carnes, oua forſibilia, & euſinodi quæ copioſe nutriunt. Vtatur puſana hordeacea. Oleribus frigidis, intybo ſi iui vitroque, enduiam & ſcatiolum hodie appellant, portulaca, laſtuca, & ſimilibus veſcatur. Fugiat vinum, bibat aquam in qua parum decoctum ſit cinnamomi, aut hordei. Quod ſi aut conſuetudo, aut vinum imbecillitas aliter ſuadeat, aut morbi paruitas permittat, vinum quidem dandum, ſed tamen imbecillum, & aqua multum dilutum. Exercitetur medioeriter, ſilicet, frequenter vtatur balneo, ita tamen, vt corpus prius vacuetur, ægerque minime febricitet. Somnus ſit mediocris. Gaudeat & lætetur, omniſque reliqua animi perturbatio abſit. Curandi ratio ſtatim a ſanguinis miſſione, niſi aliquid ſit, quæ hanc prohibeat, auſpicetur. Incidenda autem erit vena in cubito exterior, quam humeralem alio nomine, & hodie cephalicam vocant, aut media ſi alia non appareat, eius ſcilicet patris, in qua dolor potiſſimum viget. Siquidem hæc vena capiti continuata eſt, adeoque non ſolum per eam a laborante particula in contrarium auellere, verum etiam vacuare licet. Id quod non ſolum Hippocrates, & poſt hunc Galenus, verum etiam Rhaſes, non contemnendæ auctoritatis inter Arabes ſcriptor, libro ſuo nono, quem *Almanſori inſcripſiſſe, capite 1. docet*. Et nos in libr. 3. *Difficilium quaſtionum*, hoc ipſum mani-

A manifestissimis argumentis demonstrauimus. Quod si vero ætas, aut virtus imbecilla venæ secundæ consilium inteturbarit, cucutbitæ affigendæ erunt, non quidem capiti, sed partibus illi continuatis, & coniunctis, nemp̃e ceruicis lateribus. Id quod Galenus lib. 13. *Theor. meth. cap. 13.* confirmat, vbi sic scriptum reliquit: *Dum adhuc generantur mala, minime iis partibus qua laborare incipiunt, sed qua illis sunt continuata, cucurbita imponi debet, euellendo in contrarium causâ.* In hunc vium, & reuulsionis gratia, nexibus, ac frictionibus in partibus inferioribus vti expedet. Quod si dolor iis perfectis intra diem quartum aut quintum non sedetur, appareatque adhuc in oculis, fronte, & facie tumor, Linguis & naribus, fetis porcinis immixtis, eliciatur. Vel aperiatur vena frontis, potissimum si dolor sit in posteriore capitis parte.

Bis parte. His iam peractis, refrigerantia & adstringentia medicamenta capiti adhibebuntur, de quibus abunde supra, capite nimirum 2. dictum est, vt nunc ea tepetere nihil arineat. Ceterum alius quoque, vt in hoc vitio aperta sit in primis, Medicus curabit, quapropter si sua sponte excrementa corporis non deiecerit, hoc vel simili decocto subducatur, quod accipit: *Florum buglossi, (borraginem nominant) rosarum, violarum, singulorum manipulum dimidium. Seminum quatuor frigidorum marium decorticatarum, singul. drachmam vnam, Myxorum sebessens appellant, prunorum damascenorum, singul. numero duodecim. Vuarum passarum, exphracum (amarindos vocant) vtriusque vnciam vnam. Corticum myrobalarum flauorum, citrini: hodie nominant: ceruleorum, Indos appellant: cepulorum, ebiculos vocant: empeliticorum, emplices nuncupant: belezicorum, bellarios appellant: singulorum drachmas tres. Glycyrrhizæ, vnciam vnam: Famarizæ, adiantis (capillum Veneris nominant) vtriusque manipulum vnum. Tamariçi, ceterachii, vtriusque drachmas duas. Foliorum fenæ, polyodi, vtriusque vnciam dimidium. Agarici optimi drachmas tres. Zingiberis, drachmam dimidiam. Cognantur omnia in aqua fontana sufficienti, donec dimidium absumatur: dein solentur, & manibus exprimantur. Ius subinde decoctis faccharo, quod satis est, dulce reddatur, ac cum albuminibus ouerum spurcitis omnia eueratur, fiatque potio depurata, de qua eger appetente diluculo vnciam quatuor bibat. Quod si res ipsa validius exigat medicamentum, tum præstiterit quatuor vncias iuris nominati iam decocto addere, rhabarbari fecitici seu meridionalis redacti in puluerem drachmam vnam & dimidium. Spicæ, drachmam dimidiam. Aut in ipsâ dissoluere Cassia fistularis, vnciam vnam & dimidium, aut melius acris, quod alio nomine *Massam* appellant, vnciam vnam. Aut antidoti diaphanicon, drachmas tres. In eundem vium conducit exhibere *serapium violaceum, & oxyaccharum.* Post hæc capiti adhibenda sunt remedia, primum, quæ a capite repellendi & auertendi vim habent, vt est *oleum rosaceum, & alia quæ cap. 2. sunt commemorata.* Deinde ea quæ morbi reliquias discutere valent: vt est *alibea semen, sanumgræcum, chamamelis & meliloti flores. Olea præterea chamamelinum, anethinum, & iis similia.* Licebit etiam oleis iam dictis incoquere *serpyllum, samphysicum seu maioranem, & id genus alia.* Ex quibus deinceps Medicus pro arbitrio suo & ægroti irrigationes, linimenta, vnguenta, emplastraque componet, ad eum modum, qui in superioribus capitibus expositus est.*

Cupant: belezicorum, bellarios appellant: singulorum drachmas tres. Glycyrrhizæ, vnciam vnam: Famarizæ, adiantis (capillum Veneris nominant) vtriusque manipulum vnum. Tamariçi, ceterachii, vtriusque drachmas duas. Foliorum fenæ, polyodi, vtriusque vnciam dimidium. Agarici optimi drachmas tres. Zingiberis, drachmam dimidiam. Cognantur omnia in aqua fontana sufficienti, donec dimidium absumatur: dein solentur, & manibus exprimantur. Ius subinde decoctis faccharo, quod satis est, dulce reddatur, ac cum albuminibus ouerum spurcitis omnia eueratur, fiatque potio depurata, de qua eger appetente diluculo vnciam quatuor bibat. Quod si res ipsa validius exigat medicamentum, tum præstiterit quatuor vncias iuris nominati iam decocto addere, rhabarbari fecitici seu meridionalis redacti in puluerem drachmam vnam & dimidium. Spicæ, drachmam dimidiam. Aut in ipsâ dissoluere Cassia fistularis, vnciam vnam & dimidium, aut melius acris, quod alio nomine *Massam* appellant, vnciam vnam. Aut antidoti diaphanicon, drachmas tres. In eundem vium conducit exhibere *serapium violaceum, & oxyaccharum.* Post hæc capiti adhibenda sunt remedia, primum, quæ a capite repellendi & auertendi vim habent, vt est *oleum rosaceum, & alia quæ cap. 2. sunt commemorata.* Deinde ea quæ morbi reliquias discutere valent: vt est *alibea semen, sanumgræcum, chamamelis & meliloti flores. Olea præterea chamamelinum, anethinum, & iis similia.* Licebit etiam oleis iam dictis incoquere *serpyllum, samphysicum seu maioranem, & id genus alia.* Ex quibus deinceps Medicus pro arbitrio suo & ægroti irrigationes, linimenta, vnguenta, emplastraque componet, ad eum modum, qui in superioribus capitibus expositus est.

E De dolore capitis & biliosis humoribus. C A P. XII.

HOC genus doloris capitis sit ab omnibus quæ corpus vniuersum, præcipue caput, præter naturam calefaciunt & exsiccant, adeoque bilem flauam procreant: qualia sunt, Galeno libro 2. *De temp. cap. 2. teste*, sollicitudo, ira, dolor, labor, exereitatio nimia, vigilie, abstinencia, & inedia. His accedit victus ratio ex biliosis cibis, alio nimirum, porris, ac similibus constans. Notæ eorum qui sic dolent similes sunt iis, quos ob calorem, solis potissimum æstum, dolor affligit: sed maior ipsis morbus, ob eius acrimoniam accedit, & faciei pallor: Interim etiam oris amaritudo, siccitas oculorum, linguæ & narium adest. Præterea malum hoc ætati vigenti, & temperaturis calidioribus, vitæque sollicitæ, & iis, quæ ad dimidium paulo ante commemorauimus, qui flauam bilem coaceruant, accidere solet. Eger moretur, in aere natura frigido & humido, qui arte etiam, vt supra cap. 7. ostensum est, parari potest, si ædium pauimentum assidue humore frigido irroretur: aut flores ac germina, quæ frigida humidæque facultatis sunt cubiculi, per arcem vt sunt *rose, viola, entium capreoli, & id genus similia, spargantur.* Vniuersa quidem victus ratio humidior

16 Operum Leonhard. Fuchſii Pars III.

ſit. Cibis itaque veſeatur humidis, & boni ſucci, lactuca, portulaca, oxalide, ſpana-
chio & intybis, piſcibus exiguis ac ſaxatilibus. Potus ſit aqua, aut aqua in quapa-
rum cinnamomi decoctum ſit. Vino autem in totum abſtineat, bibar aquam, ſi mo-
do eius uſum ferre poſſit. Sin minus, decocto cinnamomi utatur. Quieſce utatur, &
ſomno largiore. Balneum quoque huic temperatum, vñctioneque conferunt.
Lætetur, & omnes animi perturbationes declinet. Porto curan. ſi ratio ſtatim a bi-
lioſi humoris vacatione perſpicanda, quod ſcilicet in ipſe tenuis & mobilis ſit, at-
que adeo euacuationi, perinde atque pituita, propter ſuam craſſitiam, minime re-
luſcetur. Quod ſi vero humor ille aliquam corporis partem quietus obſederit, at-
que adeo incandefcat, eamque partem exutat, & caleſcencia medicamenta (que-
lia ſunt omnia ea que purgant) reſpuat, ante bilis purgationem exhibenda erunt, quæ
eius calorem ac feruorem reſtinguant, impetumque ipſius abundant, adeoque il-
lam conſequant, hoc eſt, alterent & euincant. Neque enim concoctio, de qua nuna
nobis ſermo, aliud eſt, quam humoris morbum efficientis a natura alteratio. Alter-
rat vero, ubi cauſis morbum efficientibus fortior eſt, eaſque ſuo robore permutat
& euincit. Vt concocta non ſint niſi ea, quæ a natura euicta atque debellata ſunt. Ta-
lia itaque medicamenta ante purgationem eoſque diluculo ieiunio præbenda, do-
nec in uinis decens apparuerit concoctio. Nam hac ratione bilis cocta, & veluti ſub-
aſta, ac edomita, naturæque obſequens reddita, abſque moleſtia minorique nego-
cio ad conuenientia loca euacuationis a purgante medicamento trahitur. Non eſt
igitur ut inſicias eamus, bilem quæ aliquam partem corporis quietam obſidet, exigere
concoctionem, ut educi e corpore queat: ſed hoc potius conſtanter negamus huic
opus eſſe, quod præſtauit Auicenna, & hunc hodie ſequentes Medici fere omnes af-
firmant, ut craſſitiam adſpiciatur. Sic de humorum concoctione I. Aph. 22. loquitur
Hippocrates, dum ait: *Concocta medicari, atque mouere non cruda, modo non ſurgant: plu-
rima uero non ſurgunt.* Sic etiam Galenus, & poſt hunc Alexander Trallianus. lib. 1. cap.
16. ubi ex proſeſſo de dolore capit ſe bili prognato agit. & Actuarius in libro *De comp.
medica. cap. de ſtenu bile purganda*, de bilis concoctione loquuti ſunt, ut copioſius lib. 2. no-
ſtrarum Inſtitutionum ſeſtione quinta cap. 30. & in noſtris in Hippocratiſmum citatam aphoriſmum
commentarij diximus. Sed ad inſtitutum noſtrum reuertamur, ac medicamenta ali-
quot quæ biliſos humores concoquere poſſunt, ut ſunt *Serapia violaceum, de intybo nym-
pheæ, oxyſaccharo, & ſimilia, enumeremus.* Tale eſt quod accipit: *Serapiæ violacæ, vnciam vna-
nam, Serapiæ nympheæ, vnciam dimidiam. Liguoris ſtillatici intybi ſatini vtriuſque, roſarum, v-
triuſque vnciam vnam. Miſceantur omnia, & appetente diluculo ab agrotiis bibantur.* Vel *Ser-
apii oxyſacchari, vnciam vnam. Serapii violacæ, vnciam dimidiam. Liguoris ſtillatici horraginiæ,
cichorii, vtriuſque vnciam vnam & dimidiam.* In hunc uſum exhiberi poſſunt *Zilapia ro-
ſaceum, & violaceum, decocta & ſeminibus cucumerum, cucurbitæ, portulacæ, intyborum ſatiatorum,
radicibus eorundem & cichorii, roſi, violæ, nympheæ, lactucæ agrumæ, damaſcenæ, ziziphæ, mixtæ,
& ſimilibus.* Ceterum vacuatur biliſos humor iam concoctus per abſynthij dilutum,
vel aloen, vel hieram picram per ſe datam, aut cum modica ſcammonia, aut catapo-
tiis quæ ex aloë conſtant. Neque ab inſtituto aberrabit, qui decocto purgans
quod ſuperiore capite commemorauimus, bibem ſum præbebit, in eo drach. tres aut
quatuor. Antidoti e ſacco roſaceo, aut epiſſo diſſoluens. Vel hoc medicamento utatur,
quod habet ſtorac horraginiæ, violarum, nympheæ, ſingularum pugillum vnam. Hordei de-
corticati, drachmæ tres. Deſequantur in aqua ſufficienti, & colentur. In colatura diſſoluantur
Manna optima vncia dua, & Diacatholicon vnciam dimidiam, & fiat potio. Proderit etiam
exhibere rhabarbari diſlutum, quod recipit: *Rhabarbari ſelecti, drachmæ dua. Spice, ſer-
pulum vnum. Concidantur ſingula minutatim, & macerentur in ſtillatici liquoris intybi ſatini la-
tuoris, caſſia, bugloſi, ſingul. vncia vna. Vini optimi ſemuncia horæ duodecim, dein valde expri-
mantur & colentur, adieciſſi antidoti e ſacco roſaceo, epiſſi ſingulæ drachmæ vnam & dimidiam.*
Commixtis omnibus fiat potio purgans, quæ circiter crepuſculum ſumatur horis ſex
ante paſtum. Vri quoque licebit catapotii aurici vocati alephangini, & rhabarbaro, & hiera
ſimplici, & ſimilibus, quæ in libro noſtro ſecundo De vſitata componendorum medica. huius temporis
ratione, ordine receſſimus. In delicatis nō temere quis hoc utetur bolo, qui accipit: *Diacy-
du, ſcrupulū dimidiū. Maceris cinnamomi, maſtichis ſingul. grana dua. Sacchari violacæ, nympheæ,
vtriuſque*

Cunctio.
Bilis quide
interdum
ut vacue-
tur, como
de coctio-
nem exigis,
nunquam
autem ut
craſſitiam
adſpiciatur.
Concoctio
quid

Purgatio.

Dilutum
rhabarbari.

Bolus pur-
gatorius.

- A** utriusque quod satis est, fingatur bolus. Vel eo utere, qui habet rhabarbari drachmam dimidiam. Diacatholicon, unciam dimidiam. Antidoti & succo rosaceo, drachmas duas. Cum saccharo fingatur bolus. Sumat illum mane hora quarta, prandeat decima. Hora dimidio antequam prandat utatur hoc lotorio, quod accipit iuris pulli gallinacei salis experis, unc. quatuor. Sacchari rubri, semunciam. Atque cantur. Non absurdum etiam erit clysteribus uti, in hunc vel similem modum paratis. *Malua, alebce, in ybi salini utriusque, violarum, foliorum Beta, singul. Manipulum unum. Hordei integri, unciam unam. Seminum quatuor communium frigidorum minorum, singul. drachmas tres. Coquantur omnia in aqua fontana ad tertias, & colo transfundantur. Deinde accipe iuris decocti & colati, lib. unam. Atedulla casta fistularis, unc. unam. Hiera picra, unciam dimidiam. Olei violacei, uncias tres. Mellis violacei, unciam unam. Salis, drachmam unam & dimidiam. Commixtis omnibus fiat clyster.* Clyster.
- B** licebit etiam exhibere pilulas de hiera simplici, & iis similes bilem ex capite deducentes. Post biliosi humoris vacationem localia & ea adhibeantur medicamen- Localia.
ta, copia, quæ caput refrigerare ac roborare, ac etiam humectare possunt, quorum multa cap. 8. huius libri commemoramus. Conuenit autem hoc maxime, quod tecipit: *Oleum violacei, nymphaeae, utriusque unciam unam & dimidiam. Commixtis idis frons linatur, & tempora, mane & vespere.* Quod si vigil supra modum æger fuerit, sicut put oleo violarum, rosarum, nymphaeae, & papauerino inungendum erit. Prædictis interdum parum opii verbi gratia grana duo adiciendum erit, ut saltem hac ratione, si aliter non liceat, somnus conciliari queat. Mitius erit si addas lactis mulieris, unciam unam. Galenus in hunc usum trigoni pastillum, qui a Paulo lib. 7. cap. 12. describitur, ut scilicet eo frons inungatur, commendat. Fiant frictions brachiorum, & lotiones crurum. Si iam dictis medicamentis dolor non cedat, refrigerantibus medicamentis discutientia miscenda sunt. Tandem mediocriter discutientibus per se utendum erit.

De dolore capitis & pituitosis humoribus. CAP. XIII.

- G**ENERATUR ab omnibus, quæ pituitam in capite procreant, ære frigido & hu- Causa.
mido, cibis isdem qualitatibus præditis, piscibus, lacte, oleis, fructibus, acie, somno & satietate, & id genus aliis. Dignoscitur capitis gravitate, faciesque si alba & humida fuerit. Nota.
Si denique æger somno facile tentatur, piget est, sensibus minime viget, & excre- Vitiata ra-
mentis caput redundat. Aer in quo æger versabitur, calidus & siccus sit natura : aut si haberi eiusmodi non possit, arto per luculentum ignem suffusus, & odoramenta nonnulla, nempe cinnamomum, thus, gariophyllos, lignum aloes, & similia paretur. Inedia huic affectui salubris est, & paucis alimentis utendum erit. Carnibus vescatur magna ex parte assis, & odoramentorum accessione conditis. Inter olea sal- Vitiata ra-
nia, hyssopus, saturcia, thymus, petroselinum vulgare, serpyllum & maiorana confert. Pro- Coracio.
pottu utatur vino tenui. Panis sit fermentatus, salis, bene coctus, sibi commistum a- Piscine ex-
nismum habens. Motu mediocri, & aliis quæ cap. 9. commemoramus. Cutandi ratio a tenaciosa.
pituitosis humoris extenuatione auspicabitur. Quapropter ea, quibus extenuan- Ducendum
di & incidendi crassa & lentu vis inest exhibebuntur, præsidia: cuius farinae sunt mel pituitam
rosaceum, oxymeli simplex, compositum, & scylliticum, serapius & stichade, liquores stillati- extenuamus,
ci hyssopi, betonica, maiorana, salvia, & eiusmodi. Paretur igitur medicamentum quod ac-
cipit : Mellis rosacei, unciam unam. Oxymelitis simplicis, unciam dimidiam. Lique-
ris stillatici betonica, serpylli, maiorana, singulorum unciam unam. Mistis omnibus fiat po-
tus. Vel id quod habet : Oxymelitis scyllitici, unciam unam. Serapii & stichade, unciam dimi-
diam. Liquoris stillatici hyssopi, apii, maiorana, singul. unciam unam. Commisceantur,
fiatque potio. Quod si serapiorum & stillati etiam liquorum viros displicuerit, li-
cebit hoc vel simili decocto uti, quod accipit : Radicum feniculi, petroselini, apii, singu- Ducendum
la, unciam unam. Radicum paeniae, drachmas tres. Seminum anisi, feniculi, scilicet, sicut mon- pituitam
tanum officina vocant, singul. drachmas tres. Stichadiæ, origani, serpylli, maiorana, calamin- extenuamus,
tha, betonica, salvia, singul. manipulum dimidiam. Cinnamomi selecti, maceris, utriusque Ducendum
drachmam unam & dimidiam. Decoquantur tantisper in aqua iuxta quantitatis, pituitam
dum medietas relinquantur. Ius decocti colo transfundatur, & saccharo suave red- extenuamus,
datur, atque deinde oui albuminibus depuretur, adiciaturque serapii ex hyssopo, Ducendum
oxymelitis simplicis, utriusque unc. tres. Commixtis omnibus fiat potio. Porro extenua- pituitam
 extenuamus,

18 Operum Leonhard. Fuchſii Pars III.

Purgatio. tiſ, & ad educationem præparatis humoribus, ea quæ purgandi pituitam vim obtinent medicamentis propinanda veniunt. In quem vium pilulas has deuorabit æger, quæ recipiunt: *Pilul. cœchiarum, drachmam unam & dimidiam. Pilularum chiera compoſita, drachmam unam. Pilul. alephunginarum, drach. dimidiam. Agarici in paſſillarum formam redacti, ſcrup. duos. Myrobalarum cepularum, ſcrupulum unum. Turbit optimi, ſcrupulum dimidiam. Sticheadii, zingiberis, utriuſque grana quinque. Maſtiche, grana ſeptem. Scammum paſſia, numero 3. Caſtorii, grana quatuor.* Cum ſtillicidio lauandulæ liquore ſingantur capſotia pro ſingulis drachmis vnde im. Aurillas, quæ habent: *Pilularum azaiareth, drachmam unam. Agarici in paſſillis redacti, ſcrupuli duos. Cum ſcrapio & ſtichade formetur capſotia.* Competit vero hoc malo affectus non ſemel, ſed bis aut ter purgare: quod craſſi & tenaces humores repentinæ ac ſubitæ purgationi non conſectim obtemperant accedant, ped. tentum vero & identidem purgando extenuati ac præparati facilius purgatorius medicamenti obediunt. Glandes etiam conſici poſſunt, quæ habent *pulueris hiera ſimplicis, drachmam unam. Agarici, drachmam unam & dimidiam. Salis ſoſſilis ſaxei, drachmam unam.* Mellis quod ſatis eſt ad excipiendum, figuerentur glandes. Conferunt etiam clyſteres, non ſolum propter euacuationem excrementorum, quæ in inteſtiniſ continetur, verum etiam propter reuulſionem eorum quæ ad caput feruntur. In hunc igitur uſum decoctum paulo ante deſcriptam conſuecit, licet uis iuris aceti ſiantur *uncia duodecim, & in iis diſſoluantur benedictæ laxatiua, uncia dimidia. Antidoti indi maioris, drachma tres. Diaphenici, drachma dua. Aſtellæ roſaceæ, uncia una. Oleorum laurini, rutacei, citrarumque uncia una & dimidia. Salis ſoſſilis ſaxei, gemma officina nominant, drachma una.* Miſceantur ſingula, & fiat clyſter.

Clyſter. **Capſula ex Purgatio.** Vacuæ ita quæ vniuerſo corpore, ea quæ apte expurgare poſſunt, adhibenda erunt in dicam ita, quæ ſia ſunt apoplegmatiſimi, quorum exempla ex capite primo huius libri peti. Purgatur etiam caput per uſum *maiorana, bliti, braſſicæ, & ſimilium, de quibus in lib. 2. de uſitata noſtri temporis medica. compoſendorum ratione, cap. 25. diximus capſoſe.*

Gargaris. Poſſunt & hoc nomine exhiberi gargarismi & ſtillicidii liquoribus hyſſopi, betonicæ, erigani, hiera picra, & oxymelitis compoſiti. vel in eum modum, qui accipit: *Hyſſopi, maiorana, utriuſque manipulum unum. Saluæ ſerpylli, thymi ſingularum manipulum dimidiam. Coquantur in aqua iuſta quantitatē ad tertiam. Accipe iuris decocti librā unam. Oxymelitis ſerpyllæ, acetæ tres. Miſceantur & fiat gargarismus, quo utatur æger mane ieiunus.*

Sternutatoria. Vel hunc, qui habet. *Radicis pyrethri, piperis longi, utriuſque drachmam unam & dimidiam. Seminii ſtaphydis agriæ, drachmam dimidiam. Maiorana, pulegiæ, hyſſopi, organi, betonicæ, ſingul. manipulum dimidiam. Deccoquantur omnia in aqua iuſta quantitatē ad tertiam, luri decocti colato adi. cemelii roſacei, unciam unam & dimidiam. Oxymelitis ſyſſitæ, unciam dimidiam. C. m. mixtis vniuerſis fiat gargarismus. Præterea ſternutamentorum quoque hoc in vitio ſciuit, quæ accipiunt: *Maiorana drachmam unam. Nigellæ, drachmam dimidiam. Caryophyllorum piperis alba, cubebærum, ſingul. ſcrupulum unum. Nucis moſchata, caſtorii, ellebori albi, ſingul. ſcrupulum dimidiam. Terantur ſingula, & in tenuiſſimum redigantur puluerem pro ſternutationibus ciendis. Ditiſoribus ali. quid moſchi & ambaris, utriuſque nimirum grana duo commiſceantur. Naribus denique odoramenta calida adhibere conuenit, aut otibiculum aliquem odoriferum aite paratum, qualis eſt quem capite nono commemorauimus. Erthina quoque (barbaris naſalia vocantur) indita naribus mirifice commolare ægrotantibus ſolent, quæ recipiunt: *Seminii ſtaphydis agriæ, pyrethri, piperis candidi, ſingul. drachmam dimidiam. Nigellæ, maiorana, utriuſque ſcrupuli duos. Ellebori albi, ſcrupulum dimidiam. Triſtis ſingula cum reſina terebinthina & modica cera ſiant erthina pyramidi formæ referentia. A capitis purgatione conueniunt inuulſiones, embrocha, ſacculi, & id genus alia medicamenta ſupra cap. 9. producta, quibus etiam quod reliquum eſt a purgatione totius corporis diſcutiendi vi. incit. Intra corpus adhibebuntur hand inutiliter embrocha ſacchara, obduſta, antidota ex ambare, meſſico, aromatici roſacei, e cumino, dianthos, thetica, antidotus methridati, ex aceto, ſacchara maiorana, roſmarini, betonicæ cum ſcrapio & ſtichade. Præ aliis autem hæc p. iſſimum antidotus conferet, quæ accipit: *Specierum antidoti & gemmæ, dianthos, utriuſque ſcrupulum unum. Cubebærum, maceris, utriuſque, drachmæ dimidiam. Ligni alci, caryophyllorum, ſeminii ſaniendi, ſingul. ſcrupuli dimidi.****

Sticha.

A Sticbadu serapulum dimidiu. Sacchari candidissimi in stillatione forum paonia & lanardula liquare liquifaci, uncias sex. Fungantur orbiculi aut mortuli pro agro intus arbitrio. Nō ignoamus practicarum (ut vocant) scriptores nonnullos, his quæ nunc commemoramus subiciere. Caput de dolore capitis ex humoribus melancholicis nato, præter tamen decorum ac necessitatem: quomodo omnia quæ ab illis dicuntur, rectius ad Caput de Asthenocholia transferenda veniant.

De dolore capitis & ventriculi vitio adeoque per consensum orto.

C A P. XIII.

HAftenus capitis palmatio primogenio solve dolores ut curare oporteat, monstrauimus, nunc reliquum est, ut eorum qui per consensum accidunt, curationes tradamus, initio sumto ab eo, qui a ventriculo male se habente excitatur. Is autem magna ex parte accidit, ubi exiguis ac tenuis quædam in eo, & præsertim in ore eius, humor acris coæternatur, a quo vapores prauis excitati sensum feruntur. Cognoscitur mordaci dolore, quem qui ita dolent percipiunt: & naulea, quæ tum, ore potissimum ventriculi patiente, infestare ægrotantem solet. Porro qui sic caput dolent, si diutius famem & inediam ferunt magis offendentur. Augetur enim ipsis propter inediam eiusmodi humoris malicia, & prauitas. Curare eos, qui sic infestantur oportet, nihil remedium capiti adhibentes, quomodo nullum peculiare ac proprium caput sustineat vitium, sed ab humorum in ventriculo prauos excitantium vapores ascensum molester. Noxios igitur ventriculi humores, quam celerrime vacuare oportet. Euacuantur autem, qui in ore illius continentur, facie his qui ad vomitum proclives sunt, aquæ tepidæ potu. Qui vero ægre vomunt, difficilius adeo ut etiam nonnulli digitorum, aut pinna immixtione ad vomitum ventriculum irritantes, nihilo plus proficiant. Porro ad os ventriculi ob naturalem suam lenitatem, flaua & pallida bilis promere effertur. Pituitosus autem, aut acidus, aut fuscus, in spacio & amplitudine magis totius ventriculi, quam in ore ipsius firmatur. Optimum autem fuerit, in fundo ventriculi ipsos contineri, facili enim, relicto ventriculo, ad intestina delabuntur. Pessimus sit affectus, ubi vitiosi humores in ventriculi tunicas sic immerguntur, ut vix elui possint. Si itaque in tunicis ventriculi receptus fuerit humor, optimum remedium est hiera picra medicamentum. Hoc vacuato, cibis subinde boni succi & ventriculo commodis vtendum. Et cum ad prauorum humorum in ventriculo tedundantiam, tum concoctis facultatis imbecillitas, tum cras ventriculi infirmitas plurimum conferant, danda est opera, ut concoctis facultas, itemque os ventriculi per ea medicamenta quibus adstringendi ac roborandi facultas inest, firmetur. Quorum omnium copiam suppeditabit lib. j. in quo ex professo de ventriculi vitio tractabimus. Prohibendi autem potissimum sunt vapores ne a ventriculo ad caput & cerebrum efferrantur, hoc vel simili medicamento, quod accipit Coriandri preparati, vne. vnam. Anisi sumiculi, cinnamomi optimi, singulorum drachm. at quinq. Maceris drachmam vnam. Nucis moschata, drachmam dimidiam. Sacchari ad pondus omnium fiat puluis, qui statim a pulsu sumatur, puluerem sumto potui diu differatur. Capiti quoque statim a principio adstringentia adhibenda erunt, ut roborato capite minus vapores

E acumos sursum elatos recipiat atque admittat.

De dolore capitis ex ebrietate. C A P. XV.

EBrietatem parit maxime vinum natura calidum, vaporosum, merum & largum, liberalliusque ingestum. Generant autem calida temperamento vina dolorem capitis, quia vaporibus caput omnino replent, quandoque etiam humoribus temperatura calidis. Notis ad dignoscendum hoc vitium, nullis opus est, cum e sermonibus ægrotantis facile cognoscere viti causa possit. Curandi ratio duabus potissimum rebus perficitur, nimirum Vacuatione, & Refrigeratione. Itaque si vinum etiam adhuc permanset, & in ventriculo fluctuat, ut aqua tepida per se, vel pauco oleo admixto epoto vomat, qui caput dolet iubebis. Quod si etiam post concoctionem caput doleat, refrigerantibus, & vaporibus qui ex alto ad caput feruntur reprimentibus medicamentis vtendum est: quale resaca est per se, & cum aceto, aut cum hedera & brassica succo. Quin & ipsa brassica folia in aqua calida macerata, & capiti circumdata, illigataque, naturaliter ebrietati resistunt. Eiusdem etiam decocta efus in id efficax est. Amara etiam amygdala quinque aut septem ieiunio oblata, ebrietatem arcere creduntur. Præsentem quoque ebrietatem exstinguunt, centani

Videtur
tio.

vii minoris decoctum, Actio auctore: cornu ceruinum, verbenacaeque recta semen ex aqua potum. A
Haben ſa deinceps cura eſt ſomni & quietis: quod vbi factum fuerit, per totum diem
ad velperam in balneo dulcis aquae lauare: vbi laueris, cibis boni ſucci, non tamen
calefacientibus nutrire oportet. Sunt autem huiusmodi, *piſanae ſuccus, ſerbitio ex alica,*
panis ex aqua, anaſorbilia, & lentiusculum, praefertim humidioris ventriculo praeditis. Ex o-
lenbus *laſtica* boni ſucci eſt, & refrigeratoria: *braſſica* vapores deſiccata. Ceterum
poru omnino aquae vren ſum eſt in tis, quae eius potu aſſueſci ſunt, aliaſq; habent ventri-
culum ætuoſum ac exuſtum. Verum quia nonnullorum ventriculus propter aquae
potum ſubuerſitur, vinum renue albumi, & modicum, praefertim ſi aquam bibere ze-
ger nequeat, malum granarum iſtis concedendum eſt, aut ſolū per ſe, aut cū alica ſub-
acta, probe cocta, calida. *Vina praeterea piſſa, & pyra,* aliqua quidem cruda, aliqua vero

Palmulae
ca
piſis dolore
inducunt.

cocta, vt *malum cotenem,* ſtomachum corroborant. A palmulis abſtinere conſilium eſt
vt quae proprietatem quandam habent capitis dolorem inducendi. Arſi neq; poſt
hæc probe dormire poſſint, ad balneum poſtridie quam eitiffime ducendi ſunt, & a-
qua calida eis frequenter in balneo ſuperfundenda. Dein de vbi dormierint, aut om-
nino interpoſito tempore quieuerint, rursus ad balneū deducendi ſunt, dein veluti
pridie nutriēdi. Quod ſi mediocriter habeant, & aquam bibere nequeunt, permittē-
dum eſt vt aquoſum vinū, vt dictum eſt, bibant. Cibi etiam, vbi mediocriter ſe habue-
rint, dentur *gallorum teſticles & ala, piſces ſaxatiles, & tenera carne praediti, columbarumque pul-
la.* Porro conſtat omnibus, ſatius eſſe & iſpoſ, & omnes, qui caput dolent, augelcēte

Generalia
praecepta
in viſus
ratione ob-
ſeruanda.
Ambulatio.

adhuc & vigente dolore, quieſcere: remittente vero & declinante, idoneis locis potiſ-
ſimum ante cibum, deambulare. Apta vero ſunt iſis, qui caleſcere deſiderant, calidiora: C
qui refrigerari, frigidiora. Et ante cibū quidem plurib; deambulationib; vtendum, a
cibo autem paucis & lentis. Oportet vero neq; comedere multum, neq; ſtatim de-
ambulare, ſed poſt duas aut tres, aut etiam plures horas. Quod ſi aliquando ex vapo-
rib; & humorib; in caput ſublatis reliquæ quædam relinquatur tenentib; meatib; impa-
ctæ, & ob id etiam capitis dolor perſeueret, a roſaceo quidem deſiſtendū eſt, vtendū
vero primum chamæmelino moderate calido, poſtea irino: maximo pere n, huiusmo-
di affectus iuuant. In balneo autem caput aqua perfundatur, non ſolum, vt aliquid eor-
um, quæ intra ipſum habentur, diſcutiatur: verum etiam ſomni conciliandi gratia.
Qua propter ſecundum quoq; aut tertium ad velperam balneum apparandum eſt, D
acceptis ab eo laſticis ex aceto. Die ſequenti ea quæ caput magis calefaciunt, appli-
cabuntur, niſcendo irino oleo, nunc nardinum, nunc coſtium, nunc alia ei* generis
olea, & vnguenta. Hac igitur ratione capitis dolores ex vino curantur. Quanquam nō
ignoto Germanos noſtros hanc curandi rationem prōſius contemnere, vt qui longe
alio minusq; iſſilis moleſto remedio vtantur. Nam iuxta vulgares hos verticiles:

Potatio re-
perita
nocti.*Sit tibi ſerentina nocet potatio vini:**Hora matutina reſubar, & eris medicina.*

Sed pulchre huius ſui moris paulo poſt pernas dant, vbi ex hac curatione ac frequenti
ebrietate in maximos incidunt morbos apoplexiam, paralyſin, epileſiam, deſtillatio-
nem capitis, & id genus alios, vnde Medici non parum lucri ſentiunt.

*De capitis dolore ex ictu, vel caſu. C. A. P. XVI.*Viſus ra-
tio.

N Aſcitur ſepe capitis dolor ex ictu aut caſu, quod vbi accidit, curatio eius magno
ſtudio tractanda erit. Nā periculū inducit, dū humores copioſius ad ipſum caput
confluunt. Quare dum a vino, & carnibus, omnibuſque cibis plenioribus ſolidiorib;
buſve abſtinere oportet, praefertim ſi xgrotaſſent febricitent. Potus ſit aqua, cui ali-
quid cinnamomi ſit incoctum. Piſanae vero ſuccus, lutea onorum, ius malux elixx,
laſtica, intuba, & cucurbitæ iis ſunt exhibendæ. Praeterea quies, corporiſq; tran-
quilas conuenit. Abſtinendum etiam a ſole, balneo, clamore, diſtentione partium
corporis, & a cibis acidis, acerbis & ſaliſis. Quod ſi itaq; ictus, aut caſus vulneris, vel con-
tuſionis cauſa fuerit, ſcopi plures erant inuentionis remediorum. *Primo* ſane, qui pro-
pter vulnus exiſtit, cuius cauſa glucinantibus medicamentis, & phlegmonem areen-
tib; vt conuenit, poſtquā vlcus ſabia ſibulis impoſitis cōmiſſa fuerint. *Secundus*, qui
ob contuſionem: & tertius, qui dolorum cauſa adhibetur: quos quandoq; in ipſis ſolis
ictus particulis fieri conſtat, plerumque veto etiam ad vicinas partes propter contriui-

Curatio.

tatis

Aratem substantia, extenduntur. Nam membrana, quæ caluariam ambit, & cutis, quæ huic extrinsecus circumtenditur, vtraque propriam substantiam continuam habet, per totum caput extensa est: & ob id sine sepe caput ipsa dolere contingit, præsertim si ictus vltq; ad membranam os caluæ ambientem penetret: quem membrana caluariam ambiente diuisa rasiq; curare oportet, ratione qua caro producitur. Quod si per cõmunionem mēbranæ caluariam ambientis, quæ per futuras cum dura mēbrana habet, etiam intra caluariam ipsa inflammatio distribuatur, eiusmodi capitis dolor periculo non vacat. Ceterum non raro accidit in casu ex alto, aliquam cerebri aut membranarum eius particulam abeumpi: quod vbi contigerit, etiam amplius capitis dolor inualefcit, ipseque totus affectus curatu difficilior, & periculum præsentius & vehementius est. Nam conuulsiones, *Tralliano teste*, magna ex parte, & delicia cõstantur, vt mortem ipsi maxime præcipitem inducant. Optimum igitur in iis, nisi ætas prohibeat, & facultas vitalis imbecilla appareat, curationis initium a sanguinis missione moliri: ita nanque influxus reuelletur. Incidenda autem erit humeralis vena quæ ex directo loci patientis sita est: vel ea non apparente, medica. Quod si propter ætatem aut virium imbecillitatem, aut etiam ambo simul, sanguinis detractionem tētare prohibeamur, per clysterem aluum vacuabimus, tum vt huius excrementa vacuentur, tum vt humores qui ad patentes partes ferri consueuerunt reuellantur. Vacuatio ne igitur facta, & corpore toto recrementis libero, deinceps etiam parti laboranti auxilia ad mouere oportet. Conuenit autem in primis congruis capitis irrigationibus visæ lana nimirum oleo dulci imbuta, capiteq; ex ea omni parte cõfecto, ne scilicet netorum or-go, cerebrum nimirum ipsum, refrigeretur. In quem vsum embrochæ etiam probantur. Inde autem remedijs ad phlegmonem commodis vtetur, Incipientibus nanq; & adhuc nascentibus ipsi, rosaceum cum aceto: in vigore autē consistentibus rosaceum per se adhibemus. Illis vero decrefcentibus, medicamentis laxantibus appellatis vtitur: quemadmodum in induratis phlegmonib; absinthium ac pulegium rosaceo admiscemus. At nec circa iniuria indefinita acetū rosaceū permiscendum erit. Cutis enim capitis, aut quæ post eam est membrana caluariam ambientis phlegmone citra quidem vehementem dolorem oborta, per exigui plane acetii ad rosaceum pmissionem iuari possunt. Lædentur autē vbi magna fuerit, dolor emq; vehementer induxerit. Anniaduertendū autē, vbi crassæ cerebri mēbranæ nūdæ rosaceū offertur, quæadmodum in iis, quib; aliquid ex capitis ossis exscinditur, accidit solum ipsum modice tepidum adhibem⁹. Quum vero citra denudationē, p capitis iuxta siniciput partem, sinus & integra exsistente caluaria, rosaceum ad cerebri mēbranam peruenire velim⁹, acetum ei, vt eo perducatur, miscemus. Cuius item rursus vehemens virtus tum per viarum transitionem, tum per rosacei mixturam exsoluitur. Ceterum si vigilie vegeant, etiam *chamelino oleo*, & non rosaceo duntaxat, perfundere debem⁹, plus aut minus p ratione phlegmonis, & ægri tēperamentu. Item *rosa arida folia* macerata prius passo, seu *vino dulci*, deinde cocta, atq; trita, & ita imposita, & fertula campana similiter tractata, vel myrti folia tenera ex vino trita, cum myrrha, & pulegium ex

E vino tritum capiti plurimum psumt. Sin membrana cerebri fuerit vulnerata, egtegie ipsam conglutinat, Archigenis decreto, *Calamintus succu infillatur, & milis farina arida inaspera*. Deinde *butyrum*, & rosaceum ac adeo: *suillus salis expers, vestitus, missa inter se, & sepe facta infusa*. Porro in contusionibus citra desperationem ac fixuram circa caput factis, eodem *Archigenis auctore*, polenta imposita commoda est. Amplius vero & clypeum, atque ipsæ adeolanz sordib; sudoris succidæ eodem modo: magis autem propriè simlaginem ex aqua pro cataplasmate imponens, aut organum cum polenta. In medio enim autem capitis vulnerib; in quibus nuditas per se non adest, pilos rademus, sibilisque impositis constringemus, ac glutinant. b; vtetur, de quibus *lib. 6.* vbi ex professo de curatione ulcerum tractabimus, copiosius disseremus.

De dolore capitis in febribus. C. A. P. VII.

FQuod si febrentes capitis doloribus affliguntur, accurata perpenzione conludentum erit, *num capitis dolores statim initio cum febribus inuadant, aut postea febribus inerscentibus oriantur*. Nam si non confestim cum febre dolor capitis irruat, sed interea temperis, dum sc. febris ipsa prope iudicationē venit, tunc nulla ponitur remedia quæ

rantur, quod is vomitum, aut sanguinis e naribus profluuium deeret rium portendat, quemadmodum copiose Hippocrates in libro Prognosticorum, & post eum Galenus libro 3. de Crisibus & libro primo ad Glauconem, capite ultimo tradunt. Nam ea, quæ admoventur, præterquam quod nihil iuuant, etiam naturam impediunt. Si vero simul eum febribus inuadat, a vaporibus, aut humoribus ob febris magnitudinem fusis, ac velut effereuscentibus ad caput elatis, atque ob partis imbecillitatem, accidit. Quare si ab humorum copia oriatur dolor, & in principio eum febre irruit, vena secunda est post primam aut secundam remissionem, si nihil prohibeat, præsertim in corporibus boni habitus, multique sanguinis. In contrarium etiam trahendum, atque adeo reuellendum a capite erit, acerbis clysteribus, quorum exempla petes e capite De apoplexia, & nexibus ligaturis, & frictionibus in partibus inferioribus plurimis. Cueurbitule etiam occipitio aut ceruici affigendæ. Capiti vero admouendæ sunt irrigationes, quæ ab eo vim repellendi obtinent, ac deinde vacuantibus, postremo vero corroborantibus. Repellunt autem oleum rosaceum, & alia quæ supra capite citato sunt connumerata. Vtendum vero ipsis, in calidioribus habitudinibus ac hora æstiuæ frigidis, & eum modico acetosin frigidioribus autem ac hyeme, tepidis. Si febris vehemens fuerit, vigiliasque crebre ægrotantem infestauerint, e capite papauerum, sedo, & id genus aliis, quibus refrigerandi & somnum conciliandi vis inest, medicamentis paratis, utendum erit. Trallianus: rosaceum per se capiti superfundendum esse, aut cum psyllis, aut hedera, aut sempernino. Sciendum vero erit hoc etiam in loco apud Trallianum mendose legi, ut in prologo id est, serpyllum pro psyllis, simili quo supra errore. Præterea irrigationibus utendum erit, qualis est quæ accipit: *Florum violarum, nymphaeæ, rosarum, vitrorumque manipulū unum. Hordei decorticati, unciam unam. Capiti papaueris, unciam dimidiam. Sempernini maioris, manipulum dimidium. Cequantur omnia in aqua iussa quantitate ad tertias, & fiat embrochia.* Vbi cerebrum abunde refrigeratum fuerit, ea lubinde adhibenda sunt, quæ caput calefacere denuo, atque adeo vacuare atque discutere reliquias humorum possunt. Quapropter chamamelis olei, anethini, irinoque utendum, aut decocto chamameli, altheæ & similium. Et si tenaces ac crassi fuerint humores, serpyllum, aut pulgrem camam, vel calamitibus, vel mentha, vel sisymbrii, in iis decoquere conuenit. E oltremum, e caput per rosaceum oleum, & similia, nempe betonicam, chamamelum, ac melilotum, corroborandum ac firmandum erit. Porro non solum in iis qui ex febribus caput dolent, sed etiam in omnibus aliis circa caput obortis vidis cauere oportet hæc quæ sequuntur: *Vitis semen, absinthii succum, salis potionem, eruum, myrrham, thus, hedera corymbos, crocum, peucedanum, cyclaminum & styracem, quod natura sua capitis dolorem ac grauitatem inducant.*

De Cephalæa. C. A. P. XVIII.

Cephalæa, diuturnus & ægre codens, ac contumax capitis dolor, Græcis dicitur, quæ ob exiguas occasiones, maximas habet exacerbationes accessione seu, adeo ut neque strepitum ferat ægrotus, neque vehementiorem vocem neque lucis claritatem, neque vini potionem, neque caput repientia odoramenta, neque intum: sed in quiete & tenebris propter dolorum magnitudinem cupiat decumbere, ut cui videatur caput veluti a malleo feriri. Nonnulli etiam tanquam contundantur, aut distendantur ea, quæ circa caput sunt, sentiunt: non paucis vero viq; ad oculorum radices dolor pgetitur. Ceterum hoc vitium sane non nunquam continuos dolores habet, non nunquam vero exacerbationes, & intermissiones, vel ordinatas, vel inordinatas. Iam quidam ex eis cerebri membranas dolitant, quidam vero membranas tantum caluariam ambientem. Fit a plenitudine, aut humorum vaporumve acrimonia intra vel extra caluariam contentorum inflammatione, & capitis imbecillitate. Dolores itaq; qui cum grauitate inuadunt, plenitudinem indicant: qui vero cum erosi, ne infestant, aut humorum biliosorum, aut vaporum acrimoniâ: qui cum pulsu, phlegmonem: qui eumensione, siquidem extra grauitatem & pulsum obueniunt, spiritus crudi & flatulenti copiam demonstrant: cum pulsu vero, membranosi corporis phlegmonem. At si cū grauitate distentio fiat, copiam humorum intra membranas contentam. Ac dolores quidem in superficie hærentes, membranæ os caluæ ambientis malū significant. Qui vero in alto ac profundo affligunt, cerebri membranarum. Quibus enim affectus in-

- A**tra caluariam est, si ad oculorum radices dolores procedunt, eo quod oculorum tunica a cerebri membranis habeant ortum. Quod si etiam putris humor calidior euaserit, cum febre caput dolent: febricitant autem omnino, & qui ex phlegmone dolent. Porro qualis in hoc vitio esse debeat victus ratio, facile ex superius. *De vitiis capitis doloribus* Capitibus colligi a quouis studiose potest. Consulto itaque hanc, ne temere reidem tepe repetamus, præteruimus. Curandi ratio, ubi humorum vaporumve copiam causam esse deprehenderit, siquidem ex totius corporis plenitudine generata sit, ab inuerti corporis vacuatione auspicianda erit. Veni itaque in hac corporis plenitudine incideoda primum cubiti externa, vel hac non apparente in media, eiusdem quidem lateris, quam humeralem vocant: idque faciendum si vires patiantur, aut aliud quippiam non obstat. Si vero velut imbecillum existens, caput ad se quæ seorsum feruntur excipit, materiam in totum corpus reuellere oportet, atque ita mederi parti afflicta. Acronibus itaque clysteribus, & extremarum partium ligaturis, & pluribus infernarum partium frictionibus uti conuenit. Interdum si adhuc clangus redundare videatur, etiam e naribus, vena a saperra, quæ totum satis esse videbitur, vacuato. Mox hiera, cuius vim excaueris intenderisque exhibenda est. Post totius vero corporis vacuationem, tuto ad ea quæ caput euacuant accedes, deinde ad ea quæ firmant, ac robur addunt. Caput vacuant apoplegmatisini, & qua naribus induntur medicamenta, *Locustia, vicia.* Græci vocant, ut est succus cucumeris sylvestris, elaterium appellant, cum lacte infusus, vel etiam aridum elaterium inspiratum, succusque cyclamini, & porri, & alia quæ supra capis. *Commemoramus.* Repellit autem oleum omphacinum, hoc est, ex immaturis olivis expressum, & rosaceum per se, & cum aceto dilutum: & quod ex capitis papaverum, & tencris oleis germinibus, & hedera corymbis, ac mentha viridis apparatur, & quæ sunt similia, de quibus in precedentibus capitulis abunde diximus. Ceterum adhibebis remedia tepida, ubi copia humorum frigidior & crudior fuerit: frigida, ubi calidior & biliosior extiterit. Post hæc, quæ discutunt medicamenta sunt admouenda, ut est oleum chamæmelinum, anethinum, & iis similia supra nobis commemorata. Siquidem crassior humorum copia fuerit, serpyllum, aut polegi comam, aut calami stipes, aut silybrii oleo elixabis ac copiam vacuabis. Hæc autem ipsa etiam robur particulæ adiiciunt, quapropter eis ad perfectam usque curationem uti oportet. Omnium vero maxime discutit, & strenne corroborat verberna recta, præsertim viridibus & arida, cum radicibus & serpyllo pariter oleo incollis. Si verberna per se in oleo decocta caput perfuderis, omnis capitis dolori diuturno ex frigore oborto, aut ex crassissimis humoribus, medeberis. Maxime autem profunt sub aquario vase nascentes asellæ, si oleo incollantur.

De Hemisrania. Cap. XIX.

- H**emisrania vitium est doloris in dimidia capitis parte, hunc dextra, hunc sinistra ortum, quod futura secundum longitudinem eius extensa distinguitur, sub qua intra capitis ossa linea medium cerebrum diuidens protenditur. Hoc cunctis ut plurimum per circuitus exacerbat, ac quibusdam extra caluariam, quibusdam in profundo capitis, nonnullis iuxta temporum musculos dolor vehemens sentitur. *Causa.*
- E** Causa doloris huius vaporum, aut humorum siue multorum, siue calidorum, siue frigidorum, vel per venas, vel arterias, vel per vtriusque influxu: interim quidem ipsi solis partibus caluariæ internis, hoc est, cerebro, & eius membranis, recrementis a sua ferat propellentibus: interim partibus corporis, quæ infra caput sunt, viciatis vapores aut humores sursum mittentibus. Trallianus accidere hemisraniem scribit, postquam recrementum aliquod alteri capitis parti infixum fuerit, aut quum procreatum est in spiritum soluator, irriterque loca singulis diebus, aut vno interposito, aut duobus, pro subiecta specie motus fumens initium. Notæ quibus vapores aut humores copiosi calidi aut frigidi deprehenduntur, & capitis superioribus studiis petendæ erunt. Porro quomodo in loco capitis vitium fuerit, ex iis quæ in capite. *De cephalæa* diximus, cognoscas. Quibus hoc adiciendum erit, quod si membrana caluam ambiens patitur, tum adeo vehementer dolent, ut ne manuum quidem contactum facile ferant, adeo ut ne cuti quidē ipsa omnino a vitio immunis sit: quæ admodum si in partibus, quæ intra caluariam continentur dolor sentiatur, ique ad radices usque oculorum extendatur, liquido constabit partes intra caluariam laborare, nec manuum contactu dolorem irritari. Victus rationem

Hemisrania.

Causa.

Notæ.

24 Operum Leonhard. Fuchſii Pars III.

Viſus ſu-
tio.

Cura-
tio.

Localia.

Vagantia.

vertigo
Vertigo.

Cauſa.

promte ex iis, quæ in præcedentibus capitibus commemorauimus, mediocriter etiam docti conſtituent. Præcipue tamen vitabunt ægrotantes, ea quæ vaporū acrimiam copiam ſurſum ad caput mittere poſſunt, vt ſunt *allia, cepe, ſinapi, raphanus, & ſimilia*, potiſſimum ſi a calidis ac biliſis humoribus ac vaporibus hemicrania nata ſit. Neque temere a nobis dictum eſt, ſi a bilioſis humoribus ac vaporibus nata ſit. Nam ſi a frigidiſis humoribus, potiſſimum in ventriculo contentis, hemicrania orta eſt, iam dicta, & alia caleſcientia & extenuantia olera maxime proſunt. Cuius rei teſtis eſt Trallianus qui ita ſcribit. *Ex oleribus iis, qui hemicrania ex frigida cauſa laborant, ſcandix, gingidum aſſargi paluſtres, beta cum ſinapi, & cappares.* Alium veto diuturnos dolores frequenter diſcutit. Quigitur hemicraniem curare aggreditur, iſ principio num ſanguinis miſſione, aut corporis purgatione indigeat æger conſideret. Si enim ob plenitudinem vitium ortum fuerit, humeralis vena (quam hodie *cephalicam* nominant) quæ e directo male affectæ parti culæ eſt, incidenda erit. Sin propter vnius humoris redundantiam hemicrania inuaſerit, per conuenientia quæque moleſtantiem humorē vacuare poſſunt medicamentis humor purgetur, vt in ſuperioribus monſtratam eſt capitibus. Vniuerſo corpore vacuato, ad localia vocata præſidia veniendum, ac vel per præparatæ manus digitos, vel lintum dimidia frontis pars, & ea præſertim, quæ circa iſtorum muſculus eſt, fricando caleſcenda, atque id ante acceſſionis tempus faciendum. Poſt acceſſionem medicamentis a veteribus Medicis *Hemicranicis* appellatis, vtendum, quorum aliqua recenſet Galenus capite 3. libri. De compo. medica. localium. Si calor multus in doloribus percipitur, iis quæ aliquid habent refrigeratorium: ſi ille non adeſt, iis quæ vehementer caleſciant. Vtriſque autem aliquid corroborans, quod aſſectiſſima ſi cultate præditum ſit, miſceatur. Optimum vero in frigido affectu remedium erit hoc vnguentum, quod accipit: *Oleum anethini, irini ſingularum vncias dimidiam. Piperis albi, ſerpylli, vtriſque ſcrupulum vnam & dimidiam. Caſtorii, ſcrupulum vnum. Euphorbii ſcrupulum dimidiam. Cera quod ſatiſ eſt ſit vnguentum quod dimidia frontis parti, & muſculo temperi illinatur.* Miſce etiam in hoc malo conſert, illud repidum in aurem inſuſum, quod recipit: *Olei dulcis, vncias vnam. Euphorbii, ſcrupulum vnum.* His commixtis, gutta vna in aurem inſillitur. Plus autem & minus euphorbiæ adiiciendum, prout corpus acri aut hebeti ſenſu præditum fuerit. Quadam etiam naturæ proprietate euphorbium aceto dilutum, ac latere dextro dolente ſiniſtro applicatum: & contra ſiniſtro dolente dextro illitum, hemicranicis maxime conſerre, *Actius prodidit.* Trallianus laudat tanquam generoſum auxilium Euphorbii vnam partem, caſtorei tantundem, aqua excepta auri iuxta partē dolentem impoſitum, ita tamen vt ſtatim in balneum eat, & lauet æger. Recenſet etiam alia quædam, quæ apud eundem quiſque legere poterit. Idē etiam poſſe lumbricos terræ tritos, & cochlearum carnes lateri patienti illitas, tradit. Sunt qui perſicorum nucleos tritos, ac illitos parti male affectæ miſce conſerre, memorizæ prodiderint. Quod ſi vero a calidis humoribus aut vaporibus dimidia partis dolor accidit, ea ſunt auxilia quæ ſupra in curatione doloris capitis ex calore & biliſis humoribus orti memorauimus, adhibebuntur. Conuenit autem in primis panis ex aqua tepida, vt quæ ſupra modum ipſi auxilietur. Malua etiam, & lactuca comēſta prodeſt. In vniuerſum autem cibus ſit humectans, & balnea temperata, poſtremo purgatio expura & ſcammonia.

De Vertigine. Cap. v. XX.

Quod virium *vertigo* Græcis hoc Latinis *vertigo* tenebricoſa dicitur. Alio nomine Græcis *oymbio* Galeno ſectio quarta aphor. comm. 27. teſta, appellatur. Barbari hoc ipſum corrupta voce *ſotomiam* v. cant. tradunt. Eſt autem vertigo tenebricoſa, vbi obſcurationes hebetudineſque oculis obuerſantur, adeo vt de repente viſus euaneſcat, & omnia circumagi & rotari videntur. Hippocrates vero, eodem Galeno ſectio. tertia aph. com. 17. auxiliare *vertigo* nominatur. Diſfert autem iam dictum vitium ab eo, quod ſimpliciter *vertigo* Græcis, & Latinis *vertigo* dicitur. Nam, vt idem Galenus lib. 4. viſ. 2. cap. comment. 27. atteſtatur eſt, quando caput diſtaxat circumagi videtur, vt ſuſine lib. 3. Inſtitutionum noſtrarum ſectio 1. capite 11. diximus. Oritur hoc pathema inter dum, cerebro primogenio vitio laborante: inier dum etiam, quō oris ventriculi conſenſu laborat. Cerebrū vero patitur, vbi craſſus & lenis humor ipſum occupat, a quo vaporoſus ſpiritus ab imbecilli calore

matius

- A** natus re solutus, in cerebri partibus inordinate mouetur, & tenebrarum offensiones adducit, & imaginatricis facultatis iudicium peruertit, unde illa rerum obiectarum circulo se obicit, simulque se circumagi qui patiuntur, & concidere existimant. Ori autem ventriculi rotentur, quando propter viciosos humores in eo acervatos, vapores exhalatio ad cerebrum fertur, spiritum animale in illo rotans ac circumagens. Qui hoc vitio laborant, is a quacunque leui occasione præ oculis tenebræ appa-
Nose.
rent, adeo vt nonnunquam concidant ægrotantes, maxime vbi in circum rotentur. Si quide nullis ab vna rotatione euenit id, quod aliis a pluribus accidere solet. Proinde hebescent siue alium quempiam, siue rotam circumactam, aut id genus aliud quipi-
B am, aut ipsos quoque in aquis vortices circumagi viderint. Visibilis enim spiritus ro-
Vitiis
tae agitatur, aliusquam dictis occurrens, eodem motu circumuehitur, atque ita turbu-
lentus, inæqualis, inordinatusque humoris & spiritus motus redditur. Siquidem
consentaneum est humorem & spiritum illum eodem modo impelli, quo res ipsæ,
quæ cernitur. Humores enim & spiritus, quum ex fluentium & motorum genere, is
agita is ac circumactis corpus vna commoueri, & ad eandem motionem ferri neces-
se est. Vbi ex primario cerebri vitio vertigo pendet, tum aurium sonitus, vehemens
dolor capitis, grauitasque præcedunt: Item *olfactus*, atque *alterius cuiusque sensus a capite
procedentis oblatio*. Patiuntur autem tum potissimum, quum sub sole æstuant,
vel aliam ob causam calefacto capite humores dissoluti circumaguntur. Vbi vero
ab ore ventriculi oritur, stomachi morbosionem, *achorpyi* Græci nominant, & nan-
C sciam præstent, vt plenius libro tertio de labo, locis Galenus capite octauo docet. Æger,
Vitiis
quod ad vitium rationem attinet, commoretur in aere puro & lucido, deuitet autem
crassum & nebulosum. Accensione tamen ingruente, præstat ægrum in aere obfcu-
ro & quieto versari, in quo spiritus & vapores mori, facilius ad quietem deducuntur.
Cibus vescatur boni lucci, ac cœne octu facilibus. statque omnino carentibus, carni-
bus in mirum perdicum, *caporum phasianorum, gallinarum, ventularumque*: piscibus deni-
que saxatilibus, ouis forilibus, & eiusmodi, quæ nullo negotio concoqui queant. Vi-
tanda omnia, a quibus vapores sursum feruntur, vt sunt *odoramenta, allia, cepa, porri, si-
napi, & iis similia*. A cibo ea exhibenda, quæ vim habent adstrictoriam, & vapores
sursum ad caput ferri prohibent, præsertim si vitio stomachi morbus ortus est. Bi-
D bendum vinum aquosum, album, tenuissimum, non admodum antiquum, aut hydro-
meli. Exercitium sit mediocre, in quo, quantum fieri potest, caput quiescat. Somnus
diurnus vitetur. Nocturnus sit proluxior. Caveat sibi æger ab animi perturbationibus,
Ventricis excrementa singulis diebus deiciat. Nun intueatur res in gyrum actas &
rotatas, aut celeriter motas, vt currentia flumina, neque in præcipitis ambulet: hæc eni-
m singula vitium exacerbare valent. Porro, quod ad curandi rationem attinet, ver-
Causa.
tiginosos in accessione odoramentis, frictionibus, & id genus aliis excitare conuenit.
Virium autem attestante robore, si nihil aliud obstitit, vena humeralis secanda est,
siue principium morbi fuerit, siue etiam processerit. In sanguinis vero missione
obseruandum, ne confertim sanguis vacuetur, propterea quod a quacunque leui oc-
E cisione æger facile cecidat. Pluribus itaque distractionibus per certa interval-
la vrentes, congruam mensuram explebimus. Quod si vero sanguinis missionem quid-
piam prohibuerit, alius subducatur, semper redundanti humori medicamentum ad-
aptandum, præcedente tamen eius concoctione ac præparatione. Mitissime vero cõferte
primò per aerem vacuare clysterem, non solum propter eorum quæ in intestinis con-
tinentur vacationem, vt supra quoque monuimus, verum etiam ob reuulsionem eorum
quæ ad caput feruntur, cuius quidem exemplum in capite de *Apoplexia* proferemus.
Præmissis itaque vniuersi corporis vacationibus, caput localia adhibebunt præidia:
inter quæ non postremum locum occupant encurbitulæ cum sacificatione occipiti-
Localia
o admota. Postea apophlegmatismis, gargarismis, & sternutuentis vtendam est.
F In nares deinde anagallidis luccus aut radices betæ, aur cyclamin infundendus. Ni-
trū vero cœ nigella tritum, & oleo antiquo mixtum, per nares egregie purgat. Deinceps
æger ad balneū ducend⁹, præsertim naturale sulphureū, ac caput embrocha ex
medicamentis discutiendi: facultate præiitis concinnata, irrigandum. Quod si vero
caput in balneo supra modū incaluerit, rosaceo & aceto sæpe fouendum est, atque re-

refrigerandum. Si igitur per hæc præsidia vitium cessauerit, subinde validioribus abstinentum: sin persuerit, apertis arterias in temporibus circa aures incidere oportet, ventrem tamen prius aut medicamento, aut clysteri purgato. Ut autem incidende sint arteriæ, ex *Paulo Agineta* discas, qui id ipsum perspicue *libra 6. capite 4. t. adit*. Neque tamen cauterium hoc occipiti post aures accommodabitur, quod accipit: *Cantharidum, abietis capitiolum, alius, & pedibus, drachmam unam. Fermenti acris, drachmam dimidiam. Cum aceto & vino & sublimi ignis commercio destillato subigantur, & admoventur*. Verrugo autem a ventriculi oris consensu, vomitu curatur: potest, qui hoc moueatur medicamentum, quod accipit: *Anethi manipulum unum. Sciminum raphani & vaporum, utriusque drachmas duas. Radicis raphani, semunciam*. Ebulliant in aqua iuxta quantitatē, donec pars tertia absumatur. Ius decocti coletur, & addantur subinde *Oxymelitis syllitici, sequinipia*. Commixtis omnibus fiat potus; qui a comestione statim tepidus exhibeatur. Prodeunt etiam deuorare catapota stomachica, vocata, *hierapicra, & similia*. Dentur frequenter a cibo, que os ventriculi constringunt, atque adeo ne vapores sursum ad caput ferantur, impediunt: ut sunt *diacatoncon sine speciebus, catonca ipsa, pyra adstringentia, cerandrum præparatum, faniaculum saccharo incrustatum, & anisum, pœonitque semen, & cistmodi, de quibus suo loco satis copiose dicemus*. Vendum quoque palato catonconum catne. Capiti etiam applicanda, quæ vaporum ascensum inhibent, ut *oxyrhodinum & alia, de quibus supra dictum est*.

De phrenitide. C. A. P. XXI.

Phrenitis quod. **Phrenitis** Galeni libro secundo de Sympt. causis auctore, est cerebri, aut eius membrarum phlegmone. Sic dicta, quod in ea mens, quam Greci φρενις vocant, lædatur. Ceterum, quæ ad phrenitidis definitionem attinent, in annotationibus nostris librum undecimum Galeni de morborum ratione caput 18. copiose diximus. Sui autem phrenitidis, eandem Galeni libr. 4. de male affectu loci, capite 4. teste, species seu differentias tres, prout sensus interiores, qui de illius sententia eodem sunt, nempe imaginatio, cogitatio, & memoria, læduntur. Quippe sunt phrenitici quidam, qui cogitatione manente illæsa, sensibus atque imaginatione deprauate mouentur: veluti Theophilus Medicus, & Theophrastus, cuius Galenus in lib. de Sympt. diff. meminit, cuiuslibet constat. It enim quum aliqui prouiderent se gerere, & differere, atque eos qui tum præsentis erant, ex ætate noscerent, tibicines tamen quosdam arbitrabatur esse in angulo cubitali, in quo decumberebat, & quæstibus canere & pulsare, & festos videre præbatur, alios quidem stantes, alios autem illos sedentes, atque ita continenter canentes, ut neque noctu, neque interdum quicquam remitterent. Præinde assidue clamans, inquit eos a cubiculo expelli. Hic vero ubi conuulsi, quæcquid singuli eorum quæsum visitabant, vel dixerant, vel egressi, narrabat. Denique visum quæ de canioribus apparuerant, probe meminuit. Eiusmodi phrenitidis speciem in se ipso adolecentulo adhuc experius est etiam Galenus, quo 3. libr. 4. de affectu loci, cap. 1. commemorat. Quum enim per astatem ardentem febre laborares, & festucas auro colore excubitis eminere, & floccos similiter in vestibus esse putabas, quos auferre conatus, nihilque sub digitis eductum inueniens, accuratius vehementiusque id efficere conatus es. Audiens itaque, duo ex amicis qui tum aderant, dicentes: Videsne hunc iam & floccos euellere, & festucas colligere? statim intellexit id ipsum quod dicebant se fecisse. Quum vero sic animo constaret, ut rationalis in eo facultas non vacillaret, recte inquit dicitur: proinde ne phrenitis me arripiat, auxilio citote. Ex quibus iam pl. num fit, ne iuxta Theophilum, neque in Galeno cogitationem, rationemve oblitteratam fuisse, sed solam imaginationem. Alii rursus de iis, quæ oculis offeruntur recte, quantum ad sensitiuam notitiam imaginationemve pertinet, iudicant, cogitando vero ac rationando a naturali iudicio aberrant. Hoc pacto afficiebatur phreneticus ille, cuius meminit Galenus locis iam citatis: qui quum Roma cæsi cum Iulio pueri consisteretur, surgens a cubili, obserat in ianuam, venit ad fenestram, per quam & ipse videri, & prateruentes videre poterat. Itaque ex viuentis singulis ostendens interrogauit, inberentem ut ea prouideret, rogans: tum ipse deinceps omnia arripientis eiecit, at illi magnis acclamationibus riserunt. Postea, inberentem puerum quoque prout, quum eos interrogasset, atque id illi insisteret, illico ipsam dicitur: quem ab alto cadentem videntes, suppresso itatim risu, accurrerunt, & contractam iam puerum sustulerunt. Hic sane singula vatahis nomenclaturis probe nominauit: unde intelligi potest, neque imaginationem circa illa fuisse læsam, neque nominum memoriam deletam, sed solam

A solam cogitationem a naturali iudicio deuiasse. Sunt præterea qui simul & sensus sine imaginationis & cogitationis vitio, quod memotiz etiam sequitur abolitio, laborant. Tali delirio specie per pestilentiam correpti sunt illi, quos Thucydides *lib. 2. belli Peloponnesiaci* scribit omnium, quæ antea nouerunt oblitos fuisse, ita ut non solum suos familiares non agnoscerent, sed ne seipsum quidem. Quæ ideo prolixius a nobis commemorata sunt, ut hinc primum discerent huius nostri æquis studiosi, plures esse quam vnum interiores sensus. Neque enim alias imaginatione illa, si, amitteretur cogitatio: aut contra, integra cogitatione, imaginatio obliteretur. Dein, ut sciret principes facultates esse totius cerebri, adeoque harum functiones nequaquam in diuersis cerebri partibus, ut *Actius lib. 8. cap. 2. & post eum recentiores Medici* fecerunt omnes consensum, perfici, sed in toto potius cerebro, quemadmodum *superius in Institutis nostris lib. 1. sect. 8. cap. 3. diximus*. Ceterum oritur phrenitis ex sanguine exuperante, vel bilioso humore, seu, ut *Trallianus ait, a flaua bile*, cerebrium, vel eius membranas occupante. Sciendum vero hoc loco etiam, quum ex flaua bile auctores phrenitidem procreari dicunt, non ita eorundem letimonem accipiendum esse, quali ex sincera bile, & a sanguine secrete, eandem nasci censeant, sed quod ex bilioso sanguine, seu bile sanguini permixta in cerebrum, aut eius membranas decumbente fiat, ut plenius in nostris commentariis *superius*. *Galenus de medendi ratione librum cap. 18. docuimus*. Vtraque phrenitis extialis est, sed mitior tamen quæ ex immodico sanguine fit: vehementior quæ ex bilioso gignitur sanguine. Pro ut vero maior emille aut minorem obtinet acrimoniam, eo malignior aut mitior sit.

C phrenitis: Quod si veto bilis ipsa, ex qua vitium nascitur, petusta fuerit, grauissima ac ceteris omnibus perniciosior phrenitis accidit. Quos phrenitis inuadit, hos febris continua, quod materia quæ affluxit in loco angusto coarctata sit, eiusque impediatur perspiratio putrefact, & amentia infestant, plurimaque parte somnis difficilis, & vigilis continuè comitantur. Interdum etiâ somnus turbulentus accedit, ut exurgat ægri, exiliant, furibunde vociferent, verba sine ordine & sensu effundant, interrogantibusque nihil apposite, aut maiore cum tumultu, aut temeritate respondeant, præsertim vbi aliquis antea dum bene valebat fuerat mansuetus. Nonnunquam occipit dolor infestari. Oculos denique habent eruentos, vebementerque squalidos: & sæpe eos perficant, interim aridos, interim lachrymahtes. Lingua eorum tacta est aspera, & ex narib, aliquando sanguis destillat. Floccos præterea auellunt, & festuos ex stragulis se vestibus capiunt. Pulsus ad hæc exiguos, languidos, & quadantenus duos & neuosiores obtinet. Spirationem quoque (ut in *Prognosticis auctor est Hippocrates*) taram habent. Porro quibus sanguineus humor vitium procreauit, ille cum risu insanit. Quibus veto flaua bilis, illi ferociter & immaniter se uiunt, ita ut cohercere nisi vinculis nequeant, omniumque quæ dicunt, faciuntque, obliuiscuntur: adeo ut laborantes aliqui, quum matellâ petunt, micere tamen negligunt: aut quum lotium emittunt, matellâ ipsam tradere haudquaquam meminerunt. In victus ratione sic fegerat æger: Decumbat in loco tum aeris, tum luminis temperati, vasisque picturis æarente: in quem amici quidem gratissimi ingrediantur, qui tamen inopportune non interpellent, & nonnunquam blande & leniter alloquantur, nonnunquam accribus increpent. Cibus primum esto pitæne cremor, aut alica hordei, aut panis medulla cum aqua mulla, aut melle rosaceo addito citreorum, aut puniceorum succo, aut simili, qui humores densare ac cogere possit, ut ægrius ad caput ferri valeat, sæpius lota. Oleribus vescatur postremo, lactuca, & malua elixis, eiusque generis aliis, quæ refrigerare atque humidare possunt. In morbi inclinatione pitesc squamosi & saxatiles dari possunt. Mala quoque punicea, cerasque, si multus intus conficiat fetuor, offerenda. Potus sit aqua in qua parum cinnamomi, aut hordei decoctum, cui admixtum sit serapium violaceum, rosaceum, aut nymphet, quod nenuphatium hodie barbara voce appellat. Hæc autem non conferunt, hoc est copiose & celeriter, ingurgitanda, sed parcius & per interualla exhibenda sunt: quum alias exiguo vrantur potu. Hinc est, quod eos rectissime Hippocrates *lib. 1. Prænotionum. & lib. 8. Epid. par. 2. aph. 6.* *superius* nominet. Potro vbi concoctionis notæ in lotio apparuerint, & febris vehementia remiserit, atque vires non satis robustæ fuerint, vinum tenue & aqua dilutum, quod *superius* *et* *Græci* nuncupant, dandum. Quod tutius certe sit iuriis, qui sani hæc bibere consueuerunt, & ventriculû naturam im-

becillum ac frigidum obtinent. Nam, *vt Trallianus testatur*, ferociam phreneticorum A mutat, & ferinos motes ad hilaritatem transfert, somnumque conciliat. In quiete denique acri quoad acri fieri licet retineantur: si diuites fuerint, famulorum adminiculo, in pauperes, vinculis. Nam inordinata motio, vires conuellit. Balneum quoque dulcis aquæ, temperatum modo corpus squalidum & aridum sit, confert: idque si tepidum tum acribeatur. Neque enim vitii quantitas tantum, quantum ipsi nocet auditas, ac vigilæ immodicæ. Quare cum balneum prædictum humectet & refrigeret, quod acri abunde demonstrauimus: non solum febricitatem, verum etiam immodicas vigilas, mentisque alienationem vna cum febre profigare potest. Non est tamen, quod sæpe antea monuimus, nisi prius vacuato corpore, eo vtendum. Præterea supra modum efficiunt phreneticis animi perturbationes: proinde nihil quod morbi iam inferat, aut bilem ceteris, his permittendum est. Ceterum quod ad curanditationem attinet, si ægri vires non obstiterint, protinus, & nequaquam veluti quidam docent posttidie, sanguis mittendus erit: quod non sit aliud salubrius, neque præsentius auxiliū. Secunda vero cubiti vena exterior, quam humeralem vocant: aut si ea non appareat, media, & quantum tolerint vires educendum. Non tamen vsque ad anism deliquium, vt nonnulli magno cum errore statunt: præstat enim minus auferre quam oportet, propter plurimam in illis factam ex vehemēti motu resolutionem. Prospiciendum quoque diligenter, ne clauis brachii vinculum æger soluat, aut adimat. Postea rectam etiam in fronte venam incidere licebit. Fit autem id recte, si collum artificiose fœtea lænea constringatur, vt vena attollatur. Ita namque si factum fuerit, sanguis statim vena secta citra impedimentum erumpet. Quod si vero ætas venæ sectioni obstitit, tum cucurbitulæ cum scarificatione occipitis scapulis, & spinæ admo- uendæ erunt. Quæ hoc etiam nomine conducunt, quod humorum ad cerebrum defluxum in contrarium auellunt atque vacuant. In hunc sane vsū confert maxime clysterum vsus, qui accipiunt: *Florum violarum, nymphae, singul. pugillum vnam. Foliorum malue, violarum, intybi, ficiini angustifolii, lactuce singul. Manipulorum vnum. Hordei decorticati, vnciam vnam. Alyxurum (Sebesten vocant) numero vndecim. Seminum cucurbitæ melonum cucumeris singul. drachmatres. Prunorum, numero viginti. Coquantur in aqua iuxta quantitatem tantisper, donec tertia pars absumatur, & colo transfundantur. Deinde accipiantur iuris decocti, vncia duodecim. Medulla castæ fœtularis recens extrahit, vncia vna & dimidia. Mellis rosacei, vncia vna. Olei violacei, vncia tres. Salis, drachma vna & dimidia. Commixti omnibus fiat clyster. Si volueris vt vehemētius purget, addenda erit hieræ picra, aut antidoti & succo rosaceo, vncia dimidia. Ridiculum vero est, quod nonnulli iam dictorum calidorum antidotum prohibent, metuentes ne febrem augcant & agitent. Quasi veto ex noxiorum humorum vacuatione & auersione, *Galenus* 1. sect. apho. com. 24. teite, non maior sit vitilitas, quam id quod consequitur ex eis detrimentum. Ad humorum a capite auersionem non parum conferunt vincula ex tēmis corporis partibus inieci: vitem pedum frithones cum sale & aceto, idque genus alia. Caput autem rosaceo, vel oxyrhodino tepidioribus pannis lincis in imbutis irrigare oportet. Inflammato enim cerebro, et membranis eius, frigiditas tuta non est, sicut neque vehemens caliditas. Siquidem frigiditas meatus constringit, neque finit excrementa e capite discent: at ingens caliditas feruorem congeminat. Æstate itaque rosaceum exquies tepidū adhibendū, cum paucis aceto: hyeme autem mediocriter calidum, vt humor a capite repellatur, & ne immodice calefactū, sed aliqua ex parte refrigeratū ab oxyrhodino, humorum ad se trahat, illisque impleatur. In hunc vsū etiā admiscere illis licebit, succū solani plantaginis, aut illarū & similium herbarum stillaticios liquores. Si malum ipsum vehemētius fuerit, caput faciemque assidue oleo in quo capra papauerum decocta sunt, fovebis. Trallian^{us} quum morbus viget & vigilas, mentisque alienationem inuehit, oxyrhodino caput largiur, madefaciendū esse monet, & decoctū papaueris capisum, psyllium: et si in comendole, vt alia sæpe, psyllium scribat: & hederam permiscendam docet. Odorata quoque naribus obiciemus, rosas, violas, nymphaeas flores, & eiusmodi. Nares quoque ipsas intus, aut frontem succis prædictorum medicamentorum illincimus. Nam sopite ac stupefacere principem facultatem oportet, cerebrum nimirum, quod supra modum incaluit, refrigerando. Si vigilas quoque admodum vigent, quæ somnum*

Carasia.

Venæ sc.
dio.

Clyster.

Myxa.

Localis.

Somnia.

- A** conciliare possunt, *ut est Diaconijon*, quod *Tralliano teste*, non solum vigiliis, sed etiam febri medetur, & caput tanquam ab igne adustum refrigerare potest: & alia multa quæ supra commemorauimus, non temere adhibebuntur. Inter alia vero hoc non parum conducit vnguentum, quod recipit: *Vnguenti populeum, drachmas duas.* *Olei violæ drachmas tres.* *Seminis hyssopami, corticis radicis mandragoræ, utriusque scrupulum dimidium.* *Opii grana duo.* *Cera grana tria.* *Actiparum, cera alba quod satis est: fiat vnguentum, quod temporibus utilitur.* Sunt verò id genus medicamenta caute & cum iudicio adhibenda, quod cerebrum suapte natura frigidum sit, ac pars corporis princeps. Quapropter imbecillioribus hec quaquam fortia & vehementia, sed non in pondere & quantitate adhibenda sunt. Embrocha etiam hæc tepida caritati adiuuenda, quæ accipit: *Florum violarum siccarum, rosarum rubearum, nymphaeæ singul.* *Manipulum vnum & dimidium.* *Hordei excocti, viciam vnam.* *Seminis papaueris albi, drachmas duas.* *Seminis lactuæ, drachmas tres.* Decoquantur singula in aqua fontana iusta quantitate ad certum, *siveque embrocha.* Possent etiam decoqui in eundem viam filia lactuæ, solani, phylli, & capiti papauerum. Sub puluinarum etiam calices papaueris, aut poma mandragoræ supponenda. Poltreum vbi morbus iam non nihil reledit, minorque factus est, id quod tertio die vplurimum accidere solet, discutientia medicamenta, quæ morbi reliquias ad crassos vapores dissipare possunt, adhibenda. In quem vium iam commemoratam embrochâ ad-mouere licebit, *adiciunt tamen floribus chamæmeli, anethi, meliloti, althææ, & similibus.* Sunt qui hoc tempore gallinas, aut catulos per medium filios capiti non tenere apponant, quæ contra vulgus in morbi principio, ac summo incremento eos admoueant, phlegmonem & febrem hac ratione augens. Alii adhuc calidum arietis pulmonem, vel recens exanimante acceptum, vel aqua feruenti calefactum, vel pullum columbinum, admoueant. Porro si diuturnum iam vitium fuerit, in eo scrypyllum, rhyumum, althæa, & spondylium decoquere conuenit. Galenus quoque *libr. 11. & 12 Ther. method.* castoreo vtendum esse (phlegmonem iam scilicet inclinante) de cet: quod nimirum non continuo locis circa cerebrum, sed ossibus interuenientibus occurrat. In ista autem medicamento & partium tenuitas, quod ipsum iis (quorum per densa propugnacula transmitti vim oportet) est accommodum: vt his de causis castoreum phreniticis etiam magno cum fructu adhiberi queat. Phrenitici vbi sese recolligunt, ebrietatem, otium, ciborum corruptiones, & in primis solis æstus cauebunt.

De Lethargia. C. A. P. XXII.

- A**liæ propterea dictus, de eo enim hic agitur, vitium est phrenitidi contrarium, nempe sopor præter naturam continuus, & inexpugnabilis pene dormiendi necessitas, atque obliuio cum lenta febre. Aliqui latine *veternum* interpretantur. Hoc vitio correptis, omnium rerum obliuio accidit, vt verbis nulla suppedietur materia: hinc etiam nomen nactum est. *aliæ* enim obliuio est, *et* vero captura, vel *et* iners: vt *aliæ* non sit aliud, nisi iners obliuio, aut malam obliuionem inducens. Causa eius est pituita atque putrefacta, aut pituitosa plenitudo, quæ frigore nimio, ac humore cerebrum imbuit, & in somnum impellit. Lethargicos propterea dictos comitatur febris lenta, & nequaquam acuta, putreficit enim in hoc vitio pituitosus humor, *Galenus libr. 13. Ther. method. teste*, cum profunda in somnum delatione. Pulsus iis magni rarique sunt, & vndosi. Spiritatio ipsa nimis rara & imbecillis. Somnolenti præterea sunt perpetuo lethargici, desidiosi, & ignaui. Vix & tarde quocumque modo impelluntur, respondent, Oculos quandoque ad vociferationem aperiunt, & denuo claudunt, ad soporemque reuertuntur. Senuunt enim lethargici, atque ægri, ideoque ægre excitari possunt. Obliuiosi, & dementes, perit enim in iis & memoria, & ratio. Oliscant crebro, & hante ore aliquandiu persistunt, tanquam claudet & id obliui. Sæpe ad meiendum vocati, porrectam matulam manu tenentes, meiere obliuiscuntur. Deiciunt per aluum magna ex parte liquidiora. Nonnullis contra venter indurefcit: Urinam reddunt iumentis similem. Quidam ex eis tremiscant, & vndique sudant. Cubile, in quo decumbit æger, splendendum, lucidum, & repidum sit, æque ad calidum & siccum parum declinat. Cibi sint attenuantes, incidentes, exsiccantes, qui condiantur apio, aniso, cumino, pipere, cinnamomo, garyophyllis, & id genus aliis odoramentis. Ex quibus æger vescatur montanæ auculæ, pulli gallinæ domesticæ, perdices fardæ, merula, & similibus. Oleribus vtatur

30 Operum Leonhard Fuchsi Pars. III.

porra, asparagii, feniculi, & cinsmodi. Cremore denique pitifanæ aut pitifanæ ipsa, inter-
 dum sola, *Tralliano* scito, interum cum oxymelite, aut in qua hydropi coma, vel pulgri,
 vel thymi fuerit decocta, præsertim si febris non fuerit valida. Potus sit hydr. meli,
 aut vinum aquosum, tenue & album subadstringens. Nam ipsum cum teipelluuo
 cibo datum, non mediocriter adiuuat, *ut Celsus visum est.* Ceterum si vires permiscuerit,
 & nihil aliorum obstitit, *Galeno libro 13. Therapeutica meli hodi suadente,* sanguinem ita-
 tum initio mittere expedit. Sin min 15, clysteribus acerbis & betonica, ruta, salua, manro-
 na, centaurio minore, semine feniculi, agarico, & pulpa colocynthidiu, aliis eluenda, q. o-
 rum formula in capite De apoplexia reperies. Dein oxyrhodinum capiti admo-
 uendum, repellendum. Enim a capite humor est, quiquis is fuerit, *eodem Galeno teste.* In
 quom vsum etiam frictions cum pyrethro, pipere, sale & aceto, ligaturæque extremi-
 conueniunt, maxime a cibo, ne videat vapor ad caput feratur. Odoramenta
 quoque a somno excitatoria admouenda, vt est *castoreum, funiculus extinctæ lucernæ,*
capillus hominis, pice humida, bitumen, challianum, sulphur sagapenum, cornu ceruinum abra-
tonum, pencedanum, & succus laferpitiu. Saturcia quoque, *Pinio libr. 4. dere medica capite*
19. autiore, ex vino pota, aut cum aceto frequenter capiti infusa, lethargicos & tam
 localiter dormientes excitat. Extrema, cutraque pungere, nonnquam pilos quoq;
 in ipsis vehementius euellere oportet, quo excitentur. Lucebit etiam in aceto *thymum*
calamintham, pulegium, hyssopum, & origanum, aliaque eius generis addito castorio in-
 coquere, ac naribus ægri admoouere: quo vapor ad cerebrum delatus, humorum cras-
 situdinem dissacet. Ac frons illinenda est aut castorio, aut pilis humanis, *Tralliano au-*
ditore, crematis leuigatisq; ex aceto, quous forsan etiam naturali quadam proprietate le-
 thargo aduertentur. Palatum etiam valentibus & acerbis medicamentis, verbi gratia,
sinapi cum melle, antidoti mistridati, sberacea & puluere pyrethri, inungendum. Conarique
 oportet, pituitam in didem affixam digitis euicere. Abiis vero, etiam steinutamenus
 ex castorio, & pipere, vtetur. Si admiscerint, apoph. gmatismorum etiam vltus erit.
 Quod si vltus virium non discutitur, caput radendum, deinde fouendum est sale, melle, &
similibus in sacculis adhibitis, aut serpyllo, hyssopo, & thymo cum pauco castorio, & aceto, ac oleo,
decollo: aut castorio cum modico aceto trito, additque oleo vino caput irrigandum. Ad hac
 fin ipsi mox in capite prodelt, ex caricis & linapiæ aceto contritus, *ut in libro tertio*
De comp. medic. mensurauimus confectio, vt a capite & ex alto ad circumferentiam tra-
 hat. Postea cucurbitulas occipiti affigere cum plurius mo igne oportet, circa primam &
 secundam ceruicis vertebra, partim leues, partim cum lescificatione, vt nō solum a
 capite attrahant, verum etiam vacuent, Castorium quoq; capiti illinendum. Quinet-
 iam id ipsum, quod docet Alexander *Trallianus c. 26. libr. 1. potu:* date cum oxymelite
 expedit. Nam vno hoc medicamento nonnulli inierunt et toto corpore inpediti, la-
 nitati sunt restituti. Sit autem *castorii drachma vna. Oxymelitis, uncia vna.* In hunc vsum
 erit inter theraea exhiberi potest. Præterea ad excretionem follicitare naturā
 oportet, tum clysteribus, tum iis quæ vinam mouent. Pubem oleo rutaceo, aut iri-
 no, cui sit adiectum paululum castorii, alpergere conuenit. In potu etiam danda, quæ
 crassit emat enuare & incidere valent: vt est *apii feniculi, adiansi, & similitum decoctum,*
cum oxymelite simplici, vel scyllitico, & serapio hyrasmia. Nam vt deglutiant: et aliūmodi potio-
 nes crebrius adinueniendi sunt: ideoq; vt per bombylium ori saltem instillentur, cera-
 bimus. In diuturnis lethargiis, vbi vires fuisset, danda hiers est ex colocynthidi de sterma-
 tamentaque ex eleboro albo struthio, pipere, & castorio, aliaq; *(quorum paulo supra scita est men-*
tio), medicamenta admouenda. Porro vbi morbus inclinare incepit, gelatio statim
 continua vtilis est, & balneum, quod supra modum confectis hoc tempore solet. Si-
 quidem Alexander *Trallianus* c. fert, se cognouisse quendam, qui grauissimo lethargo
 laborauerit, adeo vt se leuari nō sentiret. Is post septem morbi dies balneum
 ingressus, tantum fecit auxilii, vt a somno statim expersiceretur. alioque attente
 intelligeret, & ipse vbera expedite faceret, familiares omnes agnoscens. Quod si
 vero balneum statum propter vires imbecillas ferre haud possit, saltem domi in solio a-
 quæ calidæ laundus erit. Cauendum tamen, ne aqua caput ægrotantis perfundatur.
 Smocmate autem mordaciore in balneo detergendus, vt *vinifese vsta, sinapi, pyrethro,*
pipere, lauri baccis, sale vna, & similib. quibus duplum nitri addendum.

Decaro. C A P. XXIII.

K ^A ^{Ar} proprie dictus, vitium est, quod sensuum, vniuersarumque motionum priuatio, spirandi tamen facultate manente illaesa, non sequitur. Arabibus Rhazi praesertim, *Subet* appellatur. Alio nomine perniciosus dicitur, *ut lib. 3. Insitum nostrarum scilicet. i. caput. 12.* copiosius ostendimus. Differt a lethargo, *Actio teste*, quia lethargici interrogati respondent, neque omnino morti decumbunt. Caro autem laborantes somni quidem profunditate occupantur: at si stimulantur, etiam sentiunt, nihil tamen dicunt aut loquuntur, neque oculos aperiunt. Praeterea, *ut Paulus annotauit*, febris earum praecedit, eaque vehementior: lethargum subsequitur. Item carus aliis symptomatibus superuenit: saepe enim febrium accessibus, comitialibus, cerebri compressionibus, nunc quidem ossibus, hoc est caluaria, fracto & coarctato, nunc vero membrana arteriolem cerebri ventriculum custodiente, compressa. Lethargus autem propriam quandam consistentiam obtinet. Distat etiam ab apoplexia, quod in hac spiratio vehementer opprimatur, sic ut quispiam etiam magno conatu vix spirare possit. In citra autem spirandi facultas, *ut testatur Galenus lib. 4. De affectibus loci. cap. 2.* haudquaquam ledatur. Fir earos proprie dictus, variis a causis, nempe ab humore frigido, crasso, ac omnino viscido cerebrum occupante. Item a frigida morbo calore innatum ad interiora reuocante, & cerebrum grauantem atque opprimentem in pituitarum febrium accessionum initiis. A vehementi capitis ictu, contusione mulcutorum temporum: ossis perforatione, & ventriculi cerebri attritione. Signa ^C ex iis quae paulo ante commemorata sunt, facile colligi possunt. Siquidem somni profunditate occupantur, oculique in hoc vitio perpetuo conuiuent. Ceterum victus ratio & curatio eorum, quicquid laborant, cum lethargicorum plane conuenit, nisi quod ad maiorem inelisionem attenuationemque declinamus. His vero in primis conferri edera nasturtium aut coctum in iusculis, aut crudum in acetariis. Nihil enim est, quod cerebrum magis exsiccat, vimque & vigorem animi magis excitet, quam nasturtium. Vnde prouerbio dicitur, in socordes, somnolentos, ignauos, hebetes, stupidosque, *ede nasturtium*. Ut mirari subeat, aliquos inueniri, qui illud si minus conciliare scribant. Stomacho etiam cataplasma & alia medicamenta, quae calefaciunt & corroborant, sunt adhibenda, quod si pituita, quae illum refrigerat & humectat, refertur sit. Quorum formulas describimus *libro tertio caput. 1. De ventriculi imbecillitate*.

Caros quid
Subet,
Differt con-
traria a Le-
thargo.

Ab apople-
xia.

Causae.

Nota.
Videtur & in
vicio & cura-
tio.

Decatoche & catalepsi. C A P. XXIV.

K ^A ^{Ar} proprie dicta Graecis, *occupatio, detentio, & deprehensio omnium nimirum sensuum*, Latinis dici potest. Recentiores medicinae scriptores *congelationem* nominant. Est autem *subita detentio & occupatio, tum mentis, tum corporis sensu ac motu priuati, agra in ea corporis figura permanentis, in qua fuerit correptus, siue sederit, siue iacuerit, siue clausus, siue apertus oculis persisterit*. Detentio autem in qua oculi aperti manent, *Catoche* proprie nominatur. Ea vero, in qua oculi clausi sunt, improprie *catoche* vocatur, *ut libro tertio Insitum nostrarum sectione 1. caput. 12. fusius monstrauimus*. Quapropter medium quoddam inter phrenitidem & lethargum vitium est. Nam ratione frigiditatis cum lethargo conuenit: siccitatis autem ergo, cum phrenitide. Hoc est, quod hoc vitio affecti, neque plane phreniticis assimilentur, neque etiam lethargicis. Accidit hoc vitium nonnunquam ob Languinis, melancholici scilicet, qui frigidus & siccus existit, copiam, *ut antea testatur Aetius*, in caput irrumpentem, ipsumque implem- ^{Causae} tem. Is enim commemorat, se olim hoc vitium conspexisse in adolescente, multo sanguine, melancholico nimirum, referto, qui quum dies tres exegerat neque conuiuens, neque ad obiecta minas oculis nutans, neque respondens: quarta autem ingenti sanguinis, melancholici scilicet, e naribus eruptione facta, protinus omnes turbulencias recessisse. Fit etiam frequenter, *eodem teste*, a melancholico, hoc ^F est, frigido & sicco, humore, cerebri posteriora de Galeni libro quarto de loco, *locus cap. 3. sententia*, per tissimum molestante. Galenus libro primo de sympt. *causis capite secundo* per consensum cerebri cum ore ventriculi, ubi scilicet humor pituitosus, aut vapor aut melancholicus sursum fertur. Ab utroque namque *catoche* fit, proprie dicta, a melancholico: improprie vocata, a pituitoso, *ut loco supra citato monstrauimus*. Inuadit

Catoche &
Catalepsi.
Congelationem.

Causae.

Nota.

Note.

Diferimen
inter caso-
chem & ca-
tem, ac le-
thargum.Vitus ra-
tio.

@uatio.

Κῆρα
Sopor.Κῆρα
Sopor.Κῆρα
Sopor.

hoc vitii hominem subito, qui voce sensuque priuatur, nihil audit, nihil respondet, respiratio nulla fere apparet, sed quasi mortuus decumbit. Pulsus est exiguus, languidus, & vehementer densus. Alius & vrina detinentur, aut cerie parum reddunt idque non siccitatis prorsus ratione, quod æger humido interdu plurimo abundet, sed propter sensuum stuporem siue insensibilitatem. Facies alias subrubescit, cum scilicet a sanguine melancholico vitium procreatur: alias vero liuet, quando nimirum a melancholico humore ortum fuerit. Porro oculi in hoc vitio immobiles plane manent, vel uti congelati. Differt autem a caro, quia Galeno lib. 4. *De laboran. aff. feb. lib. 2. cap. 2.* teste, ut in hoc palpebræ perpetuo clauduntur, sic in catoche interdum, ubi scilicet a pituitoso nascitur humore, apertæ manent. Distat etiam a lethargo, et si enim vitium vitium sit a vehementi refrigeratione, tamen in lethargo, ut statuitur Galeni lib. 2. *Aph. comment. 3.* refrigeratio immixta est humiditati, in catalepsi vero siccitati. Vitis ratio pro causarum ratione variatur. Æger vero interim singulis diebus, interim vno interposito nutiri debet. Quare quum vitium hoc vehementer sit periculosum, si aut cibo aut potu erretur, operam dabit Medicus, vt se in vitium ratione adhibenda prudenter gerat. Alimenta autem sint prorsus cremor, & huiusmodi. Aqua vero pota infestissima est. Flatum enim auget, fluctuationes cit, lienem attollit, neque sitim restituit: potus autem sit multo diutius cocta, & quæ multum bullierit: aut vino vitatur aquoso, albo, enui, ac subadstringenti, & bene diluto, vt caput non percutiat. Quod ad rationem curandi spectat, si facies subrubescit, atque adeo æger sanguine melancholico abundare videtur, & vires valide fuerint, cubiti venam anteriorem, quam cephalicam vocant, secate ne differas. Postea si caput calidius appareat, ea quæ refrigerant adhibebis. In hunc usum oxyrhodinum, vel papaueris calyculos in oleo decoquere oportet, ac eo subinde caput inungendum. In reliquis, quibus scilicet facies liuescit, adeoque ex melancholico humore cerebrum occupante vitium hoc accidit, primo clysteribus melancholicum succum trahentibus alius abluenda est ex floribus buglossi; caput, thymo, epithymo, radice polyadii, folliculis senæ, & si similibus compositis, quorum formulas infra in cap. De melancholia producemus, quod si alius sic non obediit, ellebori nigri radicem tum quoque incoquere non aliter metuit. Caput autem oleo chamaemelino, in quo serpillum aut hyssopum, aut thymus, aut simile aliquid coctum fuerit, aut libaneo aut anethino, aut simili inungendum. Idque totum potissimum facendum, vt caput frigidius esse appareat. Porro si in vrina crassities affuerit, dandum etiam anethi, apii, calamintha, & aliorum quibus extendendi facultas inest, decoctum. Reliqua quæ ad curandi rationem necessaria sunt, partim ex capite De phrenitide, partim ex eo quod De melancholia inscribemus, partim etiam ex eo quod De lethargo est inscriptum, petenda erunt.

De comate. C A P. XXV.

Κῆρα et auctor est lib. 3. *Epid. com. i.* textus septim in expositione Galeni est *οἷον*, id est delatio in somnum, quum agri vigilare nequeant, oculos minime apertos, sed conuiuentes potius habentes: vel profundo, aut tenui leuique somno, vel etiam vigiliis detinentur. Quocirca Hippocrati & aliis Græcis Comadum est generum, vnum quidem *ινδου*, id est, somniculosum, vel *παρῖ*, id est, græce: aliter: vtrumque vero *αἰον*, hoc est, vigilans. Primum ita dictum est, quod ægri in eo profunde & diu dormiant, ita vt vix expergisci possint. Hoc vtrique vitium Latinis *gravis & profundus somnus* dici potest. Significat enim com somniculosum, siue græue profundum, vt non simpliciter *longum somnum* quod nonnulli putauerunt, sed Galeno lib. 2. *Aph. comment. & lib. 3. Epid. com. 3. autior*, *δυσχερ*, hoc est, cum a quo quis agere & difficulter excitatur. Quare *αἰον* simpliciter, & sine aliis adiectione, vel etiam cum adiectione illa *ινδου* & *παρῖ*, est vitium, in quo agri vigilare nequeunt, nec apertos habent oculos, sed conuiuentes, atque & unde facile expergisci nequeunt somno detinentur. Cum hac vero adiectione, *αἰον* *αἰον*, hoc est, vigilans *αἰον*, Galeno com. 3. iam citati libri tertii *Epid. teste*, est vitium, in quo ægri aperti oculis vigilare non valent, sed conuiuent spe somni conciliandi, & vigiles tamen manent. Quare vt coma soporiferum a comate vigilante discernamus, necessarium erit. Commune quidem est vtriusque non posse attollere oculos: statim enim gramantur, & dormire cupiunt, hincque adeo est, vt vtrumque comatis appellationem forti-

- A** fortitum sit. Privatim autem somnulosum id obtinet, vt in eo ægri dormiant. In vigilante autem ægri oculos quidem claudunt spe dormiendi, vigiles tamen permanent, vt hoc nomine facile discerni possint. De diffinitione veto generum soporis copiosius lib. 3. sect. 1. cap. 31. Institutum nostrarum diximus. Coma soporiferum, vt testis est Galenus comment. primo, libri 3. Epid. fit inter dum, vbi cerebrum immodice irrigatur, vt nonnullis vsuuenit ebriis, repleto in ipsa ebrietate capite, atque admodum humidato. In febribus etiam soli vapores calidi & humidi a partibus inferioribus sursum elati, cerebrum implentes & irrigantes, vitium hoc inducunt. Subinde etiam ob solum frigus, quod primum sensitiuum, hoc est cerebrum, occupat. Est cum ambobus iam dictis, hoc est frigiditati & humiditati, succedat somnus ille grauis & profundus. Quo sane casu profundior & grauior somnus erit: velut tenuior, si a sola intemperie frigida vel humida ortum sit. Fit denique propter vitium imbecillitatem, adeo iam languentium, vt apertas palpebras seruare haud valeant. Quare pulsus in ipsis languidissimus, tardus, rarus, & parvus est, quo ab eo comate quod humiditas & frigiditas committit facile distinguitur. Vigilans autem coma a pituita cum bile commixta nascitur. Ægri in soporifero comate, Actio teste, demissa infirmiori mandibula obdormiunt, ac quoties excitantur, nouo repente somno capiuntur. In vigilante autem enormia loquuntur, totoque corpore in composito iacent, & partim ea quæ in phrenitide, partim etiam ea, quæ in lethargo apparent, signa adiunt. Curandi ratio iuxta duplex coma variatur. In soporifero enim eadem quæ in caro & lethargo adhibentur remedia; atque vt summatim dicam, post vniuersi corporis vacuationem, pro frigiditatis aut humiditatis ratione, calefactio vel siccitas intendenda est. Si enim ex humiditate tantum somnulosum coma originem ducit, iis quæ exsiccat capiti ad motus curati debet, ex acerrimo videlicet acetos cum rosâ, & chamæmelo permixta, eo irrigato, ac eiusdem medicamenti euaporatione per nares suscepta. Sin ex frigiditate, anethinum oleum, vel chamæmelinum calefactum adhibendum: ac quantum intenta est frigiditas est, tantum etiam calefacienda augenda sunt, vt etiam pulegium & ruta aliquando in oleo coquere liceat. At si ex frigiditate, & humiditate iunctis excitetur, vt lethargus curatur. Si ex virium imbecillitate natum est, per ea quæ illas instaurare valent sanari dum erit. In vigilante partim phrenitidis, partim etiam lethargi remedia locum habebunt. Vtrum autem aliud superare debeat, ex humore exsuperante cognoscitur. Si enim pituita superauerit bilem, magis ad lethargi remedia declinandum erit. Sin contra bilis pituitam vicerit, magis ad phrenitidis præsidia nos conuertemus. Quare auxilia quæ ad vigilantis comatis curationem sunt necessaria, e capitibus de phrenitide & lethargo petenda erunt. Glandes autem potissimum in hoc vitii genere conferent sedi suppositæ, quod irritando efficaces admodum sunt.

De memoria abolita. C A P. XXVI.

- M**EMORIA abolita. C A P. XXVI. Abolito partim per se, partim etiam cum quadam rationis noxa accidit, quemadmodum & rationis noxa per se prius incipit: deinde memorie insequitur. Contingit autem vtrunque pati nonnunquam adionem. Abolentur ambæ in lethargis, ceterisque soporiferis morbis. Fit etiam, vt prædictis vitis iam solutis, obliuio succedat. Quod vbi acciderit, tum frigida omnino intemperies in causa erit, quod vel perit, vel grauius læsa est memoria. Hæc nonnunquam humiditati, nonnunquam etiam siccitati iuncta est. Interdum autem vnaquæque prædictarum per se causa vitii esse potest. Quapropter causæ diligenter a Medico discernendæ sunt. Si itaque sola intemperies sicca cerebrum pertinaciter oblidens causa vitii fuerit, vigilæ frequentes infestabunt. Sin humida tantum, torpores, & in somnum propensiones, somnosque longos & graues efficiet. Si vero humiditati frigiditas etiam accesserit, caros & lethargos creabit. Eorum itaque, quorum memoria perit, somnos obferuare oportet, vtrum scilicet vehementer an modico somnolenti sint, aut omnino non somnolenti. Sic enim vincetem inuenies intemperiem. Præterea considerandum est, vtrum excernant quippiam ex naribus, vel ab ore quod a capite defluat, vt monet Galenus lib. 3. De affectu loci, cap. 3. an arida huiusmodi partes sint, quippe ex iis affectu ipsum cōiectura consequi poterimus. Videtur ratio pro

34 Operum Leonhard. Fuchsi Pars III.

Causa.

causarum varietate mutatur, ut ex iis quæ paulo post dicemus, manifestum fiet. His A
in eum modum definitis, facile curandi ratio præcipi potest. Nam si propter vehem-
entes purgationes, ceterasque immoderatas inanitiones, aut syncopas, atque adeo
siccitatem memoriæ noxa supervenerit, nulla alia re addita, vitæ tantum rescien-
tia succurrere oportet. Corroborato enim corpore, collectisque viribus, memo-
ria reparatur. Quæ autem ad eam victus rationem necessaria sunt, ex capite *De he-*
thica febre petent studiosi. Si ob extremam senectam memoria pereat, frustra labo-
r.andum, ad moris scilicet remediis, non est: sed tantum convenienter victus ratio-
ne contentos esse oportet. Verum si repente memoria defecerit, ceteris partibus
incolumibus, epilepsiam, aut nervorum resolutionem, aut apoplexiam vereri oport-
et. Quare tum omni studio ac diligentia providendum erit, ne tale aliquod acci-
dat, quod futurum suspicamur. Quibus enim prædiis factum morbum repellimus,
isdem futurum arcebimus. Quod si vero ex aliis morbis, ut lethargo & pestilen-
tia, memoria pereat, tum strenne remediis contra eundem. Pestilentiam autem se-
qui memoriæ abolitionem, supra capite 20. ex Thucydidis historia, quam refert Gale-
nus in lib. *De symptom. differentiâ*, ostendimus. Summa vero curationis in calefacien-
do tum intrinsicus, tum extrinsecus consistit, si a frigida plane cerebri intemperie
nuda vitium ortum fuerit. Calefactoria itaque medicamenta tam extra, quam in-
tra, ut dictum est, corpus adhibenda. Extrinsecus autem inunctiones capiti ex oleo ca-
lido, idque ætate, adhibendæ. Hyeme vero in nix cum aceto acriori, interdum
serpyllo, calamento, & iis similibus in eo decoctis. Quidam etiam adiciunt piper, C
& lauri baccas, vitæ & cast. rium, cum oleo occipiti illunt. Confert etiam hoc vn-

Vnguenti.

guentum, quod accipit: *Olei a lateribus, de castoreo, utriusque vnicuius dimidium. Radici acor-*
riphi, utriusque scrupulum vnum. Pyrethrorum, utriusque scrupulum dimidium. Cum cetra
quod satis est, fiat vnguentum, quo rasum occipitium inungatur, & subinde saccu-
lus imponatur, qui accipit: *Florum rosmarini, melissophylli, laurandule singul. manipulum di-*
midium. Florum sambuci, manipulum vnum. Stichadi, drachmas tres. Nucis mosebata, ligni
aloes, masticis singulorum scrupulum vnum. Contusa in sericum dimittantur, formeturque sac-
culus. Eius farinæ medicamenta complura e superioribus capitibus petenda erunt.
Intro in corpus autem acorus conditus, saccharum florum betonica, maiorana, rosmarini, la-
urandule, spica nardi, melissophylli, salvia, adiciunt piperis, garyophylli, cinnamomo, & id genus, aliis D
odoramentis simulantur. Si vero a frigidityte & humiditate memoriæ abolitio fiat, non
tantum ad calidum, verum etiam ad siccum vergat vniuersa victus declinabit. Hie-
ra picra exhibenda, quæ vacuando nihil vitæ secum trahit, sed id tantum quod mo-
lestum est educit. De n. *apoplegmatisimi, sternutamenta,* & reliqua, quæ caput per os &
nares purgant, ad movenda. Sinapismus quoque capiti vtiliter applicatur. Quod ad
victus rationem attinet, alimenta sunt, quæ calefaciendi exsiccandi que vim obtineant.

Sacculus.

Ab infrigidantibus omnibus abstinendum erit, & oleis, & fructibus bellariis, ca-
seis, & lacte, aliisque quæ status gignere possunt, crassioris succi ac humectantibus ali-
mentis. Acriora vero ex intervallis alimenta afferenda, ut sunt *origanum, thymra,*
quam satyriam vocant, pulgum, & eiusmodi. Cavere autem oportet in vniuersum cru-
ditates, tanquam rationi ac menti infestissimas. Dandum agrotantibus vinum te-
nue, album, & valde antiquum: sira enim moderatâ caliditate cum alia non pauca ef-
ficiat, animam etiam tranquillam, festivamque reddit, consonos illi morus præben-
do. Plurima vero aquæ, multoque magis vini potio pessima est: vehementer enim
humectat caput, ac nihil æque obtuionem inducit, quam humiditas. Somnus sit tem-
peratus. Cura satietatem. Veneris usus rarissimus: neque enim totius corporis sanitati,
neque rationis actioni, si immoderata fuerit, confert. Balneo etiam, potissimum a si-
napismis, locuserit. Quod si ex pituitæ redundantia memoria amissa fuerit, eam prius
concoquere & præparare, dein medicamentis convenientibus vacuare oportet, ad
eum modum, qui in præcedentibus capitibus expositus est. Sin ex frigida & sicca ce-
rebr. intemperie obliuio orta sit, aut ex melancholico humore, curationes e suis po-
tendæ locis erunt. Hæc pro reparanda abolita memoria sufficiunt in
p. 28. Alia enim quæ requiri possunt, ex supe-
rioribus petendæ erunt.

De p.

A De Apoplexia. C A P. XXVII.

- A**POPLEXIA est, ubi patiente communi nervorum principio, subito omnes corporis particulae motum simul & sensum amiserunt. Vel est privatio sensus & motus in univ[er]so corpore, cum functionum a & oluntati imperio procedentium lesione subito superveniens. Si in altera duntaxat parte obstructio fuerit, *inchoata est apoplexia* Græcis, *resolutio* Latinis dicitur, ut capite sequenti clarius docebitur. Fit a pituita, hoc est, frigido, crasso, lentoque humore, ventriculos cerebri principallimos una vice & cumulati[m] replente, quem nimis cruditates, arebræque potissimum ebrietates procreant. Contingit etiam ob calum, aut istum cerebrum concutientes, atque ut illic humores confluent efficien-
tes. Aeris quoque admodum frigidi occurrit, qui cerebri humiditates & excrementa coadunat, & constringit. Præcedit hoc vitium capitis confectus & acutus dolor, & irregularium venarum elatio, vertigo, oculorum splendores, & extremarum partium sine ratione refrigeratio, totius corporis palpatio, diffusus motus, & dentium inter ducendum stridores: urinam emittunt argenteam, nigram, paucam, & farinaceum sedimentum habentem. Qui autem in hunc morbum acutissimum & extremum incidunt, sensu omnino carentes, mortui vivunt. Quapropter clausis oculis insit dormientium decumbunt, atque stertunt. Discernitur vero vitii magnitudo ex noxa, quam inspirationi infert, vehementia. Vbi enim hæc ipsa naturalis ordinem, plurimum egreditur, magnam ubi autem paulum impedimenti est, parvam in cerebro noxam esse conicere oportet. Omnium vero pessima spiratio putanda est, quæ intermittitur, & magna cum violentia trahitur. Hoc vitio correpti, ut dormientes, oculis clausis decumbunt, & nonnunquam stertunt. Spiratio in illis nonnunquam tam est exigua & debilis, ut sensum effugiat, iacentque mortuis per similes, si præsertim qui corde sunt minus calido. Lanagitur capta, aut accensa candela horum naribus, & ori admoveenda: sicut autem poculum aqua plenum thoraci: quæ si moveatur, respirationis & vitæ sunt indicia. Licet autem nullum vitæ indicium appareat, tamen ante tertium diem exactum non sunt sepeliendi, quod multi reuixisse videntur. Id genus vitii senes maxime, qui remperatura sunt pituitosiores, & qui simili viti sunt victus ratione, occupat. At si in iuuentute atque ætate tempore aliquem inuaserit, vehementem necessitatem portendit. Vitium hoc nequaquam, aut raro curatur: neque enim temere ab Hippocrate est dictum: *Apoplexiam vehementem saluere impossibile, debilem vero non facile*. Mortem enim in naturæ celerem. Qui eius periculum effugerint, in diuturnum subinde malum incidere solent, aut quibusdam membris, aut vniuerso corpore resoluti, sepe etiam ratione violata. Qui igitur quoquo modo curationem recipiant, iussitatem sanguis ex utrisque humeris modo plenitudo addit, virtutisque robur, detrahendus est. Lata vero vena sit incisio, ut sanguis crassus eo expeditius promaneat. Præterea alius chysteribus actibus ducendus est, qualis est qui accipitur: *Salvia, origani, betonica, ruta, stichadis, singulorum manipulum unum. Calamintha, hyssopi, pulegi, singulorum Manipulum dimidium. Seminum fœniculi, fœselis, siler montanum nominant) annisi, singulorum drachmas tres. Centauri minoris, manipulum unum. Radices polypodii, drachmas sex. Agarici optimi, drachmas tres. Seminii cariani, drachmas duas & dimidium. Medulla colocynthidis, drachmas duas. Decoquantur in aqua iussa quantitate, donec dimidium eius absumat. Dein recipiantur iuris decocti, uncia una & dimidia. Hiera picra, benedictæ laxativa, utriusque unciam dimidiam. Antidoti indi, drachmas tres. Diapberi con, drachmas duas. Mellis rosæ, cola transfusi unciam unam & dimidiam. Oleum laurini, rutæ, de calore singulorum unciam unam. Salis fossilis gemma hodie vocant) drachmam unam & dimidiam. Commixtus omnibus, fiat clyster. Commendatur etiam mirifice viti glaucinum, quæ ex colocynthide, agarico, elleboro nigro, sale gemma vocato, & similibus constituantur sunt eiusmodi, quæ accipiunt: Mellis colli & concreti, uncias duas. Colocynthidis, agarici, ellebori singulorum scrupales duos. Salis fossilis sacci, scrupulum unum. Redactis in omentibus in palærem, cum melle misceantur, & fermentur glandes longitudine sex aut plurimum etiam digitorum, filo appenso, ut pro arbitrio extrahi queant. Post hæc totum corpus potissimum autem spinalis medullæ initium, oleo copioso calido, cui prius *serpyllum calamintum, anethum, aut simile aliquod incoctum fuerit*, inungendum. Extremis etiam corporis partibus ligaturæ, & frictiones vehementes & asperæ cum decocto*

Apoplexia quid.

inchoata, Causa.

Note.

Apoplexia magnitudo.

Quoties potissimum occupet.

Curatio. Aphasia.

Clyster eccia.

Sal gemma Glandes.

Pentakis.

36 Operum Leonhard. Fuchſii Pars III.

radicis iſidis, adhibenda. Cucurbitulæ quoque erim ſcarificatione occipiti & hu-
 meris affigenda. Caput denique prius ſalum irrigandum oleo chamamelino, anethino,
 rutaceo, aut eo in quo primilla, qua paulo ante commemorata ſunt, decocta fuerint. Theriaca
 quoque & mithridato diſſolutis in ſtillaticio hiorum conuallii, vel lauandulæ li-
 quore vtendum. Naribus admouenda ea, quæ odore ſuo excitare ægrotantes ſolent,
 vti eſt opopanax, caſtorium, piper, ſagapenum, galbanumque. Sternutamentorum quoque
 ratio habenda erit, quæ ex pyrethra, elleboro albo, caſtorio, & aliis qua in ſuperioribus dicta
 ſunt, conſtant. Embrocharum etiam vſus conuenit e chamameli, meliſſi, ſaluia, pulegii,
 maiorana, origani, calaminta, & ſatureia decocto paratarum. Præſtat tamen ſedes vi medi-
 camentis, cuiuſmodi ſunt ſinapiſmi, qui a noſtris hodie emplaftra rubificancia vocantur:
 qualis eſt qui accipit: Olei coſtini, vnc. vnam. Olei caſteriori & euphorbia, vtriuſque drach.
 tres. Sinapiſ, drach. duas. Caſteriori, drachnam vnam. Sagapeni, drachnam vnam & dimidiam.
 Euphorbia, ſcrupulum vnum. Acci, drachmas duas. Cum cera quod ſatis eſt, ad emplaftri con-
 ſiſtentiam coquant. Præſtat etiam ante ſinapiſmi admotionem caput inungere oleis
 laurino, rutaceo, de caſtorio, adiecta aqua vite vocata. Sarrago præterea, hæc anchora, calo-
 facienda, & capiti calida admouenda. Oportet etiam ori, viſperto, digitum vel pen-
 nam oleo irino madefactam inferere, vtea quæ inſunt, eiiciantur. Porro ſedes quoque
 iis medicamentis quæ ſtatus educunt, ruta, eumino, nitro, & melle illinenda. Vbi
 vitium remiſerit, cubus exiguus, levis, mollis, diſtribui facilis, & ſuauulentus, adiec-
 to ſere ſemper melle, aſſumendus, vt eſt gallinarum, aut pullorum ius cui hyſſopus, ſerpyll-
 lum, ſatureia, maiorana, aut ſaluia incocta ſunt. Si vox nondum tedit, & vires permittunt,
 cucurbitulæ occipiti cum ſcarificatione affigantur. Si fieri poſſit, etiam hypocho-
 ndriis. Ægri poſtquam ab acceſſione liberati ſunt, atque coaſerunt, remediis ii quæ
 mox ſequenti capite dicemus vtendum erit, deim vehantur curru, aut leſſica, aut penſi-
 li lecto geſtentur. Potus ſit mulſa, ſive oxymel. Caueant ſibi a vini potione. Poſt 21.
 diem, ægroti balneo aereo & ſudatorio credantur. Verum de medicamentis, quæ ad
 reliquam curandi rationem requirantur, ſequenti capite copioſe dicemus.

De reſolutione alterius lateris. C A P. XXVIII.

Refolutio. **P**aralyſis & viciſſim quæ Latinis reſolutio dicitur, Galeno lib. 3. De laborantibus locis, cap.
 10 auſore, eſt, vbi alterum duntaxat latius aut dextrum aut ſiniſtrum, ſenſum ſimul ac mo-
 tum amittit. Interdum etiam in vna aliqua tantum parte (verbi gratia) manu, eture,
 lingua, accidit. Animaduertendum autem hoc loco erit, quod reſolutio ea, quæ ſe-
 quitur apoplexiam, vt teſtatur Galenus lib. 4. Viſc. acut. comment. 23. priuatim Græcis
 & Syriis nominatur. Proinde paralyſis nomen generalius eſt, quam paraplegia, quod
 hæc ſolam eam, vt dictum eſt, quæ ex apoplexia fit illa vero omnem reſolutionem ex
 quæuunque occasione ortam, ſignificet. Ceterum quum per reſolutionem interdum
 ſenſus tantum, interdum motus, nonnunquam ambo pereant: neruorum reſolutio po-
 tiſſimum dicitur, vbi modus deperditus eſt. Cui autem nunc duntaxat ſenſus,
 nunc motus tantum, iam vero vterque ſimul admittantur, Galenus lib. 1. De ſym-
 ptomatibus cauſis, cap. 5. copioſiſſime explicat, vt non ſit opus hæc nobis denuo com-
 memorari. Hoc autem in præſentia dixiſſe ſatis ſit. Netuos aut cutem deſinentes,
 quod cutis motu careat, ſenſum duntaxat afferre: eos veto qui muſculis additi ſunt,
 ſenſum motumque illis impattiri. Quapropter ſi cutis netui ſaueiantur in vulnera-
 tis, aut ſi eos noxia materia laceſcit, atque occupat, tum ſenſus amittitur. Sin illi
 nerui lædentur, qui in muſculos inferuntur, illis qui ad eum feruntur illæſis, amit-
 tetur quidem motus, ſed perſtat ſenſus: quod ſi vtrique noxa illata fuerit, & ſen-
 ſus & motus peribunt. Generatur quidem a multis craſſis & lentis humoribus ner-
 uos aut neruorum principia obſtruentibus, qui ne animalis facultas a principe par-
 te ad membra delabatur, impediunt. Hac ſane ratione refrigeratio ingens ex niue,
 compreſſioque neruoſorum corporum, reſolutionem efficiere poſſunt. Ad cuius vi-
 ti dignotionem multis indiis minimo opus eſt: nemo enim non videt eam partem
 quæ motu deſtituta eſt, reſolutione affectam eſſe. A qua vero cauſa acciderit, partim
 ex ægri relatione, partim etiam ex ſignis ſupra de dolore capitis & pituitioſis humoribus
 ordo commemoratis, deprehendere licebit. Viſus ratio in vniuerſum attenuatoria &
 ſiccans eſſe debet. Verſetur itaq; æget in aere calido & ſiccato: qui ſi talis haberi nequit,
 indu-

- A** industria Medici parietur, igne luculento, suffitibus ex caryophyllis, & aliis id genus. Primisque tribus diebus tenuissimo vtatur victu, hoc est, omnimodam sustineat inedia, aut solius melicrati viu, aut pauco pitisanæ succo contentus sit. Dein cibi boni succi, & concocti faciles, assique exhibendi, montanarum præcipue auium, & perdicum carnes, oua forbilia, amygdalæ & pinæ. Panu sit bene coctus, admixto aniso, aut melanthii semine. Inter olera vtatur æger *feniculo petroselino, hyssopo, maiorana, saluta, & satureia*. Vi-
tet pisces, fructus, & omnia frigida humidaque. Potus sit exiguus, sitimque quam po-
test maximam sustineat. Bibat mulsam, cui saluia, aut cinnamomum incoctum aut ad-
mixtum sit. Vel vtatur potu, qui hodie a barbaris Medicis Hippocras nominatur, qui
accipit: *Cinnamomi selecti, uncias duas. Zingiberis, unciam dimidiam. Piperis longi, granorum* Hippo-
cras po-
tus.
B paradisi, acori, (quem hodie galangam maiorem appellant) sing. drachmam unam. Cardamomi, Acorus
drachmam unam & dimidiam. Næci moschata garyophyllorum, maceru singulorum drachmam quid.
unam. Decoque in aqua fontana libra sex, donec quarta pars hoc est, libra una & dimidia ab-
sumatur. Ius decocti refrigeratum colo transfundatur, diligentius, quæ decocta fue-
runt expressis, & cum sachari libra dimidia, huic dulcedo concilietur, huiusque potus. Vi-
no abstinendum, donec vitium totum deficiat. Aut si difficulter propter consuetudi-
nem tanto tempore a vini portione arceri potest æger, aut vitium imbecillitas vini vsum
suadeat, detur quidem, at non nisi modicum, aquolumque, & in morbi inclinatione. Mo-
tus atque exercitium, si illis uti conceditur, summe conducunt. Somnum fugiat diur-
num. Nocturnus vero sit modicior. Gaudeat, & animi perturbationes fugat. Curandi Casus.
C ratio, si permiserit ætas, habitus corporis, anni tempus, & similia, a sanguinis missione
auspicanda, potissimum ubi plenitudinis indicia astuerint. Oportet tamen detractionem
esse moderatam, ne corpus refrigeretur, sanguisque a laceribus incolumioribus
auferendus. Dein aliquot diebus a sanguinis missione transactis, alius clysteribus irri-
tanda erit, quorum hæc formula, quæ accipit: *Malua, albea, mercurialis, chamamelis, sal-* Clyster.
uia, betonica singulorum Manipulum unum. Sicchadis, unciam dimidiam. Ruta, calamintha,
utrisque manipulum dimidium. Seminum feniculi, ammeos, utrisque drachmas duas. De-
coquantur in aqua, quoad tertia pars absumatur. Dein accipiantur iuris decocti libra una & dimi-
diidia. Benedictæ laxatiua, uncia dimidia. Antidoti indi, drachma tres. Mellis rosacei, uncia
dimidia. Oleum laurini, rris, rutacei, singulorum vis ita una. Salis fossilis sacci, drachma
D una. Commixtus omnis fiat clyster. Post hæc decocta & serapia pituitosis humores extenu-
antia, atque expulsiui idoneos redditentia exhibebis, quorum formulas supra capi-
te decimotertio recensuimus. Quibus peractis, quæ humores molestantes euacua-
re possunt medicamenta, bibendi propinabimus. Sunt autem præter ea, quæ capite iam
citato commemorauimus, *pilula azavier, de hiera composita, arabica, succida; quævis nunquam* Purgandi
medica-
menta.
non ægricum admiscendum erit. Neque semel tantum purgandi sunt ægri, sed sæpius, qua-
ruor vel quinque semper interpositis diebus. Atque initio leuius, dein vero fortius me-
dicamentum exhibendum. Quid multa? paulatim a leuioribus ad vehementiora pro-
grediendum. Namque non semel tantum, sed sæpius purgandi sunt ægri, interposi-
tis tamen semper diebus quibusdam: Sequenti purgatione die, theriaca, & Mishrida-
E *dati antidotus magna cum utilitate exhibentur. Purgato iam vniuerso corpore, sternu-* Capitis
purgatio.
tamentis, apophlegmatismis, gargarismis, odoramentis, & aliis, quæ in capite 13. com-
memorauimus, vtendum. Nam id genus medicamenta pituitum, quæ in cerebro reli-
qua est, educunt, & ne ad affectas partes defluat, prohibent. Capiri denique, vnde to-
tius morbi radix exoritur, calida medicamenta illinenda, castoreum nimirum, peucedani
radix, menta, bacca lauri, trino oleo, cui parum acetii adiectum sit, incocta. Quare si aeris im-
bientis frigiditas hand impedierit, caput radendum, totumque ad frontem visque in-
tingendum. Proderit etiam purgationi subicere conseruas saluia, rosæmarina, maio-
rana, leuandula, ac spica, quæ sicchadis sunt species, adiectu theriaca, confectiõne diamoschi, di-
ambra, & id genus alii. Præterea medicamenta etiam, quibus ducutiendi inest facul- Diffusi-
tatis.
F tas, iis locis, vnde nerui, qui ad latus male affectum, sensum aut motum, aut verumque
deterentes, oriuntur, ad mouenda erunt. Id quod Galenus libro 3. de male affectu locis,
cap. 10. Paulianæ Syri sophistæ exemplo luculenter ostendit. Verum a leuioribus semper
auspicandum, nimirum oleis chamamelino, amethino, e spica, liliaco, & trino: quibus
latus quoque resolutum fovebimus. Quod etiam hoc nomine, nempe vt caleat, li-

- A** & apophlegmatismi, quorum hæc sit formula, quæ accipit: *Seminis staphydis ægræ, masti- Apophle-
ches, radicis pyrethri singulorum drachmam unam. Hyssoi, organi, utriusque drachmam unam & dimidiam. Sinapi, drachmas duas. Trina excipiantur terebinthina resina, aut rosæ melle, & cera* *monit.
mut.*
adhibita sunt pastilli manfies. Porro ligatura, quæ in oppositum, æqualiter veluti capi-
strum aliquod, partem resolutam trahit, admoventi debet. In hunc usum etiam condu-
cit crebro specula intrueri, quo videntes faciei torturam ægri, eam corrigere summo an-
nitantur studio. Parti autem laboranti, hoc est, nervis a tertio pari ortus, nœdicamenta,
quæ in præcedenti capite sunt commemorata, imponenda erunt. Sciendum tamen
hoc loco erit, non eam maxillam, quæ petuerit esse apparet, sed oppositam resolutione
infestari. Nam semper pars ubi resoluta fuerit, in diuersum trahitur musculum. Sana
B namque pars proprio musculorum munere fungens, oppositam sibi partem relaxatam
ad se trahit. Vbi lingua fuerit resoluta, vniuerso corpore prius vacuato, venas sub ipsa ex-
sistentes incidere oportet, & cucurbitulam mento admoventi. Apophlegmatismis quo-
que, collutionibus, & gargarismis ex saluia, rosæmarinæ, hyssoi, calaminthæ, strechadæ,
sinapi & similibus vtendum. Exercitia denique linguæ non negligenda, occipitque &
ceruici vniuersæ acriæ vnguentæ & linimenta illinenda. Cætera quoque & sinapismus
ponere curret Medicus. Postremo ad motus cantharidibus cum fermento aut ævæ angia
vesiculæ in ceruice excitentur. Rumpantur deinde, & brassicæ folia superponantur, a- *Vesicæ re-
soluunt
curatio.*
quantandem vacuata mox loqui incipient. Vesica resoluta, siue vrina detineatur, siue
præter voluntatem excernatur. Imo ventri & interfœmineo medicamenta communia
C applicanda sunt. Iam dictis quoque oleis ac medicamentis tota vesicæ regio ac penis in-
ungantur. Sedi immittendum oleum rutaceum, nardinum, & spicæ aut oleum in quo e-
ryngii radix, ruta, aut cuminum, aut anethum, aut simile aliquid decoctum fuerit. Vti-
liter etiam iis butyrum, castorium, galbanum, vel opopanax admiscebis. Vesicæ quo-
que hæc per colem transmissa valde profecerunt, vel sola etiam suffecerunt. In primis
itaque qui nihil vrinæ reddunt, per vrinariam fistulam (quam *cathetera* vocant) vrina eli-
cienda erit, dein medicamenta, quæ modo diximus, in vesicam per angustissimum ru-
bulum paruo vtri insertum, vt catheteri aperte coherere queat, infundenda. Dictu e-
nim mirabile est, quanta ex huiusmodi iniectionibus post vrinæ excretionem sequatur
utilitas. Benefaciunt etiam medicamenta vrinam cientia potui data, consimiliter casto-
D rium. Præterea laxantibus insidebunt ægri, & cataplasmata inde conficiemus. Cole re-
soluto, seminis, non vrinæ, excretio, & concubitus impeditur. Oportet igitur iisdem
prædiis (*quæ in vesicæ resolutione commemorauimus*) vti. Priuim autem lumbis & coxa-
rum vertebri calefactoria adhibenda, & ea quæ virgam intendere valent, de quibus *sua
dicemus loco*, vsurpanda in medicamenta. Præter reliqua vero, *Ætio nullæ*, ceteri puden-
dum femori tanquam cingulum illigatum, eiusdemque carnes comestæ, & ex aubus
sturni, sic affectis plurimum conducunt. Castorium autem tum huic, tum aliis omni-
bus resolutionibus efficacissime accommodatur. Vitare autem præcipue oportet sic la-
borantes, cibos & potus refrigerantes. Harum partium exemplo facile reliquas etiam
E curandi methodum obseruet.

De Epilepsia. C. A. P. XXX.

- E**pilepsia nihil aliud est Græcis, Galeno libro 3. De affectibus loci cap. 5. septe, quam convulsio vni-
uersarum corporis partium, non perpetua, sed quæ ex temporum accidit intervallis, cum mentis
& sensuum oblatione. Sic autem dicta est, *Tralliano lib. 1. cap. 17. septe*, quod ægri rerum obli-
uiscantur, & sensus eorum derineantur, vel quod sensum capitis, atque mentem pariter
apprehendant. Latini, præsertim Celsus lib. 3. cap. 3. *morbum comitalem* nominauerunt
quod ea laborantes, in comitiis manifestabantur, comitiaque quo die aliquis concidisset,
interrumpabantur. Tres sunt eius vitii differentię: quas ubi commemorauimus,
causas simul explicabimus. Gignitur enim primum hoc vitium, ubi cerebrum primo-
F genia ratione laborat: id quod accidit, si crassus lentusque pituitæ, vel melancholicus
humor spiritus meatuum in cerebri ventriculis obstruxerit, necruorum principio se
quatenne, quo id quod noxiū est expellat & excutiat. Cerebrum enim partem
ipsam nullam laxiorem amplioremque ac capaciorem ad excipiendā & excutiendā
excrementa hæc crassa & lenta, obstruccionemque efficientia habet, quam ventricu-
Epilepsia.
*Comitia-
lis mor-
bus.*
*Tres epi-
leptici des-
tinctiones.*
Causæ.

40 Operum Leonhard. Fuchsi Pars I II.

- II. los suos. *Secundo* fit propter consensum oris ventriculi male affecti, quum scilicet cerebrum ob acres humores in ventriculo contentos ofque eius mordicantes & affligentes in consensum ducitur: vel propter vapores ab ore ventriculi sursum ad cerebrum elatos, quos illud tanquam noxios excutere nititur. Sic Galenus libro 5. *De affectu loci, capite 5.* Grammaticum quendam iuuenem fuisse tradit, qui quories vel vehementius doceret, aut cogitaret, aut in ediam sustineret, aut irascere, comitiali morbo corripiebatur: idque non alia ratione, quam quod os ventriculi, vt pote quod ex quito sensu præditum erat, primaria ratione patetetur, ac deinde per consensum ipsum quoque cerebrum, vt nihil mirum sit, quod totius corporis conuulsio postea consecuta sit. Scribit etiam idem eodem in loco quosdam ob vehementem crudelitatem, qua os ventriculi affectum fuit: item alios quod meracioris vini plus bibissent epilepsiam incidisse.
- III. *Tertio* accidit epilepsia, at raro admodum, cum a parte aliqua corporis veluti quædam frigida aut, ægro id ipsum etiam sentiente, ad cerebrum vsq; ascendit. Hoc genus motu comitialis, Galen. lib. 3. *de affectu loci cap. 9.* scribit, se vidisse in puero, qui decimum tertium ætatis annum agebat. Quum enim ipse adolescens etiam dum, cum optimis eius tempestatis Medicis cõuenisset ad idoneam inueniendam cut: nonem, audiuit tum narrante puero, malum ipsum a crure initium capere, mox illinc restat ascendere pet scemur, & imminentes illi lumbos, ac per latera ad ceruicem, donec ad cerebrum perveniret, quod cum primum tangeret, ipsum haudquaquam sibi constare. Vnde perspicuum fit, epilepsiam primogeniam a crassis & lentis humoribus cerebri ventriculos obstruentibus perspicuo fieri. Siquidem propter iam dictos crassos humores spiritus meatus in cerebri ventriculis obstruentes, cerebrum seipsum quatit & contrahit, vt id quod noxium est excutiat. Neque enim facile illi ob crassitiem dilabuntur, vt igitur excutiantur necesse est. A crasso autem humore vitium hoc fieri Galeno lib. 3. *de affectu loci cap. 7. resse*, argumento est, quod & subito fit, & soluitur confestim. Subitaria namque meatuum & ventriculorum cerebri obstrutio, non nisi a crasso lentoque humore fieri potest. Siquidem siccitas sensim & paulatim multo que tempore efficit, vt cerebrum coti in stat contrahatur. Tenuis autem humor laxiores cerebri meatus occupare & obstruere nequit, vt in fratratu dicemus. Sbito igitur tum facta epilepsia, natura confestim humores in cerebri ventriculis contentos, animales spiritus exire prohibentes, excutere aggreditur. Vt hinc omnib. veteris amantibus manifestum fiat, epilepsiam quæ primogenia fit a tenui humore, vt multi nostræ grati Medici, etiam eruditione clari arbitrantur, fieri non posse. Neque enim obstat quo minus in errore versetur, quod afferunt, citam solutionem, *materia paucitatem & tenuitatem indicare, quod crassa difficile moueantur.* Nam verum quidem facilius ac citius materiz paucitatem esse fatemur solui, hincq; adeo fieri, q; in epilepsia humor crassus & lentus, quia paucus, in singulos accessionib. soluat & excutiat: in apoplexia vero quoniam multus, adeoq; vniuersos cerebri meatus prorsus, vel vt Gal. lib. 3. *de affectu loci cap. 9.* ait, confestim inplet ac obstruit, subito interficiat. Vt recte Galenus dixerit lib. 3. *de affectu loci cap. 8.* epilepsiam a pituita transire in apoplexiam: vbi scilicet materia multa fuerit, nec a cerebro excuti poterit. Falsum vero est, quod dicunt citam solutionem, *materia tenuitatem indicare.* Siquidem id perpetuo verum non est, sed interdum cita solutio materiz etiam crassitudinem monstrat, vt in epilepsia, in qua crassus humor subitum, vt paulo ante dictum est, meatuum & ventriculorum cerebri obstrutione facit. Quum enim is ob crassitiem suam promte nõ dilabatur, sed cerebrum præter naturam contrahat, & hunc violenter ac confestim excunat, necesse est. Sunt autem qui *crassum humorem cerebri ventriculos obstruere negant, nec tum spirituum transitum impediri concedunt.* Nam si crassus & lentus humor, inquit, ventriculos cerebri obstrueret, vt illi putant, qui spiritum quo minus exire possit, impediret, cessaret motus, aut saltem minor fieret, vt in paralyti accidit. At tantum abest vt cesset, vt omnes partes præter voluntatem ad motum concitentur. Hæc illi. Sed facile quæ ab iis obiciuntur diluemus. Fatetur enim si in epilepsia crassi humoris tanta copia esset, vt cerebri meatus & ventriculos confestim & omnino obstrueret, motum omnem, quod vtique in apoplexia fit, cessare. Quum autem in epilepsia cerebri ventriculi a crassis ac lentis humoribus non omnino obstruantur, fit vt in ea motus omnis non cesset. Atque hinc aliqua epilepsiz & apoplexiz diffetentia apparet. Cessat quidem in epilepsia mo-

Epilepsia primogenia a tenui humore fiti haud potest. Aduersationem & argumenta improbantur.

Epilepsia & apoplexia diffetentia.

- A** tus membrorum voluntariis, is tamē qui prater voluntatē fit, mox consequitur. Quod vero Galenum aberrare cōseor, ideo quod extraarterias spiritus animales in ventriculis cerebri contineri scribat, in eo ipsi iniuriā faciunt: & leuatores parum esse peritos produunt. Si quidem ex dissectione constat, a plexu qui ab extimi foris iouolucti foramina appellatur in singulos cerebri ventriculos, dextrum & sinistrum, atque ramos qui animalem ad eos spiritum deferunt, confendere. Docet etiam idem fufius Galenus lib. 7. de Hippo. & Plato. dogmatib. c. 6. vt longiorem me esse non sit necesse. Quod vero deinceps dicunt, si epilepsia fit propter aliquam obstruētiōem, ea erit in incatu illo qui a cerebro ad peluim siue infundibulum, ^{quod} Græci vocant, peruenit, per quem pituita ad palati foramina descendit: at qui contra accidit in epilepsia, in qua per illam viam expurgatur materia, quæ insultum excitat, & ea, quæ cum spuma ex ore eiicitur ab ægris. Quis vero anatomes tam imperitus est, vt nesciat meatum illum ex eorum cauitate dextri ac sinistri ventriculorum, seu a tertio cerebri ventriculo recte decliue versus peluim siue infundibulum, quod cerebri pituitam excipit ferri? Quod si igitur in epilepsia, veluti a nobis ostensum est, dexter & sinister cerebri ventriculi obstruuntur: tertius quoque obstruat necesse est, vt mirum non sit per illam viam, totum nihil expurgari. Neque etiam mirandum est, si vt Galenus lib. 9. de usu par. cap. 1. scribit, decliues ii meatus, tum per palatum in os, tum per corpus narium conuolucis & magnis orificiis pituitam & crassa cerebri excrementa expurgantes obstruantur, epilepsia sequatur. Rifu vero dignum est, quod ex spuma, quæ in iis, qui epilepsia correpti sunt, apparet, colligunt, hanc a teo ui vel spumosa, & acri fieri materia. Quod enim in epilepsia spuma generatur, id nequaquam ob materiz tenuitatem accidit, sed, Galeno etiam sect. 2. aphor. com. 43. teste, ob motum in conuulsione vehementiam, & quod humor, qui epilepsiam excitat, tenacē consistentiam habet. Hocq; adeo fit, vt epilepticorū spuma, quas etiam in currentibus equis circa os accumularur, non facile dissolubilis, sed ita b. 1. s. fit. Sed pergunt illi hoc modo Galeni sententiam impugnantes. Non sequitur, atque epilepsia subito fit, ergo a crasso viscoso que humore generatur. Quod enim hac repente fit, id materiam potius tenuem esse, quam crassam indicat, vt cito solutio, materia paucitatem & tenuitatem. Crassa enim difficillime mouetur, tenuis vero facillime. Hæc illi. Fallum vero est, vt paulo supra diximus, etiam solutionem perpetuo materiz tenuitatem indicare. Nam contrarium in epilepsia accidit, in qua perpetuo, vt comprehensum est, & paulo post latius dicitur, obstruētiō ventriculorum cerebri est, quæ a tenui humore fieri nequit, vt qui laxiores ac ampliores occupare eius meatus atque obstruere non possit, quod Galenus lib. 4. de crassi pulsum cap. de pulsa Peripneumonicorum confirmat, vbi tenuem & biliosum humorem fere dissolui, & nequaquam visceri adhærere & obstruere posse scribit, quod pueris etiam notum est. Quod vero crassa materia, quæ difficillime dilabitur, & per se mouetur in epilepsia cito expellitur, causa est, quod cerebrum in sese contractum quatiendo illum violenter excutiat. Quod quum antea nobis copiose dictum sit, non est, vt id ouoc pluribus doceam. Mitari vero subit, cur aduersarij coouulsioem particularem a pituita, quæ perpetuo crassa est, ounquam vero tenuis, fieri fateantur, & epilepsiam, quæ non est nisi vniuersalis conuulsio, quum tamen diuersitatis nulla sit ratio, ab eadem generari insipienti? Verum eos, qui nouas & a veritate abhorrentes opinioes ferere student, satan, errorum pater, ita excæcat, oculosque eoruodem præstringit, vt quid dicant aut faciant scire non possint. Ceterum progrediuntur aduersarii & epilepsiam primogeniam fieri a reoui humore, eius quæ per consensum fit exemplo, docere conantur, vt pote quum semper a tenui substantia oriri dicunt. Vt igitur etiam primogenia ab eadem causa fiat, necessario sequi dicunt. Pro sententiz vero suæ confirmatione initio produunt exemplum Galeni lib. 3. de offe. loci cap. 5. de Grammatico quodam, qui quum vehementius doceret, aut cogitaret, aut maiorem in ediam iustioeret, aut iraceretur, epilepsia corripiebatur. Vero non vident eius rei nullam aliam causam fuisse, quam quod prædicta omnia plus bilis, Galeno quoque libro 2. de temper. cap. 8. testante, in ventriculo illius Grammatici generantur, quæ ventriculi os facili sensu prædictum primo affixit, & deinceps per consensum cerebrum, & vniuersum corpus conuulsorio motu cooculsum est. Non igitur epilepsia illa a vaporibus eleuans a flaua bile, & porracea, vt illi somolant, facta est, sed ab acrimonia bilis in ventriculo contentæ, & os illius affligente, quod deinde per

42 Operum Leonhard. Fuchſii Pars III.

conſenſum cerebri epilepſiam efficit. Atque hinc eſt, quod Galenus recte libro 3. de afflic. loci cap. 9. ob actem humorem non ſolum ſingultum, verum etiam conuulſionem non raro per vniuerſum corpus euenire memoriz prodiderit. Quod vero de vaporibus caput conſcendentibus aſſerunt, vt ſit in ventriculi cruditate, & vini meracioris potu, facile quoque diluitur. Nam vapores illi vel ſunt craſſi ac turbidi, vel admodum humeſtantes, a materia craſſa, vel ſupra modum humida ad cerebrum delati. Hi igitur vna cum praua ſubſtantia materie conſcendentes cerebrum impleant, inque eius ventriculis obſtructionem efficiunt, quam epilepſia conſequitur. Quod conſtat Auicenna, qui Fen. 1. Can. 3. traſt. 5. cap. 2. diſertis verbis ſcribit, eos qui puram qualitatem, circa ſcilicet materiam, epilepſiam facere aſſerunt, falſum dicere. Accedit, quod Valeſius, inter vocatos praethicos, non infima ſortis, vapores iam diſtinctos in ventriculis cerebri creare obſtructionem, quod non ſint puri, ſed ſibi commiſtam ſubſtantiam, unde eleuantur, habere, aſſerit. Quare quum aduerſari dicunt, materiam craſſam in parte conſeſam eleuari non poſſe, verum eſt, ſi tota materia intelligatur, ſiquidem ea non tota, ſed tantum vapores ab ipſa elati, qui cum materia illa communicant, & ſecum aliquid de eius ſubſtantia ad cerebrum deferunt, ad cerebrum aſcendunt, in eoque obſtructionem efficiunt, epilepſiam accerſunt. Atque hac de prima epilepſia per conſenſum ſaſta cauſa dixiſſe ſatis ſit. De altera cauſa iam dictae epilepſia, idem aduerſariis reſpondemus, nempe qualitatem illam a parte ſubieſta non puram ac ſolam conſcendere cerebrum, ſed cum frigida materia, unde eleuatur, vel venenata. Licet igitur ſpiritualis autem hac ſit, tamen cum frigida ſubſtantia communicat, quae elata cerebri implet ac obſtruit. Porro ob venenatam autem auram, aut veneni vim a parte primo laborante elatam, cerebrum expellere ſeſtinat, adeoque conſeſtim ſeſe contrahens & coarctans epilepſia accidit. In omni itaque epilepſia, excepta ea, quae ab acris & mordace humore in ventriculo contento ſit, ſive primogenia fuerit, ſive a ventriculo, aut alia quavis corporis parte ſubieſta conſeſcente fiat, cerebri obſtructio accidit. Nam craſſos & lentos humores obſtruere cerebrum, in conſeſſo eſt. Vapores autem quum nequaquam puri, ſed vna cum ſubſtantia frigida & craſſa conſcendant, obſtructionem efficere poſſe, paulo ante abunde nobis monſtratum eſt. Venenari vero vapores obſtructionem efficiunt, quod propter contagem, quam ſubieſtae partes cerebri ventriculis impertiunt, contrahuntur & coarctantur, vt ſcilicet contagem illam a ſe depellant. Quod multis opus eſt verbis. Ventriculi cerebri in omni epilepſia coarctantur & contrahuntur, vt quod noxium eſt a ſe expellant. Vt iam conſpicuum ſit omnibus, nullum epilepſia genus a tenui fieri materia, niſi hac vna vel acris, vel venenata fuerit. Primogeniam vero perpetua craſſa ac lenta accidere. Sed longius progreſſus ad inſtitutum tedeam. Praecedat hoc vitium, corporis animique inſtantia & ſtatus minime voluntarius, triſtitia, eorum quae perceperunt obliuio, turbulentiae ſomniorum imagines, capitis dolor, eiusque plenitudo continua, in itacundia poſiſſimum, pallor faciei, & linguae inordinatus motus. Nonnulli vero eam mordent. Quamprimum autem iquaſerit vitium, aegri concidunt, conuellunturque, ſterunt, ac interdum vociferantur. Nonnulli tremunt, atque circumaguntur. Sed peculiaris admodum nota vitii eſt, oris ſpuma. Non deſunt, quibus etiam vrina & ſtercus praeter voluntatem excernitur, nonnullis genitura. Quibus ab ore ventriculi vitium oritur, palpitatio ipſius praecedit, turbatio, & eroſio: & ex inedia, aut cibo tardius ſumto affliguntur. Corripit hoc vitii genus maxime pueros, eoſque adhuc infantes ac paruulos: quod ſcilicet humidiore cerebri temperamento praediti ſint, quae de cauſa vitiis, hoc eſt, inſanile ſeu puerile nominatur. Deinde adoleſcentes, & aetate conſiſtentes, minime vero ſenes & decrepitos. In quibus acutiſſimum eſt vitium, ſtatim crebris acceſſionibus, & ſymptomatum vehementia iugulat. Pluriſque diuturnum eſſe ſolet. Proinde ſi non pubertate, vel menſtruorum initio, vel dum vterum ferunt, ſolutum fuerit, ſaepe viſque ad mortis diem prorogatur, niſi congruam Medici curationem fuerit aſſecutum. Id quod Hippocrates etiam reſtat, qui ſic ſcriptum reliquit: *Quibuscumque morbi comitiales ſunt ante pubertatem, mutationem accipiunt: quibuscumque autem viſſimoque ſunt, commorantur.* Coarguit autem & indicat comitali morbo laborantes ex bitumine, aut gagate lapide, aut cornu caprino ſuffitus: comestum item iecur hiticum, aut odor cocti iecinoris. Potro hoc vitio correptis vitium ratio, quae incidit & extenuat,

Nov.

Quae potissimum
complect.
Puerile
malum.

1. Aph. 7.

Vitium
quo.

- A** nuaſt vtilis eſt. Aeris itaque conſtitutio, in quo æger verſatur, calida & ſicca ſit, poſſiſſimum ſi a pituitoſo humore fuerit exaltatum vitium. Quæ ſi natura talis non fuerit, igne luculento, ſuſcitibus cum caryophyllis, cortice citri, roſmarino, maiorana, ſaluia, ſerpyllis, ſtechade & ſimilibus. Si vero ex melancholico ſucco vitiū orrum fuerit, ad calidum inclinans aer deliquet. Fugere oportet carnes omnes, demitti auium mōtānarum: quæ tamen cum aliquo extenuatium medicamentorum, hyſſopo ſcilicet, maiorana, ſerpyllo, origano, & betonica, exhiberi debent. Item legumina, piſces, & vinum: præſertim antiquum, craſſum, & copioſum. Potus autem ſit muſca, aut vinum aquoſum, tenue, & dilutum. Capparis eſus mirifice prodeſt. Aluum vt apertam habeat ægri, vnice medico curandum erit. Exercitia ante cibum conſeruit, & friſtiones: ſed capiti poſt omnes reli-
- B** quas partes adhibitz. In balneo mora diuturna obeſt. Deuitandus coitus liberalis, moderat* vero prodeſt, *iuxta id lib. 6. epid. ſect. 3. aph. 32.* Venus morbis, qui a pituita ſunt, cōfert. Somnus ſit nocturnus, & mediocris, impenſe caueat diurnū. Abſtineat alliis, cepis, ſinapi, & euſmodi euaporantibus, præſertim in cœna, q̃ ciborum copia multos effert humores contingat, & morbi comitialis acceſſionem moueri. Nam eſi vim incidendi haber, tamen fugienda ſunt, q̃ caput non nihil repleat. Porro apium etiā vitādum eſſe, Trallianus ſcribit, ceu naturaliter Comitiales offendens. Potum etiam ſtatim a balneo, vini poſſiſſimum meracioris, fugiat. Panis ſit rectiſſime coctus, & bene fermentatus, eiq̃ cotiandrum, *Tralliano aſſeſſante*, incoctum ſit: ita enim conſeſſus humorum vapores ad cerebrum ferti prohibet. Ceterum ſi infans hoe vitio laborauerit, non admodum medicamentorum præſidiis (*Paulo reſſe*) ſubuenire ſtudebimus. Nam ætate ad calidiorem ſicciorēque ſtatū vergente, & vitū moderatiore, ſua ſponte plerunque vitium finitur. Quod Hippocrates cōfirmat, inquit: *Quicunque iuuenis morbo comitiali laborat, mutatione maxime aſatis, & temporum, & locorum, & viſſum quoque liberantur.* Oportet autem ſolius infantium, & nutricum vitūs rationem habere. Quapropter nutrix boni ſucci cibis vtatur, ſi infans nondum ablaſtus fuerit. Præterea ante cibū exercitetur, eorum fugiat: a vici ſiquidem conſuetudine lac renuſus ſit, odoris gratiam in deterius mutat, & humidius efficitur, menſtruaque elieuitur. Quid multa? paulo ante præſcripta vitūs ratione calida & ſicca vtatur, vt lac ſcil. calidiuſq̃ tenuiſq̃ efficiatur. Mediocriter tamen extenuantibus vtatur, ne ex illorum uſu, quæ nimium extenuant, vteri vaſa aperiantur menſeſque promanent, & lac inſinuatur. Præſtat itaq̃ ſceniculo, aniſo, & aliis quæ lactis copiam faciunt viridib. magis, quā aridis vti, quæ magis acia ſunt. Nam, vt *Trallianus reſſatur*, quum ſicca magis ſint acia, plus vteri vaſa aperit, & nimis ſanguinis mēſtruoꝝ vacuationes ab ipsis incitantur, quo nihil eſt deterius. Dum enim ſanguis expurgatione decreſcit, lac etiam imminuitur. Vino quoq̃, maxime forti, nutrix abſtineat, vtaturq̃ hydromelite, vel cinamomi decocto. Quod ſi malo ſucco redūdat, purganda etiam erit. Capita autem infantium aſſidue oleo anethono, & irino, adiectis puluſculis, cyperi, liris, adiantis, maioranæ, & ſimilium inungenda. Nunquam tamen aqua calida vel frigida lauanda ſunt, multo minus tota immergenda, aut irriganda. Dato etiam ad lingendum mel deſpumatum. Commendatur etiam a multis hoc celiſma, quod accipit: *Sacchari candidiſſimi, vncias duas. Olei de amygdaliſ dulcibus, quod ſatu eſt, ad inſuſtā celiſma celiſmatis inducendam conſiſtentiam. Detur infanti lingēdum.* Sunt qui admixcent viſcū quer-
Curatio lib. ſaniam.
Aph. 32.
- E** cinum, & vnicornu, neque ſine magno pueri ægrotantis incommodo. E collo etiam radix pzoniz viridis ſuspendenda. Quantū enim hæc ipſa ad ſanandum hoc vitium conſerit, ex hiſtoria Gal. quam natrat *lib. 6. de ſimpl. med. ſenſ. cap. de paonia*, ſatis liquet. Puer enim totis 8. menſibus a morbo comitiali, ex eo tempore, quo radicem geſtabat, libet fuiſſe: ſed poſteaquam q̃ a collo ſuſpenſum erat, decidiſſet, proſinus conuulſione denuo correptus eſt: ruſus ſuſpenſo in locum illius alio, inculpate poſtea egit. Porro q̃ poſt annos pueriles in hoc vitium prolabantur, eorum partes conuulſas ac diſtortas inungere, irrigare, & in rectum dirigere ac etiā deligare oportet. Deinde oſaperiendū, cuneuſq̃
- F** dentibus interponendus, ac penna oleo irino illita, pituitæ extrahendæ gratia, vomitus puocandus. Odoramentis etiam ſenſum excitare cōuenit, vt peucedano, ruta, bitumine, & ſilphii ſucco. Perſeuerante vero exacerbatione, glās ſubiiciēda erit, ex agarico, ſale gemz vocato, hiera picra, & melle deſpumato conſecta. Præterea Medicus audacter & violenter illorū maxillas diducat, inſundatq̃ in os caſtorium, aut laſerpitii ſuccū cum
- Curatio lib. d'altorum.

44 Operum Leonhard. Fuchſii Pars I.II.

Curatio p
sonis comi
tialis inue
terata.
Preparatio.

Purgatio.

Difficien
tia medica
menta.
Medicamē
ta morbo
comitali
naturę pro
prietate ad
uerſantia.

Curatio e
pilepsie et
ventriculi
vicio.

Si a paricu
la quadam
oriatur vicio.

oxymelite. Cluſſerem etiam acrem, iam excitatis, iniicere oportet. Cuius quidē formu- A
la e ſuperioribus perenda. Qui conualeſcunt, viribus antea recreatis, hiera Galeni, aut
alio conueniente medicamento, quorum formulas iam ſape diximus, purgandi ſunt.
Hæc quidem recentis & acuri morbi comitalis curatio eſt, quare deinceps quomodo
inueterato ſit ſuccurrendum trademus. Oporter igitur laborantes diu aquam bibere,
arque initio curationis, niſi quid prohibeat, ſanguinem ex vena poplitis mittere, quod
Gal. teſte, in lib. de ratione curandi per ſanguinis miſſionem, ex cruribus potius, qui comitali
morbo obnoxii ſunt, euacuandi ſunt, quā ex gibbero. Interpoſitis dein 4. aut 5. diebus,
corpus reficere, ac medicamenta extenuantia propinare expedit, ſerapia nimirum ex
abſinthio, de hyſſopo, e ſtychade, oxymeli ſcillitico, decoctum hyſſopi, & Tralliano
auctore plurimum conſert. Nam lenta & craſſa recremēta attenuat & incidit, nec permi- B
trit, vel in ventriculo, vel thoraçe recrementū in craſſiū coire ac ſpiſſari. aliud n. per
vriſas, alium per alium expellit. Radices pzoniz, & alia quæ ſupra. 13. conſemoraui-
mus. Poſtea purgantib. medicamentis vacuandi ſunt, nempe pilulis coctis ſecidis, de
ſarcocolla, de agarico, & ſimilib. loco iam citato nominatis: idq; ſi pituitoſo ex humo-
re vitium ortum fuerit, faciēdum. Sunt, qui in colocynthidem extracto ſemine ac me-
dulla tantum relictā, vinum dulce conſiciunt, totaq; nocte ſinunt: dein mane ex colant,
& tepeſcunt propinaut. Si vero melancholico humore corperit hoc vitium, ea, quæ
humorem hunc vacuare poſſunt, exhibenda, quorum formulas in capite de melancholia
reperis. Licebit tamen aridi ellebori nigri corticem terere & cribrare, ac ex muſſa cir- C
citer drachmam vnam dare: aut cum melle coctō, adiecto modico pipere, in pilulas re-
dactum aſſumere. Vbi ſatis purgatus eſt æger, ad balneum ducendus. Tertio die hypo-
chondriis & ſcapulis cucurbitæ cum ſcariſicatione aſſigendæ ſunt. Deinde compluſculis
dieb. interpoſitis, corpus reficiendū eſt, & ruruſ hiera Galeni purgandū. Poſtea capiti
& occipitio cucurbitulæ admouendæ. Sequēti die panis in muſſa coctus, additis amygd-
alis amaris, contritis, aut ſerpyllo, aut calamintha, aut menta, aut ruta, cataplaſmatis
inſtar capiti applicandus. Atq; hoc tribus diebus faciendū. Mox caput detraſis capillis,
peucedani ſucco in aceto diluto, in quo ſphondylium, ſerpyllū, aut iris incocta ſit, per-
ungendum. Ruruſ in interea corpore recrearo, purgandus erit æger tribus tantum hie
drachmis oblati. Quibus peractis, ſternutamenta, apophlegmaria, & ea, quæ per
nares purgant medicamenta, exhibenda. Non negligenda etiam alia medicamēta ex
ſiccantia & robotantia caput, vt eſt conſerua roſmarini, e pzoniz floribus, item conſe- D
ditiones diamorchi, diambæ, & ſimiles. Tempore interpoſito, ſi neceſſarium eſſe vide-
bitur, clyſtere aliud eluenda erit. Tandem vnguēta, ſuimenta, & emplaſtra, quibus diſ-
cutiendi vis ineſt applicanda, quorum in c. 28. mentionem fecimus. Sunt quædam me-
dicamenta, quæ naturæ quadam proprietate, atq; adeo a tota eſſentia huic vitio aduer-
ſantur: vt eſt radix pzoniz, viſcus quercinus, cornu ceruinum, oſſa humana combuſta,
& alia multa: quæ lubens prætereo, q̃ copioſe a Tralliano lib. 1. c. 25. & a recentioribus o-
mnibus ſint expoſita. Trallianus loco iam oſtenſo, experimentum quoddā Ruſtici cu-
iſſidam reſert, nempe Rutam ſylueſtrem contuſam naribus inditam & admotam. Hæc
non ſolum a morbo excitare, ſed ipſum etiam curare tradit. Porro ſi ob primariam ven-
triculi rationem epilepſia accidat, vt æger probe concoquat, providēdum. Panis igitur E
diligēter elaboratus, ex vino antiquo, tenui & albo, medio critere adſtringēte, circa ho-
ram 3. aut 4. diei aſſumendus. Date aut expedit ſingulis annis, maxime ſi ob biſoſi hu-
moris inibi ventriculum grauat, caputq; tentat, vacuetur. Tōum namq; ventriculum
purgat, viresq; eiſdem reparat. Quæ quidem curationis ratione iuuenem quendam
Grammaticum ap prædicto vitio Gal. liberauit. Si aut a pituitoſo humore oriatur vitium,
agarico purgandus æger erit. Neque parum prodeſt ſeſilis radix & ſemen, vel anisolo-
culia rotunda trita, & ex aqua pota. Conſert & mirum in modum aſſidua crurum ſcari-
ficatio. Ceterū ubi ex particula quadam vitū hoc inuadere percipitur, ſiue ea manus, F
ſiue per fuerit, ſine fortiter excipi debet pars, quæ paululū loco, vnde aſſectus incipit,
ſuperpoſita eſt, vt vapor illi via præcludatur. Cum remittit vinum, peracta totius cor-
poris inanitione, prius inuentionib. excaſcare corpus oportet. Deinde medicamen-
ta, quæ calefaciunt, rareſciunt, & malam temperaturam parit, vnde vitium oritur, e-
mendant,

- A** mendant, & ea, quæ exurete & exulcerare partem possunt, apponenda, vt est lepidium, & similia. Succedente etiam tempore sinapismis locus irritandus. Cauterius etiam pars exulceranda erit, cum cantharidum abiectis capitibus & aliis drachma vna & dimidia, admixtis fermento & melle anacardino, vt scilicet. praua illa qualitas & materia huius vitii causa vacuetur. Post omnia commemorata thenace, & naturalia balnea locū obtinent. Per totum vitæ curriculum cauenda cruditas, & ante cōcoctionem alterius cibi assumptio, alimenta cassis succi, diutina cibi intermissio, commotio turbulenta, vinum largius potum a balneo, vt dictum est, odoramenta acrida, & quæ caput replent. Fixis præterea & inconniuentibus oculis ex alto prospectus, diuturna in balneo mora, & capitis a sole vitio fugienda etia.

B De conuulsione. C A P. XXXI.

- S** *Παραρ* Græce, conuulsio vero Latine, est vitium, in quo nerui atq; musculi præter voluntatem ad principium contrahuntur & conuelluntur, in eoque affectum veniunt, quem etiam in motibus secundum arbitrium factis, tractis videlicet seu remissis ad propria capita musculus, assumserunt. Vel aliter, velari definit Gal. lib. 2. de sympt. causis, cap. 2. Conuulsio est, quæ nervus musculique ex eodem cogit affectum, in quem ab animali facultate, quam naturalem habitum feruere, ducuntur. In hoc enim vitio musculus in eas trahuntur partes, a quibus nascuntur. Quippe attractio fieri nequit, nisi ad suam originem retrahatur musculus. Cetetum animaduertendum in conuulsione nō perpetuo vnam & eandem partē laborare. Nam interdum cerebrum ipsum noxam sustinet: interim spinalis medullæ initium: nōnunquam nervus aliquis, aut musculus, qui particulari morioni deputatus est. Quod ita dignoscendum erit. Si simul cum vniuerso corpore faciei partes cōuellantur, cerebrum ipsum laborat. Si vero totum corpus conuellitur, faciei artibus illæsis permanentibus, spinæ initium infestatur. Vbi autem pars vna duntaxat corporis conuellitur, nervus aut musculus eius motioni destinatus, perperit. Quod scire præstat, vt laboranti parti medicus remedia adaptare queat. Eius autem tres sunt species, seu differentie. Prima Græcis *τρίμυος* dicitur, *diffensio* Latinis, Cello *rigor*. Est, quæ ceruix vna cum reliquo corpore recta atque immobilis manet, & in neutram partem inflectitur, sed iuxta in utramque partem recta intenditur. Altera *μικροδύστρος* Græcis nominatur, Latinis *tensio ad interiora*. Accidit enim, vt ea caput, ceruix, reliquumque corpus in pectus contrahatur. Tertia *μεγιστοδύστρος* Græcis, Latinis *tensio ad posteriora* appellat: in ea enim caput in dorsum ac scapulas conuellitur. Quod ad huius vitii causas attinet, animaduertendum. Hippocratem duas duntaxat statuisse, *μικροδύστρον*, hoc est, *plenitudinem & inanitionem nervorum corporum*. Sicut enim videmus lora & chordas extendi, vbi aut multa madent ac irritatae sunt humiditate, aut vehementius exsiccantur: sic & in corporibus animantium nervosae partes conuulsione corripiuntur, vel nimium humectantur, atque adeo implete, vel violentius exsiccantur, vt copiose Gal. lib. 3. de affectis locis, cap. 5. & lib. 2. de sympt. causis, cap. 2. docet. Vtum Hippocrates ipse de conuulsione, vt primogenio vicio loquitur. Præter hanc autem alia est, quæ per consensum partis alicuius accidit: & hæc fit, vbi aliquida parte primo patiente ad cerebrum ipsum effertur, quod vt a se expellat, huiusmodi motu conuenit. Iuniores medici barbaram sectantes medicinam, spiritum non proportionatum ad materiam vocant: quod scilicet neque ob materiam quæ implete possit nervosae partes, neque ob inanitionem siue defectum materiz accidat: sed a qualitate quadam, alteratis per continuationē partibus: aut substantia, vel spiritali veluti auta vel fluida ad nervorum principium delata: sicut contingit iis, qui a scorpionum, aut alia venenata feta idti sunt. Erii vero hæc conuulsionis species quia a venenata materia fiat, ad plenitudinem referti potest: tamen quum materia hæc pauca sit, ac plerumque mortax, adeoque ex accidente deficiet, ideo Gal. lib. 5. aphor. com. 1. permittit, vt aliquis hanc per inanitionem factam esse dicat. Fit etiā conuulsio propter nervi aut tendinis partis cuiusdā puncturā. Quod si aliquem sanū, Gal. 2. aph. com. 26. refert, repente & statim ab initio, vel nō multo post morbi ptincipia cōuulsio corripit, præsertim si temulentus fuerit, ac in ocio degēs homorepletionem haud dubie originē ducit. Vbi vero post pluri-mos sudores, aut vomitū, aut alui deiectiones, aut sanguinis eruptiones, aut vigilias, aut famē, aut motus tum multos, tum vehemētes subseqūt, inanitio & siccitas in causa est. Conuulsio per consensum facile ex relatione ægræ, aut affidentum cognoscitur. Vicius

Conuulsio.

τρίμυος.

μικροδύστρος.

μεγιστοδύστρος.

Conuulsio.

cap. 19.

Conuulsio per consensum.

lum.

Spiritus non proportionatus ad materiam.

Noct.

Vicius.

46 Operum Leonhard. Fuchſii Pars III.

ratio in conuulſione, quæ fit a plenitudine, eadem eſt ei, quæ in capite *de reſolutione* eſt A
perſcripta, nempe calida & ſicca. In ea vero, quæ ab inanitione fit, humidã eſſe oportet.
Nutriti igitur ſunt ægri in cõuulſione ex inanitione forſitionibus, & iuriſus pingui-
bus, & carnis concoc̃tu facilibus & contuſis, probeq; nutritiſus. Pro potu, vino v-
tantur tenui & aquoſo, quod facile per omnes corporis partes diſtribuitur: niſi febris af-
fuerit, tunc enim piſanæ cremor vilis erit, aut pro vino danda aqua, in qua cinnamom̃
aut glycyrrhizæ parum ſit decoctum. Somnus etiam accerſendus erit. Viſa exercitia,
& omnia, quæ corpus inanire poſſunt. Oleo dulci, aut amygdalino, aut hyſdreleo calido
inungantur ægri. Lauacro etiam aquæ dulcis tepidiorẽ videntur. Quid niſi ta viſus in
vniuerſum talis ſit, qualis eſt eorum, qui hæctica laborant febre. Curatio conuulſionis, B
quæ a plenitudine orta eſt, ſtatim a ſanguinis miſſione auſpicanda, modo niſi ſit, quod
eandem fieri prohibeat. Liberaliter autem ſanguinem auferre conuenit, ita tamen, vt
non conſertim fiat, ſed pluribus vicibus. Aliquid enim ſymptomati relinquendum. Mit-
tendus vero ſanguis ex gibberi vena media. Poſt ſanguinis miſſionem, acti clyſteri, ſi ita
ex re eſſe ægri viſum fuerit, alius eluenda. Partes autem, quæ conuelluntur, valenter
continendæ ſunt, & inordinatis motibus omnino reſiſtendum. Oleo quoque rutaceo,
aut irino, aut alio quodam ex hoc genere perfricandæ: aut lanis iam dictis oleis imbutis
contegendæ: aut veſica lata calido impleta oleo, collino ſcilicet, de piperibus, de ver-
mibus, e caſtorio, vel hyperici iis ſuperimponenda. Quod ſi vero a pituitoliſus humorib.
conuulſio euenierit, tum ſi primum omnium extenuandi & incidendi erunt, atq; vt ad
expulſionem idonei ſint, præparandi, modo non ſit admodum vehemens, ac dolorem C
ita magnum afferat, qui vires præſternere poſſit. Tum enim ad maius euitandum peri-
culum, potentiſus remediiſus vacuandum erit, ſic tamen, vt illis extenuandi & inci-
dendi iungantur. Præparati ſubinde conſectiſus medicamentiſus pituitam purgantibus,
quorum multa in capitibus *de epilepſia, & reſolutione* commemorauimus, vacuandi. Suc-
currit ita laborantibus *centaurei minoris potius, aut Cardui benedicti appellati 3 j. cū aqua muſſa*
vinciſus tribus. Aut myrrhæ, aut caſtorii 3 j. Caſtorium enim omnium ſecuriſusimum, expedi-
tiſusimum, & maxime efficaciſus eſt. Cucurbitulaſus etiam cum ſcarificatione admonere pro-
deſt: leues enim lædunt. Si crura contrahuntur, coxis & poſtremæ vertebra: ſi manus
conuelluntur, dorſo & primæ ipliſus vertebra, tum ei, quæ humero ſuperiacet. Caput D
per terea apophlegmarifmiſus, gargarifmiſus, & ſimilibus medicamentiſus purgandum. Pro-
cedente tempore balneo vti conſert. Singuliſus itaque diebus bis aut ter in aquas ſulphu-
reas, vel aluminofas, vel falſas deſcendat: non tamen diu, ne vires deiciant, iſus immote-
tus. Vel ſi naturalis nullus viſus eſſe poteſt, laconico vti licebit: aut aqua, cui incocta ſint
ſolia lauri, abrotanum, chamæpitiſus, ſiſyriachæ, leuandula vocata herba, pulegium, abſinthium, ruta,
ſaluſia, hypericum, maiorana, & betonica. Conuulſi quoque partes pelilibus, Inporum & vul-
pium veſtiri debent. Inunctiones etiam, quæ in cap. *de reſolutione* diximus, adhibendæ.
Frigidæ ſuperfuſione, cuius Hipp. meminit, non temere vtatur Medicus, niſi ſingula,
quæ idem ille requirit, ad eſſe cognouerit, ne pro remedio mortem adſerat. Ceterum
calida medicameta, qualia ſunt *theriaca, antidotus miſtridati, & eiſusmodi, nempe diamoſchi,*
dia galanga, &c. ſunt aſumenda. Omnium tamẽ ſecuriſusimũ & optimũ eſt *caſtorium*
diſuſum, ad cochlearis parui, hoc eſt, drach. vniu. menſeram datum. Verum idipſum non tan-
tum hauſtum, ſed etiam extra illitum conducit. Porro conuulſio, quæ ex inanitione &
ſiccitate accidit, maximum ſane malum, & propemodum inſanabile. Viſtuntur
hoc modo laborantes humectante, veluti in hæctica, cancerum ſeu aſtaciũ ſuui-
liũ carnis, & aliis reſtaurantibus humiditatem cibi ac potibus. Pinearum quoque
cometiſus laudatur. Eos autem, qui ſic conuelluntur, oleo, vel hyſdreleo calido fouere o-
portet. Oleo item violaceo, amygdalarum dulcium, pinguedinib; gallinæ & porci, adiectis aliis,
quæ humectant: *viſque ſpina ſota inungenda.* Ad lauacrum etiam deducere conuenit, tem-
peratoque ſolio vti, frictioneque cum oleo leniſſima. Conſert autem ſi in balneo de-
coquantur aliquot capita veruecis, ac herbæ humectantes, qualis eſt *malua, viola, lactuca:* F
item *ſemina lini & ſenogræci, quod mitigandi vi prædus ſunt.* Et in vniuerſum fere, curandi
ſunt vt hæctici. Si iſtu alius ſerz venenatz, atque adeo per conſenſum, conuulſio ac-
cidit, annitendum initio erit, vt venenum extrahatur: id quod efficias, ſi vulnus dilate-
tur, locuſque totus in citæitu ſcarificetur, ſuper impoſitis cucurbituliſus. Vulnus etiam
latio.

Curatio
conuulſio-
nis a plen-
titudine.

1. Aphoc. 37

Cochlearis
parum.

Conuulſio
non ab ina-
nitione acci-
dit.

Curatio
conuulſio-
nis ab iſtu
ſere vene-
nate.

- A** latioribus canteris ignitis inuten-dum. Postea porri semina, cum sale trita, aut alia, aut cepas illitire oportet: & post crustæ calum vsque ad dies quadraginta, aut sexaginta vulnus a cicatrice arcebis. Ad quam si festinabit, rursus vitis aut ficulneo cinere vlcus aperies. Prodest enim vt vulnus diu apertum maneat, quo venenosa sanies extrahi, & emanare possit. Confert & *marubiu*, & *anagallidis folia illimire*. Locus etiam oxalidis radicis decocto fouendus est. Nam eam mitissime Aetius commendat. Conducit etiam theriaca cum rosaceo diluta, & vlceri apposita, eo quod venenum, aut eius qualitatem a profundo, attrahat atque vacuet. Hæc enim alexiteriorum *teste Galeno lib. 3. de simpl. med. facul. c. 17.* actio est. Priuatim vero ea actione esse præditam theriacam, idem Gal in lib. de theriaca ad *Pisone* testatur, vbi sic scriptum reliquit: *ex istis quibus in præsentibus præparatur Theriaca, & istis in omnibus & in singulis tunc aduersus venenosa est esse prædita.* Quod est: *In summa, theriaca & extrinsecus imposita, & epota, rabies ferarum moribus præsentibus medicamentis cuiusdam instar exaltat auxiliatur.* Vt hinc constet, toto cœlu errare Gentilem, & alios nonnullos, qui huius placita sectantur, eo quod theriacam extrinsecus admotam intro & in profundum pellere venenum asserunt, quum a tota substantia venenum ad se potius attrahat atque vacuet, *ut dictum est.* Plura ad institutum nostrum facientia reperient studiosi in curatione istius canis rabiosi. Si vero conuulsio sit neruo, vel tendine punctis, locus puncturæ dilaretur & aperitur, vt sanies effluat, & ea quæ iam dicta sunt medicamenta calida ei imponantur. Quod si vero conuulsio hæc remediis nullis compesci potest, neruus, vel tendo a Chirurgo pertransuersum, in parte altiori quam punctura, secetur. Præstat enim necus, vel tendinis actionem perire, quam hominem mori.

De incubo. C. A. P. XXXII.

- E** *uolens* Græcis, Latinis vero *incubus* & *incubo*, est vitium, vbi aliquis noctu, quum somnium ingreditur, se grâ di mole opprimi, inuadique ab alio credit. Neque enim Græcis alia de causa ita est appellatum, quam *in iis prædictis*, quod inuadere & opprimere significat. Nam qui ita laborant, se ab aliquo opprimi, quod simul vocem impediatur, ac veluti suffocet, arbitrantur. A Themisone *στυγνάλιον*, nimirum a *suffocando*, nuncupatur: siquidem præfocati in ea zgotantes videntur. Ontur id vitii ex crapula, & continua ventriculi cruditate, inde vapores crassi & frigidi eleuati, cerebri ventriculos replent, prohibentes facultates cerebri per neruos diffundi. Comitatur eo detentos difficilis morus, torpidus in somno lentus, suffocationis imaginatio, & veluti ingruentis alicuius detentionis. Ad hæc vox suppressitur, aut incerta indilcretaque editur. Quædam ita in iis imaginibus afficiuntur, vt se opprimentes audire credant. Cum plurima tandem anxietate attenuato spiritu, & discusso, atque apertis meatibus, repente exeat. Occurrit enim huic malo per initia: nam perseverans, & assidue inuadens, grauius aliquod malum, vt apoplexiam, morbum comitiale, aut maniam pronuntiat, ac inducit, crasso humore in ventriculis cerebri sensim collecto. Vicius sit tenuis, & qui statim minime generet. Parcissime cœnet, cibisque boni succi, & qui facile concoquuntur, alatur. Vino non vatur, nisi aquoso. Somnum fugiat diurnum, nec statim a comestione cubitum eat: A pastu sumat æger adisi ingentia, pyra, aut cotonea mala, saccharo condita. Dormiat aut in latus, non supinus, & (vt summatim dicam) tota victus ratio talis sit, qualis est eorum, qui comitiali malo laborant. Curandi ratio, si plenitudo affuerit totius corporis, a sanguinis missione aspicienda. Gibberi autem vena exterior secanda est. Si n caochymia aderit, purgationibus corpus vacuandum, cataportis coctis, de aganico, & timilibus. Er si pituita recludauerit, humores extenuantibus medicamentis ad purgationem præparandi sunt. Vniuerso purgato corpore, localia ad mouere medicamenta oportet, apoplegmaticos videlicet, *errhina, embrothia*, quorum omnium formulas ex superioribus preter studiosos. Succurrit autem iis potissimum *paonia semen nigrum*. Danda vero sunt grana quindecim trita ex aqua. Caput quoque fouendum oleo anethino calido, & pileo tegendum, dum cubitum eunt. Intra corpus exhibenda, quæ caput corroborant, aromaticum rosatum vocatur, *diamofibi dulcis antiodatur, diambur, dianthon, pluris a coticum barbari nomanant, & c.* in modis.

De mania. C. A. P. XXXIII.

- M**ania vitium est, quod Latini *insaniam* vocant, & *furor*em. Hoc enim detenti fera rum instar redduntur effrenes, & furunt. Differta phrenitide, q. in ea licet febris, ma-

48 Operum Leonhard. Fuchsi Pars III.

Causa.

Mors.

a. Aph. 19.

Vitium ra-
tio.
Curatio.

Localia.

Diacodium.

Embrocha.

Balnetum.

nia vero citra febrem accidit. A melancholia, quod sine metu & tristitia fiat, sed cum
audacia, aliusque paulo post dicendis symptomatis. Oritur, *Actio autem*, plurimo san-
guine incorrupto ad cerebrum fluente, interdum temperato & multitudine tantum
laedente, ut in ebriis accidit, interdum bilioso. Galenus *lib. 2. De sympt. causis*, hanc mor-
tadibus & calidius humoribus, qualis est maxime flava bilis, cerebrum cum suis mem-
bris stimulanis, vel a calidiori cerebri temperatura nuda nasci tradit. Præcedit ma-
niam capitis debilitas, aut ium tinnitus, splendoresque præ oculis obuectantur, ingentes
vigilæ, curæ sibi inuicem succedentes & extraneæ, grauedo vibratioque capitis. Proce-
dente tempore hæc omnia increbescunt, tabidioreque appetitus in illis excitantur, & in
Venerem promptitudo. Præterea nocturnæ pollutiones iugiter fiunt, excauantur oca-
li, ac minime nutant. Cæterum a solo sanguine maniam ortam comitatur risus assiduus,
ridiculis quibusdam visis ante oculos occurrentibus. Vbi vero flava bilis sanguini com-
mifcetur, iracundiam reddens tanquam ab ipsa stimulo interius cerebro & membra-
nis, iracundi, audacesque euadunt. At si flava bilis etiam superaffuerit, crassificatque, cere-
brum ac membranas stimulanis & diuellens, ferinum furorem percipit. Atque hunc est,
quod hanc maniz speciem *caninam* aliqui nominant. Ea enim cotrepti, assidue rixan-
tur, multa loquuntur, corporisque inordinato motu vtuntur, aspectu toruo, & inuete-
cundo præditi sunt. Arabes *maniam lapinam* cognominant. Quæ vero adstantes mor-
dentes, amicosque iniuria afficiunt, verberant, & vulnerant, ideo catenis vinciendi sunt,
ne alicui noceant, aut sibi manus infectant, aut se præcipites dent, aut in flumina conii-
ciant. Hinc rectissime ab Hippocrate dictum est, *Desipientia, quæ cum risu sunt securiores*.
Quæ vero cum studio periculosis. Vitius sit tenuis, cibus ioribilis, liquidus, citi a satietatem,
bonum alium faciens, & qui nihil aut minimum sanguinis genetet, vinumque omnino
prohibere oportet. Cuius a sanguinis missione, ubi a sanguine vitium accidit copioso,
ordienda. Giberi autem exteriorem venam incidere conuenit: aut si non apparuerit,
mediam. In mulieribus mensium suppressione laborantibus, malleoli vena secanda: eo
enim delapsu frequenter menstrua prouocantur. Tantum aut sanguinis detrahendum,
quantum vires tolerare possunt. Sedato enim feruore, confestim recitantur, simulque
reliquis præditiis locus relinquitur. Verum quum nonnulli in prima quidem oblatione
strenue inanitionem ferant, in sequentibus aut animo linqui consueuerint, expedit iis
in prima statim oblatione detinere quantum postulauerint: ita enim simul euacuatur
plurimum flatuosi, vaporosique spiritus. In sanguinis itaque effluxu assidue pulsus tangen-
dus est: qui si conciderit confestim de repetitione cogitandum. Postridie autem, nimis-
rum reparatis iam viribus, repetitio molienda. Porro post sanguinis detractionem caput
rosacco & aceto fouendum, aut succo polygani, aut melino oleo. Dein succidatana oleo madefa-
cta sincipiti applicetur, assidueque noua mutetur. Post inanitionem sanguinis, vespere
somnia conciliantur: euacuato enim sanguine, si vigiliæ successerint, ægri immaniores
euadunt. Quare medicamentum soporiferum, *Diacodium vocatum, cum succo priscana, aut*
cum aqua andacter pondere vnius cochlearis exhibendum: ita enim iucundus somnus allicie-
tur. Et plurius quidem ipsorum sumto soporifero, omnino tepescunt. Quapropter
vbi prima die post medicamentum satis dormierint, vna die interpolata, rursus *diacodium*
propinandum. Consuevit enim a sanguinis missione conuenienti viâ adhibito, exa-
ctam curationem petficere. Observandum tamen, ne postea vitæris offeratur: nam sen-
sus stupidos reddit. Vsum eius, aliorumque soporiferorum medicamentorum mon-
strauimus *lib. 1. de compos. med. cap. 4.* Probatur etiam *oleum violarum cum lacte farnina*. Item
embrocha e violis, floribus nymphae, salicis, & rosarum f. liliis lactica, semine papaueris, & e-
iusmodi parata, aliisque medicamenta, quæ c. 1. a nobis sunt commemorata. Alius præterea *cum*
idoneis alimentis, & cum chylisteriis mollienda est. His peractis, ex venis etiam e fronte, ab
ea potissimum quæ media in fronte est, sanguinem, si res postulauerit, detrahemus. Vel
hirudines capiti circalim, sincipiti præcipue, admovebimus. In iis quibus biliosior
sanguis fuerit, ex hiera picra, & alius medicamentis bilem vacuantibus, purgatio prius
mollienda erit. Si vero delirantes purgantia medicamenta b bere renuant, interim vt
facilium fiant, cibum molliorem namtram olei, buccellum, vel sicabos pinquibus, vel palmulis,
interdum etiam potionibus admittenda sunt. Vnicæ autem ipsos tuat *hippocamaris radix*. Se-
menque ex aqua post purgationem potum. Declinante morbo æger ad balneum aquæ dulcis
ducendus

- A** ducendus, ac reliquæ medicamentis discutientibus dissipandæ. Quod si a flava bile affata generatur, clysteres qui attrahunt & a capite reuellunt indicendi. Caput præterea *oxyrhodino* perfundendum, alijsq; medicamentis frigidis & humidis touendum. Vtendum etiam purgationibus, & medicamentis frigidis & humidis, fetuoremq; bilis restinguentibus ac domantibus. In summa, iis, quæ nõ admodum calefaciunt, sed potius humectant, & adustos & asiatos humores vacuant, qualia multa in sequenti capite de melancholia dicemus. Plura igitur, si quispiã requireret, is ad caput sequens de melancholia, seles conferat, atque ea, quæ ad institutum faciunt, inde excerpât.

De Melancholia. CA P. XXXIII.

- M**elancholia, est mentis alienatio, seu desipientia sine febre, cum timore & mœstitia, ex melancholico maxime humore mentem occupante, ac temperaturam suam immutante, nata. Fix vero id ipsum trifariam. Interdum enim vniuerso in venis corporis sanguine melancholico effecto, ob commune vitium, cerebrum quoque ipsum lèditur. Ab eo enim sanguine spiritus vitales & animales inficiuntur & turbulenti fiunt. Quare mens læditur. Nonnunquam veto reliqui corporis sanguis prorsus innocuus & syncerus est, solus autem is, qui in cerebro continetur, alteratur atque melancholicus fit: idq; bifariam accidit. Aut enim aliunde in cerebrũ derivat, aut in ipso et melancholicus humor generatus est, tum videlicet internus calor aut flava bilem, aut crassum atrumque sanguinem superflauit. Interdum etiam ob cruditatem ventriculi, quod hinc manifestum est, quod hoc vitio correpti, *Galen. libro 5. de off. lib. locis cap. 5. assestante*, post cruditatem melancholicis symptomatis magis molestantur. Quippe propter cruditatem ipsam primo lienis fit obstructio, postea vero prauus & melancholicus sanguis, vel, ut *Galenus ait*, vitiosa sanies, ex hoc viscere in ventriculum confluit. Eo vero influente, mœstitia, metus, & id genus melancholica symptomata, propter melancholicos vapores ad cerebrum elatos, excitantur. Nonnunquam etiam ob contentum in ventriculi vasis sanguinem crassiorem & melancholicum, qui propter phlegmonem, vel intemperiem vehementer calidam inflammatione uellic existentem, & hunc ad assantem generatus est. In iam dictis vero affectibus finistrum hypochondrium statibus impletur, & tenditur, grauitatq; sensum petcipit. Vt hoc etiam nomine merito melancholia hypochondriaca nominetur.
- I**gitur ob affecta, quæ circa ventriculũ sunt hypochondria, melancholia iam dicta provenit, quæ modo autem exhalationemue quandam maligniorem ac melancholicam, modo substantiæ humoris partem ad cerebrum sursum trahunt. Quemadmodum enim nonnulli frequenter eleuata a ventriculo fuliginosa quadam aut tumosa exhalatione, aut omnino crasso vapore quippiam suffusioni simile præ oculis obiciunt: sic ascendente ad cerebrum melancholica exhalatione tanquam fuligine aut fumo, melancholica symptomata circa mentem eueniunt. Quare tres sunt in vniuersum melancholiz species, seu differentiz. *Præ*, cum totum corpus melancholico sanguine redundat. *Altera*, quando is sanguis ipsum duntaxat cerebrum occupat. *Tertia*, quando hypochondria ipsa primum affecta, in consensum subinde cerebrum rapiunt. Hæc melancholiz species Græcis quædam *ἐξ ὀξυγαστρικῆς*, hoc est, *stomatiz & hypochondriacæ*, Arabibus & horum sequacibus barbaris *Murachia* nominatur. Cõmunia omnium signa sunt, metus, tristitia, adurum & auersio luminum, iuxta hanc *Hipp. sententiam*: Si timor & mœstitia longæ tempore habentes persenerint, ex eo melancholia significatur. Metuunt enim & tristantur omnes, odioque habent homines: nec si roges eos quamobrem moreant, reddere causam possunt. Priuatim veto melancholicotum vatiz & infinitæ fete sunt imaginationes. Alii enim credunt se bruta esse animalia, & voces & gestus ipsorum imitantur. Sic *Gal. lib. 3. de affectib. lib. 2. 6.* narrat fuisse quendam, qui se gallum esse putauerit: ideoque gallos cantare audiens, ut hi alarum, sic ille brachiorum plausu latera quatit, gallorum sonum imitatus est. Alii vasa fictilia, ut idem eodem in loco testatur, & testas se esse arbitrantur, atque idcirco obuiantibus, ne collidantur, cedunt. Præterea hi mortẽ expectant, atque adeo non raro sibi mortem conficiunt: illi eandem esse paucis. Talis fuit, de quo *Galenus scribit*, qui timuit ne *Athlas*, qui mundum sustinere dicitur, grauius sub tanto onere, ipsum a se excuteter, atq; ipse cum illo collideretur, ac nos quoq; cum ipso perissemus. Nonnulli semper rident, *Democritumque* agunt: alii *Heraclitũ*, nun-

Melancholia quid. Cassile.

Tres melancholiz species.

Notæ. Aph. 25.

Variæ melancholicorum imaginationes.

50 Operum Leonhardi Fuchſii Pars III.

quato non lacrymantes, referunt. Quidam ſe numine afflatoſe exiſtimant, & futura vaticinantur, quos *Λαμναι* priuatim Græci nominant. Sunt qui perditæ amant, & non niſi de amore loquuntur, quos Græci *Ιερμαί* nominant. Alii ſe reges, & imperatores eſſe exiſtimant. Alii ſe ſerpentes in ventre habere imaginantur. Sunt etiam qui noctu per ſylvas, luporū more, diſcurrunt, & hominibus inſidiantur, vt merito Græci *Λυκοδύονες*, & alii *Λυποι* dicantur. Quo ſane Plinius & alii reſpexerunt, dum homines in lupos commutari ſcripſerunt. Ex eorum quoque numero ſunt, qui Græciſ *πανιδύονες*, hoc eſt, *βωminam οφεί*tes, qualis fuit Timon apud Lucianū. Sunt & alii inſinitæ ſere, vt dictū eſt, eorum imaginationes, quæ ſingulæ connumerari non poſſunt. Porro peculiareſ illorum hæ ſunt notæ.

Signo pecu-
liaria.

Qui ex totius corporis conſenſu melancholia laborant, ſis corporis habitus eſt gracilis, niger, horſutus, & ex toto melancholicus, vel natura, vel acquiſitus per ſollicitudines quaſdam, aut vigiliās, aut prauorum ciborū eſum, aut hæmorrhoidum, aut menſtruarum ſuppreſſionem. Qui ex hypochondrii vitium cōter axerunt, ſes ſane præter metum & triſtitiā cruditates, quæ plurimiſ ſtatim conſequuntur, acidi ruitus, aſtus, & grauitas hypochondriorum, arguunt. Hypochondri circa vitium exor dium. Venires etiam deſiccantur, ſomnus exiguus ſit, ſumma turbulenta & enormis, ſalvus diuerſi in ſingulis corporis partibus, vertigines capitis, & in auribus ſtatum ſonitus. Deinde vbi vitium accreuerit, atra bilis comitantur ſymptomata, quæ vtiq; conſociatione, vel excretionē, vel maleſis ſtatibus, vel vomitu, vel ructu leuantur. Vitiū ratio cuiuſmodi ſit, quæ melancholicum humorem minime poſſit procreare. Verſandum itaque in aere calido & humido. Cibis vtendum boni ſucci, humidis & temperatis, panem cibum coctū, ac probe conſectis carniſ caporum, gallinarum, perdicum, phaſianorum, piſcium ſaxatilibus, & eiſmodi. Contra deuit cibos omnes, qui melancholicum humorem generant, quos ordine & copioſe quidem Galenus lib. 3. de affectu locū, cap. 8. recenſet. Elixīs, non aſſis, nec frixis vtendum cibis. Vinum æger bibat tenue, album, neque valde vetus adeoque debile. Forte enim caput tentat. Craſſum vero & nigrum viret. Exerciitium ſit mediocre, equitatio aut deambulatio per loca ætæna & viridia, aut nauigatio. Æger etiam balneo aquæ dulcis (quo ſe vno præſidio cum vitu humido Gal. lib. 3. de affect. locū, cap. 1. vitiū hoc, vbi nondum in longum eſſet protractum eutaſe ſcribit) frequenter vtatur. Somnus illi ſupra modum conſert: quapropter ſi ſopore non obrepat, conciliandus remediis ſupra dictis, veluti etiā coitus, at moderatus. Gaudeat & lætet in hocque habeat, qui iucundis ſetmonibus, cantu, aut aliis mūſicis inſtrumentis hilaritatem excitent. Ceterum vbi vniuerſum corpus ſanguine melancholico abundauerit, medendi initium a ſanguinis miſſione auſpicari expedit. Secunda vero (Galeno loco iam ſapienter citato antè) cubiti venæ præcipue autem media, quæ ſcilicet communis eſt ei, quæ humeraria nominatur, & ei quæ per axillam ad manum fertur, iecorariaque dicitur. Quod ſi fluens ſanguis melancholicus appareat, reliquum ſimilem in vniuerſi corporis venis eſſe ſpēs, audaciſq; vacues. Si vero fluens ſanguis talis eſſe non videatur, melancholicum humorem in toto corpore non redundare iudicato, ac ſtatim eum ſupprimito. Talis veto non eſt, vbi flauus fuerit, tenuis, & rubicundus. Porro in ſanguine craſſo, vulnus ſatis amplum & latum fiat, vt ille egredi poſſit. Vbi enim ſolū cerebrum ſanguinem melancholicum continet, æger ſanguinis detractione non indigebit, niſi forte multum ſanguinis ſit, ac præſeruationis gratia venam incidamus. Quum itaque ex primaria cerebri ratione melancholici efficiuntur, frequentibus balneis, vitu boni ſucci & humido, minimeque ſtatuſo, vna cum decenti animi delectatione, ſine alio potentiori remedio curandi ſunt: humor enim qui moleſtat, ob temporis breuitatem vt excernatur, nondum contumax eſſe poteſt. Malum autem ſi aliquandiu durauerit, valentiora magiſque varia medicamenta requirit. Siue igitur ex totius corporis conſortio, facta prius, vt diximus, ſanguinis detractione: ſiue ſolius cerebri primario affectu melancholia orta fuerit, medicamenta quæ per inferna purgant exhibere oportet. Inre-

Vitiū.

Balneum
aquæ dul-
cis.

Curatio.

Decoctum
preparans.

poſitis tamen aliquot a venæ ſectione diebus, in aurota quotidie æger bibat hoc decoctum, quod accipit: *Florum bugleſſi, celi, violarum, ſingulorum manipulum vnum. Pnerum paſſarum detractis vinæci, vnicui vnam. Aſpleni ſive ceterachis, manipulum vnum. Fumaria, manipulum dimidiū. Corticū radicū cappariū, tamarich, vtriuſque drachmæ tres. Radicū ſeneculi, petroſelini, glycyrrhizæ, ſingulorum drachmam vnam. Thymū, cithymū, vtriuſque*

- A** utriusque drachmam dimidiam. Decoquantur singula in tribus libris aquæ, donec tertia pars absumatur, deinde colo transfundantur, & saccharo adiecto ins decocti dulced reddatur, atque cui partifectur, & addantur serapii & sumaria, de epithymo, utriusque uncia dua, & fiat potio. In eundem usum hodie propinant serapium violaceum, & buglossa, & pomis, admixtis aquis stillaticis sumaria, lupi alchitri, iurbi hortensis latifolii, endivium vocant, & buglossi. Verum cum stillaticiarum aquarum visus ventriculo non admodum conferre videatur, præstat prædicatarum herbarum decoctis uti, commistis setapii in hunc vel consimilem modum. Serapii & buglossi, unciam unam. Serapii de epithymo, unciam dimidiam. Decocti ceterochii, sumaria, & iurbi hortensis latifolii, uncias tres. Commixtio omnibus fiat potio. Post hæc corpus quem
- B** Trallianus miris modis extollit, & similibus. Proderit autem hulus etiam decocti purgantis visus, quod recipit: Florum buglossi, violarum, rosarum, singulorum manipulum unum. Prunorum passorum detractis vinaceis, oxypbanicis, utriusque unciam unam. Myrobalanorum caruleorum, lusterorum, empticicorum, belerizicorum, singul. unciam dimidiam. Folliculorum sene, polypodii, utriusque drachmas sex. Prunorum damascenorum numero decem. Coquantur in aqua iussa quantitas ad tertias, dein in colo transfusis, adiecto prius saccharo, iuri decocti dulcedo ac suavis inducatur, de quo in aurora, uncia quatuor exhibeantur. In iis, si non satis purgent, licebit dissolvere antidoti diosena, drachmas duas. Mirtice quoque conducit diluam epithymi, in eum paratam modum. Epithymi, una. dimidia. Maceretur horis viginti quatuor, in feri caprini lactis uncias quatuor, dein valide exprimantur, & colo transfundatur, atque in aurora, propinetur. Valet etiam diluam foliorum sene, quod sic parari potest. Foliorum sene, uncias duas. Prunorum damascenorum numero duodecim, contusis macerentur in sero lactis caprini horis viginti quatuor, deinde exprimantur, & colo transfundantur, atque in aurora, ut antea est indicatum, bibantur. Licebit etiam hoc uti pulvisculo, qui accipit: Epithymi, unciam dimidiam. Lapidis armenii, agarici, utriusque drachmas duas. Scammonia præparato, drachmam unam. Garryphylorum numero viginti. Redigantur omnia in pulverem, & singulis septimanis drachmam unam, vel drachmam unam & dimidiam ponderi dentur, in serapio rosarum laxativo, vel serapio de pomis. Vitale est etiam lactis sero ventrem subdugere: veruntamen id non fit quod ex calco fuerit expressum. Melius est enim id, quod per decoctionem, & Actio
- D** nolla, ex lacte separatur. In ollam enim novam iniiciendum lac, & virgulto ficus movendum: cumque ter quaterve deferbuerit, aceto multo irotetur: dein excolatum, potui exhibeatur, a principio quidem admixto melle: cum vero ventris subdudum inceperit, non miscetur mel. Neque temere quis a purgatione, interiectis quibusdam diebus, clysteribus utetur, ut qui a capite avertere admodum queant. Sunt autem eiusmodi, qui
- E** tiam hoc fuerit concitatum, horum quoque purgationem moliemur. Id quod facere nos monet etiam Hippocrates, iniquens: Melancholia vexata, hamorrhoides: superuenientes bonum. Et rursum: Insanientibus si varices, vel hamorrhoides superuenierint, insania solutio. Danda quoque sunt medicamenta, quæ animi tenebras abigere, atque adeo lætitiæ patere valent, viresque reficiunt, ut est saccharum buglossi, iurbi hortensis latifolii, violaceum, rosaceum, latifolium Galeni vocatum, diosena & complura alia. Nulla denique ratione, quod antea etiam monuimus, balneorum aquæ dulcis visus est negligendus. Embrochas quoque caput humectare potentes adhibere oportet, qualis est quæ accipit: Malva, althea, violarum, boraginis, singul. manipulum unum & dimidiam. Chamæmelis, fitchada, utriusque manipulum unum. Florum nymphaeæ, manipulum dimidiam. Seminii lactuce, drachmam unam. Seminii iurbi hortensis angustii folii, drachmam unam & dimidiam. Bulliant in aqua iussa quantitas, & iure decocti caput rasum irrigetur. In eundem usum convenit adhibere inunctiones ex oleo violaceo, chamæmelino, nymphaeæ & similibus. Studiose postremum annitendum, ut imaginationes absurdæ, talæque, & immensa mœstitia, quacunque fieri potest ratione propulsentur. Huius reimmemorandum exemplum exstat

Potio:

Decoctum
purgans me
lacholia.
Diluum e-
pithymi.
Diluum so-
luti sene.
Pulvis pur-
gatoria.Sero la-
tis parti-
dum.

Clyster.

a. Aph. 11.

b. Aph. 12.

Balnea.
Embrocha.

Hilota.

Hypochō
driac
melichō
lic con
tra.Cucurbi
tularum
appoſitio.Vomitus
et con
tundit.

apud Alexandrum Trallianum, qui *libr. 1. cap. 17.* mulierem quandam hunc in mo-
dum quandam ſanitati reſtituiſſe ſcribit: *Mulier* (inquit) *melancholia virio corrupto, inter*
dormiendum anguine ſe degluſiſſe putabat. Cuius itaque ei vomitum, anguem exſiſtūtem pelat, qua
vomitum excipiebat, claudere inferni: quem ſimulasque conſpexiſſe melancholicas, euomiſſe
rata, emorem falſam ſuſpicionem poſuit, & ſalua euſit. Ita Philodotum Medicum quandam
qui ſibi caput amputatum eſſe, quod tyrannus factus fuiſſet, putabar, curaviſſe idem tradi-
dit, impoſito repente capiti ipſius plumbeo pileo, vt gravitatem ſentiens, caput ſe reco-
piſſe ruriſus exiſtimaret, quo plurimum gauſus, vana imaginatione liberatus eſt. Por-
ro ſi ob hypochondriorum offeſionem vitium conſtituerit, vtendum aſſidue potu deco-
cti pulegii, non ſolum anre medicamentorum putantium exhibitionem, verum
etiam poſt. Similiter & centaurei decocto. Vnicæ autem in hoc vitio condunt deco-
ctum hoc, quod accipit: *Florum boraginis, violarum, utriuſque manipulum dimidium. Fa-*
maria pulegii, abſynthii, centaurei minoris, aſari, chamadryis, cetheerachii, lupi ſalutaris, ſingulorum
grammum unum. Seminum aniſi, ſemeniſ, petræoliſti, dauci carci, ſingulorum drach. unam & dimi-
dium. Folliculorum ſena vna. Dimidium Radicum polypodii, drach. quinque. Corticum radicum cap-
parum, drach. tres & dimidium. Ligni ſamaricæ, drach. ſex. Corticum myrobalanorum indorum,
citrinorum, chebularum, ſingul. drach. quatuor & dimidium. Thymi, epithymi, utriuſque drach.
duos & dimidium. Decoquantur ſingula in tribus libris aqua fontana, donec tertia pars abſuma-
tor, poſtea decoctum cola tranſfundatur, alioque cui purificetur, & adiciatur Serapi de ſumaria,
de pomis, & de epithymo ſingulorum uncia vna & dimidia. Deinde quoque abſynthii deco-
ctum iugiter exhibendum. Vile enim eſt ſtomacho & ventriculo, pluriſimique ſtatus
generationem in ventre impedit, neque extreme ventrem compellit: ſed vrinam mo-
uet, optimamque coctionem præparat: adeo vt hoc ſolo remedio plurimi ſanati ſint.
Exhibenda etiam ea ſunt, quæ vrinam movent, vt aniſum, daucum, oſſarum, carcum, hypo-
marathri ſemen ac radix, & chamadry. Horum enim quodlibet aqua decoctum ſumitur,
vel in puluerem redactum, potuique inſperſum. Vile etiam fuerit, vt hypochondrio-
rum curam habeat Medicus. Fovebuntur itaque ruta, anethi, abſynthii, abroton, pulegii,
agni ſeminis, haccarum lauri, ſerpylli, artemiſie, ſeminis nigellæ, carci, & ſimilium decocto. Hæc
enim dolores leniunt, flatulque diſcutiunt, maxime vbi oleo incocta male affectæ par-
ti cataplaſmatis in ſtar applicantur. In flatibus autem ſtomachi cum punitione, cum-
num aceto decoqueres, & pulegium, ſtomachum fovebimus. Cataplaſmata autem
habeant in oleo decoctum aniſum, aut aptum, aut cuminum, abſynthium, & iſi ſimilia. Cum
admones, plurimo tempore tam vacuo adhuc ſtomacho, quam poſt cibum adhibere
permittes. Cumque cataplaſma auferitur, conregenda hypochondria ſunt ſana la-
tiori, vel leuiſſima æ pura pelle agni, locum prius oleo nardino illinentes. Vtendum et-
iam appoſitione cucurbitularum leuolum, hoc eſt, citra ſcarificationem. Videbitur enim
tibi præſidium hoc, Galeno libr. 12. Theri. meth. teſte, in huiuſmodi vitio incantamenti cu-
luſpam ſimile quid efficere. Illico enim admoſta cucurbita, qui ſpiritu ſtatuſo crucian-
tur, tum a dolore liberi, tum omnino ſani redduntur. Ad phlegmonas autem & duriti-
es, cucurbitulis cum incisione vtendum. Quibus vitium diu durauerit, præſentiſſimum
eſt remedium, ex longis intervalis, etiam a cibis per vomitum purgatio. Non tamen
validis vomitoriis vtendum eſt: talia enim inſeſta ſunt ſtomacho ac ventriculo anxia-
tem afferunt. Concitetur igitur vomitus cum aqua tepida, cui oxymeli ſit admixtum.
Quod ſi tamen neque hoc modo poſſunt euomere ægri, digitos aut pennas in os de-
mittendo irritare oportet. Proderit autem iſis vaice vomitus, qui per elleborum ſit
album, in eum modum: Accipe ellebori albi, drach. unam. Concideſcat in minutæ particulas,
& raphano ſatu magno inſigatur. Tranſſuſis tribus diebus iterum excimatur, raphanusq; deinde ſer-
uiter exprimatur. Poſtea accipe ſucci de raphano expreſſi, drach. ſex. Aqua calida, vna. qua-
tuor. Oxymelis, vna. vna, & commixtis ſingul. vniuerſum calidum ægro propinaſe. Vel
conſice vomitorium in eum modum: Accipe ellebori albi optimi, drach. tres. Errophano
prius perforato inſige, ac ibi noctem unam integram dimitte. Poſt die vbi in taphanum vires
ellebori migraverint, amoto elleboro, raphanus in minutæ diſſecetur, & in oxy-
melite propinetur, diligenter cauendo, ne quidpiam ellebori in raphano relinqua-
tur. A vomitu autem ſi cruditas adhuc durauerit, quæ ventriculum roborant, eun-
demque caleſciunt, exhibendæ erunt. Si vero melancholicus humor in ventriculo

vel

A vel hypochondris fuerit, a quo melancholica exhalatio sursum ad cerebrum transmittitur, humor ille ad modum paulo ante dictum purgandus erit. Caput denique, ne vapores illos recipiat, roborandum.

De tremore. CAP. XXXV.

Vitium, quod Græcis *τρεμος*, Latinis veto *tremor* dicitur, ex duobus perficitur motibus: uno quidem, dum cogitur membrum ob motum atque gravitatem ad infectionem tepere: altero, dum sursum a facultate fertur. Vitium hoc in vniuersum ob nervorum imbecillitatem accidit: quod ætas senilis palam testatur. Priuatim vero plures alie cause ipsum efficiunt: nempe frigidius natura temperamenrum, frigida potio, præsertim in febribus intempestive assumpta. Frigidi præterea, crassi, & leni humoris abundantia, vini que multi metacioris usus, senectus, atque timor. Signa neque ad videri, neque causarum dignotione villa sunt necessaria, quod scilicet partim visu, partim etiam ex ægri sermonibus atque corporis constitutione deprehendi queant. Vitiis ratio sic constituitur, ut causis plane sit contraria. Cibus vero facillime distributionis offeratur: primum lorbilis, mox volatiliu, & piscium molli carne prædiorum. In crassorum lentorumque humorum redundantia, iis uti conuenit, quæ incidendi & extenuandi vim obtinent, de quibus in præcedentibus sape dictum est. Vitanda veto in vniuersum omnia, quæ nervos offendere possunt, vini maxime metacioris potio. Bibendum vero dilutum & aquosum, aut hydromeli. Quoad rationem curandi attiner, qui ex erroribus commisisse manifeste tremunt, a noxiis prorsus abstineant. Qui igitur ex vini potione tremunt, iis vinum circumcidendum est, quoad in totum non toto fuerint liberati. B. bant interea hydromeli, cum decocto saluæ, aut betonicæ, vel laualdulæ. Si a frigidis & crassis humoribus tremor accidit, curandi ratio erit adhibenda eadem, quæ resolutioni & conuulsioni a plenitudine ortæ, sanguinis duntaxat missione excepta. Extremæ autem corporis partes oleis calefacientibus præunctæ, lanis molliibus contegantur. Dein cucurbitulæ citra scarificationem a priori vertebra usque ad spinam lumbosque affigantur, ut scilicet crassi & leni humores vertebrarum foramina obstruentes, ad cutis extremam superficiem trahantur, atque adeo subinde facilius discutiantur. Proderit etiam, ut æger quotidie pipetis giana quinque ex mulsi cyatho, hoc est, *vnc. vna & dimidia* bibat. Proderunt etiam medicamenta roborantia cerebrum, illudque calefacientia & exsiccantia, *conserua salua, rosmarini, lauandula, confectioes diagalanga, & diamefibi*. Sunt præterea quædam alia medicamenta simplicia, quæ præsumta trementes adiuuant: nempe castorum, altheæ radicis, & eupatorii decoctum, & ex animalibus desumptum lcoris cerebri. Quid multa medicamentis, vñ dionibus præsertim ad resolutionis curationem conscriptis, in huius generis vitio vtendum.

De Ophthalmia, siue lippitudine, CAP. XXXVI.

Ophthalmia Græcis, *lippitudo* Latinis, nihil aliud est, quam tunica vel membrana adnata, quam barbaram sectantes medicinam, *Coniunctiuam* vocat, phlegmone. Adnatam vero hanc dixerunt, propterea, quod aliis, quæ oculum ipsum constituunt, tunicis forinsecus adnata sit, ligamentum existens toti oculo ad circumiacentia ossa. Hinc est, quod ambientes oculum partes, ad malas nonnunquam in vehementiori lippitudine simul attollantur. Fit hoc vitium vel ex plenitudine vniuersum corpus grauante, ob quam adnata etiam humoribus referta tenditur: vel ab influentium biliosorum humorum acrimonia vehementer erodente: vel propter crassorum humorum, aut statulentorum spirituum intensionem. Dignoscitur, si adnata oculi, quæ natura candida est, obscuri guinis confluxum admodum dolet, ac rubra esse videtur, & ex oculis lacrymæ resulant, atque in maioribus oculi angulis fordes quædam & lacrymæ seruidae acerui. Si vero a biliosis & acris humoribus orta sit, lacrymæ fluentes acres, & rodentes erunt, vniuersumque corpus cacochymum esse apparet. Sin ex crassis humoribus facta est, græuitas magna tensio erit, nullæque apparebunt lacrymæ. Locus in quo decumbit æger, obscurus & tenebrosus sit, splendorem enim sine molestia ferre haud possunt: & pro causæ diuersitate aut frigidus, aut calidus. Si in propatulo egreditur æger, linteam atrum, aut cæruleum, aut vinde oculis obducatur: siquidem si colorem visum motu affectum,

54 Operum Leonhard. Fuchsi Pars III.

Viſus.

Carnio-

Adstringe-
re & reſi-
ſtere.
Liquores
mitigantes.

Emplaſtica
& reſiſte-
rentia vbe-
menter ad-
hibenda ſunt.
Stupefacien-
cia non to-
mere admo-
uenda.

Balocum.

Fomentum
diſcutiens.

aut fatigatum corrigunt ac recreant, *ut teſtatur Galenus libro primo de ſymptomatu cauſis*, v-
bi ex profeſſo de iis quæ oculos aut moleſtiant, aut triftant, agit. Tenui autem proſus v-
tendum viſu, ac cibo parciorē, ne immo dicæ aucti humores ad oculos confluant. De-
uitet carnes, lactiſque uſum. Vino, præſertim inter initia abſtineat, bibatque aquam in
qua ſit decoctū parum cinnamomi, aut hordei, donec vigor prætereat. Quod ſi tamen
craſſiores humores reſiſſionem procreant, hydromeli, aut vinum tenue & aquo-
ſum bibere conuenit. Exercitari haud prodeſt, ſed quieſcere. Somno moderato vtan-
tur ægri, & maxime nocturno. Perturbationes animi procul abſint. In curandi ratione
animaduertendum, num ex plenitudine fuerit contracta ophthalmia: id quod cogno-
ſcitur, vbi cum ingenti dolore oculos affligente plurima tenſio, rubedo, renitencia, &
calor affuerit, ſeruidarum quæ lacrymarum copia defluxerit: tum enim a miſſione lan-
guiniſ hæc ipla auſpicanda erit. Venam autem ſecare oportet gibberi exteriorē, quam
humeralem vocant, atque eam quæ e directo eſt laborantis oculi. Et vbi vehemens fue-
rit phlegmone, ad animi viſque deliquium auferre conueniet. Si vero a rodentibus aut
craſſis humoribus lippitudo orta fuerit, id quod lacrymæ tenues, falſæ, acres, calidæque
aut contrariæ, *ut diſtinctum eſt*, monſtabunt: atque adeo totum corpus cacoehymū fuerit,
præſertim abundauerit humoribus, primū, quæ acrimoniam bilioloſorum & mordican-
tium humorum mitigare & obrundere poſſunt, & deinde, quæ noxiſ illos humores
vacuare & purgare poſſunt medicamenta propinanda: quæ certe pro redundantium
ac inſeſtantium humorum variare immutanda veniūt. Corpore vacuato, humorum,
qui ad oculos ſeruntur impetus deorſum, & ad alias corporis partes ignobiliores, infer-
narum partium ſtriſionibus, ligaturis artuum, & cucurbitulis collo & ſcapulis ad moris
reuellendus erit. Poſthæc adhibenda ſunt medicamenta repellentia, quæ non exaſpe-
rant, hoc eſt, non vehementer ſunt ſortita adſtriſionem: & quæ tum propria ſua ſub-
ſtantia ſunt moderatiora, tum leniētis liquoris admixtione adhuc magis talia ſunt. Le-
nientes autem mitigantesque humores medicamenta ſunt, *Gal. lib. 13. ter. med. cap. vltim.*
reſiſte, potiſſimum oui candidum, ſænograci decoctum, & adhæc amplius ipſum lac. In
quo ſane prouidum eſſe medicum oportet, vt iuuenulæ ſimulque boni ſucci ſæmi-
næ exſiſtāt, vberibus iſpius in cotem, in qua collyrium teritur expreſſis, quo calidum
adhuc oculis infundatur. Hoc vero præcipue in iis qui vehementi dolore affliguntur,
vel propter phlegmonis magnitudinem, vel ob influentium humorum acrimoniam,
faciendum. Fronti itaque illinendi ſucci roſarum, plātaginis, ſolani, ſemperuiui, folio-
rum ſalicis, aut eorundem liquoris ſtillatici, cum oui albo & aceto. Hiſ admixcere cō-
uenit *bolam armeniam, ſhur, acatiam ſantala rubra, balaiſtia, & ſimilia*, ex quibus adiecto oleo ro-
ſaceo, & farina hordeacea, cataplaſma aut emplaſtrum componatur. Emplaſtica vero & anody-
na, hoc eſt, dolores ſedantia, vt eſt cæruſſa lota, amyllum, & cicuta, non ſunt temere ad-
hibenda. Hæc enim etſi maxime reprimere quod influit, & ſimul ſentum torpeſcere
poſſunt, tamen (*ut teſtatur Gal. 6. Aph. comm. 31.*) vehementes fluxiones non reprimunt,
ſed potius excerni prohibent. Quare ſi humores conſuentes acres fuerint, corneam
erodi continget. Si vero multi, magis irritari, & vehementius extendi. Ex quibus pro-
feſſo niſi medicamētum fuerit ſummo opere ſtupefaciens dolores imparibiles excitantur.
Si vero tale fuerit, viſoriam vim miſcetur det. Quare vehementer ſtupefacientia,
niſi maxima doloris neceſſitas urgeat, non ſunt ad mouenda: q̄ ſcil. facultati viſoriam
offendant, adeo vt deſinente phlegmone, vel obſcure & debilitate, vel niſi omnino vi-
deantur. In principio itaq; medicamēta quæ refrigerant, adſtringūt & repellūt, admo-
uenda. In incrementō morbi, repellentib. nōnihil ex iis q̄ diſcuriunt, admiſcendum. Ar
in vigore, mitigatoria applicanda. In inclinatione, ea quæ diſcutiendi tantum ſculta-
tate pollent. Vbi igitur concocta iam phlegmone ipla fuerit, & ſimul corpus vacuum, vt
non amplius ex capite ad oculos fluxio metuenda ſit, tum vtrique lauaciones iis in bal-
neo temperato ſunt aptiſſimæ. Nam, *ut Galenus loco paulo ſupra citato ſcribit*, & dolorem
ſtatem ſedant, & fluxionem quæ ad oculos fertur, ſiſtunt, maxima quidem ex parte
inter lauandum per thoracem corpus excreta, reliquo autem contemperato. Fomen-
tum in ſuper omnino adhibendum eſt iſpis oculis per ſpongiam, ſi quidē mediocriter ſit
dolor, ſemel aut bis in die. Si vero vehementior fuerit, præſtat ter aut quater, & ſæpius
vt, in longis præteritis æſtibus diebus. Fiat vero fomentum per meliſſum, ſorum chama-
meli, &

A meli, & fœnugræci decoctum. Est enim hoc medicamentum maxime omnium, quæ oculis admoventur, sine offensa discutiens. Lauandum tamen prius curiose fœnugræcum, ne quid illi vel pulueris, vel sabuli adhaerens clain lateat. Aloe etiam per se, vel succo, aut liquore stillatitio fœniculi & rosarum diluta, mirabiliter confert. Perorisitæque hoc uti collyrio, quod accipit: *Liquoris stillatitii rosarum fœniculi, & euphoragie singul. unc. v. m. m. Aloe, drachm. v. unam. Pampulygis lotæ, drachm. dimidiam.* Commisceantur singula, & fiatque collyrium liquidum. Si a biliosis fiat humoribus, dolor sedandus, & bilis purgantibus medicamentis vacuanda, eiusque feruor, ac fluor compescendus. Pari ratione faciendum erit, si a crassis humorib. lippitudo fiat, nempe concoquendi & alterandi e-runt pituitosi humores, postea purgandi, tandem topica adbibenda. Sin ex flatulento **B** spiritu oriatur, itidem humores pituitosi tum alterandi, tum purgandi sunt adhibitis reprimentibus, & postremo flatus discutientibus medicamentis.

De Pierysio. C A P. XXXVII.

Pupillam nervosa est adnatae membranae eminentia, seu membranula, quæ ab angulo maiori quidem oritur, sed usque ad coronam seu irim oculi progreditur. Quum vero augetur, pupillam etiam obteggit. Latini *vunguem* appellant, barbari *vungulam*. Oritur magna ex parte ob scabiem oculorum, siue scabram lippitudinem, aut continuum humorum crassorum & lentorum defluxum. Signis quibus vitium deprehenditur nullis, est opus, cum oculis ipis sit manifestissimum. Vitius rationalis sit, quæ crassos & lentos humores extenuet: quæ qualis sit, ex superioribus facile cognoscitur. Ceterum quod ad curandi rationem attinet, animaduertendum, quod magna & diuturna pterygia sola chirurgia amoluntur: quam copiose tradit Aetius *lib. 7. cap. 60.* & Paulus *lib. 2. cap. 18.* Recentiora, & magnitudine mediocria præsidis dissipantur abstergentibus: sic tamen, ut vniuersum corpus primum a crassis & lentis purgetur humoribus. Initio itaque ea, quæ crassos & viscidos humores extenuant, & incidunt medicamenta: deinde vero quæ eisdem purgant & vacuent, sunt propinanda: quorum omnium matricem & formulas & præcedentibus petent studiosi. Neque enim necessarium, neque etiam decorum esse iudico, singula repetere. Corpore vniuerso purgato, pterygium primum ex aqua temperate calida, & cum decocto, *maluæ, alibæ, chamæmelis, semine lini, senegre, &* similibus toueatur: deinde quæ extergunt repurgantia medicamenta admoucantur: qualia sunt

D inter simplicia tuis in tenuissimum puluerem redactum, irem laxæ testa vsta. Vehementiora veto æs vstum, *chalcantem, seu atramentum fortium, squama aris chalcitis, mysi, & fel porcinum.* Pumex præterea torrefactus & tenuissime tritus non inuiti ter vino leuigatus illinitur. Fel quoque caprinum cum succo artemisæ, & melle mixtum inungendum. Est & hoc efficax medicamentum, quod accipit: *Atramentis fortioris, drachmas tres. Gummi, drachmam unam & dimidiam. Leuigata vino illinantur.* Et hoc quod recipit: *Atramentis fortioris, gummi, salis ammoniaci singulorum drachmæ duæ.* Hæc trita in aceto, in collyria digerantur, cum visus ex postulat, adhibeantur. Aliud laudat: *Chalcitis vsta, donec in pruna conuersa sit, seminatam. Cruci, drachmæ unam.* Terito & excussato, & vtere, hoc nimis pulvere vngue affricans. Præstantissima enim sine liquore detrita, siue in star pulueris inpersa & affricata.

E & collyria. Mitissime etiam conducunt testæ sepiæ cum sale ammoniac otrite, & applicata. Hæc collyria commemorasse sufficiat, quod quisque possit sibi tan et Græcis, quam Arabicis auctoribus complura eius generis medicamenta citra laborem comparare.

De Phylactanis. CAP. XXXVIII.

Quia tunc pustulae sunt exiguae, veluti quaedam bullae, supra corneam potissimum tuni-
cam eminentes: quales iis potissimum accidunt, qui ex anthematis affliguntur. Phlyctæ-
nae.
Sic dicitur *amē f. hunc*, hoc est, *ab ebullitione & ferveore*. Barbari *vericæ* nominant, quod se-
ro humore plenz sunt. Color phlyctænarum variatur, prout in superficie, aut pro-
fundo corneæ sunt. Nam quum cornea tunica ex quatuor veluti membranulis tenuis-
simis constet, sit ut interdum sub prima phlyctæna oriatur membrana, vnde etiam co-
lore nigrior apparet. Interdum sub secunda aut tertia, quæ et candidior spectantibus
offertur, quoniam in profundo occultatur: natiuus enim phlyctænz color niger
est, cornea vero tunica veluti cornu pellucida est, & candicat. Quanto igitur phlyc-
tæna profundius fuerit, tanto candidior apparebit, magisque dolorifica, & mole-
sta. Oriuntur ob copiam sanguinis, aut ab acerbis humoribus. Notis ad vitu co-

Vesicæ.
Colicæ
phlyctæ-
narum
quæ re-
stant.

Caulicæ.
Nec.

destritur ac dissolutum immittendum erit. Oculusetiam oui albumine irrigandus, & illiendus linimento, quod ex ovo simul cum vitello ac rosaceo, & vino tepidato conficitur, excipiturq; lana & applicatur. Subsequentibus diebus fovebatur rosarum aut melissæ decoctione instillabaz, hac mulieris cum suo rocam multum, vel et opacatum. Linimenta præterea vteris, quæ ad phlegmones & inflammationes descripta sunt, præsertim, quod ex capibus papaveris, mulchillo croco, & pane præparatur. Levia tamen sunt linimenta, & superior tantum palpebra illis innatur, vt commode aperiatur oculus ad defluenda lacryma ex-cernenda. At si vicus fordidus fuerit, mala medicetur aqua, & fortiusq; deco-

Facere
ei facere,
quoniam
barbari
mucilage
non va-
let, ut pa-
candus.

me purgari oportet: inde plurimum abluui: postea in aqua dulci purissima diea nocte madefactum in fictili exacte decoqui, vitariq; in decoctione vase æneum. Postero die effusa priori aqua, & alia pura affusa, ad ignem splendendum fumo carentem decoquitur. Ideo vero primam & secundam aquam abucimus, ut omnis inde amaritudo eximatur. Tercio igitur purissima aqua adiecta & exquisitissime operta, hanc ad liquidioris mellis consuetudinem decoquit: inde per linteum excolabis, fenugrecum nequaquam exprimens, fed eo tantum succo contentus, qui iponte defluer, quem ad fordes depellendas seruabis. Seruati autem in alteram diem, vel quam longissime in tertia potest: vltterius n. moratus accescit. Vbi vlcus satis purgatu fuerit, a succo fenugreci abstinerebis, & ea quæ glutinandi ac incarnandivim obinent admoueabis. E quorum numero est hoc cithure collyrium, & accipit: *Ammoniaci sarcocolla, vitrisque drachmas dimidiam. Theriac drachmas decem. Croci, drachmas duas. Omnia leuigata, ac fenugreci siccum excepta, in collyria digerantur.* Vlcenib; iam incarnatis, & ad planiciem (quoad fieri potest) sedatis, collyria quæ ad cicatricem ducunt, & ad mouenda erunt, quod est, quod accipit: *Porphyræ elææ, drachmas tres. Plumbi vißi & latti, drachmas duas. Croci, drachmam vnam. Squama æri drachmas duas. Gummi guaiaci tres.* Omnia leuigata, & aqua pluuiali excepta, digerantur in collyria ad vsum. Sunt qui *aleen diligenter lotam, & corallia rubra* adiciunt.

• *Collyria*
• *et* *thorac.*

Collyria
ad usum
cum sa-
cro.

De cicatricibus & albuginibus oculorum. CAP. XL.

Post curationem vicerum oculorum, dum continui eorum solutio restituitur, elatrices illis innascuntur, quæ alio nomine *albugines* vocantur. Hæ autem duplices sunt, quædam enim in summa oculi superficie consistunt, & hæ quidem Græci *σφαλε* appellantur, Latini autem *mucosæ*, & *cicatrices*, & *albugines* rarij dicuntur. Quæ vero radices altius agunt, hæ *αδανω* Græci *albugines crassæ* Latini vocant. Ceterum hæ oculi cicatrices recte *albugines* dicuntur, omnes enim cicatrices in nigro oculi candidæ videntur, densata enim cornea tunica, subiectus ipsi capulus color non amplius transparet, eminentes vero præcipue albescent, planæ minùs candicant, magis autem autem partim nigra oculorum quodammodo assimilantur. In extendis autem cicatricibus vnice opus est congrua vidus ratione, vt temperata materia, probulque succus partem totum corpus diffundi possit. Ab omnibus igitur acribus, salis, & crassi succi cibis, ac vini copia abstinere oportet: maxime vero concoctioni studere, rebusque boni suoci mediocriter vo-

1. **Albugi-**
 2. **nes oculi**
 3. **rugi, sive**
 4. **albugi-**
 5. **nes,**
 6. **epithelie**
 7. **epithelie**
 8. **epithelie**
 9. **epithelie**
 10. **epithelie**
 11. **epithelie**
 12. **epithelie**
 13. **epithelie**
 14. **epithelie**
 15. **epithelie**
 16. **epithelie**
 17. **epithelie**
 18. **epithelie**
 19. **epithelie**
 20. **epithelie**
 21. **epithelie**
 22. **epithelie**
 23. **epithelie**
 24. **epithelie**
 25. **epithelie**
 26. **epithelie**
 27. **epithelie**
 28. **epithelie**
 29. **epithelie**
 30. **epithelie**
 31. **epithelie**
 32. **epithelie**
 33. **epithelie**
 34. **epithelie**
 35. **epithelie**
 36. **epithelie**
 37. **epithelie**
 38. **epithelie**
 39. **epithelie**
 40. **epithelie**
 41. **epithelie**
 42. **epithelie**
 43. **epithelie**
 44. **epithelie**
 45. **epithelie**
 46. **epithelie**
 47. **epithelie**
 48. **epithelie**
 49. **epithelie**
 50. **epithelie**
 51. **epithelie**
 52. **epithelie**
 53. **epithelie**
 54. **epithelie**
 55. **epithelie**
 56. **epithelie**
 57. **epithelie**
 58. **epithelie**
 59. **epithelie**
 60. **epithelie**
 61. **epithelie**
 62. **epithelie**
 63. **epithelie**
 64. **epithelie**
 65. **epithelie**
 66. **epithelie**
 67. **epithelie**
 68. **epithelie**
 69. **epithelie**
 70. **epithelie**
 71. **epithelie**
 72. **epithelie**
 73. **epithelie**
 74. **epithelie**
 75. **epithelie**
 76. **epithelie**
 77. **epithelie**
 78. **epithelie**
 79. **epithelie**
 80. **epithelie**
 81. **epithelie**
 82. **epithelie**
 83. **epithelie**
 84. **epithelie**
 85. **epithelie**
 86. **epithelie**
 87. **epithelie**
 88. **epithelie**
 89. **epithelie**
 90. **epithelie**
 91. **epithelie**
 92. **epithelie**
 93. **epithelie**
 94. **epithelie**
 95. **epithelie**
 96. **epithelie**
 97. **epithelie**
 98. **epithelie**
 99. **epithelie**
 100. **epithelie**

r. Cando

Collyria
acidum.

58 Operum Leonhard. Fuchſii Pars III.

Aloe.

Alind.

inirpaz
per op
inirpaz
Sugillata.
Macula
oculi.
Caulis.
Signa.
Curatio.

Localia.

Caleſc
gena.

inirpaz
per op
inirpaz
Sanio in
tra cor
nem.
Caulis.
Note.
Curatio.

aut thur. Cotnu autem cerui & caprarum, combuſta, ſine omni eroſione abſtergunt. **A**
Aloe vero mixtæ cuiuſdam facultatis eſt, ſicut & roſa: ineſt enim illis quædam amaritudo qua extergunt, ineſt & adſtriſio, qua vnire poſſunt, & ad cicatricem perducere. Ad
liciamus iam dictis collyrium adhuc vnum aridum, quod recipit: *Oſſium ſipia ſarcocolla,*
ariſtolochia rotunda, myrrha ſpuma, nitri ſachari, ſingularum drachmas duas. Tritis omnibus ſi
at puluis. Hæc commemorariſſe ſufficiat, quia plura alia apud diuerſos auctores conſcri
pta reperiuntur.

De Sugillatis. C. A. P. XLI.

Ynter *opaz* & *inirpaz* Græcis dicitur, quando propter iſtum aliquem fractis aut contu
ſis vaſis, intra tunicas oculorū ſanguis colligitur, & in extrema parte veluti ſanguinis
puncta apparent. Latini *ſugillationem* & *ſugillata* vocant. Recentioribus Medicis *macula*
oculi appellatur. Cauſæ etiam præmiſſa deſcriptione ſatis patent. Signa etiam nulla re
quiruntur, quod vitium viſui ſtatim ſe manifeſtet. Porro cum ſanguinis effuſio & venis
facta eſt, accidit, vt progreſſu temporis lueſcat & denigretur, exiguis nimirum grumulis
ex ſanguine in multas oculi partes diſperſo, coactis. Quare merito ad eius curatio
nem ſtatim ſeſſant Medici priuſquam denigreſcant, eo ſane curationis conſilium di
rigentes, vt ſanguinem diſſipent: non ignari, quod ſanguis qui in grumos coierit, æ
gerime poſſit diſſipi. Quia vero tunica venularum, ex quibus ſanguis exſilit, contun
ditur ac rumpitur, parum quid ex adſtringentibus ad diſcutientia admixſetur. Si enim
ſolam diſcuſſoria facultatem haberet medicamentum in principio admotum, non
ſolum quod effuſum eſt diſcuteretur, ſed & per fiſſuras aliquid ſanguinis, qui in contuſis
venis continetur, attraheret. Poſtquam vero in naturalem ſtatum redierint venulæ, ci
tra adſtriſionem ad diſcutientia medicamenta venire tempeſtiuum eſt. Quare venæ
ſectio, ſi opus fuerit, aut purgatione, ſi ita viſum fuerit, præmiſſa, ſtatim ſanguis pa
lumbi, vel columbæ ex teneris præcipue alis expreſſus, aut lac muliebre calidum, cui
thuris vel croci paululum ſit adiectum, inſtillandum. In eum quoque viſum albumen
candidumue oui tepetactum oculo inſundendum. Atque amplius lana munda exce
ptum, & ſuperimpoſitum. Recte autem valet & luteum oui toſti, cum vino illitum: aut
meliloto coctum ex vino, eodem modo impoſitum. Inſuper *roſarum folia* & *flores ſcor
ſon.* & cum vino triſta, ſemique potenta, aut *braſſicæ folia* illius proſunt. Recens etiam caſcus, &
qui ſalem nuper accepit, eo quod mixtam facultatem, emplaſticam & obturantem
per ſe, & diſcutientem & aliquid adſtringentem ex ſale habeat, initio illitus conſert.
Huius quoque generis ſunt, *croci, melilorum, & roſæ.* Hæc autem antequam admo
ueantur, oculus decocto *maluoli* & *ſanaguaci* ſonendus erit. Conducit autem bis in die medi
camentum applicare, ac ſimul prius decocto prædicto calido per ſpongiam mollem
fouere. Vbi vero iam ſine phlegmone oculus fuerit, & ſugillata vetuſtatem contraxe
rint, ex ſolo *ſanaguaci decocto* oculi fouendi erunt, & diſcuſſoria, citra ea quæ adſtringen
di facultatem obtinent medicamenta, ſunt admouenda. In veteratis vero ſugillatis, &
quando nigreſcunt, conuenit *raphanum* applicatus. Diſcutiens etiam medicamentum
eſt *myrrha, hyſſopus, ſanaguaci, chamæmelum, folia lilii, & alia, quæ in libro 1. de compoſ. me
dic. recensuiſimus.* Ex iis ſtudioſi parabunt medicamenta idonea, quorum etiam copiam
apud Galenum libro 5. de compoſ. medic. ſecundum locos inuenient.

De pure ſubternis. C. A. P. XLII.

Pure *opaz* & *inirpaz* vitium Græciſit, quando pus ſub cornea nonnalcus, nunc in ſu
ma ſuperficie colligitur, humanæ vnguis ſpecie. Hinc eſt, quod idem vitium Græcis
etiam *inirpaz* nominetur. Aliqui interpretes *ungulam*, barbari *ſaniam* intra *cornicam* vocant.
Fit interdum ab vicere, interdum etiam ſine vicere, ſi capitis dolor, aut ſippitude, ſeu
phlegmone præceſſerit: ob ingentem enim phlegmonem diſruptis vaſis ſanguis effuſus
ſuppuratur. Signa partim nunc dicta ſunt, quibus accedit *pulſariorum dolor*, ac circa y
niuerſum oculum *rubor*, & *temporum dolor.* Initio curationis, ſi phlegmone aſſueſcit, alius
clyſteri abluitur, & inanitur. Dein, vbi nihil obſtiterit, ſanguis a ſuperiori gibberij re
na, quam *humeralem* vocant, mittatur, & cucurbitulæ occipitio, aut ſanguisugæ tempo
ribus affigantur. Quibus peractis medicamentis ad phlegmonem idoneis, & antea
commemoratis, vtendum. Phlegmone ſopita, aut nulla penitus exiſtente, locum
ſpongii, primo moderate, deinde adiectis quibuſdam, *decocto nimirum ſanaguaci & ſi
milium,*

A *miliūm*, paulatim progrediendo, magis ac magis fouebimus. Ad curationem autem huius vitii medio critere discutientia medicamenta, vt est *aqua mulsā, fenugraci succus, & huiusmodi*, vtilia sunt. Quæ enim vehementius discutiant, & exsiccant, statim quidem ea, quæ tenuia sunt, vacuante reliquum vero crassius redditum, eogunt atque exsiccant, vt vix extirpari queat. In summa, si vitium citra vlcerationem consistit, valent medicamenta, quæ supra in capite de *pterygio dicta sunt*. Si vero cum vlceratione, tunc ea, quæ medioeriter discutiant, quorum multa in superioribus recensuimus, magis conueniunt.

De Suffusione. CAP. XLIII.

- Y** *νηγμα* quæ dicitur Græcis, *suffusio* Latinis *casaracta* barbaris dicta est, *humoris lentis & glacies modo concretæ, inter corneam & crystallinum humorem effusa, quo visus easenus saltem impediatur, ut non possit discretis rerum species & colores oculis apprehendere*. Eius mali causa est, vt ex iam dictis constat, humor crassius iuxta pupillam inter corneam & crystallinoidem collectus. Firetiam Paulo libro 6. cap. 31. auctor, ob frigiditatem & imbecillitatem spiritus visorii: idcirco senibus, & iis, qui longis morbis laborarunt, magis euenit: ob violentum denique vomitum, & ictum. In eo ante vitio tanquam pusilli culices, vel alia lucentia, caliginosa que corpuscula assidue præ oculis aduersari videntur. Quibusdam veluti lanatum filamenta, & telæ araneæ, quibusdam circa lucernas circuli offeruntur. Aucto vitio, symptomata quoque augentur. Hæc autem non nunquam propriæ naturæ oculi, nonnunquam ventriculi malo feruntur accepta. Quare inter hæc duo discrimen habendum est. Si enim visa ob humorum in ventriculo contentorum vitium oborta fuerint, vtrique oculo similiter accidunt. Quæ vero per proprium vitium apparent, neque incipiunt simul in vtroque, neque similiter apparent. Deinde ex tempore quoque ipso distinguuntur. Si enim tribus quatuorue, auriam pluribus mensibus suffusionis symptomata apparuerint, contem plantique tibi pupillam, nihil renebrosum videatur, ab ore ventriculi malum procedere inuenies. Si vero non ita multum temporis intercessit, querendum est in primis, vtrum ex quo incipit malum singulis diebus perpetuo huiusmodi apparitio perseverauerit, nullo scilicet interueniente die, qui omni querela caruerit, an diebus quibusdam laborans exacte videatur conualuisse. Nam assidue tas suffusionem portendit. Intermissio vero, quod vitium a ventriculo produci, suspicionem excitat. Idque magis, si vbi quis perfecte concoquens, nullum sibi visum apparere fateretur. Sed multo magis, si quum apparuerunt visa, mordicus in ore ventriculi doluit: maxime vero, si post hæc vomendo, eiecit remordente, mitigata fuerint symptomata. Vbi vero altera pupilla tenebrosior, aut turbidior, aut non exacte pura videtur, suffusionis esse initium censendum est. Vici ratio in hoc vitio sit attenuatoria, & exsiccatotia. *Hyssopo* igitur, *satureia*, *sampso*, *feniculo*, *betonica*, *salua*, & *euphrasia* in cibo utendum. A vino abtineat in tota medicatione æger, & pro eo aqua, in qua parum sit decoctum, cinnamomi, aut aquam mulsam bibat. Euter omnia caput replentia. A balneis sibi caueat, nisi vel lassitudinis, vel cruditatis causa sint necessaria: atque netum quidem in aere balnei diutius immorari, neque in solio perstare: sed senum quidem ingredi, cōfestum vero egredi oportet. Fugiat pisces, fructus, & quicquid corpus humectare potest. Curandi ratio inter initia quum per consensum ventriculi accidit, nec affectus adhuc in oculum est, purgatione, quæ per hieram picram sit, & aliis quæ euaporationem a ventriculo ad caput prohibent, curatur, nisi quid obster, a sanguinis missione incoanda. Vena autem gibberi secanda exterior, seu humeralis. Actibus etiam clysteribus & purgationibus, utendum, quorum formulas & superioribus petent studiosi. Neque negligenda sunt medicamenta extenuantia, tam simplicia, quam composita, quæ redundantes humores præparant, vt ex simplicibus sunt paulo ante nominata. Ex compositis serapia ex *hyssopo*, *calamintha*, & *stichade*, qualia multa recensuimus in superioribus capitulis. Inter cetera vero hoc potissimum confert, quod accipit: *Oxymelitus scyllitici vicia vna. Melissa rosacea, vicia dimidia. Liquoris stillatitii feniculi, betonica, maiorana singul. vicia vna. Commixta omnibus fiat potio*. Potest parari decoctum & feniculo, *euphrasia*, *verbena*, *ruta*, *chelandia*, & id genus alius oculis destitutu herbis. Inter ea quæ purgant, non postremum esse hoc in vitio videtur illud, quod recipit: *Catapatorum co. biorum suis sine quib. esse nolo. sing. scrupulū vnum. Azarici in formam pastilli redacti. ser. dimidium. Cum stillatissimo liquore summi.*

60 Operum Leonhard. Fuchsi Pars III.

fiant pilula. Frequenter vero pilulis vtendum erit. Post vniuersi corporis purgationem A cucurbitulæ cum scarificatione occipitio sunt assignandæ, vtendumque per intervalla apophlegmatismus, & iis, quæ per nares purgant, quorum formulas in precedentibus capitulis & in lib. 2. de compos. medic. posuimus. Cauterium quoque, quale est, quod cap. 20. descripsimus, occipitio aut post aures apponendum erit. Oculis autem medicamenta, tum simplicia, tum composita, quibus discutiendi vis inest, adhibenda: vt est *mel seminis iuue-cus & liquor stillatissimus, ruta, verberna, betonica, chelidonium anagallis folia viriū, & caprisolum vocatum.* Inter composita vero hoc potissimum conducit, quod accipiet: *Liquor stillatissimus sententia unciam duas. Liqueur stillatissimus chelidonia maioris cupressæ, viriūsq. unciam vnam & dimidiam. Sagapeni, drach. vnam. Pampolyges, drachmas duas. Myrice, fiatque collyrium.* Vel illud, quod habet liquorum stillatissimorum rosarum, feniculi, euphorasie, chelidonii, sterum libi conuallid. singul. unciam vnam. Vini optimi pellucidi, drachmas septem. Aloes optima thuria preparata, cinnamomi, polii, radicis Valeriana, & sterum sicca singulorum subtilissime puluerisatorum scrupulum vnum. Sagapeni scrupulum dimidiam. Sacchari candefacti, drachmas tres. Capbura scrup. dimidiam. Myriciesur, fiat collyrium. Præterea omnia fellis genera per se, aut cum feniculi succo illita profunt. Myrrhæ quoque & piperis partes æquales cum melle. Atque ea, quæ nunc commemorauimus præidia, suffusionem recentem, & quæ nondum radices egit, curare possunt. Vbi vero vetula & perfecta fuerit, sola chirurgia sanabitur, quam Paulus loco antea citato abunde docet.

De dilatatione & diminutione pupille. Cap. XLIV.

Modus. **M** *Typhlos* Græcis, dilatatio, aut *effusus pupille* Latinis dicta, fit quando pupilla colore quidem nihil euariat, sed multo quam consuevit latior fit, vt interdum iridis circulo appropinquet: qua nonnunquam omnino visus impeditur, interdum permultum, vt videat quidem eger, sed obscure. Contrarium huic vitium, in quo pupilla angustior, obscurior, rugosiorq. fit, Græcis *psine*, Latinis *tabes & diminutio pupille* vocatur. Recentioris constructionem pupille nominant. Dilatio accidit ob humorem excrementitium, qui confertim vel sensim affluens vueam extendit. Diminutio vero propter densationem a siccitate ortam. Hinc est, quod magna ex parte periculosas imbecillitates ab inanitione factas, & vehementissimos capitis dolores comitetur. Signis aut vitii dignotionem nullus est opus, quod visui expositum sit. Præterea qui dilatatione pupille laborant, iis omnia quæ vident, propter visibilis spiritus dispersionē, minora apparent. Contra, qui diminutione eiusdem afficiuntur, iis propterea, quod cogatur ac densetur spiritus vitia veris maiora esse videntur. Vitis ratio in dilatatione sit extenuatoria, alioquin emolliendæ idonea. A vino vique ad exactam sanitatem, prorsus abstinendum. Deambulationes lenes ac longæ in obscuro loco factæ conducunt. Ad balneum crebro accedendum non est. Atq. vbi accesserit æger, capitis lotioni parcendum. In diminutione vtendum vitis ratione humectante, nimirum *serbis in iunibus boni succi, vinog. flano & odorato.* Cibum formis mox sequatur. Balnea quoq. profunt, & capitis cum calida aqua irrigatio. Qui dilatatione pupille infestantur, iis primum sanguis a vena gibberi exteriori mittendus, aut purgantia medicamenta propinanda. Quæ si fieri nequeunt, venas in angulis oculorum diuidere oportet: deinde cucurbitulam occipitio admouere. Omni præterea studio annitendum, vt materia ad inferiora trahatur. Clysterib. igitur vtendum, vt aluus humecta sit, & humores noxii ad inferna detrahantur. Marina quoq. aqua frontem & oculos perfundere cōuenit: hyeme quidē tepida, æstate autem frigida. Imo & facies tota in eadem aqua mergenda est, ibiq. apertis oculis aliquo tēpore detinenda. Quod si desit marina, dulcis aquæ quidpiam salis adicito, aut poscam aquosam sumito. Ceterum medicamentis localib. vtendum sub adstringentib. sicut *rose, croce, spica nardi, thuris cortice, pampolyge, acacia, & iis similibus.* Item medicamentis mediocriter discutiensibus. Vehementiora enim & acriora, humorum copiam attrahunt, atq. adeo membranas distendunt, latioremq. pupillam efficiunt. Plurimum autem adstringentia, & nimium refrigerantia membranas indurant: emplastica vero easdē crassiores reddūt. Pupillam autem plus æquo cogere & coarctare omnino inutile est: nam ita tandem diminutionem incurreret. Ex medicamentis itaq. moderate adstringentib. & ex siccantibus siue discutiensibus collyria huic vitio idonea parabuntur. Tale autem est, quod recipit: *Craci, aloes, myrrha singul. drach. duas. Pampolygi lase, licii, viriūsq. drach. vnam. Vini optimi, uncias duas.*

Mellu

A *Mellu vnc. tres. Crocus primum ex vino modico seritur, deinde aloë, myrrha, & alia. Vbi crassitudine in acceperint, mel additur. Vnita in vitro vase reponuntur ad usum. Diminutioni contrariam adhibere oportet curationem, superiora membra exercendo, humeros scilicet & brachia, cum spiritus detentione, caputq; & faciem diligenter fricando, extremisq; digitis oculos correctando, ac calida tepidaue faciem fouendo: deinde caput vnguento aliquo eorum, quæ moderate calefaciant, verbi gratia irino, vngendo. Tum palpebris paululum diductis illinendum erit oculo acie & rarefaciens medicamentum, quod humores possit attrahere, quale hoc est, quod accipit: *Ammoniack, drach. unam. Li. Collyrii. cii, drach. tres. Croci, drach. duas. A Eryngii, drach. dimidiam. Tritis in aqua, & subactis vitior.**

Caritis
diminutionis.

De visus obscuritate. C. A. 7. XLV.

- B** *Minus Græcis, obscuritas visus Latinis dicitur. Est autem emmimada, vel maxima ex parte videndi interceptio, sine manifesto pathemate visionis circa oculum apparente: pura enim vndiq; pupilla conspiciatur. Hæc interdum paulatim irrepit, interdum etiam repente ingruit, vt perquam modicum, vel nihil omnino cernatur. Obscuritatis itaque sensum irreptentis causæ plurimæ sunt, vel enim spiritus crassescit, vel tunice densantur: vel humores oculorum non crassescunt tantum, sed etiam lentiores fiunt, atq; ad o spiritus visorios obscurant. Longus præterea ac diuturnus morbus, & ingens motor, ob humorum dispositionem, quam veluti oculi corrugatio sequitur, visus obscuritatem efficiunt. Repentinæ vero, nerui visorii, propter crassos lentosque humores confertim in ipsam incidentes, obstructio, vel eiusdem resolutio causa est. Præcedunt hoc vitium assidue cruditates, vini meri portio, moraque sub sole, capitis calefactio aut refrigeratio, post cibum continuæ lectiones, vel balnea, vomitus, concubitus impotuitus & immoderatus, violenta spiritus detentio: quod tubicinis frequentissime accidit. Hæc itaque iis similia si fuerint moderata, quædam vitia, hoc est, bebetudinem efficiunt: immoderata vero obscuritatem. Porro accidit nonnunquam obscuritas ob vehementem capitis percussionem aut casum a sublimi loco, neruo visorio resoluta aut confusa: vel, quæ omnium benignissima est, ob ingentem concussionem delapsa humorum multitudine, & neruum vitulorum obstruente. Neruo resoluta, aut tarde, aut nihil mouetur oculus. Si vero propter violentum capitis idum, vel casum a cerebri connexion abscindatur, primum*
- D** *quidem oculis redditur prominentior, postea etiam excavatur, & non alitur. At vbi propter crassorum lentorumque humorum multitudinem, absque alia causa nerui cautitas obstruatur, grauitas capitis, præcipue in radicibus oculorum consequitur. Si igitur repente inuasent aliquem visus obscuritas, & æger plenitudine laborauerit, gibberi venam exteriorem, aut mediam secare oportet: tunc enim expeditissimum præsidium sanguinis missio est. Aliquot deinde diebus interiectis, iubet Aëtius, fasciam collo neçtere ac constringere venas, iisdemque tumefactis iterum eam soluere, & idem tertio reperere, vt per spiritus motum humores obturati agitentur, & violenter concurantur. Postea a tumefactis angulorum naso adiacentium venis, vtrinque sanguinem copiose mittendum esse præcipit: atque se quandoque tres cotylas ab iis ipsis venis eduxisse. Quibus omnibus peractis, cucurbitulam cum scarificatione occipitio affigere oportet. Contingit enim plerumque, vt cucurbitula adhuc in hærente, homo repente respiciat. Hirudines etiam in hunc usum, ad mouere temporibus cõueniunt. Neq; iam diutis præsidii tantum contenti erimus, sed totum corpus quoq; si viresferant, purgabis mus medicamentis, quæ crassos & lentos humores educere possunt, antea tamen præparatos. Clysteris quoque attractorii & ab oculis reuellentis visus laudatur. Postea apoplegmatisims, sternutamentis, & id genus aliis medicamentis caput expurgandum, qualia multa supra, vbi de capitis egimus dolore, produximus. Sinapismi etiam visus in capite non erit alienus, & adurentia medicamenta, quæ Græcis dicuntur, occipitio admota. Collyria denique & succi vniuersarii liquoribus funiculi, ruta, celandini, mellis, pipere*
- F** *longo, aloë, Pempolyge, myrrha, ammoniack sale, & similibus patata, conducunt. Si vero visus obscuritas sensim accidit, idem sanguinem ab angularibus venis mittemus. Et si æger pauci fuerit sanguinis, id protinus ab initio facere oportet. Sin multi, ex humerali primum sanguis auferendus. Deinde cucurbitula cum scarificatione occipitio affigenda. Purgare etiam corpus conuenit. Perseuerante quoque morbo, caput per ethina, & a-*

depressionis.
Obiectio.

Castia.

depressionis.

signa.

Cursio.

lia paulo ante commemorata purgabimus. Illitio autem oculorum primo quidem in omni obsecratione quovis modo confusa, simplicioribus iam recentibus fiat, postea ad composita transcendendum, quale est, quod accipit: *Liquoristillatitii betonica, ruta, verbenaca, ibelidensis, euphrasia, samiciu & rosarum, singul. vnam vnam. Piperis longi, drach. vnam. Aloes, scrup. duos. Myrrha, scrup. vnum. Pampolygia, drach. dimidiam. Arida terantur minutissime, & formetur collirium.* In victu ratione in vtroque sine vitio concoctionis curam vnicui habere oportet. Ac si moderatus, siue parum ad sicum declinet. Somnus cōfert moderatus, & nocturnus. Evitandum etiam, ut alimentis præcipue alvum emolliamus. Exercitio inferiorum partium, ut humores deorsum trahantur, vrendam, pluribusque deambulationibus in obscuro loco. A vino abstinendum, & aquæ potio viriliter toleranda, aut melle, aut aquæ cinnaomom decoctæ. Omne crassius succi alimentum, assiduumque cōcubitum, & capitis insolationem, balneaq., & meridianos somnos vitare cōvenit, neque a cibo nimis agitari, neq. legere, aut scribere. Animi perturbationes, ira, & curæ ingentes, tumores, & eiusmodi fugiendæ, præsertim a cibo. Vitandæ etiam assidue vomitiones. Confecta autem quotidie frigida, præsertim pluviali, aqua faciem abluere.

De Nyctalopia. C A P. XLVI.

NYCTALOPIA Græcis, nascitur in Latinis, dicti sunt, qui interdum quidem vident, sole vero occidente obcurant, sed nocte omnino nihil. Plinius & alii Latini varium ipsum nocturnam cecitatem vocant. Accidit ob capitis imbecillitatem, præsertim propter visorii spiritus, reliquorumque humorum, ac tunicatum oculi crassitudinem. Vitium ex agrotantis querimonia innotescit. Vici ratio in vniuersum fit exenuatoria, vitandaque omnia crassifacientia. Abstinentum a vino. Curatio, si æger boni habitus fuerit, a sanguinis missione auspicienda. Incidendæ vero in gibbero humeralis, & in angulis oculorum venæ. Si vitioso succo abundauerit, idoneo medicamento purgetur, sic tamen ut antea attenuantibus & in cidentibus medicamentis humores crassi præparentur, aut per clysterem alvus inanitur. Post totius corporis vacationem, apophlegmatismos adhibebis, ac per nases mareniam attrahes, sternutationesque concitabis. Præter autem alia medicamenta, quæ supra commemorauimus, vnicui hoc confert, quod habet: *Piperis, flaphydia agria, vtrumq. scrup. duos. Sinapi, scrupulos quatuor.* Terito & cribrato: deinde cum succo radicum betæ ad mellis liquidum consentiam excipito. Hæc vbi simul subegeris, naribus adinouero, iubeq. ut per nases attrahantur: idq. diebus quinq. aut septem efficias. Insuper ante cibum *hyssopus, origanum, ruta aut decola* potui dantur. Siis prædictis morbus non propulabitur, igitur purgationem moliemur. Commendat autem vnicui Acrius hoc, quod habet: *Scammonii, drachmam dimidiam. Cestrii, scrup. vnum. Salis, drach. dimidiam,* idq. in robustioribus. In imbecillioribus, hodie præsertim, vero *scammonia, scrup. quatuor* sufficit. Hæc purgatio, ut idem testatur, sæpe perentim sanitatem restituit, aut morbum magna ex parte leuauit. Post dies paucos iterum exhibendū medicamentum, quod pituitam simul & bilem vacuet. Quale est, quod recipit *catepotiorum lucii materum, drach. vnam. Catepotiorum arabicarum, scrup. vnum. Agarici trachysiaci, scrupulos duos.* Formantur pilulæ cum stillatitio liquore sceniculi. Oculis autem mel despumatum illinendum, & ad iniectum humorem retinendum, oculi claudendi. Alumen etiam cum melle tritum allines. Sine autem *aluminis scissi partes dua, ut salis ammoniaci pars vna trita cum melle aut mulis lacte.* Polyglamini recentis, vel caprarum succum cum melle, aut lacte mulieris. Fel quoq. hirci ex melle illitum paucis diebus viciu tollit, ut inquit Alexander. Acrium tamen medicamentorum assiduus vsus temouendus est: sicut antiquissimum oleum nunquam quærendum. Traditur a multis conferre sic laborantibus iecur hircinum assum, & cum sale absq. oleo seruans comestum. Quidam & sanie fœæ aquoso humore a iecore illo dum torrefit, effluente, illinendos oculos iubent. Alii idem iecur elixantes, apertis oculis vaporem hinc cleuatū excipiunt. Sunt qui illud cum felle assandum esse, ut validius fiat, putant. Alii inter assandum *osula fantia, vel trusa, vel chelidoni* infingenda esse monent. E latecium quoque & melle per interualla illitum prodest. Præterea sel perdicis, aut hirci inunctum iuuat.

De expressione oculi. C A P. XLVII.

EXPRESSIONE oculi, hoc est, expressio oculi, est vitium, in quo sic exprimuntur oculi, ut exserti persceneret. Recentiores, *exsertum oculi* appellant. Est scire idem vitium, quod prædicta oculi nominatur,

- A** tur, nam eandem propemodum curationem requirit. Accidit is præsertim, qui in ath-
 leticis certaminibus suffocantur, aut qui aliam ob causam strangulantur. Mulieribus
 etiam nimio pariendi dolore afflictis, & propter vehementem pariendi conatum. Ob
 plurimum etiam defluxum, confertim a capite irruentem. Vbi a strangulatu, aut dolo-
 ribus partis euenit vitium, e sermionibus ægri cognoscitur. Si vero propter humorum
 copiam capitis aderit grauitas, & pupilla auctior erit. Porro si ob strangulatum oculus
 exprimitur, gibberi venam incidere oportet. Sin ob humores multos acciderit oculi
 expressio, purgante medicamento vtendum erit. Quod si ob pariendi laborem expri-
 mi oculos contigerit, vteri purgationes superuenientes frequenter vitium sanant: insig-
 nitur opitulati conuenit. In vitis autem, si post sanguinis missionem aut purgationem vi-
 tium non remiserit, cucurbitulam occipitio defigere commodum est. Leuiter autem
 comprimendus est oculus, & comprimendo in suum locum reponendus. Oculo vero
 lana melle illita cum modico croci apponenda est, linteolumque duplicatum supra sua-
 uiter intelligandum. Confert iis aqua marina frigida, fronts superius. Item quæcumque, alia, quæ re-
 primere & contrahere possunt: ut est polygonon, bolus armenia, balauitium, rhubarbarum, fides,
 gella, acacia, hypocistidis, lycium, folia floris, rosarum, & iis similia, quæ in lib. s. de compos. medic. c. 7.
 commemorauimus. Hæc in aqua pluuiali, vel vino decoquantur, & in eo decocto spongia
 imbuta laboranti parti imponitur. Item ex polygoni plantaginis & rubi foliis in aqua pluuiali
 aut vino adstringente decoctis, & acacia scrupulo duobus. Croci granis tribus. Licet, hypocistidis, v-
 triusque scrupulo dimidio cataplasma componi potest. Nec minus collyrium, quod accipit: A ves-
 losa, similia præparas a sarcocolla nutrita singul. scrup. dimidium. Spica nardi, croci utriusque grana
 quinquæ. Stibicos vsti & loti scrup. vnum. Cum tremote tragacanti fiat collyrium.

De agilope. C A P. XLVIII.

- A**gilope, Galeno lib. s. de compos. medic. localium teste, est exiguum quoddam abscessus simile tu-
 berculum inter nasi os, & magnam oculi angulum ortum, quod ruptum si negligatur, in fistulam
 abit, usque ad os ipsum progredientem. Fit a vitiosis humoribus, in eam corporis partem delatis.
 Vitium ex descriptione satis notum, ideoque pluribus indicis non eget. Vitium vero hoc
 propter corporum tenuitatem, & subiacentis ossis putredinem curatu difficile est. Non
 solum autem ob id ægre curabile est vitium, sed & propterea, quod quum multaliquida
 medicamentum in experimentum adsumi possint, ea tamen non tolerat pars ipsa: neces-
 sario enim ex eis in oculum quid influit. Situs itaque ratione oculorum etiam damnum in-
 fert. Neque vilo modo a thzere eiusmodi possunt: nisi deligatura totum oculum com-
 plectatur, quam impossibile est tot diebus aliquem perferre posse, quot ad vitii curatio-
 nem requiruntur. Incoante itaque phlegmone, si corpus plenum fuerit, & vires ferre po-
 terint, venæ humeralis e ducto partis affectæ sectione vtendum. Deinde repellere
 nitentur iis medicamentis, quæ ad hoc institutū sunt idonea, quorum multa in præceden-
 tibus commemorauimus, nempe cucurbitulis, frictionsibus partium infernarum, ac
 vinculis. Si vero phlegmone perseverauerit, discutientibus medicamentis, minime ta-
 men acerbis & mordacibus, succurrendum erit. Ab acrioribus enim medicamentis o-
 culus simul infestatur & afficitur, inque ipsa parte male habente phlegmone augetur.
E In hunc itaque vsum probe faciunt glaucium & crocus vna cum perdicis, parietatiam
 hodie vocant, succo leuigata, & imposita. Crebro autem permutare hoc remedium o-
 portet: euenim statim immutatum, vim suam amittit. Scribit Alexander Trallianus, se
 huius medicamenti subsidio vsum adhuc incoante agilope, & nondū in suppurationem conuersa, non
 solum puri generationem impedivisse, sed integra sanitati restituisse. Quum vero tumor ille cito
 supparet, danda opera erit vt celeriter aperiat, ne humor vitiosus in eo retētus sinum
 creet, & os quoque lædat. Præterea alica in aceto cocta, & probe trita, non solum inci-
 pientes, sed etiam in pus muratos, eodem Tralliano teste, per sanat, rumpitque, & ad os vique
 penetrat & descendit. Ruta sativa vna cum lixiuio, quod primo distillauerit, contrita,
 coctaque, & imposita, egregie huic vitio medetur. Mordax quidem inter inia, postea o-
 fycissime miscet, & ad os vique permeat. Atque illud mirandum, quod vel nullam plane,
 vel non turpem & indecorem, aut euidentem cicatricem post se relinquit. Porro co-
 cheas cum testis suis tritis imposito: interdum aloë, vel myrrha admissa, præsidium e-
 nim hoc antequam in pus vertatur, & postquam ruptus etiam fuerit, agilopem defic-
 cat. Curant quoque agilopem, si nō in profundo os corruptum fuerit, chamæmeli folia

64 Operum Leonhard. Fuchſii Pars III.

commanſa impoſita: aut maluz folia iidem commanſa, ſi cum ſale imponentur, prius tamen q̃ diſrumpatur. Radix etiam lilij recens ad emplaftri formam trita, *Actio auſtere*, & impoſita, xgilopas curat. Rumpit enim & repurgat. Ceteru poſtquam vitum hoc ruptum eſt, vehementer deſiccantia proſunt, vt ſunt quæ ex *alumine, plumbæ, ſatiz vulgo vocata flore eius, & antimoniæ diſto conſiciuntur*. Hæ cenim non ſolum exſiccando, verum etiam ſuo pondere comprimendo iuuant, ac tumorem ſubſidere faciunt. Hæc ſi non contulerint, ad manus opera conſugiendum. Chirurgicam itaque curandi rationem ab Aeno & Paulo petes. Hoc in loco malorum, quæ in oculis accidunt, curationi ſinem imponemus: reliqua enim fere omnia eorundem vitia chirurgiam exigunt, quam attingere in iis de medendi ratione libris non eſt conſilium. Eam itaque ab auctorib. iam citatis petent ſtudioſi.

De aurium dolore. CA. P. XLIX.

Aurium dolor aliquis ex refrigeratione, in peregrinatione a ventis frigidis excitata, accidit. Aliqui etiam ex frigidis balneis, & ex medicatis aquis, in quibus nonnulli frequenter voluptatibus indulgentes lauant, oriuntur. Fit & auris dolor ex phlegmone, interim quidem ſolius circa meatum auditorium cutis, interim etiam in profundo, quando videlicet auditorius neruus ad phlegmonis affectum peruenerit. Quæ autem ratione phlegmone particulas phlegmone obſeſſas diſtendens dolorem parit, eodem modo etiam ſtatulentus ſpiritus, aut humor craſſus & lentus tranſitum non habens, dolorem efficit. Saniſi denique ac ſeroſi humores in corpore aurium generari, conſimiliter vt mordaces humores, qui ex nullo loco illabuntur, dolorem cõciliant. Aurium dolor qui frigiditati fertur acceptus, de ægri ſermonibus facile cognoscitur: & inde, quod dolor alte, citra grauitatem, vel diſtentionem, vel ardorem, fixus ſit. Qui ex calida intemperie ortus eſt, ex eo, quod in illo ſeruoris cuiuſdam ſine grauitate leu tentione ſenſus eſt, deprehenditur. Sin grauitas, diſtenſio, ſimulq; calor & dolor pullatis, aut etiam febricula obocitur, phlegmone autè laborare conſeſo. Sola citra grauitatem diſtenſio ſpiritus ſtatulentum, cui exitus non pateſcit, indicat. Si vero capitis priuſque auditus grauitas aſſuerit, præceſſitq; victus ratio ſimilis, craſſi glutinoſiq; humores dolorem faciunt. Victus ratio iuxta cauſæ diuerſitatem, facile ex iis, quæ in ſuperioribus dicta ſunt, conſtitui poteſt. Quare nõ eſt, cur hanc ſpeciatim hoc in loco proſequamur.

Ceterum cutandi ratio pro cauſarum varietate mutatur. Si enim dolor a ſola refrigeratione obocitur, calefacientibus præſidiis quam celerrime curabitur: nempe oleo *rutæ, ceo, laurino, nardino, cicino, anethino, ſiliaceo, de caſtorio, de euphorbia, & ſpicato*. Quod ſi rutam quoq; oleo communilocoquas, vel piper, vel caſtorium magnum adferes præſidium. Oleum etiam, in quo allium decoctum ſit, vel cepa, inſtillarum mirifice conſert. Sunt qui prægrandes cepas exſculpentes, deinde oleo replentes, & in fermento cinere moderate calefacientes, auribus infundant. Galenus lib. 3. de compoſ. medic. locatum, euphorbii perquam exiguum portiunculam plurimo oleo veteri commixtam mirifice commendat, quod nimirum hoc medicamentum ex frigote contraictos aurium dolores ſtrenue adiuuet. Maniſtatum vero omnibus eſſe arbitramur, quod quicquid adhibetur, auribus mediocriter calidum eſſe oportet. Porro ubi aqua medicata circa auditorii meatum continetur, oleum quod ſit tenuium partium aſſidue inſundere oportet, quo ipſum eluamus: deinde lana molli extergere, ruſuſque inſundere. Mitigat ipſos admodum oui candidum: item lac muliebre. Plurimum etiam prodeſt *adeps aſer, nux, atq; ſtem vulpinæ*. Verum ad aquam copioſam euocandam nihil præſtantius, quam oris exſuctio, quæ etiam per calamum canalemue exſugi & extrahi poteſt. Si quis etiam alteri pedi in nixus eiufdem lateris cum autè male affecta, capite parumper declinui ſaliat, aquam facile excutiet. Quum a calida intemperie dolor obortus fuerit, nõ cõteratis medicamentis propallandum erit. Mirifice itaq; conſert *oleum roſaceum in aurem inſtillarum, vel acetum roſaceum, vel album oui, aut lac muliebre, aut ſolani ſuccus, aut tale, q; accipit: Olei roſacci, vnciam vnam. Succo ſolani, drach. duas. Aceti roſacci, drach. vñ & dimidium. Miſce*. Si vero a craſſis viſcoſiq; humorib. aut flatib. dolor excitatus fuerit, medicamentis q̃ obſtrudiones auferunt, & incidunt, vtendũ: cuiuſmodi ſunt omnia amara, quæ ſine erolione expurgant, exterguntq; E quoru numero eſt *iris ſylueſtica, ariſtolochia omniũ generis, amygdala amara, vitu alba radix, centaurei minoris coma, poliu, & innamomũ. Item oleũ amygdalinũ, & alia quæ citra mol-*

ſtam

- A** *stiam meatui expurgant, abstergunt, & obstrata disiciunt, dissicantque.* Ex his itaq; auricularia medicamenta confici possunt, & usu postulante instillari. Conducit etiam *evaporatio ex ruta, maiorana, castoreo, & milio.* Præter cetera vero, cremorem porri tepidum auribus ita adflicti instillare conuenit. Vel ceparum succum, mellis permixtum. Quod si a phlegmone dolor concitatus fuerit, statim sanguis ex humerali vena eiusdem lateris mittendus est, clysteribusq; defluxus humorum in contrarium auertendus, potissimum ubi alius sua sponte non deiecerit. Reuulsionibus quoque aliis, frictionibus, vinculis, ac cucurbitulis vtendum. Dein oxyrhodinum tepidum instillandum, aut adeps asperendus, aut gallinaceus cum rosaceo. Per se enim non influente etiamnum humore magis conueniunt; idque duabus rationibus: quia doloris symptoma leniunt, mitigantque, & B phlegmonis affectum curant. At si vehemensior fuerit phlegmone, ad sedandos dolores albumen oui cum lacte mulieris tepidum instillatur. Prodest etiam tum medicamentum, quod habet, *Succi semperniui, drachmas duas. Olei rosacei, unciam dimidiam. Aceti, drachmam unam & dimidiam.* Commixtis omnibus, & agitatis, auri dolenti instillatur. Extrinsecus vero ea, quæ dolore leniunt, materiamq; impactam concoquunt, admo- uentur. Vigente autem dolore, *(qui Hippocrate teste)* quum vehemens grauisque fuerit, periculum minatur: nam & mentem turbat, & hominem rapit: necessarium est etiam iis, quæ leuiter sensum stupefaciunt, vt. Neq; n. mediocre, v. diximus, periculum est, ne cerebrum neruo, per quem facultas audiendi distribuitur, vicinum per consensum afficiatur. Miscetur autem tum paululum opium lacti muliebri, & oui candido, quæ C ipsa per se frequenter aurium phlegmonibus congruunt. Iam & castoreo opium temperatur, oportetque hoc longe ante mixtum, vel æquali pondere, *Galeno auctore,* vel duplicato castoreo præparare: ad vehementissimos quidem dolores, æquali, ad minores, duplicato. Liquor vero quo prædicta medicamenta, diligenter prius trita, & leuigata, diluuntur, sapa esto: quippe hæc multo magis dolores lenit, quam vina dulcia. Est autem sapa, mustum ad tertiam mensuræ partem decoctum. Sunt qui opio rosaceum & violaceum miscent olei, in hunc modum. *Opis scrupulum vni. Olei r. rosacei & violacei, v. trisque drachmam unam & dimidiam.* Philonis quoque antidotum crebro sic laborantibus profuit, dissolutum lacte muliebri, & instillatum. Extrinsecus vero aurem assidue oleo communi, siue ex calido fomento oportet fouere, nempe spongia aqua calente D imbuta, in qua chamæmeli flores, scenum græcum, vel lini semen fuerint decocta, lanamq; hoc imbutam in aurem conicere, sed ita vt partes phlegmone laborantes quam fieri potest, minime attingantur. Quo autem pacto quis commodissime auribus vehemen- ter dolentibus medicamenta iniicere queat, tradit Galenus lib. 3. *De compo. medic. loc. alium. cap. 1.* Et huc sane Galeni præcepto, ceu maximo in curatione autium, mentem adhibeat Medicus. Porro ubi iam dolor inueterauerit, & in suppurationem conuer- ti cœperit, medicamento ex lini seminis succo vitæ, quod vna cum rosaceo, aut chamæ- melino solum instillabis.

De sonitu aurium. C A P. L.

- A** *Vrium sonitus, quem Græci ὠρυγμῶς αὐτίς, recentiores vero tinnitum sensibilem vo-* cant, plerumque a flatuloso spiritu generatur. Nonnunquam etiam propter exquisitam audiendi sensus acrimoniam. Generatur quoque vitium hoc ex partium imbecillitate, ubi scilicet ex morbis iam conalescentibus incidit, humore neruorum auris absumto. Nascitur etiam a causis externis, frigore, æstu, istoque capitis. Si a causis exter- nis accidit vitium, facile ab ægroti sermonibus dignoscitur. Iam quod sonitus paulatim, aut vna vice, aut confertim irruat, id ipsum quoque ad inuentionem affectus con- ducit. Si enim ex certis intervallis accedant, quæ ueritatem sonitus, euidensissimum ar- gumentum est, quod flatulentus spiritus exitum non habens, interclusus est: qui profusi- re magno nixu contendens edit sonitum, præsertim ubi cibi instandi vim habentes præ- cesserint, & cruditate laborauerint frequentius ægotantes. Si vero huiusmodi aurium F sonitus non repente, sed sensim ingruant, & grauedo quædam ponderis instar sentitur, & vitus ratio, quæ crudos humores procreat antecesserit, tum crassis ac lentis humoribus vitium acceptum referas. Sin suspicio alicui fuit ex spiritu flatulento qui transirum non habent, aut crassis humoribus vitium prouenisse ac medicamentis, quæ incidunt, extenuant, & discutiant adhibitis, nihil profecit simulque apophlegmatismis vitus est,

66 Operum Leonhard. Fuchsi Pars III.

Curatio.
Si a cras-
sis humo-
ribus.

Si ob ex-
cessum au-
dendi ac-
rimonia.

Si ob im-
becillita-
tem.

Si ob im-
becillita-
tem.

Curatio.

Curatio.

Curatio.

Si ob bi-
liosum
humorē.

4 Aph. 18.

4 Aph. 18.
Si ex cras-
sis humo-
ribus.

& toro capiti propeixitis magnam occasionem habebit referendi sonitum ad sensus A
audieodi acrimoniā, præsertim si æger acuti auditus fuerit. Eins etiam hoc certissi-
mum esse indicium putatur, si tempore famis & inedia increuerit, crapulæ vero & re-
pletionis remissior fuerit. Curaodi ratio, pro causarum diuersitate variatur. Si igitur a
crassis & viscidis humoribus aurium sonitus ortus fuerit, caput lotito catapotis coceis,
aut arabicis cum agarico, aut id genus similibus purgetur: prius tamen his exhibitis po-
tionibus & medicamentis, quæ incidendi & extenuandi vim obinent. Dein apophleg-
matismis, erithinisque vtendum. Io aurem subiode instillandum, oleum amararum, aut
oleum in quo castoreum, cuminum, ruta, vel anethum fuerit tritum. Aurem quoque ad vaporem
a quæ, cui, stichas, absinthium, maiorana, mentastrum, hyssopus & origanum incocta sint, oportu-
tuo inclinabis. Succus rutæ coctus in cortice mali granati, mirifice confert. Sacculi B
item ex betonica, stichade, chamæmelo, maiorana, & alijs paulo ante commemoratis, compositi, si
calidissimi auribus imponantur, conducunt. Conferunt etiam sternutamenta, quod flatus oon-
mious per aures quam per osates discutiant & expellant. Si propter sensus auditus acrimo-
niā sonitus aurium accidat, tum ea, quæ sensum stupefaciunt, sunt vsurpanda, vt
sunt mandragora, aut papaueris succum: aut rosaceum cum paulo aceto, & paucissimo opio. Io ista-
men adhibendis prouidentia magna opuserit. Iocipiedum itaque a leuioribus, & si
necesse fuerit, ad validiora progrediendum. Commendatur vnice oleum rosaceum, adie-
cto vino aut altero grano opii. Galenus mandragora succum, & papaueris liquorem hoc in loco
laudat. Ceterum si in febribus, aur harum indicationibus foitos aurium euenerit, C
nullum eis negotium facessere oportet: quippe statim magna ex parte finiuor. Si autem
post morbum, vel capitis dolorem perseverauerint, absinthii decocto aures foueri
debent, acetum & rosaceum infundendum, aut raphani succum cum rosaceo, aut aloë
optima ex mulso soluta. Quod si hæc nihil cootulerint, veratro nigro ex aceto cootrito
vtendum, auribusque instillandum. Si ob imbecillitatem accidit sonitus, vt in conu-
alescentibus accidit, temperatum aliquod oleum non minus calidum, aut frigidum, pro-
ut necessitas postulat, instillandum erit, oempe chamæmelinum, anethum, vel rosaceum.

De surditate, & gravi auditu. C. A. P. LII.

Si ob im-
becillita-
tem.

Curatio.

Curatio.

Curatio.

Si ob bi-
liosum
humorē.

4 Aph. 18.

4 Aph. 18.
Si ex cras-
sis humo-
ribus.

Q Vum afflicta anre non solum grauius, sed omnino nihil quis audire cœperit, viciom
Quippon, Latini surditatem nominant. Grauem vero auditum tædionemque surditatem
pellant. Surditas interdum a primo statim ortu hominem comitatur, interdum etiam
posteaquam nati sumus accidit. Quod quidem vel ob biliosum humorem sursum
vergentem cootigit, vel propter crudos crassosque homores auditum obstrucentes. Noo-
nunquam etiam ob sordes, aurium meatus obtutantes. Iodicia quibus causæ & digno-
scuntur & discernuotur, facile ex iis, quæ ounc sæpius a nobis dicta sunt, sciri possunt. Si
enim a biliosis humoribus accidat grauitas auditus, post febres maxime recurreote bile
ad cerebrum, derepote iofestare solet. Facies etiam natura, ætas, & torus habitus
corporis biliosam temperaturam præ sefert. Si a crassis humoribus oritur, grauitas ca-
pitis, & alia, quæ pituitosos humores osteodunt, adfunt. Quæ a generatione statim, aut
etiam postquam nati sumus, sed longissimæ & periclitæ surditates, consistunt, immedi-
cabiles existunt. Quæ vero non absolute quidem, sed diuturnæ tamen, & ipsæ curatio-
nem ooo recipiunt, aut certe difficillime curantur. Quæ ob biliosum humorem sursum
vergentem nascuntur, vacuatiooibus per medicamenta bilem ducentia ex facili ab-
oleotur. Quidam etiam sua spooote vicio liberantur, bile iofertus descendente. Quod
4 Aph. 18. Hippocrates etiam iis verbis confirmat. Quibus, io quieos, biliosa accidunt deiectiones, hæ
superuenientes surditate cessant: & quibus surditas sit, hæc superuenientibus biliosis deiectionibus
cessat. Et iterum: Quibus in febribus aures subduerunt, alius turbas, saluis morbum. Si vero
4 Aph. 18. ex crudis crassisque humoribus prognata fuerit surditas, vel graois auditio, venæ sectiooe
aut omnio purgatiooe ex hiera cōposita, & catapotis cochiis, ænariet dictis, alijsq; si-
milibus corabatur. A ntea tñ oxymeli, & alia quæ crassos & lentos humores iocidere va-
lent medicamenta propinaoda. Corpore vnuerfo purgato, pituita apophlegmatismis,
erithinis, & sternutamentis ex cap. eliciēda. Prætereæ caput siccandū, & omnimodo cor-
roborandū. Balocis itē sua spooote featuricoitib. vel aqua marina vtendum. In ipsum vero
aurem iniicieoda medicamēta, q̄ diuidūt, inciduntq; crassos & viscosos humores, qualia
multa

A multa ad sonitus, antea sunt tradita. Privatum vero obfert *rate fuscus cum melle, aut castorei cum Vomica*
aleo anethino. Fomentis quoque ex origano, hyssopo, foliis lauri, & id genus aliis constructis u-
endum est, quae per spongas sunt, & in qua vapore per calamos perforatos ventriculo cibi non dis-
pendio accommodantur. Oportet autem alterum calami arundinis extremum concavi-
 tati auticulæ adaptari: alterum ollæ, quæ operculum perforatum habeat, & vnde quæq;
 obrurata sit, incumbere. Sit autem in olla *absinthii, menthastrum, maiorana, origanum, si-*
chus, aut simile aliquid aqua decoctum, ut vapor inde sublatu ad auditorium meatum perfor-
atur. Aceti insuper vapor in hunc modum in autem acceptus, miti fice confert. Victus
 autem ratio in universum sit tenuis. Videtur

B De Parotidibus. C A P. LII.

Parotides sunt phlegmones, quæ in glandibus, quæ auribus adiacent, emergere so-
 lent. Fit ex copioso calido sanguine, qui vel biliosus, vel pituitosus, vel melancholi-
 cus existit. Oritur autem interdum ex capite, humoribus videlicet ei impatis: inter-
 dum a reliquo corpore per morbos, febres maxime, impetu morbi per decretorium
 illuc conuerso. Signis nullis ad vitii cognitionem opus est, oculorum enim indicio sub-
 iacet. Parotides autem, quæ feruentis sanguinis plenitudini adscribuntur, dolores ve-
 hementissimos pariunt. Quæ vero bilioso sanguini, erysipelata referre magis videntur,
 nullaque gravitate locum male affectum excruciant. Quæ melancholico sanguini ac-
 ceptæ referuntur, ne modice quidem rubent, neque vehementi dolore torquent, sed
 duriusculæ sunt. Quæ ex pituitoso natæ sunt sanguine, fastigiatæ in tumorem existunt.
 Victus ratio talis, qualis fere in aliis phlegmonibus constitui debet. Curatio a venæ se-
 ctione, si ætas, aliaque permiserint, auspicanda erit. Incidenda vero vena humeralis e-
 iusdem lateris, modo vires ætasque permiserint, & corporis totius plenitudo fuerit,
 propter rationes alibi dictas. Porro non vitium in parotidibus, quemadmodum in re-
 liquis phlegmonibus, inter initia reprimendum, sed contra attrahendum: & si nihil
 notatu dignum effecerint, etiam cucurbitulas affigemus, aut fomenta assidua adhibe-
 bimus. Nam humorem noxium ex profundo ad cutem euocare, naturæque opem fere
 conamur. præsertim ubi in capite sit fixarum vitium, humoribus in eo pertinaciter
 hærentibus. Quinetiam quum citra capitis affectum in febribus acutis natura super-
 uacuos humores deponit, ex vasis, in regionem, quæ intra cutem & corpora subie-
 ta habetur, effundens, quando etiam glandulæ ex humoribus effusis opplentur, sa-
 tius esse tunc quoque videtur naturæ opitulari, febribus per humorum decubitus,
 seu ex loco in locum impetuofum illapsum medendi. Quum vero vehementi impe-
 tu influxus irrui, nihilo nos tentabimus, totum naturæ permittentes, iuxta hoc Hippo-
 craticum: *Qua indicantur & indicata sunt integre, neque mouere, neque mouere aliquid, siue me-*
dicamentum, siue aliter irritando, sed finire. Hæc illæ. Si enim cucurbitulam, vel medica-
 mentum aliquod humores ex alto ad cutem extrahens, ad mouerimus, vehemens do-
 lor hominem apprehendet, ut hinc & vigilie suboriantur, febres intendantur, & vires
 exsolvantur. Proinde tunc mitigare, non humorum impetum ac influxum proinouere
 oportet, per cataplasmatum maxime lenientium usum. Eligenda vero, quæ cum humi-
 ditate moderatum calorem habeant, coloribus mitigandis sedandisque, atque influen-
 tibus humoribus concoquendis & maturandis idoneum: veluti est quod ex frumenta-
 cea, aut hordeacea, aut lini seminis farina cum melle, aut fenogræci, aut altheæ, aut chamæmeli deco-
 ctis paratur, vel hoc quod recipit vitellos ouorum duos, butyri recentis, vnicuiam vnam & dimi-
 diam. Olei communis in aqua calida loti, vnicuias duas. Lenti cremoris seminis lini, & fenogræci, an-
 tunc. vna. Misceantur, & laboranti loti admoneantur. In eundem usum, locum assidue butyro
 illinemus iadicetis ouorum vitellis. Suillum quoque adipem cum butyro liquan-
 tes, cera exigua addita, ut molliissimum ceratum fiat, applicabimus. Ceterum initio-
 res parotidas, in quibus neque humorum in particulas copia irruit, ita, ut vebemen-
 tes dolores excitet, neque caliditas humori adest, facile curantur fomentis e muria,
 & cataplasmatibus, & medicamentis exquisitissime discutientibus, quale est, quod
 dyachylon, hoc est, e succis vocatur. Neque enim ad suppurationem festinant, neque
 dolorem inducunt validum: Si vero parotides discuti baud possunt, suppurationibus me-
 dicamentis vtendum est: nempe farina succisissima, cum caricæ decocto, & oleo. Item,

68 Operum Leonhard. Fuchſii Pars II.

quod ex polline, id est, farina *ſynceriffima tritici & fermento conſtat medicamentum*, ad hunc quidem modum: *Recipe pollinis, uncias duas. Farina ſeminis lini, & ſanaguaci, an. unciam unam & dimidiam. Pinguedinis recentis porcina, uncias tres. Caricarum pinguium inciſarum, unciam dimidiam. Miſceantur cum decocto malvarum alba, & chamamelis, ſicque cataplaſma.* Vbi vero iam ſuppurata fuerint parotides, tunc vel cute ferro diſciſſa pus excutietur, vicerique, vt in eiusmodi omnibus moris eſt, medeatur, nempe extergentibus, & exſiccantibus, aut ſane acri medicamento rumpeatur abſceſſus, quale eſt quod ex alio conſtat, & ſimilibus. Aut tentandum, vt ipſum per medicamenta, quæ attrahoriam ſimul & extenuantem vim obtinent diſcutiamus, his quotidie auferentes, ſouentesque, donec aliquid remittant, laxenturque dolores, maiori parte puris diſcuſſa: tunc enim iam primum quidem ſemel ſoluere & fouere, deinde vero ne hoc quidem facere ex re eſt, ſed ipſis medicamentis permittere oportet, vt ſi quid reliquum in profundo hæreat, id ipſum diſcutiant. Quod ſi durities adſit, ea ipſa quoque emollienda eſt. Quare per hoc rempus medicamenta mixta facultate componetur, ita vt emollientia attrahoriam ammiſceantur, vt eſt *adeps vitulina, hircina, medulla ceruæ, bellium, ſtyrax, ammoniacum*, & id genus alia, quæ alibi commemorauimus.

De Ozæni. CAP. LIII.

Ozæni Græcis vlcera narium ſunt profunda & putrida, ac cruſtoſa, ex quibus ingratus & fetidus exhalat odor. Sic vero, a grauolentia & fetore dicta ſunt. Ex actum putridorumque humorum, qui ad nares commean, illuue generantur. Quod ſi acres tantum exiſtant, vlcera cutatu difficilia ſolent pro creare, non tamen grauiter olentia. Indiciis ad vitii dignotionem non eſt opus, ex dolore enim, & ægri narratione, imo etiam viſu, in naribus vlcera facile deprehenduntur. Ozænarum curatio in hoc poſſimum conſiſtit, vt principio caput exſiccetur, ei que robur adiciatur: quod nimitum conſtat, has ob malignorum humorum redundantiæ, qui ex capite naribus inſuunt, prouenire. Roborandum vero atque exſiccandum totum caput erit, ne quicquam ex ipſo ſuperuacuum in nares, aut alias infernas partes inſuat. Quemadmodum igitur alias topicis ac localibus, niſi vniuerſi corporis vacatione præmiſſa, vt non licet: ita hic non niſi toto capite roborato, naribus ad hœuenda remedia erunt. Robur autem capiti ad hunc modum adiciendum eſt. Tondere primum caput oportet, deinde conſectim quæ adſtingunt imponenda: qualia ſunt, *oleum roſaceum, myrtinum, alumen, galle immatura, ſolia ſalici, puluis corallorum ſantolorum rubrorum, maſtichis, mœnathuris, ætæum, & ſis ſimilia.* Hæc capiti per petuis nouem diebus imponenda, ac illinenda. Vbi itaque illis caput validum robuſtumque reddideris, naribus medendis accingere, eo conſilium tuum ditigens, vt particulam affectam medicamenti mixta facultate præditis, repulſoria ſcilicet & diſcutiente, reſicces. Repellunt igitur, auſtera nimitum & acerba, quæ communem adſtringentibus appellationem ſortiuntur. Diſcutiunt autem calida & ſicca facultatibus. Ad ozænas igitur ſanandas *calamintha ſuccum* inſtillare oportet, aut ipſam aridam per fiſtulam inſufflatæ. Vel mel in nares ſtillare, poſt aliquod ſpacium adhibito ſternutamento cruſtas excutere, quæ tribus quatuorue diebus excidunt. Vbi vero exciderint, adipe anſerino & butyro cum roſaceo curantur. Vlcers etiam in naribus mali punic ſucco in æreo vaſe, vique ad dimidias cocto, perſine. Aut *malum punicum* dulce integrum vino incoctum terito, & ſotiſecus impoſito. Coſert & hoc quod habet: *Alumini ſeiſſi, drachmam unam & dimidiam. Myrrhe, drach. unam. Malicorii, rhus, ſalis ſeiſſiſ, croci, thuris, ſingulorum drachmam dimidiam. Trita in ſuffla.* Sunt qui etiam diſtis paſtillos conſiciunt, & ſis ad fiſſuras narium vtuntur. Quod ſi hæc vlcera dolor comitatur, vtete vnguento, quod accipit: *Olei roſacei, myrtini, viriſque unciam unam. Plumbi roſi, lithergiri, viriſque ſcrupul. duos. Cerniſſa, boli armenia, balauſtorii, aloes, myrrhe, viriſque ſcrupul. dimidium. Cereæ albæ quod ſatis eſt, fiat vnguentum.*

De ſanguinis ex naribus profluio. CAP. LIV.

Profluuii ſanguinis ex naribus, haud deſetorii, cauſæ partim ſunt Externæ, partim Internæ. Externæ ſunt, caſus ex alto, iſtus, exercitium vehemens, & mora in ſole. Internæ, copia ſanguinis, vel eiſdem tenuitas. Ceterum omnes eins cauſæ ſub his tribus complecti poſſunt. Siquidem ſanguis profluat ex naribus aut reſetato venarum vel arteriarum,

- A** teriarum, quæ in capite & naribus sunt, ore, aut tunica earundē rupta ac diuisa, aut sudoris in stat transcolatus. Referatur autem venarum & arteriarum os, propter tum vas-
 is imbecillitatem, tum sanguinis, qui ad os eatum impetu ruit, copiam: ad hæc acrem
 quampiam, quæ illi extrinsecus incidit, qualitatem. Diuiditur vero tum ex vulnera-
 tione, tum contusione, tum ruptione, tum erosione. Sudoris in stat transmittitur, tu-
 nica quidem ipsa rarefacta, sanguine autem tenuato, *quemadmodum fufius lib. 5. med. me-
 thod. cap. 2. Galenus docet.* Non autem temere a nobis dictum est decretorii, quod illud
 nulla prorsus iam dictorum causa fiat, sed tantum propter facultatis robur noxia expel-
 lentis. Quare ipsum plerumque morbi præcesserunt. Indiciis multis ad vitii, eiusque ^{signa}
 causarum dignotionem nihil opus est. Externæ quidem causæ de sermonibus ægri
 cognosci possunt. Copia sanguinis ex facie, oculisque quæ rubent, dolore capitis gra-
 uatuo, & aliis, quæ dicta sunt *cap. 10. huius libri*,prehenditur. Decretorium sanguinis
 ex naribus profluuium, quod curatione haud eger, e morborum, qui præcesserūt, con-
 stitutione agnoscitur. Ratio vitus sit eiusmodi, qui infrigiditate & incrassare sangui-
 nem, vias, per quas sanguis fertur, constringere valeat. Tenuem quoque esse oportet. ^{Vitus}
 Aer itaque sit frigidus, qui aut naturalis sit, vel arte patetur aeti & stillatili rosarum
 liquoris irrotatione, foliis quoque vitis, salicum, violarum per pavementum stratis. Ci-
 bus boni succi, & concoctus facilis. Sanguine feruente, æger velcatur lactucis, intybo, *sui-
 no, utroque pyris, malis cotoneis, pullis gallinaceis affit, aut cum emphacio elixit, aut in aqua chalybe-
 ta coctis.* Suiantur quoque cibi ex *emphacio, vino malorum, puniceorum, & antraciorum, vt*
C sanguis crassior & ad fluxionem ineptior reddatur. Bibat vinum crassum & rubrum:
 Contra, album & tenue deuit. Vel, vbi assuevit per bonam valetudinem, viatur in
 potu aqua frigida, aut decocto cinnamomi. Per quod hoc loco, & passim in iis nostris,
 de medendis ratione libri intelligo aquam, in qua parum cinnamomi decoctum sit, ne
 scilicet sua frigidityte imbecillum plerumque ventriculum offendat. Parum loqua-
 tur, omnemque corporis morum, animi quoque perturbacionem, iram potissimum fu-
 giat, quod hæc omnia sanguinis profluuium concitent. Partes præterea capiti subie-
 ctas, sublimes habere conuenit. Situs enim partis, ex qua sanguis profluit, in contra-
 rium fluxionis tendere, & inclinari debet. Hac enim ratione, sanguis in contrariam
 sui motus partem impellitur. Sic Galenus *lib. 5. ther. meth.* omnem particulam, vnde
 sanguis manat, sursum spectare oportere tradit. Ita Hippocrates quoque *6. Epid. Per. 7.*
Aphorif. 3. inter ea, quæ sanguinem promanantem sistunt, figuram alio tendentem rei-
 censet. Quare curandum viuce, vt caput in profluuium sanguinis natum deorsum spe-
 ctet: id quod fiet, si partes illi subiectæ sint sublimesiores. Curandi ratio ab iis, quæ san-
 guinem ad alias corporis partes auertunt præsidis, exordienda. Primum igitur si cor-
 poris plenitudo adsit, & ætas permiserit, ægerque adhuc non sit resolutus, vena in ig-
 bero secanda est, quæ profusioni sanguinis ex naribus & directo respondet. Sic enim vt
 faciamus, suadet Galenus, qui in *lib. de curandi ratione per sanguinis missionem* ita scriptum
 reliquit: *Porro reuulsivis causis, si venam fecer in directe quidem oppositis sanguinis eruptionibus,*
civissime conspiciam videbis utilitatem. At si contra fecer, nihil profuerit. Hæc ille. Vbi paulu-
E lum detraxeris, mox vnam horam intermittens, rursus detrahes, post iterum atque ite-
 rum pro laborantis viribus. Præterea infernatum partium, brachiorum videlicet, gna-
 nuum, femorum, inguinum, ac pedum, potissimum per ea medicamenta quæ calefa-
 ciunt, frictio mirifice conducit: Vincula testibus maxime iniecta, etiam valentius inie-
 cta, iis remediis quæ reuellunt adnumeranda sunt. Sanguinem denique & naribus etum-
 pentem, retinent, magnè in hypochondriis defixæ cucutbitulæ. Infigendæ autem sunt,
 si ex dextra nate profluit sanguis, super iocinere: sin ex sinistra, super hene: si ab vtra-
 que nate, super utroque sunt imponendæ viscere. Scapulis etiam, cum scarificatione,
 applicandæ sunt. His sic peractis, medicamenta, quæ refrigerant & naribus etum-
 pentem, intra & extra corpus adhibenda. Extrinsecus quidem apponenda fronti & commissa-
^{Topica.}
F re coronali epithemata & succo plantaginis, rosarum, lactucæ, exalidis, passioris peræ, cau-
 dæ equinæ, corrigiolæ sive sanguinarie foliorum vitis, polygoni, aut eorundem stillatitiosis liquo-
 ribus parata. Mirifice autem conducit linteolum in aceto madefactum frigidum, ite-
 rum atque iterum fronti & cernici admotum. Fons etiam spongiis ex aqua frigida fo-
 uenda. Porro proderit hoc epithemate fronti & iocinoti impolito vti, q. habet: *Liquo-*
^{Epithemia.}

Vitus

Per cin-
nami deci-
tam quid
intelligit-
dam.

Curandi

Folida

Ligaturæ.

Cucutbitula.

Topica.

Epithemia.

Epithema. rum ſtillatiorum roſarum ſolani, exalidis ſingul. vnc. tres. Specierum troſantalon, diarrhodon ab-
batus ſingul. drachmam vnam. Boli armenia, thoris viſſi, lapidus hamathitis, ſingul. drachmam di-
midium. Commixtu omnibus fiat epithema. Vel eiufmodi, quod habet boli armenia, ſanguinis
draconis, terra lemnia, an. vnciam vnam. Cum albo oui, & ſucco plantaginis fiat cataplaſma. Na-
ribus præterea medicamenta ſanguinem ſiſtentia indenda: quale eſt, quod Galenus
libr. 5. ther. meth. inter omnia alia optimum eſſe tradit. Recipit autem thoris, drach. duas.

Optimum
medicamentum
ad li-
berandum
ſanguinem.

Aloes, drach. vnam. Redacta in puluerem cum oui candido ſubigantur, donec ad mel-
liſ crassiſtudinem redeant: dehinc leporis molliſſimo pilo excipiantur, & admoveantur
naribus. Licebit etiam linamentum conſortium, hoc medicamento imbutum, naribus indere.

Menta quoque trita in nates coniecta, haud parum prodeſſe creditur. Pari modo ſos ſa-
licis, lanugo bombasii, ac tela aranea. Item ſpongia in acre ac ſeruens acetum demiſſa, profluſentibus
naribus extrinſecus imponeſda, atque comprimensda ſpectile, donec impellatur. Quonies vero in
nares medicamentum immittitur aliquod, os li quore aliquo implendum eſt, vino verbi
gratia, aut aqua, ne medicamentum e naribus, in os promanet. Præſtat autem ſpon-
giz initium deligare filo per acum deducto, vt facile extirpi poſſit. Extrahito autem,
quum opus ſuum perfectiſſe exiſtimaueris. Quod ſi inateſcat ſpongia, inſulque aggluti-
netur, auriculario clyſtere aquam frigidam immittito, ac inſundendo humectato, at-
que ita extrahito. Item hoc quoque medicamentum non inter poſtrema habetur, quod
accipit: Putaminis oui, drach. duas. Galliſ immatura, drach. vnam. Triſa linamento tortili, aqua
aut aceto madefacto excipito, & narium foraminibus indito. Item, ſi autem & muſum cyſſo, albu-
mine oui irrigato integre, non parum conſert. Aures quoque valide linteis & cera obturare, & in ore
aquam plantalem frigidam continere. Succus etiam ſolorum vortica linamento exceptus & impoſi-
tus ſanguinem ex naribus erumpentem reprimis. Idem quoque metuſa folia illita poſſunt.

Parata fa-
cilia medi-
camenta.

Cauda inſuper equina ſuccus, aut ipſemet ſolia trita & applicata, quemadmodum etiam per aſa-
ſtoriam, in ſiſtendo ſanguine magnam obtinent efficaciam. Cochlearum denique caro cum aceto trita,
aut eadem cum ſuis domiciliis viſſa tritaque fronti ac naribus ex aceto admota, aut in nares inſuſſa-
ta, non parum vtilitatis adferunt. Supra omnia conſert ſanguis, qui ex agroti naribus profluſcit,
ſi ſcilicet in vaſe ſigillato coſtati, ac deinde tritus fuerit. De eo accipe, drach. tres. Boli armenia gy-
pſi, vtriuſque drach. vnam. Capſura, ſyrup. vnum. Cum oui candido, & exiguo aceto reduncantur
ad mellis craſſitudinem, & fronti imponantur, naribusque immittantur. Neceſſitate ipſa urgente
gramma duo, aut tria opit adſcribere licebit. Ab eſſentia totius proprietate ſtercoris aſinum exſic-
catum, & in puluerem redactum, aut aceto diſſolutum conducere, apud omnes in con-
ſeſſo eſt. Idem etiam ſimus porcini poteſt. Intra corpus adhibenda ea, quæ inſrigidant
& adſtringunt medicamenta, vt ſunt ſerapia, roſaceum, myrtinum, nymphaea, & e papanoceri
ſaechorum roſaceum, exalydiis, & nymphaea paſtilli de lemnia terra, de ſuccino, & id genus alia medi-
camenta. Iecori etiam admoveendum, ſi ex dextra maxime nare ſanguis promanat, hoc
emplatrum, quod accipit vnguenti ſantalini, vnc. vnam & dimidium. Oleorum roſacei, &
myrtini, an. drach. duas. Lauentur hac olea accuratè in aqua frigida, dein parum aceti adieciatur,
cum ſpica nardi ſyrup. vno. Miſceantur, & tepida iecori apponantur. Potro ſi quid interea ſan-
guinis in ventrem, aut alia corporis loca deſluxit, ipſum ſi multus ac copioſus fuerit, per
medicamenta grumos diſſoluentia, & educentia, vacuare oportet. In ventre enim
& in teſtibus in grumos coactus ſanguis, in cenſionem facit. Quæ autem ſunt eiufmodi
medicamenta, ſuo dicemus loco.

Optimum.

De deſtillatione, grauedine, & rancitate. C A P. LV.
Κατὰ τὴν ἐξ ὧν ὁμοίων Græcis, deſtillatio Latinis dicitur. Fit autem, Gal. lib. 3. de ſympt. cauſ.
ſis teſte, vbi ad os & ſauces humor delabitur. Grauedo vero, quæ Græcis ῥαγε vo-
catur, dum ad nares decumbit humor, accidit. Raucedo, quæ ῥαγε Græcis appellat,
vbi ad aſperam arteriam deſtillat humor, contingit. Quemadmodum ſuſus in Inſiſti-
tibus noſtris docuimus. Deſluxus humoris cauſa eſt cerebrum, quod quidem a frigi-
re, ad frigidam intemperiem deducitur: quod iis potiſſimum accidit, qui aperto capite
ſeſe ſtatim ambienti frigido exponunt: ab æſtu vero caleſcit & repletur. Frigiditas etiam
humores quæ in cerebro ſunt, cogens ac conſtringens, perinde atque manus ſpongia
imbuta aqua, deſluxum eotundem in partes ſubiectas conciliat. Quum etiam cere-
brum ſæpe ob frigidam intemperiem nutrimentum, quod ad ipſum deſertur, conco-
quere haud poteſt, ideoque corruptum veluti excrementum in ſubiectas partes decidit.

Cathartes.
Deſtillatio.
Grauedo.
Raucedo.
Cauſa.

Sic non

- A** Si non tardo calor ambiens, humores cerebri dissolvens, destillationem creat. Præterea omnia, quæ vitæ modum caput replere possunt, de fluxum humorum in partes inferiores excitant. Sic vinū vtiq; immoderatus ingestum, balnea calidiora, & largior persufusio capitis ex aqua calida, maxime si alias calidius caput existit: & cibus sâne, qui in ventriculo crudus persueuat, neq; infra excernitur, item ea, quæ sursum euaporant, in caput impetum facere consueverunt. Externæ causæ & sermonibus ægri cognoscuntur. Qui signa ex calore defluxu humorum ex capite laborât, iis caput incalcescit, acris tenuisq; humor destillatur, tum per nares, tum per os. Facies deniq; rubescit, & nasus iis interim exulceratur. Hos etiam magna ex parte febris comitatur. Qui contra ex frigore, iis caput vndiq; & frons distenditur, meatusq; qui in ossibus sunt, quæ erithmoidea nominantur Anathemiciis, clauduntur, ita vtne vox deorsum per nares, vt Pauli verbis vtâr, transmeare queat. Pituita quoq; & casius humor e narib; stillat. Fugiant ægrem impensè calidum & frigidum, præferim a balneo: ventos austri nos, & aquilonios, Iaconicum, Venetum & omnia quæ aut constringere, aut dissolvere humores in cerebro possunt. Vtatur cibus concoctus facilibus & boni succi. Deurent eos, qui vaporum copiam ad cerebrum trahunt, nempe cepas, allia, sinapi, raphanum, & odoramenta supra modum calida. Curandum vniç, vt alius aperta sit, & singulis diebus aliquid inieciat. Præterea qui destillatione laborant, minus in cena, quam prandio comedant. A cibo nec legendum, nec scribendum. Potus sit aqua multa aut hordei, vel aqua in qua patum cinnamomi decoctum sit. Fugiendus somnus longior, & diutnus, & nocturnus supinus. Moderatus autem & nocturnus factus confert. Quod ad curandi rationem attinet, consilium est, caput, veluti mali fontem, sanare. Vbi itaq; calida in tempe caput vexatur, iis pugnandū præsidii, q̃ dolori capitis e tali causa contraïto conueniunt. Præsentissimū aut remedium capitis eum aqua copiosiore calida, modestate tamen irritatio & persufusio. Hæc enim generatim in capite vapores calidos euocare & discutere valet. Oportet deniq; sic laborantes balneis multis tepidis dulcium aquarum consolari, & temperamenti omne io melius mutare. Qui vero caput vehementer calidum & perulsum habent, atq; ob id assidue destillationibus vexantur, iis melius est hora æstiva ex rosaceo vngi. Quod si frigida interperies infester caput, calefacientibus ac tenacibus oleis, itio scilicet, rutaceo, & similibus perungendum erit. Irinum autem nō solum illinitur, sed etiam naribus instillatur. Alia præterea, nempe chamamelinum & anethinum, quæ supra de capitis dolore ex frigore orto dicta sunt, adhibenda veniunt. Si autem calidus humor a capite destillauerit, simulq; febris inuaserit, & totius corporis plenitudo fuerit, sanguis e vena exteriore gibberi, quam humeralem vocant, mittendus erit. Sin sanguinis missione propter iustas causas vti non liceat, clysteri alius eluenda, atq; a capite exsuperantes humores deorsum trahendi, aut medicamentum bilem per inferna ducens propinandū, vt sunt cataplasma aurea, alexiphagma, azaloret, & similia. Auertendi quoq; a capite sunt humores frigidiores, extremitatum, ligaturis, & cucurbitulis scapulis admotis. Intra corpus adhibeantur, quibus alterandi, & seruorem atq; acrimoniam bilis extinguendi facultas inest: veluti est serapiū violaceum, nymphaea, & papauer, diacodium præsertim vbi iam æger cubitum iutus est. Si quidem sompnum suauem afferit, & destillationem reprimat, item eorundem sacchara. Embrochæ etiam & odoramenta supra in capite de dolore capitis commemorata applicantur. Emplastū denique & terra lemnia, aut bolo armenia & plantaginis succo paratum, raso capite imponatur. Si vero frigidus humor sit, qui a capite destillet, per ea, quæ pituitam purgât, corpus vacuabis. In quem vsum multo confert validi clysteris iniectio. Præstet tamen prius exhibere nuedicamenta in cidentia & præpatantia, vt supra aliquoties dictum est. Quo persado, a capite auertere atq; retrahere humores oportet. Dein vbi humores cocti fuerint, apoplegmatisma, gargarisma, & similib; medicamentis caput expurgandū. Sacculi præterea capiti admoendi sunt, qui habent: *Flerum chamamelis, maiorana, meliloti, betonica, strachadi, soliorum lauri, pulgii, origani singul. manipulum dimidium. Cinnamomi, garyophyllorum, utriusq; drach. vnam. Nucis moschata, drach. vnam & dimidium. Gallia moschata, drach. vnam.* Terantur singula, & trita in sericum seu tenue linteum demittantur, formeturque facculus, qui sursum cotonali imponatur. Plurimum quoque destilla. nonem reprimenda.
- E** destillationem autem reprimunt omnia, quibus exsticandi inest facultas potissimum

Destillatio
um repri-
menda.
Pulvis pro
salutis.

vero nigella torrefacta. Et cuminum deustum lindeolo inditum & illigatum, preterea
auxilium adfert, si id ipsum agrotantes odorent. In eundem usum sufficientia adhibere
conueniunt, quale est quod accipit: *Thuris, mastichis, utriusque drach. unam. Ligni aloes, serpu-
vnam. Cinnamomi, geryophyllorum, utriusque serup. duos. Galie moschate, drach. unam & dimi-
diem. Foliorum lauri, santalorum laterum, & rubrorum sing. drach. unam. Moschi, ambur, utrius-
que granum unum.* Trita excipiuntur statim quod satis est, & informantur pastilli, quo-
rum vnus prunis inferat. Aliud quod habet: *Salvia, maiorana, rosamarin, singul. drachmenum
unum. Materie geryophyllorum, cinnamomi singul. scrupulos duos. Ligni aloes, scrupulum unum.
Thuris, unciam unam & dimidiam.* Terantur omnia prius, & dein commisceantur, fiatque
pulvis, qui, exigente usu, carbonibus signitis inspargatur. Grauedinis eadem quæ destil-
lationis curatio. Post igitur tum totius corporis, tum capitis purgationem, cerebri
restitutioni studendum. Sunt vero qui laminam ferream donec plane candescat, igni
iniciunt, ac ei postea acetum rosacei instillant atque affundunt, vaporem quæ inde e-
latum in nares recipiunt. Rauciras autem eiusdem fete, quibus tussis, curatur medicamen-
tus, de quibus infra dicemus.

Rauciras
curatio.

De dentium dolore. CAP. LVI.

Causa.

IS dolor, qui Græcis *δονταλγια* dicitur, a calida vel frigida intemperie interdum excita-
tur. Nonnunquam etiam propter humorum ex capite in eorundem radices destil-
lum, qui sua illis acrimonia vel erodunt, aut consimile in eis malum sua concitant co-
pia, quale est circa partes carnosas phlegmone. Dentium vero dolor, siue gingiuarum

Signa.

phlegmone, interdum in propria ipsorum substantia, interdum in nervo, qui illorum radici
insest, oritur. Si a nuda qualitate intemperie dolor accidit, minime grauius erit.
Calidaque intemperies ex totius corporis temperamento, quod itidem calidum est, item
facie subrufa, & precedenti victus ratione calida deprehenditur. Frigida ex contrariis
indictis cognoscitur. Si vero ab humore aliquo copioso influente dolor oritur, non so-
lum in dentibus grauius sentitur dolor, verum etiam in reliquis partibus, quas per-
transit. Calidus autem humor vehementiorem, frigidus vero remissiorem & diutem-
que dolorem excitare solet. Victus ratio, quæ ne dolor accidat, munire potest, eiusmo-
di sit, ut nullo non tempore quæ supra modum calida aut frigida sint, deuitentur. Vni-
ce autem cauendum, ne statim lese sequantur. Fugienda quoque acida, acerbæ, & viscosæ

Victus ra-
tio.

omnia. Lactis etiam frequens usus, dentibus mirifice obest. Studium & diligentia assi-
dua sit in purificatione dentium, quæ vna sane res eos a corruptione omnino maxime
rutos reddit. Tibi quorum frequens usus est, boni sint succi, & concocti faciles. Dolo-
re vero infestante, pro causæ diuersitate, alia atque alia victus ratio præscribitur. Cu-
randi ratio, si nuda qualiter intemperie dolor obortus sit, solis sit quæ alterare va-
lent, præiudici perscitur. Si igitur a frigore sit, proderit vino tepido colluere dentes. Ex-
trinsecus autem maxillæ calefaciendis oleis chamæmelino, rutaæ, irino, & simili-
bus inungantur. Pro oris quoque collutione in aceto decoquantur origanum, calamintum,

Curatio.
Si a frigore.

Si a calore. *hyssopus, pulegium, distamnum, satoreia, verbenaceæ, ræta radices, & similia.* Si autem a calore den-
tes dolere cœperint, in aceto decoquere oportet portulacæ, patieratiæ, semperuium
minus, & glycyrrham. Quod si intolerabilis existat calor sensus, vtendum est semi-
nibus lactucæ, intybi hortensis, & papaueris, decoctis in aceto. Forinsecus oleis frigidis,
rosaceo, nymphaeæ, & id genus aliis partes dolenti denti vicinæ inungendæ. Porro, si
ob humorum redundantium dolor excitatus fuerit, si ætas, anni tempus, aliaque permi-
serint, ac corporis plenitudo aderit, a sanguinis missione ordini curationem oportet.

Si a humo-
rum redun-
dantiis
Vena se-
ctio.

Incidere autem conuenit venam gibbeni superiorem, quam humeralem vocant, & quæ
directo male affectum locum respicit. Quæ si non contingat, eam, quæ media existit.
Eo peractio, venas sub lingua secare oportet, aut scapulis cucurbitas affigere. Si vero
vnus duntaxat humor vitiosus redundauerit, medicamento quod eum humorem pur-
gate confuevit, vtendum erit. In eum etiam usum clysteres misceantur conferent, quod non
solum alium emollire, verum etiam humorum impetum ad inferiora avertere queant.

Purgatio.

Corporis vnuerfo exanimato, ea quæ reprimunt medicamentis ad mouere licebit: vt sunt
succus plantagininis, rosarum, portulacæ, lactucæ, intybi hortensis utriusque, aut prædictorum deco-
ctum, aut stillaticus liquores, cum exiguo aceto. Vniue autem conducit dolentes den-
tes accl-

Reprimen-
tia.

- A**tes acri aceto calido, cum immixtura galla colluere. In eundem usum decocto solani, lactuca foliorum salicis, radicis pentstemonis, gallarum, & haliacabi utendum. Extrinsecus partes dentibus dolentibus vicinæ oleo rosæ, myrrhæ, inungendæ, & emplastrum ex hordeacea farina imponendū. Principio vitii iam transacti, reprimentibus admiscenda erunt discutientia: ut est sanagraci, seminis lini, alicubi, hyssopi, & id genus aliorum decoctum. Hoc tempore meliloti radix in vino, donec dimidiū absumatur, elixa, ore ea parte, quæ dolet cōtenta, præcipue auxiliatur. Vtramque enim facultatē, discutiendi nimirum & reprimēdi, meliloti obtinet. Origanum præterea hoc tempore dolorem dentiū leuat, & protinus tollit, si redactum in puluerem cum nitro gingivis inspergatur. Ad stupescientia, nisi summa virgente necessitate, & nisi humorum defluxus calidus exiit, perueniendum non est. Illis quoque paulatim utendum. In hunc usum, decoctum seminis, aut foliorum hyssopi, cum aceto adhibere licebit. Philonii quoque drach. vna in aqua, aut vino diluta, non paruum auxilium adferet. Ceterum si dolores a frigidorum humorum confluxu orti fuerint, calida magis medicamenta sunt adhibenda. Frigida enim humores crassos & frigidos cohibent, ac ne diffusi queant impediunt, atque adeo dolorem vehementiorem reddunt. Quare cum hoc potissimum medicamento utendum erit, quod habet: Piperis, pyrethri, meliloti, singul. drach. vnam. Trita dentibus dolentibus aspergatur. Porro inter ea quæ a totius essentia præparata eunducunt, egregie facere fecit ranæ in aqua & aceto probe elixius, diutius ore retentum. Præclate etiam confert senecta serpentis, in vino, aut aceto cocta. Eadem quoque vsta & trita, cum oleo ad mellis crassitudinem redacta, denique imposita dolenti laefferit. Quod si vero prædicta nihil contulerint, dens aut ferro, aut medicamentis auferendum erit. Ut autem dentem citra dolorem auferre liceat, hoc medicamento utendum. Pyrethrum acerrimo aceto in dies quadraginta conditum, deinde tritum in usum adferua. Qui vbi postulauerit, reliquos dentes cetera præmunitis custodito: ipsum vero qui dolet, circumcirca purgatum hoc medicamento integro, & post horæ interitum digitis extrahit. Piculare tacit lappa herba radice feruenti cinere calida, & denti assidue apposta: parua enim mora dentes tollit. Cucurbitæ lyluestris denique radicem cauo impone, & dentē eruet. Verines terrestres in ressa exuissos, in cineremque redactos contete, & circumcirca prius denti vbertim adperge, & per diem & noctē exaceret sua sponte. Hoc Aetius confideret esse utendum, quod veluti mysterium iam sæpe sit celebratum. Erucam e brassica nam frequentius ad ipsum dentem adhibe, cadetque sua sponte. Hac in præsentia ut patat uisacula commemorare volui. Plura alia habet Aetius lib. 5. cap. 34.

De dentibus denigratis, sumentibus, & mobilibus. CAP. LVII.

- I**uentali quando dentes ac nigrant per vniuersam eorum substantiam, non dissimile quiddam phlegmoni patientes, ob influxum vitiosorum humorum. Ut autem dentes sint mobiles, interdum ictus, aut casus in causa est. Alias redundant humiditate, quæ nervos & ligamenta relaxat, dentes mobiles euadunt. Alias etiam ab erosione aut flacciditate gingivarum, quibus dentes circumdantur. Curatio a vitioso humoris purificatione suspicanda. Postea vero, si dentes luore aut rubigine labuntur, humores vitiosi, quia dentes confluerunt, exsiccantibus sunt medicamentis dissipandi, ut est lyeum, thuris, menta, galle, mastiche, myrrha, nigella, & eiusmodi. Inter multa vero alia hoc potissimum conestet, quod habet: Nigelle, myrrhæ, thuris, singul. drachmam vnam. Mastiche, piperis albi, vtriusque serup. duas. Pistocchia, scupulam vnam. Aluminis fessis, drachmā vnam. Trita redigantur in puluerem, quo dentes perfricentur: aut resina terebinthina excepta, dentibus circumlinantur. Humoribus vitiosis depaictis, deniificis utendum, quibus exurgendi & exsiccandi facultas inest, quale est quod accipit: Nirri aluminis fessis, cornu ceruini vsti, singul. drach. vnam. Myrrhæ serup. vnam. Radice iridis silyrica, thuris, menta sicca, singul. drachmam vnam & dimidiam. Salis vulgaris testis, pistocchia, vtriusque drachmam vnam. Pumicis, testis vniuersæ, vtriusque drachmam vnam & dimidiam. Piperis, pyrethri, pulegii fessis, singul. drach. dimidiam. Parietaria, testis vniuersæ tritarum. Tufis & cribatis omnibus, fiat puluis, quo dentes quotidie fricentur. Ad mobiles vero dentes ea quæ adstringunt, & laxas gingivas firman, atque stabiliunt, adthoueantur medicameuta. Pro sunt itaque collutiones oris ex decoctis setum adstringentium, qualis est quæ habet: Rosarum rubearum.

ram, menta. plantaginis, ſingularum manipulum dimidium. Corticam nucum cupreſſi, drachmam unam. Seminii myrti, rhoi, utriuſq; drach. dimidiam. Malicorj. gallarum, utriuſq; drach. duas. *Acacia, ſcrip. duas.* Decoquantur ſingula in vino nigro adſtringente, & cum eo crebro os colluatur. Colluto ore, hoc denutricio uti licebit, quod habet: Gallarum, putaminum meli punicu dulci, utriuſque drach. unam. Balaustiurum, rhoi, myrrha, ſingularum ſcrup. unum, Roſarum purpurearum, calyculorum glandium, ſanguinis draconis, ſingul. drach. unam. Thuri, cornu cerui uſſi, utriuſque drach. unam & dimidiam. Radici biſtoria, & pentaphylli, ſing. ſcrup. duas. Tritis & cribatis omnibus, fiat puluis, quo dentes perfricentur. Aut cum oxy-melite ſcyllinico excipiantur, & uſu exigente illinantur.

De aphthis. CA P. LVIII.

Aphthæ, barbaris & recentioribus *aleola* nominantur. Sunt autem nunc ſubalbidæ, nunc ſubrubræ, alias cruſtæ modo nigreſcunt, & hæc omnium periculoſiſſimæ exiſtunt. Oriuntur, ut plurimum, infantibus, pueriſq; lactentibus, quum ſcilicet aut lac matricis fuerit vicioſum, aut non probe ipſum infans concoxerit. Fiunt etiam aliquando in iis qui ad perfectam ætatem perueniunt, tum propter vicioſorum humorum ad os deſluxum, tum propter acrimoniam eorum quæ comeduntur & bibuntur. Cognito vniuerſarum ſacilis eſt, utpote quæ viſui & tactui ſubiectæ ſint. Ad tactum quidem calidiores quam conueniunt partes ſiunt, tumoreſque excitantur. Viſa vero ex colore cognoſcuntur. Quæ enim rubicundiores ſunt, ſanguinei humoris dominium indicant: ſtatuiores, bilis amaræ: albidiores, pituitæ liuentes vero & nigreſcæ, bilis atre. Quæ infantibus accidunt, facile curantur per ea, quæ medioenter adſtringunt, vicioſo tamen nutricis lacte prius conuenientibus cibis ac potibus contemperato. Ea vero ipſis pueris in cibis poſſibilem offerendum. Oportet igitur miſcere cibis aliquid ex malis cotoneis, & aliis acerbis, pyriſque ſorbis, & meſpilis. Interdum etiam lactucæ quiddam & intybi horteneſis, ac portulacæ cibo admiſcendum, phlegmone nimirum vlceribus accedente. Conuenit quoque lens cum aceto & aqua decocta, ac modico pane commanducata. Quod ſi infans ipſe cibum capere non poſſit, nutrice eiuſ huiuſmodi victu uti oportet, nec nō ora infantium conuenientibus medicamentis illinare. Si enim ſubruſæ fuerint infantium aphthæ, a principio cum iis quæ medioenter adſtringunt & refrigerant curantur. Quare iis collutiones oris ex ſuccis oſarum purpurearum, plantaginis, ſolani, oxalydis, aut eorundem liquoribus ſtillantiſ profunt. Item ex decocto gallarum, balaustiurum, ſantalorum, rhoi obſoniorum, acaciz, & ſimilium, admixto ſucco medicato *eribes, aut diamoren.* Si vero ſubfluæ fuerint, iuſdem quidem vtendum, ſed magis refrigerantibus. Si ſubalbidæ adſtringentibus & exſiccantibus cum quodam calore vtendum. Eiuſmodi ſunt *thuri, myrrha, maſtiche, nucis cupreſſi.* Hiſ etiā ea, quæ paulo ante ſunt cōmemorata, miſcere licebit. Si liuentes & nigreſcentes fuerint, iis quæ generoſius diſcutiunt vtendum. In hoc caſu conſert *melilotum, chamamelum, anethum, ſenogracum,* adiectis tamē ſemper adſtringentibus. In iis, qui iam perfectæ ſunt ætatis, vnice corporis natuta conſideranda venit, numme mollis ſit & humida, an dura vel ſicca. Si quidē duriore & robuſtiorib; corporib; veluti ſunt piſcatorū, nautarū, venatorū, & agricolarū, validiora etiam remedia ſunt adhibenda: in becilliorib; autē & molliorib; , ut ſunt *enuchorum, & muliculerum,* mitiora. Quod itaq; ad victus rationem attinet, in hac ætate cōſtituti, ab omnibus q̄ ſalſa & acria ſunt, quæq; vicioſos ſuccos progenerare poſſunt, abſtineant. Quod v. ad curationem ipſam ſpectat, in plenitudine totius corporis, ſi nihil impediāt, primum vena humeralis, dein illæ q̄ ſub lingua ſunt, incidendæ. Si vero cacochymia corpus laborauerit, humoris vicioſi & moleſtantis purgationem moliri oportet. Corpore a redundantibus humoribus vacuato, medicamēta quibus adſtringēdi & reprimendi facultas ineſt, admouenda. Modetata vero ad aphthas remedia hæc ſunt: *Omphacium in vino quſte-ro aut miſſo diſſolutum. Rhoi obſoniorum eodem modo. Roſarum ſlor, ipſaq; roſa ſicca cum melle roſaco.* Vehementiora ſunt, quæ paulo antea commemorauimus. Deinceps vero ea quæ citra mordacitatem diſcutiunt, ut ſunt *ſenogracum, glycyrrhizæ radix, meliorum, aniſum, & alia quæ priuſ recensuiſmus.* Atqui ſi exulcerationes putreſcere incipiant, præclare facit, maxime in infantibus, ex decocto gallarum & melle illitiō. Gallas igitur conuſas aqua deco.

A decoque, & cum decocto percolato parē mēturā mellis permiscēs, totus decoque donec ad mellis crassioris spissitudinem redigatur: eoq; ut maximo remedio utere, ita ut locis illis satis diu digitis adfrices, aut tomento lanæ purpureæ digito circumvoluto partibus vlceratione laborantibus apprimas. Egregie quoq; facit centaurii minoris exulsi cinis illitus cum melle. Cupressi etiā pilulæ exulsi eodem modo. Cornu quoq; ceruinū vltum, tritum, & ad frictum mirabilitet cōducit. Ad aphthas vero quæ proserpunt summe efficac est, fœniculi radix vsta per se, & cū melle vtilis. Itē amurca in æreo vase, donec in mellis crassitudinem cogatur decocta, & illita. Nec min⁹ cōfert gallatū, aluminis & balaustiorum pulvis, æquales singulorum partes assumēs per se, aut cum melle illitus.

De fetore oris. CAP. LIX.

B **G**rauis molestusque oris dolor magna ex parte propter putrescentes gingivas, aut dentes, aut ciborum reliquias illis dentes accidere solet. Nonnunquam ob cutis oris calidam intemperiem. Intet dum etiam ob humorē corruptum, aut putrefactum, in ore ventriculi hærentem. Contingit quoq; ut nonnunquam oris aut pulmonis exulceratione, molestus sit oris halitus. Si propter putrescentes vel gingivas, vel dentes, vel ciborum reliquias oris fœtor accidit, promte quidem cognoscitur aut visus, aut de xgroti sermonibus. Quod si a calida oris intemperie nascitur, tum calor in ore sentitur, ac sitis infestat. Si vero propter os ventriculi, tunc ante cibi functionem potissimum uris halitus molestus & grauis esse solet. Otis exulcerationes visui subiectæ sunt. Pulmonis sane, totius corporis extenuatione ac tussi, quæ illius sunt symptomata, facile dignoscuntur.

Caussa

signa

C In viciis ratione omnia quæ promte in ore aut ventriculo corruptionē accipiunt, æger euicit. Talia sunt, *lac, pisces, fructus fere omnes, medulla, pinguis, aqua praua, & similia.* Cibi igitur, quibus vititur, sint boni succi, & concocti faciles. Assistam magis, quam elixis vitendum. In fine prandii & cœnæ adstringentibus pyris, cotoneis malis, & eiusmodi vlti licebit, iis potissimum, quibus ab ore ventriculi ingratus exhalat odor. Pro diuersitate causarum potus nōne sit vinum, nunc hordei, aut cinnamomi decoctum. Somnū a cibo statim fugere oportet. Si ob gingiuarum, aut dētium corruptionem oris fœtor fiat, corporisq; adhuc plenitudo, ex humerali vena primum sanguis mittendus erit, & cucurbitulae subinde ceruici sunt affigendæ. Sin cacochymum fuerit corpus, idoneo medicamento redundans ac molestans humor vacuandus erit. Corpore autem vacuato, loca-

visum

Cursio

D **E** collibus vitendum, collutionibus præsertim, quæ hoc in loco mirifice conferte solent. Inter multas autem hæc nun parum conducit, quæ habet: *Rosarum purpurearum, plantaginū, polygoni singul. Manipulum vnum & dimidium. Gallerum, balsamiatum, nucis expressi, singul. drachimas duas. Putaminum malorum granatorum, drach. vnam & dimidiam. Aluminū liquidi, vincta in vinum.* Decoquantur in aqua iustę quantitatē ad tertias: iuxta decucti per colū transuso admisceatur mellis rosæ colati, duarum, virisq; vincta dimidia, Diamaron, drachmas duas. Commixtis omnibus, fiat collutio, cum qua mane & vesperti dentes & gingiæ colluantur. Proderit etiam frequens collutio ex aqua, cui acetum permixtum sit, mane & statim a cibo. Quod si citra exulcerationem fuerit grauis ille oris odor, iuris radicem in vino veteri odurato maceratam, ad colluendum albidue exhibere, atq; etiam in ore retinere conuenit. Myrrham quoq; in vino meraco dilutam, colluendam præbere oportet. Non parum etiam confert commanducatio pyrethri, sa maris, & rnt a. Collutio item ex aceto scyllitico, aut decocto salvia, aut solo vino. Decoctum quoq; menthæ in aceto & aqua iuuat, si illo assidue os colluatur. Hoc sane bonum facit odorē, & dentes dealbat. Habet salis candidi, pumicis, origani singul. drach. duas. Radix iurdi, drach. vnam. Florum iunct odorati, drachmas dimidiam. Contritis omnibus & commixtis, dentes fricant. Si a calida intemperie fiat oris fœtor, contrariis curetur medicamentis. Sin ab humore in ore ventriculi corrupto accidat, per eā q̄ humorem illum vacuare possunt, sanetur. Cō-

Collatio oris.

Odorē bonum facit, & dentes dealbat. Si a calida intemperie.

E dissimile autem ea, quæ in ore ventriculi sunt, per vinitum educuntur. Quæ vero ratione vomitus sit concitandus, diximus cap. 34. Post hæc medicamenta, quæ itomachum roborare possunt, exhibenda: qualia sunt odoratum rosaceum, diambæ, hydromelum, & eiusmodi. Medicamenta vero, quæ in omni causa conpetunt, sunt geryophylli, mosche, mace, legnum aloet, cinnamomum, rosa, santali, nuc moschata, cubeba, & alia huiusmodi. Hæc sufficiant, quotquot enim sunt alia capitis vitia, quorum nominatum curationem huc in libro non perluximus, facile ex iis, quæ diximus, curate cuius licebit.

Remedia in singulis casibus compertissima.

76 Operum Leonhardi Fuchsi Pars III.
LEONHARTI FUCHSII DE
MEDENDIS SINGVLARVM PARTIVM CORPO-
ris humani a summo capite ad imos vsq; pedes malis, Liber II.

De columellæ & phlegmone. C A P. I.

*γάρφαρον,
αίαν,
Columella
Caulla,
Siga,
Vigna.*

*Curatio?
Veneseccio
diuersa.*



Arnosa quædam particula in summa oris parte dependens apparet, si quis toro ore plutum in aperto lingua deprimat: quod quidem veteribus Græcis duobus appellata est nominibus, γάρφαρον & αίαν, hoc est. *gargula* & *columna*: posterioribus. v. prope omnibus *αίαν*, *columella*, vocata est. Hæc sæpe admodum in phlegmone infestatur, id quod ex influxu sanguinis, aliorumque humorum a capite descendente accidit. Visui vitium subiectum est: acceditque in deglutendo difficultas, *dolor, tumor, & rubedo columellæ, & febris*. Viçtus ratio talis ferè, qualis in reliquis phlegmonibus, constituenda. Conuenit autem maxime quies, & taciturnitas, inediaque. In cœna parum, aut nihil comedendum, Curandi ratio, si plenitudo corporis adsit, a venæ sectione ordiendi erit. Incidenda v. initio vena in gibbero exterior, quam humeralem nominant, deinde ea quæ sub lingua est. Alius præterea clysteribus aut glâdibus subducenda, ut scilicet hac ratione non solum vacuentur, verum etiam a loco patiente cõfluentes humores deorsum trahantur. In hunc etiam usum cucurbitulas scapulis affigere oportet. Neque sane præterenda sunt præsidia, quæ fluxum humorum reprimere valent. Nam ut in aliis omnibus, in quibus ex influxu humorum morbus existit: ita & in hac parte prima auxilia fluxum reprimunt. Adstringentis itaque facultatis hæc esse oportet. Et si quidem moderatus sit humorum influxus, ea quæ moderate adstringunt, qualia sunt, quæ austeram nuncupantur, adsumenda. Vbi autem vehementior fuerit, acerbior etiam sunt adiungenda. Ambo si quidem adstringunt, sed imbecillius austera, vehementius acerbiora, ut *copiosè libro 4. De simplicibus medicamentorum facultatibus capite sexto & septimo monstrat Galenus*. Collutionibus igitur ex his paratis vtendum, inter quas moderatæ sunt quæ ex palmulis decoctis, aliquando sola aqua, aliquando etiam adiecto modico melle sunt. Similiter autem & extolis, pampinis vitis, pdsella, rubo, cypero, cytisinis, filiquis, radice mori, malis austeris, aut acerbis, seminis plantaginis, & torbis. Hisfortiores sunt quæ ex decocto myrti, & baccarum eius, item acerbiorum malorum cotoneorum, & surculis quercus, similiterque glandium eius, mespillorum, & cornorum parantur. Præclarissimæ vero conficiuntur ex gallis, rho obsoniorum, acacia, & vtriusque punici mali floribus, & earundem putaminibus. Mirum autem, quantum prædictorum mixturæ, simplicium & immixtorum vsum excedant. Inter composita vero medicamenta plurimum præsidii affert hoc, quod habet: *Liquorum stillatitiorum rosarum, plantaginis, oxalidis, prunellæ, solani, singulorum vnc. duas Diamoron, succi medicati eribes, vnc. dimidiã. Succi medicati ex oxycantha, drachmas duas & dimidiã. Aceti in quorūm mactatus sit, vnc. vnam. Succi malorum granatorum, vnc. dimidiã. Atque eorum singula, & cum ijs colluatur*. Aliud æque præstans, quod accipit: *Rosarum purpurearum, rubi, & trisq; manipula vnum. Balaustiorum, putaminum malorum puniceorum, gallarum, glandium quercuarum singul. drach. tres. Rhois, hypocistidis, acacia singul. drach. duas. Seminum oxalidis & cotoneorum, vtriusq; drach. vnam. Decoquantur in lib. 1. aqua fontana, dum medietas reliquatur. Iur per colum transfuso adijciatur diamoron, vncia vna. Succi medicati eribes, diascoryon, vtriusq; drach. dua & dimidiã. Aceti optimi, drachma sex. Commixtis omnibus, fiat gargarisma. His quidẽ medicamentis in principio morbi vtendum, & tunc potissimum, vbi affectus non habuerit maiorem causam, nec ægri corpus multis refectus fuerit humoribus, oeq; pars affecta phlegmone natura imbecilla existiterit. Sin contra euenierit, sæpe quidem initio, sæpe vero paulo post, hoc est, tertio die, quippiam ex discussoriis medicamentis commiscendum erit, ut est *lini semen fenugrati, & alba, radix iridis, & aque mel*. Quare Medicus perspecta caloris in ipsa phlegmone magnitudine, considerataque influxus ad eam multitudinem, atque amplius in toto corpore humorum copia percepta, vel eorum quæ adstringunt, vel quæ discutiunt augebit mixturam. Porro quotquot sunt eius generis medicamenta, hæc tepida adhibeantur: quidem ea quæ phlegmone laborant, frigus non tolerant. Post vigorem discussoria medicamenta tunc adhibentur, nisi columella indurati cœperit, tunc enim emollientibus etiam vtendum erit medicamentis, *lini scilicet semine & fenugrati, malua**

*Collutio
es.*

*Composita
medicamē-
ta.*

*Gargari-
sma.*

*Discussoria
medicamē-
ta.*

B

C

D

E

F

A malua, althea, tragacantha, & similibus quibus gargarismata parari possunt. Posthæc discutientibus, ut est hyssopi, origani, pulegij, caricæ, & radicis glycyrrhizæ decocto uti oportet. Si vero ad suppurationem tendat, id quod ex eius colore deprehenditur, nec sua sponte a collutionibus mulsi, & oxymelitis scyllitici pus erumpat, ferro aperienda erit. Post puris eruptionem exter gentibus & repurgantibus medicamentis, verbi gratia aqua hordei cum melle rosaceo mista, aut aqua mulsi, ac subinde glutinantibus, potissimum autem eupatorii succo, utendum.

De laxata columella. CAP. II.

B Non raro accidit, ut columella laxata, radici linguz ac faucibus incumbens, propèdat. Vitium hoc latini laxatam columellam, barbari casum vula appellat. Quapropter initio eandem curandi rationem quam eius phlegmone exigit. Corpus enim, & caput, principio vacuanda per medicamenta capite præcedenti dicta. Sunt qui piper nigrum, quod exsiccat vehementer, in tenuissimum pulverem tritum, ut columellâ contingat, insufflent. Quibus peractis, collutiones & gargarismi ex his quæ adstringunt & exsiccat parentur in hunc modum: Rosarum purpurearum, exalydi, eupatorii, singulorum succulentum manipularum unum. Gallarum, drachmas duas. Aluminis, drachmam unam. Myrrha, thuris, utriusque drachmam dimidiam. Seminis lini, drachmam unam & dimidiam. Coquantur in aqua ad terrias, & iuri decocti per colum transfuso adiciatur aceti optimi, vncia dimidia & fiat gargarisma. Profunt etiani pulveres per calamum vel arundinem insufflari, qualis est qui habet: Rosarum rubearum siccatum, gallarum, aluminis scissi, singulorum drachmam Pulvis. unam & dimidiam. Piperis, cinnamomi, zanzibæris, utriusque drachmam dimidiam. Myrrha drach. unam. Contusa & cribrata per calamum insufflato. Nucis etiam acete uti debet, & exsiccat & palmularum ossa ubi velis sufficienter exurito, & ambarum aequalis partes misce, ac sicis tritis vistor. Item gilla immatura, salis ammoniaci, utriusque drachmam unam. Trita insufflato. Cinis item hirundinum exustatum tenuissime confusus, cum melle permixtus, vuzque dilutus prodest. Per ea itaq; quæ dicta sunt, innaturam suam reducere columellam oportet, omni conatu & molimine adhibito, neque sistendum ad eius excisionem. Quod Hippocrates quoque præcipit, qui sic scriptum reliquit: Gurgulis sine pericula præcidit & 1. Præg. 13. scariçari quas rubis ac magni fuerit hand possit, senim phlegmone & sanguinis profusio accidit. Proinde oportet hunc alij quibusdam medicamentis per id tempus extenuare eam. Hæc ille. Quum autem per præsidia, quibus extenuandi inest facultas, nihil iuvantur, atque adeo suffocationis periculum imminet, ad eius excisionem veniendū erit: antea tamen alio vacuata. Quod Hippocrates etiam loco prius citato diligenter monuit, dicens: Fbi vero secretum fuerit omne id, quod vnam appellant, sitque pars gurgulis: vis extrema maior & rotunda, superior autem tenuior: per illud tempus minus moliri tutum est. Sed præstat simul aliud Columella subducere, antequam manus adhibeatur, si tempus ita permittat, ne æger stranguletur. Porro ut manum commodius adferas, æger in splendenti & clato loco collocetur, & tunc quidem os eius diducatur: mox vero immisso forcipis extremo, ipsa columella producta obtorqueatur. Obtorta enim velut stupida efficitur, & illaqueata curuatur citra magnam sanguinis eruptionem. Quapropter immorari oportet aliquandiu, ac eam dennerere quousque æger tolerare possit: tuncque auferre non supra forcipem incisione facta, sed ad eius fundum. Quum enim pelliculis referta sit ipsa columella, & ob laxitatem cedat, proluxa sane inspicientibus apparet. Vnde multi in experti Medici, tunc per errorem, tunc per ignorantiam alius incidentes, eam funditus auferunt, maximeque incommodi auctores ægro existunt. Columella præcisa, caput reclinetur, ne sanguis ad interiora reat: ac subinde os cum decocto rhois, acacia, gallarum, adiecto stillatio rosarum liquore colluatur. Postea ea quæ cicatricem inducere possunt, adhibeantur.

De tonsillarum phlegmone. CAP. III.

F Tonsillæ, quæ Græcis τριφυλα vocantur, Galeo lib. 3. Aph. Comment. ab auctore, sunt phlegmones eorum, quæ iuxta lithum sunt locorum. Hic vero per lithum oportet intelligere partem illam, quæ os & gulam interiacer. Sic autem per metaphorâ nominatur, ab iis, qui proprie dicuntur lithimi, qui angusti quidam terræ inter duo maria sitæ transitus existunt. Giandium vero, quæ in fine oris vinnquinguz apponitæ sunt, 7. quidam Tonsillæ. lithimus.

78 Operum Leonhardi Fuchsi Pars III.

A

Causa.
Signa.
Vicia.

Cura.

Suppuratio
non nova.

e defluxu ex capite tumores & phlegmones, Græcis *ἀμύδης*, ut loco iam citato refertur *Galenus*, appellantur. Vt cum ipsas etiam glândulas Græci *μαστοπιαγγί ἀμύδης*, quod scilicet circa isthmum, & sibi ex opposito sitæ sint, nominant: quemadmodum Latini *trissillæ*. Barbaram sectantes Medicinam, *amygdalas* nuncupant. Hæc sane frequentissime phlegmonem incurrunt: calidi enim & humidus sunt earum loci. Hoc vitio magis corripuntur hi, qui plurimo sanguine abundant, & pueri, atque infantes adhuc lactentes, ex lactis hauſtu. Accidit etiam plerumque adultis a nimia meri potione, & a multa ac ausidiote deuoratione ciborum, maxime acrium, & asperitatem inducentium. Sic affectus trāsglutienti accedit difficultas, & dolor, aliquando etiam febris. Incipiente itaque phlegmone, cibum subtrahere oportet, & aquæ potum, aut aquam, n̄ quaparum cinnamomi sit decoctum, exhibere, præsertim febre simul irruente. In vniuersum vero victus ratio talis sit, qualis in aliis phlegmonibus. Cibi autem sint exigui & fortiles, quod alias deglutiri non possint. Quod ad curationem spectat, si levis fuerit phlegmone, gargarismis adstringentibus & reprimentibus, quales in principio phlegmone laborantis columellæ assumuntur, vtendum. Cauendum tamen inter initia, ne mel gargarismis admisceatur: habet enim acrimoniam, & irritat. Verum si phlegmone vehemens fuerit, & petiolum suffocationis imminet: vena gibberi exterior, quam humeralem vocant, eiusdem lateris incidenda est, repetita sanguinis detractione: maxime si iuuenis sit æger, & multo sanguine abundet. Quod si venter non probe egerat, iniciendum est clyster. Infantium vero ventres glande immissa, & ledi illitionibus irritare oportet. Post vacuationem reprimentibus vtendum medicamentis, idque ad morbi vique vigorem. Quapropter pisanæ succum, in quo vix pallax decoctæ sunt: aut sapam, vel decoctum glycyrrhizæ, aut ficuum, aut hyssopi gargarisandum. Hæc vero omnia, ut entes quos, minus tepida sunt exhibenda. Extrinsecus autem leniter fouere conuenit spongiiis impositis, aqua in qua flores chamæmeli, vel althææ, decocti sunt. Cataplasmata quoque ex farina hordei, semine lini, fenogreci, & similibus imponenda. Remittente autem & declinante phlegmone, mel in gargarismo admiscere conuenit: quod in principio, & in augmento minime faciendum, ne acrimonia, quam obtinet, fluxum concitet. Hoc etiam tempore calidiores gargarismi prosunt. Extrinsecus autem lana mollis, oleo imbuta, collo circumponenda. Quod si ex vsu acriorum collutionum aut gargarismorum phlegmone exasperetur, & mordacitas inde accidat, lenioribus vtendum, qualis est *priana succum*, lac etiam repidum gargarisandum. Remittente vero phlegmone & dolore, prædicta oris remedia sunt illinenda, immisso digito medio: ita vt cum leni adhibita illitione partes tonsillarum, quæ intumuerūt, comprimantur, quo contentam in se materiam excludant. Veruntamen non violenter comprimere oportet, quemadmodum quidam faciunt: qui auctores ob id fiunt, quo phlegmone amplius augeatur. Si tamen aliquem hac ratione lædi contigerit, contentietur exhibitione lenientium gargarismarum, nihil illinentes. Quod si a prædictorum remedium ad motionem melius non habuerint ægri, suppurationem expectare oportet, quam etiam ex phlegmonis augmento, & exacerbationibus ad vespertam fortioribus cum horrore, inæqualitate, & aliquando cum febre dignoscere licebit. Vbi autem suppurationem futuram speramus, coadiuare oportet, vt quam citissime fiat. Quare tunc exhibendi sunt gargarismi calidiores, velut aqua multa calida, & decoctum caricarum, hyssopi, & seminis althææ. Extrinsecus cataplasma ex hordeacea farina, & fenogreco, cum decocto caricarum, althææ & melle. Quum suppuratio perfecta fuerit, dolores minuantur, & phlegmonis tumor mollior reditus, digito cedit: tunc sane acriores collutiones exhibendæ sunt, cuius generis sunt, *pulegium*, *hyssopum*, *thymum*, *calamintha*, & *thymra in sapa*, aut *mulsa decocta*, & *gargarismata*, ut scilicet abscessum rumpant. In cibo accipienda frusta panis, aqua macerata, quæ maxima, & reliqua similiter quæ eis pro cibo offeruntur acuatim ingerant. Vehementiore enim ex his circa tonsillæ obuolutione facta, consimili modo tumores adficiuntur, peninde ac si sectionem sustinerent. A ruptura caput ægri inclinetur, ad humeris commodiorem exclusionem, & aquam nullam gargarisset per se, postea etiam admixto lenticulæ, & rosarum decocto. Atque his sane immoderandum est, donec penitus ad cicatricem perducatur.

Dr

De serpentibus & malignis tonsillarum ulceribus. C A P. IV.

- A** Maligna tonsillarum ulcera interdum præcedente earundem fluxu incipiunt. Ali- Causa
quando autem a consuetis fieri phlegmonibus, potissimum efferatis, perficiuntur. Signa
Fiunt autem frequentissime pueris, æque etiam ætate iam perfectis, maxime illis, qui
vitiolis humoribus abundant. In pueris vero aphtha præcedente omnino perficiuntur.
Colore similia sunt crustis, quæ ferro inuruntur. Accidit etiam ægris siccitas in trāglu-
tiendo, & suffocatio coaceruatim incidit, maxime quum rubor subit mentum. Vbi hu-
morum a crumonia præcesserit, nome quæ depascitur locos, excipit, succeditq; vna pu-
tresfactio. Festinanter his auxilium adferre oportet: & si sunt ætatis perfectæ, & nihil sit Causa.
quod prohibeat, confidenter brachii venam exteriorem, aut si illa non appareat, mediā
incidere conuenit. Si vero virgines fuerint, quas circa ætatis vigorem, dum mensis pur-
gationem appetunt, hoc vitium crebro apprehendit, tunc eis malleoli vena sunt inci-
denda, vniæ sanguinis detractione facta: non tamen vsque ad animi defectionem, ne
subinde profluentibus mensibus vitius plane concidat. Deinde alius clysteribus, gland-
is, & sedis illationibus mouenda: atque omnibus modis conandum erit, vt auctio
ab afflatis partibus fiat. In quem vsam cucurbitule iuxta lumbos affigendæ, ac ligatu-
ris extremitatum vtendum. Postea gargarismis vti decet, *supra in capite De columella phleg-*
monibus, & sequenti dictū. Post morbi principium diatomon colluendum exhibeatur,
ex aqua calida, vel melle permixtum. Tumeriam iridis decocto, & alio loco iam cita-
to commemoratis vti licebit. Conandum autem est in vniuersum, ne digitum quidem
consulis viceratis admoueamus, aut leni saltē tactu manum aduoluamur. Etenim in-
sciti, ad quos maxime in rebus dubiis homines errore quodam confugiant, vehemen-
tius illinunt, simulque locum laborantem comprimunt, ac crustam detrahunt: quod
minime facere conuenit, priusquam eleuatam & vix innitentem crustam cōspiciamus.
C Quod si enim adhaerentem adhuc crustam auellere aggrediamur, vlcérations magis
in profundum procedunt, & phlegmones consequuntur, augmentque dolores, & in
vlcera serpentina proficiunt. Itaque sicca quidem remedia iniussile conuenit: liquida
vero cum pinnula illinire, ita vt quantum licuerit, quam penitissime pinnulam immut-
tamus. Mirabiliter autem crustas auferi stercus caninum, cum melle illitum: quod tū
optimum erit, quum ossibus canes antea per biduum fuerint nutriti. Magnopere enim Stereus ab
auxiliatur, neque odium sui inducit, neque insuauitatem repræsentat in cibo oblatum. mouet.
D Cinis item vltarum hirundinum, & centaurii maioris viticinis cum melle. Oportet au-
tem post irritationes medi camentis factas, lenire cum *ghysyrhiza decocto*: & eo, qui ex
maisthe, myrrha, tragacanthis, amylo, & croco constat, gargarismo. Cohirto autem iam vice-
repascente, lac gargarisandum, lemnia terra permixtum. Quid multa? in repurgandis
explanandisque vlcerebus maxime sollicitum esse oportet. Infantes enim pluri inui in vl-
cerum purificatione conuulsionem passi sunt. Aliqui vero via transfusurandi exliccati,
sunt strangulati. Forinsecus certe fomenta adhibere conuenit, & cataplasmata, cū eu-
sione, ne refrigeremus. Feliciter enim res procederet, si intrinsecus detentam materiā
extra posset transferre. Contegantur itaque semper post cataplasmarum ablationem,
partes circa mentum, circumpositione lanarum mollium in oleo nardino irrigatarum.
E Porro vbi crustæ solutæ fuerint, & vlcera ipsa purgata, hoc remedio vtendum erit, quod
habet: *Florum rosarum purpurearum, drachmæ tres. Croci, drachmam vnam & dimidiam. Ba-*
lasterium, drachmam dimidiam. Myrrha, scrupulam vnam. Nucum pincarum r. purgatum,
drachma dua. Amylo, drachmam vnam. Rhos culinary, aluminis fissilis, utriusq; drachmā vnam
& dimidiam. Trius & subactis melle, ad illutionem vtire.

De angina. C A P. V.

- F** *Τράγος ὀξυγόγος* Græcis, Angina Latinis, pprie phlegmone est, q̄ in gutture vel fau- αὐτόγγοι
cibus fit. Sic dicta quidē *ὀξυγόγος ἢ ὀξυγόν*, hoc est, a suffocando, quod exitusum *ὀξυ-*
εὐσιμῶ sit vitium, quod strāgulat præsentem vīa discrimen inferre solet. Hippocrates tamen Angi-
& alii veteres omnia vitia, quæ in locis iam dictis acedunt, & quas spirandi comitat dif-
ficultas, angina nomine appellant. Porro angina quatuor differtētiæ existunt. Vna, quā
fauces phlegmone tentantur. Per fauces autem, *ὀφύρα* Græci vocant, *ὅταν intra οἱ, ὅταν τῷ*
γόλῳ, ὅταν ὀφύρα ἢ τῷ ἄλῳ extrema conueniunt, intellige. Altera, quā nec fauces, neque reliqua Angine
difficilis
quatuor
fauces.

- A** quem sane vsum pedes aqua calida foueri debent, & externæ partes valide deligari ac tritari. Collum etiam lanis succidis, aut oleo calido imbutis contegendum. Gargat-
sonatis quoque statim per initia vitendum, quæ neque vehementer repellunt, neq; so-
lum discutiant. Quæ enim admodum repellunt, ea humores ad pulmonem trahendo,
suffocationis periculum afferunt. Quæ vero tantum discutunt, plus ratione sui caloris,
quam patitur, attrahunt. Exterius autem in nullius anginae specie extrinsecus repri-
mentia adhibenda sunt, ut quæ humorum defluxum ad interiora propellant, & suffo-
cationis periculum afferant. Quapropter vbi initium fuerit cum multa phlegmone, ea
quæ leniter adstringunt ostendere oportet: velut est rosarum, lentium, & palmarum deco-
ctum: aut certe adstringentibus gargatimsis, supra capite De columella phlegmone dictis, a-
liquid medicamentorum diseuientium commiscendum. Eius quidem generis est flos
B rosarum, aut rhus cum aqua mullâ decoctus, & myxarum decoctum. Quum morbus viger con-
sistitve, iis quibus discutendi tantum facultas inest, vitendum præpropere prædiis: ut
est decoctum fenograci, ficum, vuarum passiarum, glycyrrhizæ, vel valenitiorum, tridu nimirum
radici, hyssopi, nigellæ, abrotani, cum oxymelite. Licebit itaque hoc tempore vti tali garga-
rismo, qui habet: Glycyrrhizæ decoctæ, vnciam vnam. Vuarum passiarum, vnciam dimidiam. Caricæ
Caricæ numero sex. Fenograci, drachmas duas. Hyssopi, abrotani, vitæque manipulum di-
midium. Coquantur in libra vna fontana aqua, donec medietas absumatur. Iuxta decocti colo-
transfuso addeitur mellis rosæ colati, vncia vna & dimidia. Oxymelitis simplicis, vncia vna.
Commixtis omnibus, fingatur gargarismus. Item stercore caninum, quale prædiximus ca-
C pite quarto aridum confusumque, & cribratum cum melle, quæ penitusissime illinum, ut transglu-
tere possint, præstantissimum, Galeo etiam auctore remedium existit. Est autem eiu modi,
quod colore candidum est. Hirundinum similiter vssarum cinis mirè efficax esse solet. Hinc
est quod Cornelius Celsus scriptum reliquit. Si quis pullum hirundinis com. dicit, angina
toto anno non periclitabitur. Fors denique ceteri, quæ concoquere & discutere possunt
adhibeantur cataplasmata, quale est quod accipit: Farina seminis lini, fenograci, hordea-
cea, singul. vnciam vnam. Semen albeæ, drachmas tres. Maluæ, sterum chamæmeli, meliloti, sin-
gul. manipulum vnum. Caricæ confusarum, vnciam dimidiam. Nidi hirundinis, aut cineris
hirundinis vssæ, drachmas duas. Coquantur in aqua donec mollescant: dein in mortario
contundantur, & infornetur cataplasma. Vei adiectis oleorū chamæmeli, lilacei, vitæque
vnc. vnam & dimidiam & iterum ebullitis, fingatur emplastrum. Neque inutile erit, si colli
D oleis chamæmelino, anethino, lilaceo unguatur: aut decocto fenograci, meliloti, chamæmelis
ueatur. Quæ angina infestatur, triduo aqua mullâ pro cibo vitantur: inde præstanz cremo-
re pet se, aut cum suau quada potione. Præditus enim est is succus facultate extenuandi,
discutendi, alendi, & refrigerandi. Vbi phlegmone remiserit non nihil, & æget iam me-
lius deglutire ceperit, ouorum lutea perliquida, ac sorbitio ex alca præbenda. Item præ-
sanacum in fœco pulli gallinacei confecta. Pullorum quoque gallinaceorum contusorum sorbi-
tione. Quid multa? cibi & potantis vitibus respondant: ideoque immodica alimenta
vitanda. Somnus quoque in aliis omnibus phlegmonibus, sic in angina omnium maxi-
me fugiendus. Nam in somno, ut Hippocrates dixit, sanguis intro tepit, atque adeo humo-
rum ad locum patientem defluxum auget.

De tussi. Cap. VI

- T**ussis quæ non est nisi expultricis facultatis instrumentorum respiratori seruiens in motus,
ad eam symptoma: variz sunt causæ. Nam interperies frigida instrumentorum res-
pirationis interuentum Galeo lib. 5. Desympt. canisfit esse, tussim efficit. Humor item a-
capite ad asperam arteriam destillans, & sola asperitas membranæ asperam arteriam in-
trinsecus ambiens, tussim irritant. Qui præterlabitur etiam potus & cibi, tussim mou-
uent. Limbrici quoque stomachum intestantes, tussiculas paruas excitant. Aeris deni-
que humor stomachum perturbans, ac irritatæ aliquam qualiterat ad fauces demit-
tens, tussim facit. Insuper humor in pulmone & thorace detentus, in pulmonis phlegmo-
ne, morbo laterali, & tabe, maxime tussis causa existit. Inter ea quæ extrinsecus adueniunt,
atque tussim mouere possunt, sunt fumus, puluis, & quicquid est eorum quæ asperam
arteriam exasperant. Signum autem propter solam frigidam respirationis instrumen-
torum interperiem tussientium est, quod sic affecti nihil inter tussendum expuunt

82 Operum Leonhardi Fuchsi Pars III.

neque violenta tussis, neq; coacta, sed adeo exigua est, vt non solum per spiritus detentionem supprimi, & ne eueniat prohiberi: verum etiam, nisi magna admodum fuerit, sanari possit eo quod per spiritus inhibitionem frigefactæ particulæ calefiant. Præterea qui hæc tussis laborant, per crebras inspirationes magis irritantur, frigida tate videlicet exinde intensiore facta & aucta. Quare si hileniter inspirant, ac aerem attrahunt, & in calida domo versantur, parum aut omnino nihil tussit. Facie denique sunt pallida, sicut nulla premantur: calidis optime, frigidis male afficiuntur. Quæ singula, vt alia omnia, Hippocrates libro sexto Epid. 2. Aphor. 22. breuiter admodum his complexus est verbis, inquit: *Tussis sicca, leuiter irritantes, non admodum frigidosa, non a maligno, sed vento potius accidit. Id vero hinc manifestum sit, quando loquuntur, aut si aperiant, tunc tussit: quum vero non, minime.* Hæc ille. Quæ vero eum titillatione partium ab vtraque parte palati contingunt tussis, palam ostendunt defluxum a capite ad asperam arteriam deferri, itemque ad pulmonem: id quod ex difficili quæ comitatur inspiratione, facile deprehenditur. Quod si sic affecti nihil exspuant, tenuem esse defluxum indicat, qui expulsionem spiritus dissectus, præ tenuitate sua non vitra fertur, sed rursus fluxum reflectit. Ratio victus pro causarum diuersitate variabitur. Si enim ex frigida in temperie instrumentorum respiratori seruiuentium orta fuerit tussis, aer & ventus qui inspirantur, cibi etiam & potus frigidi virandi erunt. Sin ob humorem a capite defillantem ex citatibus tussis, talis sit victus, qualem supra in capite De defillatione descripsimus. In vniuersum autem falsa, acria, & quæcunque arteriam exasperare valent, fugienda. Porro tussis ex frigida tate instrumentorum respiratorum inspirationis orta, per præsidia quæ eadē exalfacere possunt curabitur. Ceruix itaq; lanis calidis vestiatur, raro inspiretur: quod spiritus oppressio, vt paulo ante dictum est, non solum tussim impedit, imo etiā sepius sanat. Quare multum conducit vt egrotantes in calida domo versentur, & leniter admodum inspirent. Thorax etiam calidis vnguētis, quale est irinum, lilaceum, chamæmelinum, anethinum, & eiusmodi foueatur. Si vero humor tenuis & acris ex capite in asperam arteriam & thoracem defillans tussim excitauerit, rum per boni succi cibos potissimum, & per medicamenta quæ refrigerant, spissant, leniunt, acrimonia inq; ac mordacitatem temperant & obdunt, sanabitur. In quem vsum conuenit exhibere serapium violaceum, nymphetæ, de papauere, antidota diatragacanthæ, diapenidion sine speciebus, pilulas bechicas, & id genus alia. Item ea etiam medicamenta, quæ a veteribus dolore leuantia & arteriaca nominata sunt: de quibus copiosissime scribit Galenus libro septimo De compos. medis. localium. Inter alia vero hoc potissimum confert eclygma, quod habet: *Sacchari violacei & nymphetæ vtriusq; vnc. dimidium. Diatragacanthæ, diapenidion sine speciebus vtriusque drach. sex. Succij glycyrrhizæ, drach. duas. Pistularum bechicarum, drach. vnam. Syriaci calamitisidis, drach. vnam & dimidium. Myrrhæ, reserum socarum, vtriusque drach. vna. Tragacanthæ, nucum pincarum, vtriusque drach. dimidium. Serapij violacei quantum ad excipiendum satis est, fiat eclygma.* In eum locum referenda venient & ea medicamenta, quæ supra in capite De defillatione dicta sunt. Ceterū si crassus & viscidus humor tussis causa fuerit, per ea quæ incidunt & extenuant, illi medebimur. Quare tum exhibenda egrotantibus serapia de glycyrrhizæ, de hyssopo, de marrubio, & calamithæ, oxymeli, & sylvestris. Aut decoctum hoc, quod accipit: *Radici miridii, petrosilini, glycyrrhizæ, singul. vnc. vnam. Radici belng, vnc. dimidia. Caricarum numero septem. Vuarum passerum mundatarum, vnc. vna. Seminum vrticæ, anisi, feniculi, sing. drach. duas. Hyssopi, adiantis, scabiosæ, marrubij singul. manipul. vnam & dimidium. Agarici optimi, drach. tres. Coquantur in aqua fontana iusta quantitatē, donec tertia pars absumatur: dein colatur transfundantur, & iuxta decocti adiciantur serapij de hyssopo, & marrubio, vtriusque vncias duas & dimidium, fiatque potio.* Postea, si ita et egrotans esse videbit, corpus per ea medicamenta quæ crassos & lentos humores purgant, euacuandum. Inter alia vero complura, quæ in superiore libro a nobis dicta sunt, vniue confert agarici dilutum quod in eum paratur modum: *Accipe agarici electi, drach. duas. Zingiberis, serap. vnum. Salis subtilis, grana tria. Trita macerentur per noctem in vini albi odoriferi, vnc. duabus. Liqueorisque stillatij absinthij, & feniculi, vtriusque vnciam vnam. Mame colentur & exprimantur, aque adiciantur antidoti Indi maioris, drachma dua & dimidia. Oxymelitis sylvestris, vnc. dimidium, & formetur potio. Vacuato tandem corpore, eclygmata, quæ officinis hodie Arabica voce loeb appellantur, deuotanda eunt, commixtis interdum alijs antidotis in hunc vel consimile*

- A** Accipe ecligmas epino sani & experti, eseylla, singul. drach. tres. Diatreos solemonis, vnc. vnam. Eclogia. Paffilorum thoracis adaperum, drach. vnam & dimidiā. Pulueris diapienidion cum speciebus, drach. vnam. Pulueris radicis belenij, iridis, vtriusque drach. duas & dimidiā. Succis glycyrrhizæ, drach. vnam & dimidiā. Serapij de marrubio, quantum ad excipiendum sufficit. Thorax przteterea extrinsecus inungatur oleis calidis, lilaceo, irino, amygdal. dulcium, adiectis pinguedinibus, & aliis hoc quidem modo: Accipe oleorū lilacei, amygd. dulciū, vtriusq; drach. tres. Pinguedinis Vagueniæ. gallina, drach. vnam & dimid. Nucyri recētis, drach. duas. Succis famogræci, radicis althea, vtriusq; drach. vnam. Stryacis, drach. dimidiā. Pulueris radicis belenij, iridis, vtriusq; drach. vnam. Croci, scrup. dimi. Cnm cera quod satis est, fiat vnguentum. Reliqua quæ ad tussis curationem
- B** necessaria sunt, ex cap. De destillatione petenda erunt.

De asthma. CAP. VII.

- Q** Vi citra febrē crebro respirant, vt solent, qui citatiore cursu fatigati sunt, a sympto-
mate, quod superuenit, Medicis Græcis *ἀσπυῖα*, Latinis *ambelysi* & *suffrursi* appel-
lantur, iidem ab alio symptomate, quod scilicet perpetuo vniuersum supra thoracem
corpus penitus rectum habere coguntur, metuentes ne suffocentur, *ὑπὸ στῆθος*, quasi di-
cas, non nisi recta cervice spirantes, nominantur. Inspiratio enim minor ipsis contingit, quā
respirationis frequentia expostulat, quamvis thorax plurimum ipsis diudatur. Ex quo
manifestum fit, coarctationem locorum præter naturam intrinsecus adesse, cuius etiam
manifeste ægri sensum percipiunt. Fit itaque asthma, quum aut crassorum & tena-
cium humorum copia pulmonis bronchiis cartilaginibusve fuerit infarcta: aut tumor
quispiam abscessui similis in ipso constiterit. Similiter vero difficulter spirant, qui aspe-
ram arteriam a multa destillatione repletam habent. Facile autem inuicem hæc mala
distinguuntur. Nam destillatio etiam sanis ex manifesta causa confestim accidit, in
totum fere citra febrē, concomitantibus etiam propriis destillationis indicis. Si vero
tumor abscessui similis in pulmone fiat, necessario febris consequitur: neque ita diu
post, phlegmone suppurata, pus cum tussi reicitur. Si autem nonnullis crudum tuber-
culum gignatur, ii neque grauitatem magnam sentiunt, neque difficultate spirandi ad-
modum infestantur. Qui vero proprie *asthmatici* & *arthropneici* appellantur, in totum
febrē non habent, granitatis autem sensus eis contingit, neque quippiam purulentum
per sputum reicitur. Porro vitios ratio in vniuersum calida & sicca sit. Quapro-
pter vitandus aer frigidus & humidus. Carnibus vtendum perdicum, auicularum non
tatarum, gallinarum, & pullorum gallinaceorum, capotum, phasianorum, & eiusmodi.
Fugendi pisces, fructus, legumina, & item omnia alia quæ crassos & lentos humores
procreare possunt. Vsus frequens sit hyssopi, oreosolini, & fœniculi. Vini quidem
potio ambobus conuenit vitis, saltem tenuis substantiæ. Potus vero in vniuersum sit
exiguus, iis quibus abscessus oboritur: multus autem, quibus bronchia, & cartilagines
tenacibus & crassis humoribus sunt obstructa. Nam potus multus eos largiter humectat
adeoque vt humores facilius efferantur tussiendo efficiunt. Siquidem eos humores re-
purgantia & abstergentia medicamenta, necessario tussis commouent. Verum non
facile per sputum reicitur ob crassitudinem, id quod repurgatum & abstersum est: hu-
medicatione igitur multa, quo facilius efferatur, indiget. Alias potus multus spirandi
difficultatem augeat, ventriculo multo potu distento & septum transuersum premente.
Tutius igitur in pastu parce bibere, a pastu vero aliquantisper a potu prorsus abstinere,
& interea os & guttur aliquo liquore conueniente colluere. Exercitio ante cibum vt-
endum, at nequaquam subito, quod complures hac ratione exstincti sint. Frictiones
thoracis profunt. Somnus sit moderatus, & nocturnus. Animi perturbationes, ira
potissimum & mœror, fugiendæ. Ceterum curatio prædictorum vitiorum quiddam
commune obtinet, quiddam etiam proprium. Commune quidem vtriusque, vt re-
dundantia humoris hæc vitia procreant absumatur & aboleatur. Proprium vero, vt
si a crassis ac tenacibus humoribus oritur vitium, per extenuantia & extergentia me-
dicamenta sanetur. Si vero a tumoribus abscessui similibus vitium fiat, per extenuan-
tia & exsiccantia. Quæ quidem curandi ratio vniuersis in profundo corporis laten-
tibus phlegmonibus communis est. In crassis itaque & tenacibus humoribus conue-
niunt ea quæ citra vehementem calefactionem extenuant & abstergunt medicamenta.

84 Operum Leonhardi Fuchsi Pars III.

Preparatio
humorum.

Siquidem ab immodico calore, veluti etiam frigore, crassi & tenaces humores magis A

crassescunt, coguntur, contrahunturque ita vt subinde difficulter abstergi & auelli possint.

Quare ex eis maxime prodest *oxymeli sylvestricum, ipsaq; sylla assa, cum mollitrita & delincta.*

Scrapia item ex glycyrrhiza, & marrubio, & hyssopo, atq; decoctum quod paulo ante in capite De tussi

commemoramus. Quod ad euacuationem spectat, si necessitas urgeat, venam in gibbero

media, aut interna pte omnibus vis incidenda, & tantum sanguinis, quantum vires pati-

tuntur, detrahendum. Sin corpus plethoricum haud fuerit, præmissa humorū ad va-

cuationem præparatione, medicamenta fortiora, quæ crassos & tenaces humores va-

cuant, frequenter propinanda. Quæ in hunc vium conueniunt catapotia de *agarico,*

& cochia vocata, item diasturpetū cum rhubarbaro scinitico, antidotum Indi, & diaphenicon. B

Dandum etiam *agarici dilutum, quod præcedenti capite descripsimus.* Alius præterea clyste-

ribus validioribus eluenda. Vomendum etiam per interualla ex sumpto raphano, & ali-

is quæ vomitum citant, de quibus *cap. 34. libri primi diximus.* Interea tamen dum fre-

quentior fit purgatio, exhibenda etunt medicamenta quæ sensim & paulatim humo-

res in thorace extenuare ac discutere possunt. Proinde *aristolochia rotunda, heleny & irida*

radices, cortice semen & spodiū, hyssopus, nigella, marrubium, calaminta, & id genus alia me-

dicamenta, e quibus decocta, vel ecligmata construere licebit, assumenda. In quem v-

sūm etiam ea ecligmata quæ supra in capite De tussi recensuimus, competent. Vñce v-

studendum, vt hæc medicamenta quæ expulsiōnem crassorum humorum thoracis et horac-

is iuuant, cū humectantibus, tū forbitonibus & potionibus exhibeantur, *vt li. 3. simpl. c. 13.* C

Galenus docet. Extrinsecus thoraci cataplasmata & ficubus, & hordeacea farina, magis ve-

ro ex loliacea habente resinam, mel, & ceram commixta, imponenda. Thoraci etiam

olea & vnguenta calefacientia, irinum, anethinum, rutaceum, & eiusmodi ad mouen-

da. Tale est, quod habet: *Oleorum anethini, rutacei, virisq; vnc. dimidium. Olei irini, drach.*

tres. Adipis gallinae, anatis, virisq; drachmas duas. Radicum iridis. heleny, draconty maioris,

singul. drach. vncem. Seminū lini, scrup. duas. Styraeis, drach. tres. Cera quod satis est, fiat vnguen-

tum. Thorax tamen nunquam non antea fricandus linteo aspero, quo referatis ac didu-

ctis meatibus, vis medicamentorum ad profunda promptius penetrare valeat. Ceterū

his etiam medicamentis vrendum, quæ exulcerare cutem, & lanien fetolosque humo-

res extrahere possunt: qualia sunt quæ rubefaciencia nominantur. In hunc vsum thorax D

& pectus cum vrticis conficari & eadi potest. Loca autem rubefacti cum lauacro ac o-

leo calido curandi. Porro in vitio inueterato, & vbi omnis medicina frustra adhibita

fuerit, ad vitionem confugiendum erit. Quæ qualis esse debeat, docet Aetius *li. 3. c. 37.*

Quod ad abscessus attinet, qui attenuantibus & resiccantibus indigent medicamentis,

vt dictum est, sciendum eos aromatum maxime facultatibus gaudere, quod scilicet hæc

omnia sint tenuium partium, & exsiccatoria, nec non calefacientia. Quare tū antidota

ex his composita, vt est theriaca, mithridatica, antidotum e mofcho dulce, diambala, o-

doratum rosaceum, & id genus alia, in maxime danda sunt asthmaticis.

De pleuritide. CAP. VIII.

Pleuritis.
Dolor la-
teralis.

Pluris, exquisitæ & ptoprie loquendo, phlegmone est membrana intrinsecus costas & la- E

tera succingentis. Latinis, *lateralis dolor* appellatur. Quum verò dicitur phlegmonem

esse membranæ costas succingentis pleuritum, non intelligendum est solum membra-

nam. Nam vna etiam circumpositæ eius partes phlegmone laborant, musculi nimirum

intercostales. Nec temere adiectum est, exquisitæ & ptoprie loquendo: siquidem ex

cruditatibus plurimis, cibisque crassis ac pituitosis, erudi lentique & crassi humores in

corpore generantur, qui nonnunquam repente se in vacuum thoracis locum, *Adip.*

lib. 3. cap. 61. testē, ingerunt, aut in ipsum etiam pulmonem, atque sua multitudine suc-

cingentem latera intrinsecus membranam distendentes, inferunt dolores, vt imagi-

natio facit phlegmonis imperitis ex libeat. De ea itaque hic nihil agetur, quod eu-

ratio eius ab asthmatis curatione parum, aut nihil ablit. Pleuritis, *qua succingentis intrin-* F

secus latera membrana est phlegmonē, sit ex sanguine copioso calido, ad iam dictam mem-

branam præter naturam confluyente, nonnunquam bilioso, aut pituitoso, aut melan-

cholico, id quod sputum indicat, vt paulo post latius dicemus. Hanc consequitur spi-

randi difficultas, tussis, febris continua, dolor vehementer pungens, pulsus durus, &

setæ modo asper. Quod si sputum rubrum & cruentum fuerit, sanguinem superare

signi-

Causa.

Signa.

A significat. Si flavum & subpallidum, flavam bilem. Quemadmodum si album fuerit, & leuiter spumofum, pituitam: nigrius vero, melancholiam in sanguine prævalere monstrabit. Succo pituitæ primis duobus saltem diebus contentus in cibo æger sit. Deinde cum pituita amygdalæ mundatæ & tritæ decoquantur, idque marumino potissimum tempore. Vesperti sumat lac amygdalarum, aut panis puri micæ cum iure gallorum, maxime ubi ægri vires imbecillæ fuerint. Pisces etiam laxatiles, in declinatione potissimum morbi, dare conuenit. Acerba & adstringentia in vniuersum omnia vitanda. Potus sit aqua, in qua decoctum sit cinnamomum. Frigidam aquam, quod spiritum in crudelescere faciat, tanquam summe exitiosam vitet æger. Vino quoque omnino arceatur. Decumbat in latus affectum, quod is decubitus sit indolen-

Curatio.

B tior, iram & motorem, aliasque animi perturbationes molestas fugiat. In curandi ratione principio diligenter a Medico erit considerandum, num corpus ægri plenitudo dinelaboret, nec ne: ut nimirum intelligat, quando calorificis medicamentis inter initia dolor mitigari ac dissolui possit, & quando minus. Si enim corpus plethoricum non sit, tum incipiente phlegmone, calefacientibus medicamentis & fomentis dolor mitigari & discuti debet. Nempe, Galeno lib. 2. *Vitæ acutæ, comment. 1. teste*, fomenta calida cutem ipsam ad perspirationes rationem efficere; phlegmonisque sanguinem tum tenuare, tum per halitum digerere consueuerunt. Quæ si facta fuerint, non solum aliquid sanguinis euacuabitur, verum etiam partes affectæ, quæ minus distenduntur, mitius subinde dolebunt: At si vel plethoricum corpus fuerit, vel

Fomenta calida.

C malo succo redundet, ut lib. 3. *Ther. meth. testatur Galenus*, curatio per ea quæ sic calent, non incoanda: fluxionem enim ad partem affectam citant. Siquidem pars cui calorifica hæc admoventur, plus trahit quam euaporet. Quapropter tum fomentorum calidorum, vrpote quæ dolorem soluere non possunt, nullus esse usus debet, sed totum corpus venæ sectione præuacuandum erit. Hæc sane respexit Hippocrates, qui lib. 2. *Vitæ acutæ*, ab initio statim sic scriptum reliquit: *Lateralis dolor sine iei per exordia fuerit, siue postea obortus sit, tentare calidus fomentis dissoluere, non abs re existit. Tentare, inquit, non abs re existit*, quasi dicat: *Quam fomenta calida dolorem non soluerint, iei diutius vitandum non erit, quod scilicet sanguinis in phlegmone copiam dissoluere haud possint: sed confestim ad totius corporis, per sanguinis missionem, remedium vacuationem.* Quamquam, vt dicam

D quod sentio, iudico Hippo. lib. 2. *de vitæ acutæ morborum aphor. 2. & sequentibus*: de omni dolore lateris, tam eo qui citra, quam eo qui cum phlegmone consistit, locutum esse. Quare quæ de calidis fomentis scribit, ei dolori lateris competunt, qui citra phlegmonem consistit. Siquidem peticulo vix vacat, si etiam in corpore quod plenitudine non laborat, usum alium attingemus: Præstat igitur tum quoque venam initi-
rundere, ut alibi fusius docuimus. Secunda igitur vena gibberi interna, quam *hecorariam* & *benarem* vocant, quæ nō ab id est, & *directo loco male affecti posita est*. Nam (vt Galenus in libro *De curandi ratione per sanguinis missionem* ait.) *Sanguinis missio quæ & directo laborantis lateris adhibita pleuritici fuit, clarissimam sepe utilitatem afferit: quæ vero ex brachio opposita, aut omnino nullam, aut obscuram, aut tertio post temporis intervalum.* Siquidem

Vena Gibberis.

E hæc vnica non solum a parte affecta retrahit reuoluit, verum etiam celeriter, quod in pleuritide, aliisque phlegmonibus internis maxime requiritur, vacuat: quemadmodum in nostra aduerfus Brachelium apologia copiose, multisque argumentis demonstrauimus. Quæ autem vena in pleuritide & directo laborantis loci sita sit, cap. 16. *Galeni de curandi ratione per sanguinis missionem in nostris commentariis* exposuimus. Eam hodie etiam Medicis apertendam esse censeo, quod illa anaxomes, & dissectionis rationi respondeat, atque tertio successu approbata sit. Eousque autem, Hippoc. loco paulo ante citato teste, sanguis aufertendus, donec vel multo rubicundior, vel pro purorubidoque liuidus fluxerit. Non tamen omni ex parte hanc, Galeno cap. 14. libri *De curandi ratione per sanguinis missionem* monitori, expectare oportet. Accidit enim interdum vt ant-

F tequam hæc fiat cessandum sit, duabus de causis, quod videlicet imbecilla sit virtus, aut phlegmone maligna. Hæc enim nihil comedit, quod vehementer impactus sit sanguis. Plura ea de re in nostris super hunc Galeni locum com. diximus. A venæ incisione chylus leuis aluo, si modo sponte sua, vt conuenit, non deiciat excrementa, infundatur, qualis est qui habet: *Asalus foliarum violarum purpurearum, mercurialis spinachia, Chylus*

86 Operum Leonhard Fuchſii Pars. III.

intybi hortensis vtriusq. ſing. manipul. vnum. Hordei integri, vnc. vnam. Coquantur ſingula in aqua iuſta quantitatē, quoad tertia pars abſumatur. Dein accipiatur iuri decocti lib. vna. Adedulla caſia ſiſtulari recens extrahita, vncia vna & dimidia. Butyri recentis ſaluſ experti, vncia dimidia. Salis vulgaris, drachma vna. Commixtiū omnibus, fiat clyſter. A corporis vacuatione caloriſica & dolore leuantia fomena extrinſecus adhibeantur: vt ſunt facculi, quia poſterioribus Græcis *πικρῶν* vocantur, & floribus chamamelī, anethi, meliloti, verbafci, ſemini-
bus lini, ſenegraci, mili & ſurfure compoſiti. Aqua etiā calida, aut iam dictorum medica-
mento: ſum decoctum, aut olea in vtre, velica, vel alia vaſculo adhibenda. Quineciam
vtiliter admouetur ſpongia magna, molliſque prædictis rebns itrigata, & ſubinde ex-
preſſa, ac calida impoſita. Veſtienda vero fomenta ſunt, ne ſcilicet vis eorum celeriter
euaneſcat. In hunc etiā vſum conuenit hoc emplaſtrum, quod accipit: *Florum* B
chamamelī, verbafci, anethi ſingul. manipul. dimidium. Seminī lini, ſenegraci, vtriuſque drach.
tres. Seminī aniſi, drach. vnam. Farina hordei, manipul. dimidium. Contuā ebulliant in aqua,
dum in melis craſſitudinem coeant: poſtea adiectis *oleum anethi & chamamelini,*
vtriuſque vnc. vnam & dimidium ebulliant iterum, & addantur duo vitelli ſuorum, craci, ſcorp.
vnum, & ſingatur emplaſtrum. Poſt ſeptimum vero diem, ſi eodem modo perſiſtat dolor,
cucurbita lateri aſſig-
nda eſt, & cutis ſcarificanda. Maniſeſtiſſima enim in pleuriticiſ
vtilitas ex cucurbitæ apoſitione apparet. Vulnuſcula vero ſcarificati loci ſale con-
ſpergenda, ſi modo ſuſtinere ægri queant. In aliis autem, linetolum oleo madefactum
ac ſale conſperſum imponatur. Sequenti deinde a ſcarificatione die, optimum eſt,
rurſus cucurbitam aſſigere, quo ſanguis ſanioſus ex impactis vulnuſculis extrahatur. C
Hæc enim detractio priore commodior exiſtit: non enim ſanguis, ſed ſanies in ſecunda
detractione auferretur. Non negligat etiā Medicus exhibere agrotanti ea me-
dicamenta, quæ ad ſpui ſacilem excretionem conducunt: vt eſt *diapenidion, diatrege-*
cantbe, ſaccharum voſolaceum, paſtilli peſtorales, adieſū alibi eſtigmatis capite De tuſſi comme-
moratis. Extrinſecus adhibenda medicamenta, quibus diſcutiendi in eſt facultas, vt eſt
ſenogræcum anethum, melilotum, hyſſopus, & ſimilia nunc ſapienter commemorata. Item *vnguen-*
tum dialtheæ nominatum. Quod ſi tamen permutationis in pus ſigna appareant, coadiu-
uare permutationem oportet, hoc aut ſimili vnguento, quod habet: *Oleum chamame-*
lini, amygdalarum dulcium, ſiliacei, ſingul. drach. tres. Butyri ſaluſ apertis pinguedinibz gallina, v-
triuſq. drachmas duas. Succī ſenegraci, ſemini lini, altheæ, vtriuſq. drach. vnam. Cera quod ſatis
eſt fiat vnguentum. Rupta tandem phlegmone, ea quæ extergunt, atque a pure ac ſanie
purificant, exhibeantur: vt eſt *aqua meliū, aut decoctum hordei, aut ſacchari rubei.* Facta puris
& ſanie abſterſione, glutinanta adhibeantur medicamenta. De quibus omnibus copioſe
in capite De pthiſi dicemus.

Fomenta.

Emplaſtrū.

Spontanea
dionem ſa-
cilem effi-
cientia.

Vnguentū.

Peripneumonia.
Cauſa.
ſigna.

Vidui.

De peripneumonia. C A P. IX.

PERIPNEUMONIA phlegmone eſt *pulmonis, cum febre acuta.* Hæc magna ex par-
te validioribus in pulmonem deſtillationibus, aut angina, aut aſthmate, aut pleu-
ritide, aliſue motibz ſit. Aliquando etiā ipſa phlegmone mali origo eſt. Hoc quidem
corruptos conſequitur difficultas ſpiritus: pulmo enim cordi incumbens, ſuffo-
cationem infert: febris acuta & ardens, grauiſq; diſtenſioque thoracis citra dolorem, E
Pulmo enim non ſentit. Quod ſi membratæ ipſius, quæ cum thorace ſecundum
longitudinem eius ſunt connexæ, fuerint phlegmone affectæ, etiā dolorem perci-
piunt. Malæ iis rubent, & tota facies, naſus in ſummo ſit ſimus, venter temporum ele-
uantur, oculi intumeſcunt, lingua adeſt ſiccitas, deieſtio appetitus, exſpiratione calida,
aque frigida, magis vero aeris frigidi conſpicua ſiccitas, tuſſis ſicca. Si autem quid effo-
ratum, ſpumofum eſt ac bñſoſum, ampliuſq; cruentū, & floridum vehemēter: quod etiā
peſſimæ ſignificationis exiſtit. Et ſi mortale vitium ipſum fuerit, vigilæ amplius
aderūt, aut ſomni breues comatodes, extremitates frigida, vngues liuidi incuruātur,
quarta, aut ſummum ſeptima die hi moriuntur. Verū ſi ad ſalutem permutteretur mor-
bus ſanguinis eruptio abundanter intercedum ſequitur, aut crebrius, Galeno libro 3. de
iudiciis capite 3. teſte, alui perturbatio, multis excreantibus bilioſis & ſpumofis humori-
bus. Aliquando autem phlegmone in pus commutata, per vntrem aut vrinam pus
excrentur, ſtatimque ab omni moleſtia liberantur. Quod ſi in pulmonem irruerit
aceruatim, aut ſuffocat, aut eum grauibz ſymptōmatis in tabem permutat. Quod
ad ci-

Ad cibum spectat, danda est peripneumoniciis primis diebus sorbitio ex pitifanæ cro-
more cum melle, origano. aut hyssopomagis enim quam in pleuritide, extenuatoriis
cibis opus est, potissimum ubi ex pituitoso sanguine vitium ortum est. Chondrus
quoque seu al-ta ex aqua mulsis non parum conuenit. Potus si exiguus: siquidem
humiditas pulmōni nocet. Possunt roboris tuendi gratia, potissimum ubi suffocatio
vrget, uti mulsæ per se, & cum nucleis pineis: aut mulsæ in qua decoctum sit hyssopum,
aut iris sicca aquæ mulsæ inspergenda. In vniuersum autem vitus ratio eorum qui pe-
ripneumonia laborant, præcipue vero qui a peripneumonia conualescunt, eadem
fere sit quæ pleuriticorum. In curandi ratione sanguinis detractio vitanda est in iis, Cura.
qui ex aliis morbis in hoc vitium incidunt, maxime si diu in hoc statu fuerint, vel si
per initia sanguinem miserint. Alius clysteribus ducenda, si ægre desineant cucur-
bitulæ, ubi nihil obstat, thoraci & lateribus admouendæ sunt, & quæ prægrandes &
mulxæ, cure incisæ & scarificatæ. Sin peripneumonia statim ab initio inualerit, sangui-
nem mittere, si vires & alia permiserint, oportet. Incidenda vero vena in gibbero in-
terna: & ubi vires sustinuerint, ex utroque brachio sanguis detrahendus: primum
quidem modice, & minime vsque ad animi defectionem, ut videlicet aliquid assue-
rur ad repetendam extractionem. Si vero quid sanguinis missionem prohibuerit, cu-
cubitulæ certe vniuerso thoraci lateribusque affigere oportet: illicque tantum sangui-
nis elicendum, quantum vires patiuntur. Aur acri clystere alium eluere conuenit, ex
decocto nimirum hyssopi, iridis, ruta, adiectæ colocynthidis medulla, salepissili, & aliis quæ ad
cuiusmodi clysteres sunt necessaria, quæ facile studiosi ex libris nostris De compositione medicamentorum
inscriptis cognoscunt. Post hæc cutandum, ut per crebram spuitionem & excreatio-
nem, quæ certe sit celerissima & facillima, thorax atque pulmo expurgetur. In quem sa-
ne vsum ea quæ superiori capite De pleuritide ac tussis a nobis commemorata sunt elegima-
ta, vnguenta, & emplastravsurpanda erunt. Quæ in eo tantum diuersa prioribus
sint, quod quæ nunc sunt adhibenda, omnia valentiora esse, maiorique extenuandi
facultate prædita conueniat. Dandum igitur ecligma & scylla, & pulmone vulpis, radicis iri-
dis ac eleuthi, adiecti decoctum. Ceratum autem conficiendum ex oleo rntaceæ, nardine, adie-
ctis medulla ceruina, iride hyssopo, marrubio, semissime tritis, & terebinthina resina exceptis, totiq;
thoraci & lateribus imponendum.

De sanguinis reiectione. C A P. X.

Anguinis reiectionem, vel certe rectius *anguinis reiectionem*, nihil aliud Latinis significat, nisi san-
guinis reiectionem, aut cruentam spuitionem. Hæc nonnunquam accidit a causa
Causa.
externa & manifesta, nempe de lapsu ex alto, plaga extrinsecus illata, percussione
vehementi, saltu, aut si granius aliquid corpus thoraci incididerit, clamore deniq; magno,
aut frigore immodico. Nam frigus venas rumpere, Hippocrates etiam testatur. Calor
quoque sanguinis reiectionem efficere notest, iuxta id Hippocratis dictum: *Calidum*
ubi quis sapius utatur proflauis sanguinis affert. Nonnunquam ex causa interna & occulta,
veluti plenitudine, sanguine vitioso & venas erodente, atque oris venarum apertione.
Venarum autem ora aperiuntur propter valis imbecillitatem, sanguinisque qui ad os
eius impetu ruit copia: ad hæc acrem quampliam, quæ illi extrinsecus incidat, quali-
tatem. Ipsa vero vasorum erosio ex acerbis contingit humoribus, siue a capite
in pulmonem delabentibus, siue in ipso pulmone generatis. Porro sanguis qui rei-
citur, modo ex thorace ac pulmone, aut aspera arteria venit, modo ex aliis locis oris,
aut gingivarum, aut faucium, aut columellæ, aut ventriculo, ad quem ex venis & par-
tibus adiacentibus, iecori nimitum & liene, sanguis delabatur. Causæ externæ
sermonibus ægri aut assidentium cognoscuntur. Internæ vero per indicia elusmo-
di. Si enim ob plenitudinem sanguinis reiectio accidat, tum confertim sanguis
rei-citur, & post vacationem melius leuiusque agunt. At si propter oris venarum
apertionem, tum calidi affectus præcesserunt: veluti si calidis balneis plurimis vsus
F sit æger, habitaaueritque in calida regione, consimili existente maxime anni tem-
pore, cibis quoque & potionibus calidis vsus sit. Etenim multitudo sanguinis cali-
da existens, venarum pulmōni incumbendum ora aperit & dilatat, atque hoc mo-
do coaceruata effusio contingit. Si vero ex venarum erosione cruentum edirur spu-
tum, non confestim, sed paulatim sanguis cum tussi exspuitur, & semper peius habent,

Possibile est etiam propter erosionem vehementem, confertam sanguinis eductionem cum tussi fieri. Quod sic deprehendes: si enim precedenti tempore per modica interualla sigillatim, & cum tussi expueris quis sanguinem, & sequentibus diebus neque casus, neque alia externa violenta causa acciderit, & tamen copiosa sanguinis eruptio prodierit, magnam erosionem factam esse euidentissimum est. Porro si sanguis qui educitur spumofus sit & subalbidus, atque ex interuallo prodierit cum tussi, absque tamen dolore, firmissimum signum eductionis ex pulmone est. Si vero pituitosa cum leuiore tussi aut excreatione reiciantur, ex aspera arteria potius scito. Si ater sanguis, & in grumum concretus cum tussi etiam & dolore partis laborantis reicitur, ex thorace,eductum esse monstrat, per pulmonem aut asperam arteriam facta translatione. Si vero ex locis qui circa fauces sunt per palatum sanguis feratur, cum excreatione excernitur. Sin ex aliquo locis oris aut gingiuarum, simpliciter expulsiur. Accidit autem nonnunquam per palatum sanguinem educi, propter hirudinem deuoratum, & alicui indidem particulæ adhærescentem: id quod localis dolor qui concernitur laborantem particulam, & sanguis ipse qui tenuis est & serofus, ostendunt. Porro si a capite sanguis defertur, titillatio palati aderit, & frequens excreatione, ac tussis nonnunquam, sanguine nimirum ad guttur delapso, iterum quædam sursum elato. Ad tussim itaque irritantur, & tamen non valde tussunt. Habet & suam figuram sanguis a capite delapsus. Est enim non adeo paucus, colore niger, leuis, cum pure aut pituita mixtus, & cum excreatione statim se in linguam infert rotundus, faciliusque per sputum reicitur. Præterea magna ex parte capitis dolor, aut granitas præcedit. Si ex stomacho eductio fiet, non magna sanguinis eruptio continget: graciles enim stomachi venæ existunt. Si vero ex iecore ac liene sanguis in ventriculum deferatur, & ex eo demum vomitione eiiciatur, aderit in dextro aut sinistro latere tumor. Quod ad vitus rationem attinet, vtendum cibis qui moderatam quandam obturandi vim, & leuem adstrictionem obtineant: vt sunt oryza, pisana, alica, alique similes frumentacei cibi, quibus succus mali cotonei, aut granati, aut pyrorum adiectus sit. Ex herbis oxalis, portulaca, lactuca, & spanachia. Ex carnibus conuenient columbæ syluestres, turdi, perdicæ, gallinarum, phasianorum, anseriorum, si cum omphacio seu succo vuz acerbæ, & rhoe obsoniorum coquantur. Vtendum quoque cotoneis, pyris, pomis adstringentibus, moris rubi, & aliis supra in capite *De sanguinis naturam profusio* memoratis. Bibendum vinum castum, rubrum, aut si febris adit, pro ea aqua, in qua chalybis ignitus exsinctus est. Aer ad frigidum & siccum declinet. Somnus sit mediocris, caputque enbantis sublime sit, potissimum ex spirandi instrumentis sanguis perfluat. Aluus sit aperta, & quotidie æger alui excrementa deiciat. Cauendum a clamore, frequenti locutione, omni corporis motu, & iracundia. Curandi ratio pro caussarum diuersitate variatur. Si enim a capite fertur sanguis, isque exiguus, simplicior & exigua sufficit curatio. Adstringentia enim per collutiones palato adhibita frigida, curationem perficient. Hæc autem ex capite *De columella phlegmone* petenda erunt. A calidis autem & tarescentibus collutionibus abstinendum, quod ab his plus sanguinis erumpat. Quod si multum a capite deflexerit, euacuatione opus erit. Quare citius per nares, aut per venæ alicuius incisionem vacuare oportet, ne per negligentiam consuetudo fiat sanguini in hos locos delabendi. Qui ubi destillationem sanguinem expunnt, iis protinus in principio venam humeralem, aut mediam, incidere oportet, nisi vehementer acris humor destillauerit, ac pro vitium modo sanguinem detrahere. Dein acris simul clystere adhibito, & vacuata alno, ac frictis quam plurimam manibus, brachiisque & cruribus per medicamentum calefactorium ac extenuatorium, extremæ eorum partes diligenter. Postea si vitium diutius durauerit, raso capiti medicamentum, cui exsiccandi & discutendi facultas inest, quale est quod ex fimo syluestrium columbarum constat, imponendum: & post trium horarum interuallum in balneum deducto, sic vt caput nulla pinguedine inungatur. Postea vero mediocriter coctos, sorbitionibus austeris, alito, deinde dormicuri theriacæ antidoti exhibeto. Sequenti die omnibus corporis partibus, capite tantum excepto, perfrictis, inquiete aduersato, rursusque ad vespërâ theriacen exhibeto. Quod si ex his destillatio non sistatur, tertia die mane mel parum coctum

Vitus ratio.

Curatio. Sanguis a capite destillans.

Curatio eorum qui ob destillationem sanguinem capite expungunt.

A præbeto, quiescereque finito, ac totum corpus defricato. Quatto die post acceptam theriacem, rursus plurimum mellis præbeto, capitique medicamentum ex fimo columbino imposito. Quod si viuum duntius durauerit, cucurbitula occipiti affigenda est. Postremum ea, quæ humores, qui in pulmonem defluxerunt, expurgare valent, propinato. At si acris admodum fuerit humor, qui destillat ex capite, sanguinis detractione caueri debet, ac purgatione potius vtendum, alimentisque & præsidus quæ infra dicemus, & supra vbi *De destillatione* egimus, comprehensa sunt, vtendum. Qui ex pulmone sanguinem reiciunt, ruptis scilicet in eo venis aut earundem patetis oris, iis præcipiendum in primis, ne respirent valde, sonumque edant: & vt patum loquantur, & fere in torum fileant. Decumbant in locis aeri expósitos, lectoque

Coratio est
cum qui ex
pulmone
sanguinem
reiciunt.

B immobilis figura sublimi. His etiam statim venam incidere oportet in gibbero internam, ac sanguinis detractionem bis aut ter reiterare paulatim reuellendi gratia. Non enim euacuatione copiosius indigent tales, nimirum a vitioso ipso vacuati. In hunc usum, hoc est, vt ad contrarium auersio fiat, frictionibus extremitatum, & earundem cum latis interolis constrictione, & ligatione vtendum. His sic peractis, primum quidem poscam diluam & tepidam bibendam exhibere conuenit, vt si quis sanguinis grumus in viscere hæreat, inde dissolutus eiciatur: neque quicquam obstat bis & ter in tribus horis hanc potionem iterare. Post hæc medicamenta adstringentia, & meatus obstruendi vim habentia, emplastica vocant, intra & extra corpus adhibenda. Per os quidem adsumta proficiunt portulaca comesta, quanquam succus eius bibitus efficaciior sit: succus polygoni, vna acerba, decoctum rhois, galle, caliculatorum glandium, radicis rubi, balaustiorum feminis: cyparissi, radicis equiseti, & aliorum quæ in capite *De sanguinis ex naribus profluvio comprehensa sunt*. Præstantiora prædictis sunt terra lemnia, & lapis hæmatitis in tenuissimum pollinem detritus, & cum succo mali punici, vel polygoni sumtus. Pondus autem lapidis hæmatitis erit scrupulus unus. Item pastilli de terra lemnia, de succino triti & cum plantagine decocto exhibiti. Inter composita vius esse poterit huius ecligmatos, quod habet: Sacchari rosæ veteris, succi medicati e ribes, vtriusque vna, Diatragacanthæ, diacatonem simplicis, vtriusque vniam dimidiam. Pulueris coralliorum, lapidis hæmatitis, terra lemnia singulorum scrupulos duos. Balsami armenii, drachm. unam. Sanguinis draconis, drachmam dimidiam. Balaustiorum, drachmam unam. Thoris, radicis symphyti maioris, vtriusque drachmam unam & dimidiam. Serapii myrtini quantum ad excipendum satis erit, fiat ecligma.

Ecligma.

D phyti maiori, vtriusque drachmam unam & dimidiam. Serapii myrtini quantum ad excipendum satis erit, fiat ecligma. Extrinsecus thorax ex vino adstringente, oleique rosaceo, cotoneorum, aut myrtino itrigandus. Si vero multa sanguinis eruptio fiat, potissimum æstate, ac citra tussim eius reiectiones contingant, neque æger debilis sit, sed robustus ac carnosus, acetum pro vino admouendum est, spongis exceptum, Proderit iam dictis oleis adicere bolum armenium, terram lemniam, corallia, & similia, atque cum cera componere vnguentum, quale infra libro 3. capite *De appetitu canino* describemus: Cataplasma quoque ex palmulis, acacia, symphyti radice, cortice mali granati, & lentium sari-næ paratum, admouendum. Nec minus confert quod ex carnis malorum puniceorum, thure, corallis rubris balaustis, bolo armenio, terra lemnia & eiusmodi componitur ceratum.

E Maximum enim hoc est, & cui animus diligenter attendere oportet, vt mox facta vasorum ruptura, & dum adhuc cruentum est vulnus contescat, priusquam scilicet phlegmone apprehendat. Nam si phlegmone præuenerit, parum spei est ad huiusmodi vulneris conglutinationem, quippe quæ se in multos dies extendit. Eluere enim oportet tum pus, tum seorsum sanguinem ipsius vlcis, posteaquam phlegmone fuerit soluta. Reliquam autem curationem, quemadmodum in tabidis, fieri oportet. Hic tamen monendus mihi lector erit, ne extrinsecus profluenti particula admo-ueantur tum adstringentia, tum citra adstrictionem frigida, nisi postquam in alia prius auersio facta fuerit, alias enim sanguinem intto compellunt, & venas quæ in alto sunt implent. Quare prius semper ad contraria reuellendum, ac subinde adstringentia ex-

Præceptum
diligenter
obseruan-
dam.

F trinsicque imponenda. Qui ab erosione sanguinem exspuunt, iis primum quæ acres humores in pulmonem destillantes putgare possunt medicamenta, propinanda, veluti antea quoque, & in capite *De destillatione* dictum est. Deinceps ea, quæ alterare & in-cassare acres tenuesque humores, atque adeo sistere destillationem valent: vt est serapium violaceum, rosaceum, myrtinum, hydromelen, minam cotoneorum vocant, & his similia.

Cutatio es-
tum qui ab
erosione
sanguinem
exspuunt.

90 Operum Leonhard Fuchsi Pars. III.

Cursio eo-
rum qui vo-
munt san-
guinem.

In eum usum interdum serapium e *papanere*, & alia somnifera, & stuporem quasi in-
ducuntia adhibentur. Destillatione de linente, erofæ partes cibis boni succi, & medi-
camentis carnem generantibus reficiantur. Porro qui vomunt sanguinem, ea victus
& curandi ratione quæ antea commemorata est utantur. Hoc est, venâ in gibbero su-
perior, quam *humeralē* vocant, illis statim incidenda est, si ex ictere: sin ex liene in
ventriculū seratur sanguis, ea ex Actio *Archigene isse*, quæ inter parvum & annula-
rem digitum in sinistra manu est. Ceterum & cibos & potus adstringentes sumere o-
portet, eos qui per ventriculū sanguinem reiciunt, non tamen vehementer & actu
frigidos. Porro ne id silentio transeat, præstat perperuo lienarem venam, si incidi
& inueniri potest, aperire, quam eam quæ est in summa manu, ob causam a Galeno
capitula libri de curandi ratione per sanguinis missionem expositam. Quippe facile curan-
tur, si exilia quæ bibuntur, particulis ipsis sanguinem fundentibus plane applicentur. **B**
Atqui sanguine in ventriculo instar grumi concreto, coagulum potandum est, maxi-
me leporinum, vel thymbra, seu saturtia cum aceto, vel ex aloë sic affecti vacuari de-
bent. Qui per palatū sanguinem excreant, gargarizabunt ex adstringentibus: si on-
tique & capiti admovebuntur ea, quæ sanguinem ex naribus fundentibus ac commo-
dantur. Porro postquam omnia, ut postulat ratio, peracta fuerint, & sanguinis fluo-
r subliterit, vires ipsis reficiendæ sunt, roburque adbibendum. In primis vero cau-
endus frequens usus balnei, vini portio, ira, & Venus.

Cursio eo-
rum qui per
palatū
sanguinem
excreant.

De empyematibus. C A P. XI.

Empyema.
Suppurati-
on.
Empyem.
Purulent.
Causæ.

Empyema Græcis *purulentam excretionem & purulentiam* significat. Latini *suppurationem* **C**
vocali. Hinc *suppurati & purulenti*, hoc est *suppurati & purulenti*, qui hoc vitio laborant, &
quibus in thorace vel inter thoracem & pulmonem pus continetur, appellatur. Fit,
quando abscessus in membrana intrinsecus succingente costas, aut aliqua alia thora-
cis membrana factus, accrevit rumpitur, & in vacuum thoracis locum, qui est inter
pulmonem & succingentem costas membranam effunditur. Accidit interdum pro-
pter sanguinis eruptionem, vlcere ad elcetricem non perducto. Interim etiam pro-
pter confluxum ex capite, & aliis superiotibus partibus in thoracem manantem. Quod
in angina sæpe contingere solet, iuxta hoc Hippocraticum: *Quicumque ab angina libe-*
rantur, iis ad pulmonem vertitur, & in septem diebus percutit: si vero has effugerint, suppurantur.
Suppuratos autem hoc pacto cognoscēs. Grauitas in profundo thoracis adest, tussis **D**
valida siccaque cum dolore, aliquando etiam cum humiditate, ob quæ reuelari quo-
que videtur. Febres per initia ipsi accidunt languidæ, inordinatæ, & ad iudican-
dum difficiles. Postquam autem ruptura abscessus iam appetit, vehementius cum
quodâ horrore febrieant, & in sermone conturbantur, offensus inspiratione. Rupto
abscessu aliquid in profundo thorace transfluere apparet, iuxta multiplices reclina-
tionis permutationes & maxime quum ab vno latere in alterum decumbunt, tum sa-
ne multitudine puris manifestatur, & fluctuationes cuiusdā sonitus sæpe sensibilibus in
reclinationibus ipsorum auditur. Pus etiam educitur nunc purum, nunc creulentum.

1. Aph. 201.

signa.

Vitæ.

Cursio.

Frumpunt autem suppurationes aliquæ quidem sursum versus in vacuum videlicet
thoracis locum: & hæc periculosiores existunt. Nisi enim quam citissime pus per spu-
tum reiciatur, tabidi fiunt, pulmone hinc exulcerationem contrahente. Aliquæ ve-
ro deorsum in alium, & intestina, ac vesicam transfunduntur, per vasa quædā tran-
smissione ad eas partes facta. Quæ qualia sunt, Gal. lib. 4. *De laborantibus locis, cap. 4.* osten-
dit. Semper autem bellica febris laborant, quoad sursum omnia fuerint educa. Qui
suppuratione laborant acrem inhabitent siccum, Cibis utantur beni succi, & conco-
cto facilis: *pisana cremore iure gallarum, carnibus gallina, pullorum gallinaceorum, perdi-*
cum, phasianorum, animumontanarum, turdorum scilicet. Iure quoque cicorum cum herbis, hyssopo,
& petrosilino. Iura enim vlcera magis detergent, ventremque lubricum reddunt. Po-
tus sit aqua mulsa, ac vinum album & tenue. Porro nisi in iis qui suppuratione laborant
summa diligentia adhibeatur, protinus puris collectio tabem accersit, pulmone, vlcera-
tionem contrahente. Primum itaq; suppurationis concoctio adiuuanda s. mentis a-
que temperate calide per spongas, cataplasmatibus & emplastris, præsertim tardantibus
suppurationibus, ex hordei, fenograci, & seminis lini farinæ, carici, columbarum fimo,
camamelis floribus, malua, alibea, & resina modica paratis. Cerata etiam ex butyro, iride, bacis
leuri

- A** lauri & ruta composita, & alia quæ collectionem mantere & discutere possunt, qualia multa in capite De asthma dicta sunt, imponenda. Quod si vitium non discutitur, quæ abscessum rumpunt admoveenda. Rursum autem abscessus, promouet in latus sanum decubitus, salforum esus, & catapotia illa dormituro data, quæ habent: *Pulueris lora picta Galeni, vnicuique vnam. Pulpa colocynthidis serap. vnum. Cum succo absinthii quod satis est ad excipiendum: fermentur pilule*, quæ itum vna aut altera teneatur in ore. Hac enim ratione accidit, vt æger crebro expuere conetur, atq; adeo nimium expuendo abscessus rumpitur. Non est tamen quod catapotia illa deuorent, & in ventriculum assumant. Ruptione facta, diligenter erit anima uertendum, quo pus proropat, adiuuare enim eius excretionem oportet. Si enim ad alium prope tet, magis emollientia sint quæ offeruntur: si vero ad vesicam serpat, ea quæ vrinam cient magis adhibenda. Si vero per tussim puris expurgatio fiat, nihil conuenientius aut familiarius exhiberi potest, quam ptisana optimo melle permixta. Proderunt etiam abstergeria, quæ partim in capite De pleuritide dicta sunt, partim etiam statim in capite De tabe dicentur. Ceterum quæ vrinam cient, cibis commodè admiscetur, vnde cunctis tandem puris excretio contingat. Ad puris vero expurgationem mirifice utilis est aqua musci & iridis, & plurima glycyrrhiza decocta. Radicis enim dulcis succus commanducatus potest. Conuenit deniq; decoctum hyssopi, iridis, marrubii & similitum, quæ ex capite De asthma petenda veniunt. Ceterum quum ruptio vix periculo careat, ne scilicet æger a copia puris suffocetur, aut copiosum in thorace contentum tabem accersat, optimum erit, iuxta Hippocratis consilium 7 aph. 4. vt suppurati in latere secentur, vel vrantur, vt eo aperto vniuersum pus effluere possit. Quare si vniuersum pus expurga: non posse metus est, vel sectio, vel vltio tentanda erit. Reliqua quæ ad curationem suppurationis necessaria esse videntur, in sequenti capite commemorabimus.

De tabe. C A P. XII.

- P**rimo Græcæ. tabes autem latine, proptèr est exulceratio pulmonis ad sanguinis spiritus a consumens, quam Abienius priuatum, vt sectio. 7 aph. comment. 16. testis est Galenus, qui non minant. Fit magna ex parte, ob acris & erodentis humoris ex capite in pulmonem defluxum. Interdum etiam, quum sanguinis aur puris eruptio in suppurationem, pleuriticis, & peripneumonici cohibetur. Qui hoc vitio laborant, agnoscentur totius corporis & carniæ extensione. Nares etiã ita acutæ, collapsa tempora, oculi cõcaui, scapulaeque instar alarũ auium prominent: hinc Hippocrati aliiq; Græcis *σπέρμα* appellantur. Præterea tussium, ac febre hectica febriunt, difficulter spirant, genæ liuescunt, vngues curuantur, pallidiq; apparent. Vtuo vincent venter turbatur. sitis ipsos magis cõficit, capilli defluunt: & id quod psputum relucitur, vehementer foedi odoris est. Quæ singula Hippocrates quoq; suis verbis innuere voluit. *A tabe*, inquit, *corruptio profusio alui superueniens letale*. Et iterũ: *Quibus scilicet tabe laborantibus capilli a capite defluunt, ita alui profusio superueniens mortuaria*. Et rursum: *Qui tabe molestantur, si spiritum quod extussum carbo inest, graue ei. Et capilli a capite defluunt, letale*. Porro vlcera pulmonis difficillime curantur, ppter ea quod citra tussim non repurgantur. Tussientibus autẽ vlcerum drumpitur ac laceratur, atq; malum quasi quodam circuitu reuertitur. Pulmo etiam inter viscera ppter respirationem in ppetuo est motu, & tussiendo quoq; lacinatur. Vlcera vero quæ lananda sunt quietẽ vtiq; requirunt. Medicamentorum ppter ea vires ad vlcerum, priusquam in vetriculo & iecinore pmutentur, puenire nō possunt. Vt cunq; autẽ ppter causas hunc cõmemoratas difficilis sit curatio, tamen nihilominus conandum, vt vlceratio illa curetur. Initio itaq; tabidis conueniens victus ratio præscribenda, in eum sane modum. Aerem siccum, in calore vero & frigore temperatum, in habitũ. Cibis eorum sit ptisana hordei, lac amygdalarum, oua sorbilia, carnes auium motanarum, pdicum, phasianorum, merularum, turdorum, gallinarum, caporum, vitulorum, hœdiq; lactantis. Pisces deniq; squamati, fixatiles, potissimũ vero caneri fluuiatiles cum lacte potati, aut cocti in cibo sumti. Ceterum lac inter omnia cibaria tabidis optimum, serosa n. sua substantia vlcera repurgat, caseosa glutinat, primum quidem humanum, deũ agninum & caprinum: quod ex mammis, si fieri potest, sugatur: aut statim multum dum adhuc calet bibatur, quæ admodum capiosè libro 3. Ther. meth. Galenus docet. Cauendum tamen vinice, ne statim a lactis vsu alium cibum (potissimum autem vinum) sumant: quod alias in

92 Operum Leonhard. Fuchsi Pars III.

ventriculo prorsus corrumpatur. Quod si veto impense admodum feblicitant, putrida maxime febris, laetis vltis haud conducen. Inter fructus profunt vuz passæ, amygdala dulcia, nuces pineæ, ficus, palmulæ & pistacia. Exercitia & motus vehementes deuitent. Suauiter autem ante cibū deambulare, haud incommodabit, præsertim vbi febris remiserit. A cibo penitus quiescant. Somno vtantur nocturno, & mediocri. Fugiant ita, trifiditas, vigilias immodicas, famem, sitim, coctum, laconitū, & quicquid corpus exinanire potest. Pot' sit vinum aquosum & tenue: aut si vchcmē est febris, aqua

Hippocra.

Cassio.

Saccharum
rosaceum.

Pulvis.

Morbili
factici.

Cardis pal-
pitatio.

Causa.

in parum cinnamomi est decoctum, aut bibat potionem quæ a barbaris medicis Hippocras nominatur. Cuius quidē compositionem in libr. 1. cap. De resolutione, monstrauimus. Quod si vitium a defluxu humoris acris ex capite oriatur, curandi ratio a destillationis amolitione inchoanda erit, quam quidem supra peculiari capite docuimus. In præsentia igitur quomodo pulmonis exulceratio curanda sit, monstrabimus. In eius itaq; curatione in primis quæ abstergerendi facultate prædita sunt, & quæ vt facile pus surium feratur, efficiunt, exhibenda erunt. In quæ vsum potissimum hydre-meli conuenit, & decoctum hordei cum saccharo & melle. Itē hyssopi, iridis, aricarum, adianti, & similia. Serapium de hyssopo, marrubio, & glycyrrhiza. Si accenderit febris, prædictis semina quas vult frigida cōmiscenda erunt. Extrinsecus vero ad mouenda emplastra & cataplasmata ex semine lini, fenugraeci, & alia in c. De empyemate commemorauit. Ex capite quoq; De asthma multa remedia ad præcortem vsum conducentia, p̄tenda erunt. Absterio & a pure purgato pulmone, ea quæ vlcus glutinare possunt, medicamenta sunt exhibenda. In hunc vsum ab omioib; fere medicis cōmendatur saccharum rosaceum: hoc n. non solum glutinandi, verum etiam abstergerendi facultatem ob tiner. Abstergit autē magis quod recens est, glutinat vero quod antiquius. Mirifice etiam confert bolus armenius, sanguis draconis, succinum, corallia, semen portulacæ, & similia, quibus abstergerendi & glutinandi facultas inest. Laudatur vnicæ symphyti maioris radix saccharo condita. Item cum carnibus cocta. Cōducunt quoq; ecligmata de palmone vulpis, & pino saccharum symphyti maioris, & adianti. Ex his igitur tale parabitur medicamentum, quod habet: Sacchari symphyti maioris & adianti, vtriusq; vnciam dimidiam. Sacchari rosacei, vnc. vna. Ecligmatis & palmone vulpis, drach. vna & dimidiam. Terræ elemis, radicis symphyti maioris, ana scrup. duos. Serapii de papauere, quantum ad ea excipienda satis est: formetur ecligma. Plurimum quoq; adiuumenta altereris pulvis quotidie exhibitus, qui accipit: Seminis papaueris albi, drach. dimidiam. Gummi arabici vocati, amyli, tragacanthæ sing. drach. 1. & dimid. Seminum cucumeris, citrulli, cucurbitæ, melonis, cotoneorum singulorum drach. tres & dimidiam. Eboris vsti succi glycyrrhizæ, vtriusq; drach. vnam & dimidiam. Penidiorum æquali omnium pendere: singatur puluis, de quo mane dentur quotidie, drach. duæ, cum serapio de papauere, aut rosaceo. Sunt qui adiciunt cinerum cancrorum fluminalium, & coralli albi vsti. sing. drach. vnam & dimidiam. Eo præterea tempore quo cicatrix obducitur, extrinsecus thoraci oleum myrtinum, aut rosaceū inungendum, adiectis interdum hoc obsoniorū sumachiū officina vocant, hypocistide, malicoria, acacia, gal-la, & similibus. Postremum corpus exteouatum iusta & conuenienti vltus ratione reficiendum omnibus iis cibis, qui boni sunt, ac facile concoquuntur, & plurimum alunt. Quo tempore hoc quoq; medicamentum exhibendum erit, q. habet: Pulveris s. pi, vnc. 1. Testiculorū galli, nucum pinearū, pistaciorū, amygdalarum dulcium singul. vnc. dimidia. m. Specierum antidoti de gemmis drach. dimidia. Specierum diarrhædon abbatis diantibon, p̄der sti rosacei singul. scrupul. vna. Santalorū alborū, cinnamomi selecti, vtriusq; drach. dimid. Materis, scrupul. vna. Sacchari candidissimi, libr. vna, diluti in liquoris stillatius buglossi & rosarū, singantur morbili. De quibus quotidie vnus sumatur. Thorax etiā inllinatur butyro, & oleo amygdalarum dulcium.

De cordis palpitatio. C. A. 7. XIII.

Palpitatio est cordis palpitatio & tremor dicitur, motus est cordis deprauatus, nimis rariū quam præter naturam dilatur, aut constringitur. Recentiores medici perperam i cardiacam nominant. Causa enim ad stomachum, quæ veteres olim a p̄der sti locis significauit Galen. vocarunt, pertinet, eiusque plane erosio seu morsus existit, vt alibi quoq; copiosius monstrauimus. Fit ab omni eo quod præter naturam cor affligere potest, vt est quævis intemperies, aut humoris vcl flat. multitudo in ambicte cor mēbran.

con.

- A** contenta, cor ne attollatur impediēte, aut tumor p̄ter naturam, & aliā quæ a Galieno libro 5. De affectu lacu, capite 1. recēsentur. Vt valde ineptiā, qui cordis palpitacionem a calida intemperie nasci non posse putant, quum tamen, Galeno etiam scilicet 4. aphor. comment. 81. auctore, ab immenso incendio hæc ipsa fieri possit. Et Paulus lib. 3. c. 34. a sanguinis feruore hanc procreari docet. In summa quicquid cordis facultatem deilect, hoc palpitacionem eiusdem efficit. Deicit autem eam omnis intemperies, igitur etiam calida. Nec obstat, quod Galenus in libello de palp. & de sympt. causis 2. hanc a frigida tantum causâ fieri scribat. Nam in illis locis de palpitacione, quæ in externis patib. & musculis, nō in corde, excitatur, loqui illum constat. Dignoscitur facile de sermonib. ægri, palpitacionē hanc euidenter sentientis, & expulsi. In calida intemperie febris, & pulsus velox atq; magnus existit. In frigida contra. Si humoris copia in pericardio cōtēnta palpitacionem accerserit, pulsus est mollis & languidus. Si a flatibus sit, leuissima corporis motione excitatur. Vicius ratio, p̄ causam vitiū efficientiū diuersitate variē insinuat. Siquidem in calida intemperie aer esse debet mediocriter frigidus: in frigida vero, modice calidus. Quare ex capitib. quæ p̄missimus, hæc ipsa fā. ille cōstitui a quouis leuiter admodum perito potest. In vniuersum autē vitādum quicquid spiritum vitalē resoluit ac cōturbat: vt est nimius æstus, ira, fames, vigilia, coitus, frigus immodicum sibi mali facit. Si multitudo humoris in ambiente cor membrana cōtēnta palpitacionē p̄creauerit, tota dicta sit extenuatoria. Potus in calida intemperie sit vinum aquosum & tenue, aut zulapium violaceum, vel rosacēū, aut buglossi decoctū. In frigida vinum meracū bibatur. Qui ob calidam intemperie eorū palpitacione corripuntur his p̄ frigida medicamenta, quæ intemperiem calidam corrigere, & robur cordi adiacere possunt, succurrēdū. Talia vero ex simplicib. sunt rosa, viola, flores nymphaea, santali, corallia, & iis similia, de quib. in libro nostro De comp. med. etiam diximus. E compositis est diambargari, diarrhodon abbatie, faccharū rosaceum, violaceum, buglossi, & eandem stirpium succi & ferapia. Ex iam dictis itaq; potiones, antidota, & m. iuli p̄ cuiusq; arbitrio componi possunt. Extrinsecus ad mouenda vnguēta, emplāstra, maxime vero epithemata vocata, faculi, & alia quęcunq; calidam cordis intemperiem alterare valent. In primis autem inter vnguēta hoc conuenit, q̄ habet: Oleorū rosaci, violaci, nymphaea, sing. drach. 2. Coralliorū rubeorū, santalorū purpureorum, rosarū purpurearū, sing. scr. 1. Cere alba quod satis est fiat vnguētum, quo cordis regio, & spina dorsi iungatur. Inter epithemata hoc potissimum cordi imponatur, quod accipit: Liqueurū stillaticiorū rosarū, exalidiū, & buglossi, sing. vnc. tres. Liqueurū stillaticii melissophylli, vnc. vnam. Specierum antidoti cordalis vocari, Sacculorū rubeorū, santalorū purpureorum, coralliorū rubeorū, vtriusq; drach. dimidiū. Sacculorū croci grana quatuor. Commixtis omnib. hæc epithema. In genere faculorum est potissimum cōpetet, qui habet: Florū buglossi, violarū, rosarū purpurearū, sing. manipulum dimidiū. Santalorū omniū sing. drach. vnam. Coralliorū rubeorū & alborū singul. drach. vnam & dimidiū. Vinū scrupul. vnum. Coniuncta in sericum demittantur, formeturque sacculus. Ceterum qui frigida cordis intemperie laborant, iis inter simplicia medicamenta p̄stan: ambar, moschus, crocus, lignum aloes, styrax, garyophylli, mace, zedoeria, melissophyllum, & eiusmodi. In genere compositorum, antidotū diambargari, anthon, aromatici rosaci, plerq; farcheticum, & similes. Ex quibus sane varia remedia inter generā parari possunt, haud secus quam in calida cordis fecimus in remperie. Siquidem vnguēta in eum componentur modum: Oleorū liliaci, spica, & de croto, sing. drachmas duas & dimidiū. Gallicæ masebatæ garyophyllorū, vtriusq; scrupulū vnum. Ligni aloes, scrupul. dimidiū. Mace, scrup. vnum. Croci, grana tria. Cere quod satis est, fiat vnguētum. Epithematū hæc forma erit: Liqueurū stillaticiorū melissophylli, maioranæ, buglossi, singul. vnc. quatuor. Specierum antidoti diambargari, diamoschi, vtriusq; drachmā dimidiū. Mace, ligni aloes, vtriusq; scrup. vnum. Ambar granum vnum. Vini optimi, vnc. vnam. Commixtis singulis formetur epithema. Sacculorū hæc est forma: Florū melissophylli, buglossi, vtriusq; manipulum vnu & dimidiū. Cinnamomi selecti garyophyllorū, mace, sing. drach. vnam. Ligni aloes, scrup. vnum. Corticis malicetrii, drach. vnam & dimidiū. Croci, scr. vnum. Ambar granum vnum. Coniunctis omnibus fiat & feris sacculus cordi imponendus. Quod si ab humore aliquo in pericardio contento palpitatio fiat, extenuanti vicius ratione, & vena sectione quæ in gibbero sit, Galeno li. 4. De laborant. loca, 1. esse, cutatur. Siquidem is

Signa.

Vicius.

Curatio calida cordis intemperie.

Vnguētum.

Epithema.

Sacculus.

Curatio frigida cordis intemperie.

Vnguētum.

Epithema.

Sacculus.

Curatio palpitacionis cordis ab humore.

94 Operum Leonhard. Fuchsi Pars III.

ibi dem sic scriptum reliquit: *Palpitatio cordis pluribus integra valetudine degentibus, tum a-
dolescentibus, tum adultis, subito sine alio manifesto symptomate euenire visa est, atque omnes
omni sanguinis detrahitio iuuat. Hoc enim pallo plerique perfecte ab hoc symptomate liberati
sunt: praesertim qui utebantur & viliu, & medicamentis, quibus esset extenuandi facultas. Hec
ille. Secunda vero est vena in gibbero interior, aut media: atque deinde vnguen-
ta, epithemata, & sacculi, eiusque generis alia medicamenta, quibus extenuandi &
corroborandi cordis inest facultas, extrinsecus & intra corpus adhibenda. Si vitium
a flatibus sit, exhibenda erunt ea erebro quae pituita purgant. Item ea, quae flatus
diseutiunt, qualia sunt, quae infra in capite de ventriculi inflatione recensentur. Quo-
rum omnium priuatum exempla proferre superuacaneum putamus, quum facile ad-
modum sit cuius ex iam dictis, & alibi commemoratis, componere omnis generis ad
institutum suum facienda medicamenta.*

De syncope, Cap. XIII.

SYNCOPE. Galeno libro 12. Ther. meth. capite 5. auctore, nihil aliud est nisi *praeceps virium
lapsus.* Omnes igitur in syncope vires subito labuntur. Differt itaque a Lipothymia,
quae syncope mitior est, *ut alibi fusius ostendimus.* Accidit quemadmodum etiam
lipothymia, ob plurimam sanguinis excretionem, immodicam ventris inanitionem
motum vehementem, dolorem ingentem, vigilas multas, sudores copiosos, omnes-
que alias immoderatas vacuationes, timorem, terrorem, & alias huius generis animi
perturbationes. Ob crudorum denique humorum in ore ventriculi redundantiam, phlegmonis
magnitudinem, & vitiosos tenues acresque in ore ventriculi mordicationes & excitantes
humores, aut quae scitidem inspiratione. Cognoscitur syncope iis indicibus. Pulsus est
ratus & obscurus, extremarum partium frigiditas, ludor circa faciem, nitoris cutis quae in
ea existit ablatio, & totius corporis quasi resolutio. Adhuc accedunt desperatio, ani-
mi rigor, & corporis laetatio. Porro euenit interdum syncope cordis vitio, ubi scilicet
vehementer intemperatum est: interdu enim stomachi, siue oris ventriculi, in eo nimirum
redundantibus, & congelatis aut crudis, aut acerbis, & erodentibus humoribus, *ut dictum est.*
Eius generis syncope, stomachica nominatur. Qui propter humorum crudorum in ore
ventriculi copiam syncopen incidunt, his hypochoondria inflata sunt, & totum corpus
ampliore mole, quam pro naturae modo cernitur, tum eiusdem coloris ad albidius, quam
pro naturali habitu sit, est mutatus: & in summa, corpus aqua inter cutem laborantibus
simile. Nonnulli etiam ad nigrius, aut luidius, quos quidem plumbei palloris appel-
lamus, accedit. Pulsus tamen arteriarum omnibus minores sunt, praeterea obscuri & inae-
quales. Qui vero propter aerium humorum redundantiam syncope corripiuntur, illi
assiduas in ore ventriculi vellicationes ac mordicationes sentiunt. Qui ob tenuis fue-
cos, ocylissime exhalantes syncope corripiuntur, in iis mortifera illa species in facie, ce-
lester apparet, nasus acutus, oculi caui, & alia quae deinceps per Hippocratem sunt ad-
scripta. Reliquae synopes causae ex adstantium sermonibus, nullo negotio cognoscuntur.
Curandi ratione pro causarum diuersitate variari, nemo est qui nesciat. Si enim propter
sanguinis excretionem, aut aliam immodicam & repentinam euacuationem syncope inua-
dit, frigida faciem aspergere oportet, aut liquore rosarum stillatio, qui in hoc casu
mirificam quandam vim obtinet, moschato, se haberi potest: si minus solus stillaticius
rosarum liquor, aut cum aceto permixtus. In vtriusque defectu, a frigida. Ab alto autem demit-
tatur in faciem, ut supit spiritus exeat: & si qui adhuc in partibus externis remanserunt,
resolui prohibeantur. Atque haec potissimum facienda sit ab aestu, aut febri incendio,
aut alia causa calida syncope fiat, non autem a frigore. Extremae corporis partes, ut crura
& manus, vinculis vehementer sunt costringendae, ac linteis modice asperis perfricandae.
Crura quidem, si supra eruptio fiat: manus vero, si infra. Cucurbitulae quoque leues
partibus, e quibus vacuatio praedit, aut sanguis erumpit, diuersitate affigendae. Os denique
dehendum, cunei aut digitorum, aut alterius rei immisione: auditorius vero meatus
& nares comprimendae, & inspiratus aer interiora petens, spiritum rescicere, ac excitare
queat. Confectum etiam variis odoramentis animum reuocare conuenit. Nihil enim est (Hip-
pocrate in libro De aliment. secte) quod vires odore citius reuocet. Prodest itaque pullos galli-
naeosos, ac per medium scissos atque dissecptos, naribus egrotantium ad mouere.
Item rosas, violas, mala cotonea, citria, & eiusmodi, Postea iusculis, & aliis sorbitionibus
conco-

1. Prog. 10.
Curnio.
Eius quae
propter im-
modicam in-
anitionem
accidit.

F

A consoctu facillimis, alendus æger. Vinū huic, ppinandum tenue & dilutum. Aer cubi-
culi sit frigidus, cubiculum vero ipsum nō valde lucidum. Stragula eis incēbens iat o-
latur: operimenta vero, quib. cōtegentur, mollia sint. Pauimentum irroretur, ac foli-
is consternatur myrthi, vitis, quercus, rubi, atq; ipsis etiam rosīs. In immodico sudore
exsulantib. partib. oleum myrtynum, rosaceum, & cotoneorum illinendum: in pri-
mis vero collum, thorax, loca sub alis, & inguina. In hunc vsū etiam conducit amyliū
& rburis pollinē candido oīi excepta, aliaq; adstringentia medicamenta illinerē. O-
doramenta quoque tum varia offerenda, nimirum rosæ, santala, cotonea poma, floris
nymphæ, & eiusmodi. Extremas vero corporis partes tum non oportet vincire. Si p-
pter dolorem syncope sit, diligenter se causā inquirere oportet. Si enim extrinseca
fuerit, facile eius amotione dolor se dabitur, atq; syncope curabitur. Si vero a nulla ex-
trinseca occasione dolor concitatus fuerit, intēnam aliquam esse causā, quæ dolo-
rē efficiat, existimare oportet. Si n. plenitudo distendens, dolorem excitauerit, protin⁹
si vires patiantur, sanguis mittendus est e vena, quæ parti dolenti vicina fuerit. Sin vi-
res imbecillæ sint, tum reuellendum dñtaxat, aut fūsum aut deorsum deriuandum,
aut vtrinq; aut frīctionib. vtendum. Vbi vero a vitiosis humorib. dolor oritur, purgare
magis oportet. Si vtrāq; coeant, ambab. vtendum vacnationib. sanguine prius misso.
Dein si noxius humor in parte fixus & impactus est, curationē p discutiencia me dica-
menta moliri oportet. Reliquorum dolorum curationes ex ppriis capitib. præsertim
excēp. De dolorib. petendæ. Qui ob mororem, tumorem & alias animi perturbationes
syncope corripuntur, ii plane suorum contrariorum admonitione curandi sunt. Nec
in morientibus, prætereunda sunt odorifera, & alia quæ intra corpus fumta spiritus re-
creare possunt. Qui propter crudorum humorum copiam syncope laborant, ii neq;
sanguinis missionem, neq; purgationem sūstinent, vtpote quos etiam sine iis syncope
subito adoriatur. Curare itaque hos per frīctionem oportet. Initio itaque vitii statim
a frīctione incipiendum: ac crura quidem primum a superiore parte deorsum, linteis
non admodum mollibus, sed modice asperis perficienda: dein etiam tota manus ab
humetis pariter ad infimas partes. Vbi vero iam artus omnes abunde incaluerint, &
metus fuerit, ne quis ex nimia frīctione lassitudinis sensus supueniat, oleo relaxare vt-
endum, quale est anethinum & chamæmelinū. Cauendum autem quam maxime ab
adstringente. Quum iā art⁹ plurimum pfricueris, postea oleum detergēdum, inde ad
spinam dorsī transcundum, hæc q; tota pfricanda similiter, linteis sc. primum, mox o-
leo. Ab hæc rursus ad crura, & subinde ad manus, tum rursus ad spinā remeandū, &
ita toto die faciendum: idq; in splendido quodā mini meq; humente cubiculo, cuius
aer tēperatus sit. Præterea mulsā in qua hyssopum coctū fuit, iis est aptissima: cauendū
que ne vel cibum, vel forbitionē, vel aquā exhibeas, vel omnino liberaliter bibere si-
nas, nisi mulsam trib. primis dieb. dñtaxat, alternatim fricando, vt solum illud temp⁹
inter sit q; somno datur, qui certe mediocris sit. Quod si pulsus iis paruus admodū in-
firmusq; sit, aut etiam supra hæc vehementer inæqualis, scire licet extremum pericu-
lum esse, faciendā tamen nobis quæ retulim⁹, nec aliud quicquā molendum. Sin pul-
sus robore mediocris sit ac magnitudine, præterea minime intercūs & cōpressus, cō-
sideranda quæ ad alium spectant: ac si sua sponte comodenō deiciat, audacter p in-
ferius aliquid infundes. Accidit namq; post aquā mulsam, vt quæ in primis venis, quæ
scil. circa iecur & mesenterium sunt, colligi superuacua solent, hac commode deūci-
antur. Quod si maior iusto recrementorū impetus ad alium citetur, principio qui-
dem percoquere mulsam amplius oportebit: ita n. minus aluum⁹ subducer, & magis
nutriet. Post hæc si superuacua largius descēdant, ne sic quidem sistenda aluus, sed ex-
hibendus p aqua mulsā prīana cremor est. Si vero fluere pergant, alicq; forbitione nu-
tries, pulsuum interim ratione obseruata. Aliquando n. subito ad imbesillitatem, vel
in æqualitatem, vel paruitatem mutantur. Quo sane tempore, panem ex vino diluto
exhibere cōueniet: idq; si nec ventriculus, nec iecur phlegmone laboret. Hac enim si
insensentur, iam corpore crudis succis referto, plane desperata salus ægro est. Ergo in
eiusmodi ægri easu, respicimus a culpa immunem præstabis, si moriturnum prædixeris, ad
nullo genero sorem medicamento vsus fueris. Atqui si quandoq; crassi abunde humo-
res deprehendantur, oxymeli p mulsā confestim exhibēdum, Ergo si astas sit, & æget

Sedores
immodicos
exacerbant.

Curatio syn-
copes a do-
lorib.

Curatio si
syncope sit
ob animi
affectus.
Curatio syn-
copes ex re-
dundantia
crudorum
humorum.

Præparatio

96 Operum Leonhard. Fuchſii Pars III.

frigida potioni aſſuet^o, frigidum huic oxymeli dabis. Sin hyemis ſit omnib. calidum, A
tunc iis qui calidæ, tum iis qui frigida inſueuerunt, offores: æq. vt ſi immodic^o æſtatis
tẽpore æſtus ſit, etiam qui calidæ aſſueti ſunt, frigidum: vtq. ſi nullum ſit iis viſcus ad
inuriã oportunitum. Sane iis aduerſiſſima ſunt tum balneum, tum aer ambiens, quo-
ties vel nimium calid^o eſt, vel frigid^o. Itaq. vt lauandi ii nõ ſunt, ſic & reclinandi in do-
mo ſunt: æſtate quidẽ quæ frigeat, hyeme quæ caleat. Læduntur namq. nõ parum ab v-
troq. exceſſu: videl. in balneo æſtate, & omni caloris incremento crudis humorib. li-
quatis, ac p. omnes corporis partes fluentib. ita vt metuentum ſit, ne ad pulmones &
cor ferantur aliquando etiã, ne cerebrum ſubeant, quum lãge præſit, vt circa iecur &
primas venas ſubſiſtant. In domo autẽ inmodice frigida, & hyeme, & deniq. ambe-
re frigidò, ſucci qui crudi ſunt, & inepti ad concoquendum manent, & iocinoris obſtru-
ctiões, ſi leues ſunt, augent: ſi nullæ ſunt, eas craſſitudine ſua hærentes impacq. cre-
ant. Si vero ad eos, quos ſyncope iam premit, ſis accit^o, vbi ventriculus & iecur phle-
gmonẽ vacent, panem exhibebis exiguum, huncq. ex vino aliquo, quod celere in cor-
pus diſtributionem adiuet: ſtatimq. ad frictiões venies, quas etiam prædito iam
modo adminiſtrabis. Ac ſi quidem æſtas ſit, aut regio naturaliter calens & æſtuan-
t, aut ſtat^o coeli vehemente calidus, aqua frigida vinum dilues: ſi nihil cuiusmodi ſit, cum ca-
lida. Quæ tamen ſecundo & tertio dabitur potio, omnino calidã exhibendã curabis.
Quippe ad vniuerſam eam curationem, cui^o gratia frictiões adhibemus, calor præ-
ſtat: vt pote crudorum humorum concoctionem adiuvans. At quib. ex ſua bile, quæ
os ventriculi infeſtet, ſyncope incidit, iis frigida exhibenda potio eſt. Vinum tamen
quod & calidum natura ſit, colore ſaluum, ſubſtantiaq. tenue, ætate vetus, & quod di-
ſtributionem in corpus promoueat, omnib. quos ſyncope male habet, offere conueni-
et: diſtribui namq. p. corpus nutrimentum quod ſumtum eſt, non in ventriculo mane-
re volumus. Qui tenuium humorum vitium ſyncope premuntur, eos paulatim & af-
ſidue vacuare oportet, ppter ea quod multã ſimul vacuationem ferre nõ queant. Hos
etiã paulatim & aſſidue nutriemus. Summa cutis denſanda, & æt cephalei frigida &
adſtringens comparandus, quemadmodum copioſe Galenus lib. p. Ther. meth. c. 14. de-
cet. Vnguendi præterea ſunt adſtrictiori vnguētis: tum cibiis dandi, qui non admo-
dum p. mte diſſoluant, non aqua miſta, non ptiãz cremor, ſed panis, & ſorbatio ex ali-
ca, & fructus aulteri, qui non facile corrumpantur, tum ipſi ple, tum vero & cum pane
etiã alica quæ in aqua ſit cocta. Dabis vero aliquando iis & oua. præcipueq. eorum
vitellos. Album n. coruin ægre concoquitur. Præterea gallinaceorum, qui lacte ſunt al-
ti, teſticulos. Itemque ſuillum cerebrum, ſed vel diligenter aſſum, vel in aqua, adiectis
porro & anetho, legitime elixum. Deniq. omni ratione agendum, vt & ſuccorum ma-
teriam craſſiorem reddas, & cum dentes, & exhalationem inhibeas. Vinum vero iis
aquoſum neceſſarium inierit initia eſt, ſumtum poſt cibum. Quod ſi ex ſententia nobis
omnia reſponderint, etiam carnei iis aliquid nutrimenti poſt alia dabimus: poſſiſſimũ
poſt quartum diem, ſuccis iam ad concoctionem venientib. Si ob phlegmonis magni-
tudinem ſyncope accidat, artus fricandi & fouendi, manuſq. ac pedes vinciedi, vigilię
imperandæ, quia ſanguis in ſomno, vt inquit Hippocrates ad interiora repit. A cibo &
potu penitus arcendi. Quicumq. ppter viſioſos humores os ventriculi erodentes ſyn-
copen incidunt, ii curandi ſunt vomitus irritati: nec ut ſi id vñ ſucceſſerit, alius mo-
uendus, aliſq. faciendæ, quæ inſi. in cap. De dolore ſtomachi exponemus. Qui in balneo a-
nimo inſiqui incipiunt, eos celere reducere oportet, neq. multa aquæ inſuſione hu-
meſtare. Qui autem iam inciderunt ſyncopen, celerrime exportandi ſunt, & reliquũ
quidem corpus leui quopiam velamina cooperiendum. Facies vero ſpongia frigida
inſoluta madefiat, aut frigida, aut ſtillaticio roſarum liquore aſpergatur. Fricandæ etiã
facies, ventriculus, & pedes. Os quoq. aperiendum, pennatum aut digito: um immiſ-
ſione: omniq. modo conandum, quo humor ipſius ſyncopes auctor euomat^o, aqua
tepidã ori inſtillata. Qui perfectiori ſunt ætate, iis capilli euellendi ſunt. Et vociferatio
quidẽ vnius utilis eſt multorum autem & ſimul edita, nocet. Vbi conualuerint, fugere
oportet tum in calidam, tum in frigidam aquam demiſſione. Aut n. laxatis corporib.
calore diſſuſo & reſoluto pereunt, aut a frigidityte adſtringẽte exſtinguuntur. Reli-
qua quæ hic deſiderantur, facile quib. locis huius methodi petere poterit, &
ex quinto Aſculi libro.

Syncope
iam præmi-
ta curatio.

Syncope
ex conuulſus
humoribus
curatio.

Syncope
ab inflam-
matione
curatio.

A De lactis defectu. C A P. XV.

LA C T I S defectus accidit propter siccam mammillarum, aut toti corporis intemperiem item ob boni sanguinis paucitatem, & quia infans imbecillis non potest ex mammarum fugit. Quando non potest fugendo ex illis adimit, tanto etiam plus attrahitur. Notat quibus causis diuersitasprehenditur, nouiores fere sunt ex iis quae antea dicta sunt, quam ut nunc reperti debeant. Ne tamen parum perit aliquid desiderare queant eas denuo narrare non grauabimur. Sicca intemperies ex totius corporis, aut mammarum macilentis & arido habitu, & aliis supra commemoratis, dignoscitur. Sanguinis paucitas, e malo corporis habitu, eiusdemque vitioso colore, & ex corporis quae praecesserunt vacationibus. Immodicus, mensum nimirum, alui, exercitii validioribus, inedia, merore, sollicitudine, & id genus aliis. Quod ad curanditatem attinet, de lactis defectu qui e sicca intemperie nascitur, hoc in loco nihil dicemus, quod facile ex iis quae antea dicta sunt in alio capite. & postea in capite De bellica commemorabuntur, curari possit.

BE IUS itaque qui fit ex sanguinis paucitate curatione, hic tantum agemus. In hoc igitur primum sanguis est contemplandus: sic monente Galeno *lib. de Simp. med. fac. 20.* Aut minor est quam conuenit, aut deteriori. Itaque qui modicus est, vniuersam victus rationem exposcit humedantem, & calefacientem mediocriter: Quae cumque plus quam expediat calefaciunt, quaeque desiccant aut refrigerant, partim qualitate ipsius sanguinis viciant, partim ipsum modicum reddentia, lac proueniunt, phibent. Dare igitur conuenit panem purum, lac, carnem vitulinam, pullos gallinaceos, perdices, hircos, oua sorbilia pisces saxatiles & squamatos, vnae passas, amygdalas dulces, lactucam, buglossam, methysophyllam, cucurbitas, & eiusmodi. Bibendum vinum tenue & aquosum. Fugendum immodicum exercitium ira, meror, & omnia quae sanguinem pauciores efficiere possunt. Si vero deterior fuerit sanguis, si quidem biliosus sit, primum purgationem desiderat biliosi humoris, per leuia quidem medicamenta, quae non admodum exsiccant: mox victum quem modo diximus. Sin pituitosus, medicamenta requirit excalescentia aut primo aut secundo ordine: non tamen desiccantia. Hae enim pituitosus humores excalescentes in sanguinem vertunt. Verum inter ea potiora sunt, quae non tantum sunt medicamenta, sed etiam nutrimenta: velat eruca, feniculum, anethum, apium, sium, polium, eaque virentia priusquam siccantur. Nam sicca plus quam oportet & excalescentia & desiccant. Quae vero desiccant, humorem sanguinis depauperant, crassiores similesque pauciores efficiunt. Et si natura quoque fuerint calida, iusto etiam calidior: sin frigida, frigidiorem. Debet nam esse modice calidus, ac neutiquam crassus, vt ex eo lac generetur. Proinde quae mediocriter excalesciunt, nullamque insignem adiunctam obtinent siccitatem, lactis potestatem facultatem habent. Inter quae sane, praeter ea quae paulo ante dicta sunt, est *sesamum in vino decoctum.* Item *butyrum recens pondere vini unciam in vino potum.* Praeterea *amygdala dulces, pistacia, nuclei pinearum triti, & cum butyro comesti.* Laudatur etiam ferculum hoc in primis, quod accipit: *Orizam decies ablutam, exsiccatam subinde & in puluerem redactam, coctamque in lacte optimo iuxta ignitos carbonas.* Inter coquendum autem sacchari candidissimi quod satis est adicitur, formaturque pulmentum. Fit praestantius, vbi adduntur *amygdala dulces, pistacia, nucleis pineae, farina hordei, cicer, & eiusmodi.* Annitendum tamen est, vt etiam cum leni thoracis frictione, aliisque medicamentis calidis & traetoria facultate praeditis, ad mammas lac alligetur.

Causa.

Signa.

Curatione fit ex intemperie.

Sanguinis paucioria.

Sanguinis deterioria.

Ferculum.

E De lactis redundantia. C A P. XVI.

CONTINGIT interdum, vt ob lactis redundantiam mamillae tumefactae replentur atque eousque extendantur, vt copiam eius vix ferre queant. Quod sane vitium Graeci *emphaliam* vocant. Fit a causa plane contraria, nimirum boni sanguinis copia. Visa & tactuprehenditur vitium. Huic quidem statim succurrendum, quod alias metuendum sit, ne mammas phlegmone corripantur. Inter initia itaque vena secanda poplitis, potissimum si menses detineantur, aut media quae in gibbero est. Vbi scilicet in toto corpore sanguis abundat. Deinde vtendi illis, quae leuiter reprimunt, ne scilicet ad pulmonem impetu quodam trudatur sanguis. In hunc quidem usum proderit, spongiam mollem posca tepida imbutam, madefactamque & expressam impendere, & mammas fasciis circumsingere. Vel palmulas cum pane & posca tritis adhibendae, Vel ouum totum cum rosaceo

emphaliam
Causa.
Signa.
Curatione.

A in formam emplastri, quod mammis imponatur. At ubi lac iam in grumos cōuersum fuerit, vltius ratione extenuante vtendum erit, & ad calidum inclinante, nisi a calore discutiente hoc vitium creatum sit. Extrinsecus lentes in muria decoctæ, adiecto modico cumino, & croco opponenda. Item: *parietaria herba viridis contusa confert. Decoctum fenograci, althea, apii, & beta folia. Farina diuini, faborum, & id genus aliorum.*

Lactis in grumos cōuersi curatio.

De phlegmone mammarum. C A P. XVIII.

ACCIDIT Interim, iustar aliarum phlegmonum, ppter sanguinis copiosi & calidi ad mammas defluxum. Interim etiam ob lac cale. modo concitum & coactum, ac subinde ad suppurationem tendens. Facile iam dictæ causæ discernuntur, quod si prior phlegmone iis quæ neq; grauidæ, neq; puerperæ sunt, accidat: alia vero, iā cōmemoratis duntaxat. In curandi ratione quæ negligenter administranda minime est: quum n. laxa, & adenosæ glandulosæ mammarum substantia sit, tacileq; fluctionib. pateat, & frigidior natura, in scirrosū affectū, & demū in cancerū promte veniti: obseruandum erit, vt in prima phlegmone cōfectū sanguis mittatur ex interna g. b. beri vena, vel media eiusdē lateris, nisi mensium subesset retentio: tunc n. consultus est, p. plurius aut malleoli venam incidere. Post hæc ad reprimendam veniendum medicamenta, quæ non oportet esse valida, ne ad interiores corporis partes nobiles humorum impetus tradatur: aut aliqua quæ discutere possunt, iis miscenda. Quare ad eum maxime vsum conuenit: osæ eū cum succo aut stillaticio liquore solan., acetæ, & decocto chamæmeli, vt scilicet in linteis madefacti & intincti, mammis imponantur. Valet

Causæ.

Signa. Curatio.

Adstringentia.

Cetiam emplastrū ex farina hordeacea, semine lini, santalis, bolo armenico, adipis porcino, & rosaceo cōpositum. Quod si medicus nō admodum conferte medicamenta reprimentia animaduertit, ad ea quæ discutunt statim illi eū progrediendum. Quæ propter hoc emplastrum est adhibendum, quod accipit: *Farina fabacea fenograci seminis lini, singul. vnc. dimidiū. Florum meliloti, & chamæmeli, vtriusque drach. duas & dimidiū. Medullæ panis tritici, vnc. dimidiū. Myrrha. Ebulliunt in aqua iustæ quantitat. dum in mellis crassitudine cœcant, postea adiectis oleorum chamæmeli, & anethini, vtriusque vnc. vnam & dimidiū. Bulliant iterum, & addantur vitellorum tres numero, croci drach. i. singaturque emplastrum. In hunc vsum lini semen, vel fenograci eum in oxymelite decoctum illi in potest, & alia eiusmodi quibus discutendi facultas inest, de quibus antea*

Discutientia Emplastrū.

Dispeditum est. Quid si vero discutendi spes omnis sublata fuerit, maturatione & suppuratione auxiliabimur. quæ perficitur hoc caraolafin vte, quod la. e. p. i. *Malua, althea, foliorum viola nigra, chamæmeli sing. manip. vnum & dimidiū. Radicis albeæ drach. vna. Bulliant in aqua donec melleant dein contundantur & informetur cataplasma. Aut singatur emplastrum ex semine lini & fenograci carici, radicis albeæ, & liliorum candidiorum, adiectis oleis chamæmelino & liliaco, adipibus porcina, gallinacea, & similibus. Suppuratione facta, ad rupturæ lectionemve mammarum veniendum. Hæc autem ferro, aut medicamenti perficitur. Medicamenta verò, quæ suppuratos in mammis humores emanare faciunt, sunt, simus columbinus, fermentum cum puluere cantharidum, calx viuæ cum simo asferino. Si ferro vti magis placuerit, locus prope papillam lunari sectione*

Cataplasma Emplastrū.

Enc accuratissime incidendus erit, vt incisione abscessus quidem profunditas denudetur, sed papilla conseruetur. Curatio reliqua talis sit, qualis aliorum vlcerum. Porto si propter lac coactum phlegmone accidit, tunc per initia vtendum est spongia molli tepida posca imbura, & expressa loco illigata. Item palmulæ cum pane ac posca trita imponendæ. Medulla quoq; panis, additis myrrha, croco, menta, & aliis quæ in cap. De redundantia lactis commemorata sunt, imponenda. His peractis, si phlegmone pericauerit, ad alia remedia, quæ paulo supra commemorauimus progrediendum.

LEONHARTI FVCHSII DE MEDENDIS SIN.

CVLARVM PARTIVM CORPORIS HVMANI A SYMMO CAPIT E
ad imos vsq; pedes malis, LIB. III.

F

De imbecillitate ventriculi. C A P. I.



VENTRICVLI imbecillitas interdum ex intemperie qualitatum effectricium citra humoris confluxum oboritur. Nam (vt testatur Galenus libro tertio, De sympt. causis, &c.) Omnis vehemens intemperies vires deicit. Fit etiā ex

Causæ.

100 Operum Leonhard Fuchsi Pars. III.

humore in ipso sinu & amplo ventriculi spacio contento, qui aut calefaciendi, aut refrigerandi, aut humectandi, aut siccandi, aut etiam horum aliqua per coniugationem efficiendi naturam obtinet: interim vero & in ipsas ventriculi tunicas immerso & infecto, ut copiosius li. 7. Th. meth. 1. 1. Galen. monstrat. Nudam qualitatem calidam testantur, sitis vehemens, cibi fastidium, nidorosisq; ructus. Frigidam contraria indicant, modica nimirum sitis, immodica appetentia, acidiq; ructus. Quid multa? si calida vel frigida intemperie ventriculus afficitur, assumptos cibos ad intemperiei naturam promutat, ut appareant cibi contra alicuius humoris complexum in nidorem aut acorem permutationem accepisse. Præterea a frigidis medicamentis, cibisq; & potibus statim adiurum hominem videbis, si calida intemperies exstiterit. Si vero frigida, calidis cibis & medicamentis iuuabitur, a frigidis vero laxetur. In humida nulla, vel exigua saltem sitis ægrum affligit, saluæ copia adest, & eibis gaudet humidioribus. In sicca, linguæ siccitas, corporis extenuatio, saluæ paucitas, sitisq; vehementissima. Porro copiam humorum viscerum nausea, vomitus, gravitas ventriculi, & ructus potissimum a cibo ostendunt. Quod si fluxa bilis redundat, oris amaritudo, bilis vomitus, sitis, ructus nidorosis, & ventriculi morsus aderunt. Sin pituita, nulla prorsus ventriculi erosio excipitur, nisi falsa fuerit: acidi ructus, nulla sitis, tensioq; ventriculi adfunt. Si vero atra bilis abundet, tristitia metusq; ructus & excreationes foetidae, piscesq; olentes, somnus cum accessione imaginationum alienarum, contractioq; & dolor poplitum & furarum. Intemperies omnis per contraria corrigitur atq; emendatur. Calidam itaq; refrigerare oportet, frigidam vero calefacere: siccam humectare, humidam siccare. Similiter vero etiam compositas intemperaturas aut calefacere & siccare, aut humectare & calefacere, aut refrigerare & humectare, aut siccare & refrigerare oportet. Calida igitur intemperie affecti, refrigerante victu curantur, præcipue vero si ex aceto frigida assumantur. Panis itaq; polca sit imbutus. In caninum genere pullis gallinaceis, pediculis, vitulinis caribus, cum aceto aut omphacio decoctis, utendum. Inter olera lactuca & portulaca maxime conducunt. Poma item, & pyra acida. Bibenda aqua frigida, si assuevit æger: si minus, decoctum cinnamomi, aut vinum tenue & aquosum propinandum. Extrinsecus ea quæ mediocriter adstringunt & refrigerant medicamenta, imponenda. Frigida intemperie ventriculi laborantes, contrariis medicari oportet, anisistuta, petroselinisq; decoctis. Cibi quibus vtuntur, odoramentis, nempe cinnamomo, calamo odorato, garyophillis, pipere, & similib. condianrur. Danda quoq; antidota diatrion pipere nominata, diacalamintus, & theriaca: forinsecus ea, quæ calefacere possunt vnguenta inungenda. In potu vsus sit vini veteris, & subadstringentis. Humida intemperie auxiliantur cibi, qui citra valentem calefactionem refrigerationemve siccant. Insupee consuetæ potationis parcitas. Utendum igitur victu tenuiore & resiccante: Vino meraciori, exercitiis, & cibi quoad fieri potest, abstinentia. Siccæ, inстар lie dicæ, de qua in li. 4. dicemus, curabitur. Copiosissime vero Galenus eius, vt etiâ reliquarum intemperantiarum ventriculi, curationem persequitur, li. 7. Ther. meth. vnde ea, quæ hic desiderantur petenda erunt. Ceterum si humor aliquis calefaciendi vel refrigerandi vim obtinens, ventriculi imbecillitatem efficiat, diligenter considerandum erit, an is humor in sinu seu amplitudine ventriculi innatet, an eiusdem tunicis impactus sit. Si in sinu continetur, ac biliosus fuerit, per vomitum statim expurgandus erit. Facilem vero vomitum reddit aqua calida, vel mulla dilutissima bibita. Satius erit, vt ante hæc humectantia exhibeas: veluti est prisanæ eremor, aut ouilutea. Sin in ventriculi tunicas est receptus humor biliosus, hiera picra alijs purgabitur, qua quidem (Galenus loco antea citato testis) nullum aliud medicamentum ad vitiosos humores qui in ventriculi tunicis decedunt, præstantius inueniri potest. Humore vacuato, victu vtantur eodem, quo eos qui calida eiusdem intemperie correpti sunt vti debere, paulo ante diximus. Intra corpus assumenda sacchara, quibus refrigerandi & humectandi inest facultas, iecem antidota istis viribus prædita. Extrinsecus ventriculo adhibeantur refrigerantia, & mediocriter adstringentia, vt est oleum rosaceum, ceroneorum, adellii santalis, balsamii, corallii, & resus. Infrigidantium tamen mediocris semper sit vsus, pro intemperiei contrarietate. Nam immodicus horum vsus, non modo non iuuat, sed etiam sepe insanabilem morbum efficit: quod scilicet ad concoctionem calorem si, mme opus sit.

Signa.

Caract.

Calida intemperiei curatio.

Frigida intemperiei.

Humida.

Sicca.

Curatio imbecillitatis ventriculi ab humore bilioso.

Hiera picra.

- A** fit. Si vero pituitosi, atque adeo crassi & lenti humores amplitudini ventriculi innatent, oxymelite vtendum est in quo ex medicamentis, quibus incidendi & extenuandi facultas quædam inest, sint decocta (verbi gratia) *hyssopus, iridis radix, origanum, satyria, & marrubium*. Sint tunicis ventriculi immergi fuerint, tum primum exhibenda quæ lentam & crassam pituitam dissolcent, postea vero purgandum. Qualia autem medicamenta sint quæ iam dictam pituitam purgent, capite decimotertio primilibrî diximus. Est veto & ipsa hiera picra ad crassorum humorum purgationem non inutilis. Vicitus quoque ratione extenuante tum vtendum erit. Antidotis item calefacientibus *diatrion pipereon diagalanges diascinnamomi, diambæ, zingibere condito, diacori, & similibus*. Extrinsecus ventriculo adhibenda sunt olea calefacientia, quale est *mar-*
Pituitosa.
- B** dinum, & menta, absinthium, mastichinum, & alia consimili facultate prædita. In hunc vsum etiam eomendantur cerata, quæ vulgus medicorum hoc licuta ito machalia nominat, quale est hoc quod accipit: *Cinnamomi selecti, garyophyllorum, piperis longi, singul. drach. unam. Gallia moschata, maceris, utriusque drach. dimid. Calami odorati, storacis, utriusque drach. 1. & dimidiam. Ligni aloes, scrup. unum. Menta sativa, drach. duas. Mastiches, ladanis, utriusque drach. duas & dimidiam. Oleorum mastichini & nardini, utriusque vnicuique dimidiam.* Cum cera & resina creberrima, quod latis est, informetur ceratum, ventriculo imponendum & obducatur serico purpureo. Aut vtendum hoc medicamento, quod habet: *Mastiches in puluerem redacta vnc. 1. & dimid. Quæ subinde spargitur in cono sicuti formam obtinente, & affunditur ei oleum nardinum.* Postea igni quoad liquefcit singula, adhibetur, & inspergitur iis *cinnamomi selecti, nucis moschate, garyophyllorum in puluerem redactorum, singul. drachina vna, & ventriculo admoventur.* Quid mirum? Hæc & alia ventriculū roborantia & calefacientia sunt adhibenda: verbi gratia, *menta, absinthium, thuris, mastiches, cinnamomum, acorus, vernus aut pro eo quam galangam maiorem hodie vocant, zingiber, macer, lignum aloes, calamum odoratus, & id genus alia libro primo, quem De compositione medicamentorum scripsimus, commemorata.* E quibus omnibus varia remedium genera, pro cuiusque atbitrio componi possunt.

De nausea & vomitu. Cap. II.

- N** AUSEA, quæ facultatis expultricis ventriculi deprauatus motus est, quo ventriculus ipse ea, quæ eius corpus contristant, quam citissime per gulam vacuare appetit. Ex vitioso humore, tum calido, tum frigido, in ventriculo contento gignitur qui aut in concavitate ipsius innatet, aut in tunicis eius infarrus, instat visci, adhæret, atque aëre aëlli potest: aut serosior existens, in ipsis ventriculi tunicis, velut aqua in spongia, immergitur. Atque eiusmodi humores ex ventriculi intemperie tum calida, tum frigida non nunquam nascuntur. Nonnunquam autem ex toto corpore, aut aliis partibus, prius male affectis in ipsum ventriculū, veluti illarum extremitatē, confluunt: vt pote ex iocinere, aut liene, aut capite, aut ex vniuerso corpore se expurgante. Si ex intemperie nascuntur, facile id ipsum ex notis capite præcedenti commemoratis, deprehendens. Vtrum vero is humor in cavitate ventriculi innatet, aut tunicis eius infarrus sit, ita cognoscet. Humor vitiosus innatens in ventriculo, ac nauseam excitantem, magna ex parte vomitus sequitur, atque ipse cibos corrumpens manifeste eiusmodi humore imbuit, & in suam naturam permutat. Si vero ventriculi tunicis humor tenax immerfus sit, nauseam quidem efficit, sed tamen talē, quam inanes vomendi irritationes comitetur, quæ lancinant tantum, & nullum humorem educunt. Sin serosus fuerit, non solum ante cibum, sed & post sumtum cibum vomitum inducit, idque si in ventriculi amplitudine innatet. Qui in superficie ventriculi infarrus adhærent, ante cibum magis inanes vomitiones mouent. Quando vero alie partes, e quibus in ventriculū excrepenta desiliunt, prius male afficiuntur, ipse æger primum laborantis partis lationem sentit, aut enim calor sensus iuxta labrantem partem ipsi accidit, aut frigus, aut grauitas, aut etiam tactui nostro dura succumbit. Si vero vniuersum corpus vitiosis humoribus plenum fuerit, id ipsum ex colore, & pustularum eruptionibus circa cutem cognoscitur, atque ex ipsa adeo vna. In curandi ratione diligenter considerandum erit, num ventriculi tantum pathus sit, aut totius corporis, aut alicuius alterius partis. Si quidem ex alia quadam parte, aut ex vniuerso corpore humores in ventriculū confluant, priorem curā totius corporis, aut partis prius male affectæ habere oportet.
- Causa.
-
- Signa.
-
- Causa.

102 Operum Leonhard. Fuchsi Pars III.

teritatem tamen ut neque ventriculum ipsum negligamus. Nisi enim vniuersum corpus humoribus vitiosis prius probe expurgetur, nihil egerit quisquis humorē qui se in locum aliquem receperit, expugnare conabitur. Sic quoque is qui primum laborantem particulam curat, velut fontem omnium in ventriculo influxionum excindit. Qua vero ratione partes quæ excrementa ventriculo demittunt, sint curandæ, ex propriis de iis capitibus perscrutandum erit. Ceterum si in ventriculo nati fuerint humores, concitantes nausæam, considerandum num tenues, biliosi & serosi sint, & in ventriculi sinu contineantur: tum enim tenuissimus pituitæ succus dandus, aut aqua tepida, & ad vomitum cogendus æger digitis, aut penais in os immillis. Si autem intrinsecus circa superficiem ventriculi iofarsi fuerint, *drachma vna aloes* in aqua diluta potui exhibenda. Siquidem calidorum, qui in ventriculo sunt humorum aloes optimum est medicamentum, ita vt sæpenumero ventriculo male habentes vna die sanauerit. Vnde quoque est, si multa in qua abstinthium incoctum sit, bibatur. Post humores vacuos, aliæque medicamenta bilis acrimoniæ obtundentia seu temperantia adhibita, quæ præcedenti capite sunt cōmemorata, calida ventriculi intēperies (ut eodem in loco docuimus) curanda erit. Si autem pituitosi, aut viscosi, & crassi humores sint, qui amplitudini ventriculi innatent, curandi sunt, ad eum modum, qui in præcedenti capite est a nobis expositus. Deinde frigida ventriculi amouenda intēperies. Quod ad vomitum quidem attinet, initio sciendum eum non esse reprimendum, a quo æger melius sese habet, iuxta hoc Hippocratis dictū *Is vomitibus spontaneis, si alia purgatur, qualia purgare partes, confert, & leuiter ferunt. San minus, contra.* Non erit itaque reprimendus qui decretorius fuerit, aut vbi ex vniuerso corpore in ventriculum confluunt humores, aut vbi in ipso ventriculo ppter intemperies nascuntur. Quate tunc potius est expultriciis facultatis motus adiuuandus e. i. t. in calido quidem pathemate aqua calida cum oleo violaceo pota: in frigida vero, oxymelitis popinato, & aliis quæ antea sunt a nobis cōmemorata. Quod si vero immodicus fuerit vomitus, atque æger plane vires iam deili: ereceperit, tum suppressioni eius studendum erit. Quare principio decubitus sursum vergens adornetur, in conuenienti & vitio contraria domo: quæ frigida quidem sit, vitio existente calidior: intra vero calida, vbi frigidum vitium existat. Extremæ corporis partes fricentur, manibusque calfactis palpentur, quin & violentius vinculis stringantur. Deinde pedes & manus in aqua solito calidiorē demittantur. Odoramentis vero naribus adinueneantur olfacienda, boni odoris: velut *rosa, mala cetonea, pulegium, menta, feniculum, spicanardi.* Ventriculus extrinsecus oleis abstinthie & rosaceo illinatur. Cataplasma ita & palmulis, *malu cetoneis abstinthie, item ceratæ ætæ & similibus, nempe mēta, lolis farina, mastiche, thure parata, & ventriculo imposita profunt.* Palmulas autem in vino veteri inacetatas optime conterere oportet, deinde mastichen & thus vnumquodque per se optime tritum adicere, & rursus simul terere. In hunc locum etiā reuocanda remedia, quæ partim in capite *De cholera*, partim etiā *De dysenteria* dicemus. Porro malo diutius permanente, & cibis non retentis, eucurbita ad os ventriculi cum plurima flamma affigendi, donec locus rubescat, atque ipsa adhuc affixa cibus præbeatur. Ceterum de vomitu sanguinis hic peculiariter nihil dicemus, quod ex curatione sputi sanguinis & dignotione causarum ex aliis capitibus facile curare poterit.

De siti immensa. C. A. p. III.

Causa. SITIS, Galeno lib. i. *De simpl. med. facul. cap. 30. teste*, duplici ratione provenire solet: partim humoris inopia, partim caloris copia. Calidior autem ventriculus multis & variis modis, propter scilicet calidam intemperiem nudæ qualitatē, simplicem vel compositam, aut calidos & biliosos humores in eonatos, aut ad eum confluentes. Item ob vini veteris & copiosi potum. Exsiccatur vero propter siccatē quæ in eo est intemperiem, aut humores falsos, aut falsæ aquæ potum: item nonnunquam ob consensum totius corporis, vt in ardentibus & hæticis febribus accidere solet. Causarum diuersitas facile ex ægeri sermonibus, & iis notis quas in duobus capitibus præcedentibus narrauimus, cognoscitur. Porro causa cognita, unicuique peculiaris curandi ratio est adhibenda. Quare siti ex calore proveniente, refrigerantibus est subueniendum. Conuenientiaque tum frigida ætis attractio, & aquæ, aut vini aquosi potio. Item cucumeris semen cōmanducatū. Decorticatum vero & tritū, ex aqua potuū, sicut ex calore ventriculi orto valde

Aloes.

De vomitu.
cap. 1.

Immodici vomitus curatio.

Causa.

Signa.

Curatio.
Ex calore
proveniens

A valde auxiliatur. Eodem modo prodest *lactuca semen manducatum & potum*; item *semen portulacæ*. Optimum ad sitim tollendum est hoc, quod habet: *Cucumeris sativi seminis decorticati, vnc. vnam. Tragacanthæ, vnc. dimidiam*. Tragacantham contraindito & cribrato, semen veto contetito, eisque ouorum crudorum recentium candida adscitico, & simul omnibus conritis catapotia informato, ac in vmbra exsiccat. Ex his deinde vnum detinendum præbero, vt paulatim dissolutum deglutatur. Quibus autem longo iam tempore ventriculus æstuat, eis succurrit radices dulcis succus potus, atque ipsa etiam radix ex aqua, & portulacæ succo. Ceterum qui siti premuntur ex calore & siccitate, vt accidit in ardentibus febribus, & peraridis omnibus, & in iis qui æstare, ac in graui æstu laborant, iis optime medetur, Galeno loco iam ostenso, oxycratum, vt

B quod ex aceto & aqua compositum sit. Acetum aurem strenue refrigerat, & quous expedite permeat: aqua vero, supra quam quod refrigerat, omnium quoque est vel humidissima. Nihil enim (vt loco antea citato testatur Galenus) aqua est humidius. Sitim etiam, quæ in febribus oboritur, lenire solet capitis irrigatio ex frigidissimo oleo, aut rosaceo, ex alto nimirum syncipite irrigato. Siccitatis quoque optimum remedium est somnus. Quare recte ab Hippocrate *Aph. 27*, dictum est: *Qui noctu bibere appetunt, huiusmodi sitientibus si superdormierint, bonum*. Proderit etiam in ore retinere *cerasæ sicca in aqua frigida macerata*. Radix item glycyrrhæ recens e terra euulsâ & comminudata sitim sedat. Vbi autem caliditas & humiditas coeant, vt accidit in ea aquæ intercutem specie, in qua in ventre falsi humoris copia congeritur, aut in iis quibus

C falsa pituita ventriculus repletus est, tum acutum optimum est remedium. Conducit etiam iis absorbere malorum & otoneorum cremorem, aut pyrorum, aut omphacii succum cum aqua. Si autem biliosi aut falsi humores in ventriculo innantes, aut eisdem immeris & iunctis firim excirauerint, tum exhibenda erunt medicamenta, quæ eosdem vacuare possunt humores. Deinde vero adstringentibus & roborantibus ventriculum vtendum est: quorum omnium exempla e superioribus petenda. His qui ob multi vini veteris potum sitiunt, frigida aqua potata succurrit, & alia quæ *lib. 1. cap. 24* sunt commemorata.

Catapotia
sub lingua
detinenda.Ex calore &
siccitate.

Oxyerat.

Sitia a fe-
bribus.Si a falsis
vel biliosis
humoribus.

De dolore stomachi. C A P. IIII.

D OLOREM stomachi Græci *epiphacis* & *epistaxis* nominant. Siquidem præcios ventriculi, vt testatur Galenus 4. *Aph. comment. 17 & lib. 3. De affectu loci, cap. 5. & multis aliis in locis, cap. 10*, hoc est *cor* nominant. Hinc est quod hoc vitium Hippocrati etiam *epiphacis*, id est, *cordis morbus* dicatur. Fit hoc vitium, vbi in stomacho prauis, biliosis, & morfu vellicantes humores detinentur. Vnde accidit, vt propter intolerabilem mordacitatem syncopen inferant, quam stomachicam appellamus. Malum ex assidua in ore ventriculi punctura & vellicatione statim innotescit. In hoc vitio cibi refrigerantes, & qui robur stomacho afferre possunt, offerendi sunt. In quo censu habentur lactucæ, & portulacæ cum aceto acceptæ: item mala punica, & citrea vocata, pyra, vix acceibz, & eiusmodi. Panis etiam, aqua egelida maceratus, conuenit. Reliqui quoque cibi tales sunt, vt facile concoquantur, & tamen corruptioni non sint obnoxii. Eius quidem generis sunt pulli gallinacei, perdice, aues montanæ, & similia cum omphacio cocta. Item pisces taxatiles cum aceto, limonibus, & acido citrili mali succo cocti. Bibant ægri aquam in qua parum cinnamomi sit decoctum, aut vinum aquosum tenue. Quantum ad curandi rationem attinet, initio vomitus est per remedia, quæ antea dicta sunt, eliciendus. Dein quoque per interna purgare oportet, hiera picra assumpta. Quod si vero syncopen accersat, eo modo quo in capite de syncope diximus æger curandus erit. Quibus peractis, remediis ventriculum roborantibus vtendum, tam extra quam intra corpus. De quibus non est necesse sermonem prolongare, quod de eis supra capite huius libri secundo, & alia locis satius copiose dictum sit. Quare ad alia ventriculi vitia progrediamur, atque quo pacto ea sint curanda, ostendamus.

Kaphacis.
Epiphacis.
yin.Kaphacis.
yin.
Causa.Syncopa
Stomachicæ.

Signa.

Vidua.

Curatio.

De phlegmone ventriculi. C A P. V.

P HLEGMONE ventriculi haud secus atq; aliarum partium corporis fit a confluxu sanguinis copiosi & calidi. Hanc autem testantur dolor immensus, assiduus, & qui

Causa.
Indicia.

- Viſſus.** nullis medicamentis ad motus mitigari poteſt. Præterea tumor, æſtus qui tactu diu-
dicari queat, febris, grauitas & nauſea. Viſum perinde atque in aliis phlegmonibus,
tenuem & exquisitum eſſe conuenit. Quod etiam monet Galen. *lib. 13. Ther. methodi*
capite cūſſem numeri, quod ſcilicet eius munus toti animali commune ſit. Vtendum
itaque puſſanz cremore: abſtinendum vero a carnibus, vino, & aliis cibis calidis. Bi-
bat æger aquam in qua decoctum ſit patum cinnamomi, aut ſuccum malorum gra-
natorum acidorum, aut aliorum fruſtuum frigidorum & adſtringentium. Parum
dormiat, ſiquidem in ſomno ſanguis intro tepit, adeoque phlegmone augeatur: & uon
mulum admodum loquatur. Fugiat quoad fieri poteſt iſtutiam, verſeturque in æ-
re mediocriter frigido. Curandi ratio a ſanguinis miſſione auſpicanda, modo cor-
poris vniuerſi plenitudo, ac virium robur adſint. Incidenda vero gibberi vena in-
terna, & pro virium robore ſanguis detrahendus. Vtendum quoque friſſibus
extremarum parium, ligaturis, & aliis ſanguinis accuſum ad ventriculum auer-
teocibus. Poſt hæc quæ reprimunt & adſtringunt, foris vbi dolor & tumor maxime
apparent, ſunt imponenda. Venter enim, poſſimum vero os eius, eorum
quæ adſtingunt complexu ſemper quidem indiget, multo maxime vero vbi fuerit
phlegmone correptus. Quare qui ſolis relaxantibus præſidiis, citra eorum, qui cor-
roborant admixtionem, curanonem tentant, periculum vitæ inſerunt. Oportet ita-
que ſiue oleum ſit, quo phlegmone laborantes partes ſonentur, ſiue cataplaſma iſtis
imponatur, ſemper aliquid ex adſtringentibus admilcere. Quapropter in hunc viſum
maxime conuenit oleum in quo abſynthium, aut malum cotoneum decoctum ſit,
admixta ſimul maſtiche, adhibere. Item ſuccum cotoneum decoctum, aut pyroctum, adieſtis
roſis purpureis, hordei farina, ſantalidis, bolo armenia, & ſimilibus. Licebit etiam v i
hoc cerat, quod habet: *ſarina hordei, vnc dimidium. Santalorum alborum & purpureorum,*
reſarum purpurearum ſing drach duas. Boli armenii, drachmam vnam & dimidium. Aloes, ma-
ſtiche, vtriuſque drachmam vnam. Abſynthii, nucis maſſicæ, balauſtorum, ſing. drachmam di-
midium. Oleorum maſſichini, reſaci, vtrorumque vnc. vnam & dimidium. Cum ceta & reſina
terebinthina quod ſatis eſt, inſormetur ceratam ventriculo imponendum. Quod ſi
maiori adſtriſione opus erit, id quod tunc ſit, quando tantæ fuerit ſtomachi imbe-
cillitas, vt nec cibum quidem retinere poſſit, recte prædictis miſcetur *emphaſium*, aut
abſynthii ſuccus, aut hypociſthii, & rhui obſeniarum. Hæc autem omnia, ſi vehemens ſit
phlegmone, æſtu frigida ſunt ad mouenda. Quod ſi alius nihil deſiciat, clyſteribus le-
uibus irritanda erit. Neque tenete facit, qui æſtus vehementia paululum ſiſſa, *ca-*
ſia ſylularis, vnc dimidium, Intibi ſatini ſtillaticio liquore dulcorat exhibet. Hoc etiam tempo-
re adſtringentibus medicamentis, quæ extrinſecus imponuntur, nonnulla quibus
diſcutiendi facultas ineſt, permilcenda etunt: vt eſt *ſarina ſenograci, ſores chamamelis,*
aliæ, & lini ſemina. Nunquam autem, vt antea quoque monuimus, etiam ne tunc quidem
quum nihil amplius affluit, & repelli quod in laborante particula continetur, non po-
teſt, ſoliſ relaxantibus & diſcutientibus vtendum: ſed ſemper adſtrigentia quæ to-
bur ventriculi enſeruari valent, admilcenda, vt diligenter etiam Galenus *lib. 13. Ther.*
meth. cap. 10. monuit. Quare hoc tempore illius emplaftri vſus conueniens erit, quod ac-
cipit: *ſarina ſemini lini ſenograci, vtriuſque vnc. dimidium. Semini anchi, drach. duas. Florum*
chamamelis, meliloti, vtriuſque vnc. dimidium. Abſynthii, balauſtorum, reſarum purpurearum,
vtriuſque drachmas duas. Hypociſthidis, ſerapul. duos. Oleorum chamamelini, ſiliaci, reſaci, maſſi-
chini ſingul. vnc. dimidium. Axungia gallina, anſerina, vtriuſque drach. duas. Commixti in omni-
bus, reducantur in formam emplaftri. Antequam tamen apponatur, non abſere erit, ſi hoc
vnguentum ventriculus inungatur, quod habet: *Oleorum chamamelini, anchini cotoneo-*
rum ſingul. drach. tres. Pulueris radicis aliæ, alſynthii ſemini lini, ſingul. ſerapulum vnum. Ce-
rat quod ſatis eſt, ſat vnguentum.

De cibi ſaſtidio. C A P. VI.

Appet. An. Cibi ſaſtidium diximus vitium, quod Græci *ἀνία*, Latini vero *inappetentiam*,
aut rectius *appetentia amiſſionem* vocant. Idem autē vitium ſecit *4. aph. 17. ἀνία*, & *Similis*
nuncupatur. Accidit aut ob ſenſus excluſionis venatum, qui ſane naturalis. *Fames Gale-*
n. lib. 1. de Symp. cauſis cap. 7. ſeſſe, excluſit, amiſſionem: aut quod excluſio non fiat, aut quod
corpus non inaniatur. Contingit etiam ſæpe propter aliquam calidam, poſſimum
ventri-

A ventriculi intemperiem, quæ solida corpora laxando dissolvit, atque ad attractionis functionem reddit imbecilliora: humida vero fundendo ac liquando supra modum extendit. Oritur interdum ob vitiosorum in ventriculo tedundantiam, & ob immoderatam ventris & intestinorum fluxionem, item sanguinis immodicam missionem. Respuunt quoque cibum ægri in continuis & vehementibus febribus, ventriculi, iecinoris, vultusque phlegmonibus, aliisque multis de causis, quas omnes nō opus est nunc recensere. Indicia quæ calidam testantur intemperiem, supra commemoravimus, nempe capite primo. Quæ biliosorum humorum vitio cibum aueisunt, ventriculi morfu torquentur, nauseaque & siti magis conficiuntur. Quibus autem humores computruerint il etiam interdum febricitant. At quibus crassi lentique hu-

Signa.

B mores fastidium pariunt, nec rosionem ventriculi, nec sitim experiuntur. Communiter autem omnibus superuenit nausea. Si iuxta principium morborum accesserit fastidium, aut iuxta eorundem vigorem, quum vires adhuc sustinere possunt, nihil molestiarum infert: modico enim alimento ægri indigent. Si vero in declinatione totius morbi appetentia perditio accedat, aut in diuturna imbecillitate, aut viribus debilitatis, aut ex immodica inanitione, periculo non vacat. Augetur vitium hoc & ab ætate: Incommodum enim eo pueri afficiuntur, utpote qui natura voraces sunt, & assiduo fomite indigent. Quare magnus præter naturam excessus significatur, si pueri appetitus perditione fuerint affecti. Quod ad curandi rationem attinet, si ex virium ventriculi imbecillitate appetentia amissio fiat, considerandum qualis intemperies vires exolvit: & per contraria ea ipsa corrigenda, veluti suo diximus loco. Si vero vitiatorum humorum præsentia fastidium excitavit, & tenues atque mordaces fuerint, antequam aliam curam adhibeamus, contentos in ventriculo humores vomitu aqua tepida copiose exhibita; vacuabimus. Quod si ægre vomit laborans, sorbitiones ut pilulæ cremorem, & alia quæ humectare possunt alimenta exhibebimus, quæ eiusmodi humores ad aluum elieat, atque inferne expellere consueverunt. Aut plane hiera picra alius purganda. Deinde per ea quæ ad hanc rem idonea sunt, corpora ad bonum perducemus temperamentum. Quibus crassi lentique humores fastidii auctores fuerint, iis medebris extenuando ipsos, incidendoque tum oxymelite, tum iis quæ ex hoc & ex muria componuntur, ut capari, oliuis, sinapi, & similibus, quæ capite primo exposuimus. Si vero propter phlegmonem, aut obturationem alicuius altius partis cibi fastidium accedat, tum illius curationem adhibere convenit. Conandum vero vni, ut per odoramenta appetentiam reuocemus, aut vitio odore diluto, aut malorum cotoneorum decocto, aut pytorum. Inunctione item leni idem conabimur per olea, rosaceū, masticchinum, & similia, ac moderata corporis frictione. In sedibus etiam lumbos & pubem amplectentes, adhibendi sunt. Cibi apparentur etiam plures & varii, ac optimo apparatu, & ultra dulcedinem quoque illi elientes, & appetitum irritantes: frumentacci in primis generis, ac multi alimenti, velut alica ex decocto palmularum, ac prunorum damascenorum lota: ova sorbilla, & ex volucribus non graueolentes, & macræ, & montanæ: pedes suilli in decoctione plurimum eliquati. Eiusmodi enim cibos si gustauerint tantum, sufficiens alimentum deinde corpori afferent. Omnia vero quæ exhibentur eiusmodi esse convenit, ut facile deuorari possint. Quæ enim multa commendicatione indigent, inieunditatem quandam afferunt, & appetitum euertunt. Nec negligendum, quin præter vnguenta extrinsecus etiam imponantur ventriculo cataplasmata ex palmulis, malis cotoneis, abynthio, & similibus, item cerata ex eadem materia apparatus, quorum etiam exempla e superioribus petenda erunt.

Quando fastidium ventriculi valet, nec ut.

Curatio.

Curatio. Considerandum qualis intemperies vires exolvit: & per contraria ea ipsa corrigenda, veluti suo diximus loco. Si vero vitiatorum humorum præsentia fastidium excitavit, & tenues atque mordaces fuerint, antequam aliam curam adhibeamus, contentos in ventriculo humores vomitu aqua tepida copiose exhibita; vacuabimus. Quod si ægre vomit laborans, sorbitiones ut pilulæ cremorem, & alia quæ humectare possunt alimenta exhibebimus, quæ eiusmodi humores ad aluum elieat, atque inferne expellere consueverunt. Aut plane hiera picra alius purganda. Deinde per ea quæ ad hanc rem idonea sunt, corpora ad bonum perducemus temperamentum. Quibus crassi lentique humores fastidii auctores fuerint, iis medebris extenuando ipsos, incidendoque tum oxymelite, tum iis quæ ex hoc & ex muria componuntur, ut capari, oliuis, sinapi, & similibus, quæ capite primo exposuimus. Si vero propter phlegmonem, aut obturationem alicuius altius partis cibi fastidium accedat, tum illius curationem adhibere convenit. Conandum vero vni, ut per odoramenta appetentiam reuocemus, aut vitio odore diluto, aut malorum cotoneorum decocto, aut pytorum. Inunctione item leni idem conabimur per olea, rosaceū, masticchinum, & similia, ac moderata corporis frictione. In sedibus etiam lumbos & pubem amplectentes, adhibendi sunt. Cibi apparentur etiam plures & varii, ac optimo apparatu, & ultra dulcedinem quoque illi elientes, & appetitum irritantes: frumentacci in primis generis, ac multi alimenti, velut alica ex decocto palmularum, ac prunorum damascenorum lota: ova sorbilla, & ex volucribus non graueolentes, & macræ, & montanæ: pedes suilli in decoctione plurimum eliquati. Eiusmodi enim cibos si gustauerint tantum, sufficiens alimentum deinde corpori afferent. Omnia vero quæ exhibentur eiusmodi esse convenit, ut facile deuorari possint. Quæ enim multa commendicatione indigent, inieunditatem quandam afferunt, & appetitum euertunt. Nec negligendum, quin præter vnguenta extrinsecus etiam imponantur ventriculo cataplasmata ex palmulis, malis cotoneis, abynthio, & similibus, item cerata ex eadem materia apparatus, quorum etiam exempla e superioribus petenda erunt.

D Si capari, oliuis, sinapi, & similibus, quæ capite primo exposuimus. Si vero propter phlegmonem, aut obturationem alicuius altius partis cibi fastidium accedat, tum illius curationem adhibere convenit. Conandum vero vni, ut per odoramenta appetentiam reuocemus, aut vitio odore diluto, aut malorum cotoneorum decocto, aut pytorum. Inunctione item leni idem conabimur per olea, rosaceū, masticchinum, & similia, ac moderata corporis frictione. In sedibus etiam lumbos & pubem amplectentes, adhibendi sunt. Cibi apparentur etiam plures & varii, ac optimo apparatu, & ultra dulcedinem quoque illi elientes, & appetitum irritantes: frumentacci in primis generis, ac multi alimenti, velut alica ex decocto palmularum, ac prunorum damascenorum lota: ova sorbilla, & ex volucribus non graueolentes, & macræ, & montanæ: pedes suilli in decoctione plurimum eliquati. Eiusmodi enim cibos si gustauerint tantum, sufficiens alimentum deinde corpori afferent. Omnia vero quæ exhibentur eiusmodi esse convenit, ut facile deuorari possint. Quæ enim multa commendicatione indigent, inieunditatem quandam afferunt, & appetitum euertunt. Nec negligendum, quin præter vnguenta extrinsecus etiam imponantur ventriculo cataplasmata ex palmulis, malis cotoneis, abynthio, & similibus, item cerata ex eadem materia apparatus, quorum etiam exempla e superioribus petenda erunt.

E Si capari, oliuis, sinapi, & similibus, quæ capite primo exposuimus. Si vero propter phlegmonem, aut obturationem alicuius altius partis cibi fastidium accedat, tum illius curationem adhibere convenit. Conandum vero vni, ut per odoramenta appetentiam reuocemus, aut vitio odore diluto, aut malorum cotoneorum decocto, aut pytorum. Inunctione item leni idem conabimur per olea, rosaceū, masticchinum, & similia, ac moderata corporis frictione. In sedibus etiam lumbos & pubem amplectentes, adhibendi sunt. Cibi apparentur etiam plures & varii, ac optimo apparatu, & ultra dulcedinem quoque illi elientes, & appetitum irritantes: frumentacci in primis generis, ac multi alimenti, velut alica ex decocto palmularum, ac prunorum damascenorum lota: ova sorbilla, & ex volucribus non graueolentes, & macræ, & montanæ: pedes suilli in decoctione plurimum eliquati. Eiusmodi enim cibos si gustauerint tantum, sufficiens alimentum deinde corpori afferent. Omnia vero quæ exhibentur eiusmodi esse convenit, ut facile deuorari possint. Quæ enim multa commendicatione indigent, inieunditatem quandam afferunt, & appetitum euertunt. Nec negligendum, quin præter vnguenta extrinsecus etiam imponantur ventriculo cataplasmata ex palmulis, malis cotoneis, abynthio, & similibus, item cerata ex eadem materia apparatus, quorum etiam exempla e superioribus petenda erunt.

De appetentia tanina. C A P. VII.

CA P. VII. De appetentia tanina, quæ Græcis *tanina* dicitur, contrarium est amissioni appetitus vitium. Qui enim sic laborant, si plures appetunt cibos: & cum appetitum cohibere nequeant, in ingerendis cibis modum excedunt: deinde multitudine eorum grauari, & assumptos cibos citra noxam ferre haud potentes, ad vomitum diuertunt. Postea rursus cibo se explentes, denuo ad vomitum reuertuntur, quemadmodum canes: unde etiam vitium hoc appellationem accepit. Fit propter frigidiores ventriculi temperaturam, aut propter viciatos & acidos humores, qui os ventriculi mordent

Cibus appetentia.

Causa.

106 Operum Leonhard. Fuchſii Pars III.

& irritant. Quippe frigidi humores vitiiati, eo quod cogendo & constringendo os
ventriculi vacuant, solutionemque suctioni proportionē respondeat, inducunt, cibo-
rumque appetentiam haud aliter quam naturale parhema excitant. Accidit etiam
nonnunquam propter totius corporis immodicam dissipationem, quæ autem huius
vim, aut retentis facultatis imbecillitatem sequitur, ut copiosius lib. 1. de Sympt. causis cap.
2. Gal. mensurat. Frigida ventriculi intemperies ex deperata concoctione, inflatione,
murmure, ac egestionibus multis dignoscitur, aliisque indicibus suo loco commemora-
rans. Acidi humores e ructu acido, multaque egestionē & liquida admodum depre-
henduntur. Immodica dissipatio si in causa fuerit, atque ob caloris qui instat ignis ci-
bos consumit, & eam rarefacit, vim acciderit: tunc pauciores ventris egestionē
procedunt, quam pro eorum quæ ingeruntur modo ac propotione, & quæ egerun-
tur sicciora sunt. Si ob retentis facultatis quæ cibis dominari non potest, imbecil-
litate proveniente, tum eorum quæ fuerunt ingesta, multa sit deiection. Quod ad
curam, liberationem spectat, frigida intemperies ad eum quem suo loco diximus mo-
dum cutatur. Si vero ab acidis humoribus ori ventriculi imbecillitas, ac veluti aqua in
spongiam immersis, canina, atque adeo immodica appetentia, fiat, initio hiera picra,
Galenū exhibenda erit. Hæc enim non tantum calefacere, verum etiam dissecare, ac
repurgare, extrahereque ex profundo ori ventriculi instans humores, & per aluum
inferne evacuari potest. Quin & robur ventriculo addit, ut subinde non facile nocuū
humorem suscipiat. Quare ea ad vitiosos humores ventriculo imbecillitas, ut supra et-
iam cap. 1. præsentis libri a nobis commemoratum est, odueendos, præstantissima est.
Exhibeat autem pondere drachmarum quatuor, ex vino cum aqua calida diluto.
Si vero puer hoc vitio laboret, qui ob amaritudinem bibere nequeat, in catapota vi-
nam vel duas drachmas huius medicamenti digeremus, & forinsecus melle cocto
oblinentes deuoranda exhibebimus. Quam veto magna ex parte a pituita acida vi-
tium hoc accidit, in utendum cibis & medicamentis quæ hanc incidere, dissecare, re-
purgare, & calcificare possunt: veluti sunt allia, porrum, thymus, satureia, origanum,
pulegium, & quæ illis similia existunt. Quapropter vacuatis initio vitiosis humori-
bus, hac tandem vitium ratione vitantur. Panis non sit recens, neque bene fermenta-
tus, cuietiam quæ vinam mouent admisceantur: velut est anisum, careum, cumi-
num, petroselinum, & quæ eius genetis existunt. Cibi sint pingues, & oleosi, Sorbi-
tiones itaque conuenient appetitum destruentes, veluti sunt pulres ex melle multo,
& oleo plurimo, aut adipe asserino, gallinaceo, aut fusillo. Ex oleribus autem malua.
Cerebella item & pinguiorē voluctium putes, pisciumque eodem modo, & omni-
no quæ appetitum auerunt, & satietatem inducunt, & quæ magno cumulo accepta,
modice alunt. Vinum autem ipsis recte datur copiosum, quantum videlicet bibero
possunt, ex eorum numero quæ impense calefaciunt: cuiusmodi sunt colore fusula,
substantia tenuia, odora, adstrictionisque expertia. Hoc enim ventriculum ex calfa-
cit, & humorem destruit acorem, ut sæpe solum suffecerit cum pinguibus & oleosis ci-
bis ad perfectamurationem: ita vtriusque ab Hippocrate dictum sit, Famem vini
potio soluit. Exhibendum vero tam ieiunis, quam his qui cibum sumserunt, etiam si
nondum sitierint. Ieiunis tamen calidum aut certe tepidum. Abstinerē autem opor-
tet ab omnibus acidis & adstringentibus cibis ac potibus, maxime vero a fructibus,
Bellaria eorum sint, pistacia, amygdale, nuce pineæ, & oliuæ ex melle. Lac etiam i-
psis exhibendum tum per se, tum cum passo aut melle: ita tamen ut obseruemus ac
vitium in eis, quibus in ventriculo accelerare consuevit. In his enim maius nocumentum,
quam vtilitas consequetur. Probe vero concoctum non solum appetitum ob-
tundit, sed & aluum obstruat emollit, fluxionesque eius sistit. Apparet etiam ex
ipso lacte potiones & placentæ: ut sunt dulciaria, & oryza, cum lacte decocta exhi-
benda. Lauare quoque per intervalla oportet, cuticulamque ipsorum large pinguefa-
cere. Iste quidem curationis modo tantisper utendum a malo penitus liberetur æger.
Si vero ex immodica dissipatione, ac transpiratione casua appetentia oritur, tunc
eorum qui hoc modo patiuntur cutem densare, ac spissiotem reddere conuenit, cum
oleo ex immaturis oliuis expresso, aut rosa ceo, aut myrto, aut alio in quo quippiam
adstringens ad lentum ignem decoctum sit, interim eis admisto alumine scilicet in ace-
to prius

Signa.

Cura.

Si ex acidis
humoribus.

Vitium.

2. Aphor.

Si ex immodica
dissipatione.

At prius acertimo trito. Quod etiam optima ratione zger in aere frigido ac perspirabili versabitur. Fugiat vero aerem calidum, & balnea consimili qualitate praedita, vini potum, & omnia quae tum extrinsecus, tum intrinsecus calefacere possunt. Potus autem sit aqua frigida, aut cinnamomi decoctum. Ducatur zger ad lauacrum frigidum, si quidem nihil id fieri prohibeat, utpote corporis gracilitas, aut pars aliqua corporis refrigerata, thorax (verbi gratia) aut alia quaeziam. Cibis exhibendi sunt stabiles, & zgre corruptibiles: ut sunt cochleae, & totum genus testaceorum, si ex duarum aquarum reiterata decoctione apparentur: carnes item suillae in vigore existentes, maxime vero ventres. Bubulae quoque pinguiore, & omnia simpliciter pinguis, & quae ventriculo innatant, tardeque concoquuntur ac distribuuntur. Sunt enim qui

Qui bubulas carnes negat non concoquantur.

B sic afficiuntur, quandoquidem ipsis calor acris ac mordax, & ut quispiam dixerit, tetriculosus inest, ex eorum numero, qui minori negotio bubulas carnes, aliaque concoctu difficilia, quam saxatiles pices, similiaque concoctu facilia conficiunt, ut *syfus* in praefatione libri primi De alimentorum facultatibus Galenus docet. Ex ovis, ea quae coquendo sunt indutata, aut sartagine frigida conueniunt. Similago abique melle ex pinguib. iussculis apparatus, similiter oryza cum butyro decocta, & panes non fermentati, iuxta proportionem autem quantum vitium imminuitur, tantum ex crassi humoris eibis est detrahendum, & ex adstringentibus fortinsecus admotis imminuendum. Aliquando enim sedata vehementis appetentiae accessione, quum corpus crudis & crassis humoribus repletur, in aliud grauius malum transitio fit. Inter adstringentia vero, praeter ea, quae supra dicta sunt, illius vnguenti vlus esse poterit, quod habet: *Oleorum myrtini & cotoneorum, utrorumque unciam dimidiam. Olei rosacei, unciam unam. Succo plantagininis, drach. duas. Santalorum purpureorum, mastiches, bistortae, rosarum purpurearum, sing. drach. unam. Buli armenii, serpyllus duos. Hypocistidis, acaciae, sanguinis draconis, singulorum serpyllum unum.* Ceterum quod laeis est, formetur vnguentum,

Vnguentum adstringens

De Bulimo. C A P. VIII.

Bulimiae Graecis nihil aliud est, quam ingens vehemensque fames, si etiam particula aliis vocibus adiecta, significationem eorum auget. Fit ex ventriculi frigiditate, indigentiaque, & vitium imbecillitate, & fere in totum ab externo frigore initium capit. Siquidem peregrinationes multae, & longa itinera, maxime per aeuum facta, vitium hoc inducunt. Dignoscitur hac ratione: fames initio multa adest, quae tamen non

Bulimiae Causa.

Dvlque quaque perdurat. Nam postea repente animo inquantur aegri, cum extremarum partium refrigeratione, & spiritus defectione. Hinc est, quod a canina appetentia differat, quae sibi famem perpetuo adiunctam habet. Porro huic vitio statim adhibenda curatio erit, quod si neque in locis desertis, aut in balneo eo correpti, auxilii facultate destituti, confestim perierint. Quare eos qui in itinere, aut alias fame magna citra febrem infestantur, resouebimus aceto, aut pulegio, ad odorandum exhibitio, aut terra quaecunque tandem contigerit aceto conspersa, aut malis, aut pyris, aut similibus aliis fructibus, qui ad manum fuerint. Auxiliatur & panis recens natus admoens, & caseus boni odoris, caro suilla assata aut cocta, & in vinum sum

Signa.

Causa.

E omne quod multum alit, & ventriculum calefacit: maxime vero quod n. dorosum ac probe conditum, sufficientemque odorem habet. Per huiusmodi enim odores, tales ut plurimum refocillantur: quum nihil sit, ut diximus libro 2 cap. De syncope, quod odore citius vires rescicere possit. Ceterum extremae etiam eorum partes fascis constringendae sunt, manuumque ac pedum summitates calidae aquae feruentiori imponendae, ipsique tum maxillatum punctura, tum capillorum, & aurium vell catione excitandi. Reuocatis vero iam ab exsolutione, panem ex vino diluto, aut aliud quippiam eorum quae acuatim vires reparare possunt, offeremus: velut sunt oua forbilia, alica cum vino. Compendiosissimum enim auxilium, inquit Aetius, ex cibo sperare possunt: quae etiam si oblatum assumere non possunt, ori indere oportet violenter, cogereque ut ipsum deglutiant. Euestigio enim & a fame, & ab animi deliquio liberantur, & celeriter excitantur. In hunc quoque usum conueniant antidota ex odoramentorum varietate composita, ut est *odoratum rosaceum, diambur, dianthum, diamoschi, aliapa moschata, & id genus alia.* Quod si in febribus (quod tamen raro accidit) bulimos inuaserit, atque circa exacerbationem febrilium declinationem

Antidota.

108 Operum Leonhard. Fuchsi Pars III.

eius accessio irruerit, intrepide cibi, quos diximus, sunt offerendi. Si vero in principio A accessiois, aut in vigore acciderit, per odoramenta prædicta reuocandi sunt ægri, maxime per ea quæ sunt frumentacei generis: velut est polenta aqua madefacta, aut panis calidus nidorem adhuc emittens, si idio quoque extremarum partium adhibenda, & cataplasmata ex palmulis, aut malis cotoneis in vino diluto decoctis. Atq; hæc vsque ad remissionem facere oportet, vt opportune cibum offerre liceat. Quod si ex his nihil melius habeant ægri, audendum est per ciborum ingestionem auxilium adferre. Cremorem itaq; ptisanæ, aut buccellas vnam & item alteram vino albo & tenui madefactas exhibebimus. His enim refocillati, ac ex improviso respicientes, deinceps vsque ad remissionem perueniunt. Vitabimus autem omnino in his qui hoc vitio sunt apprehensi, longiorem cibi dilationem ac inediã, Verum solerti ratione facta, singulis horis simplicissimum modicumque cibum dabimus. Assiduus enim bulimus & exoluit, & animi deliquia, vt dictum est, affert, quibus ægre auxilium reperitur. Quod autem in ipsa etiam accessione liceat ægrotantes nutrire & cibare, perleganti hystoria Galenus lib. 10. *Ther. meth. cap. 3. glendit*, vbi multa quoque ad institutum facientia offendunt studiosi.

De cruditate. C A P. IX.

Anergia.
Cruditatis.

CRUDITAS, quam Græci *Ανεργία* vocant, vbi cibi in totum non permurantur, Causæ eius intemperies ventriculi, phlegmones, scirrhi, abscessus, & quæcunque eius generis existunt. Aliquando autem ventriculo non equaquam male affecto cibi crudi permanent: aut propter immoderatam ciborum & potuum ingestionem, aut C ob vitiosam ipsorum ciborum qualitatem, aut ex intempestiua, aut etiam inordinata functione, aut ob recrementum vitiosum, aut somnum breuem, *quemadmodum Galenus lib. 3. De symptomatibus causis capite 2. copiose docet.* Causarum diuersitas partim ex ægri & assidentium sermonibus, partim etiam ex indicis certis deprehenditur. Ex sermonibus ægrotorum & assidentium cognoscantur immodica ciborum & potionum, itemque intempestiua & inordinata ingestio, somnique breuitas. Vitiosæ autem ciborum qualitates, e nidoribus & rufibus. Corruptiones enim nidorose in calidioribus & biliosioribus, acidæ vero in frigidioribus natura, & magis pituitosæ fiunt. Eodem modo & de excrementis, quæ in ventriculo præexistunt, iudicandum erit: quæcunque enim ex eis pituitosa & frigida sunt, acidæ corruptiones efficiunt: quæ D vero calidæ & amara bile mixta, nidorose. Ipse quoque ventriculus aliquo modo male affectus, si quidem frigidus morbus existat, acidæ perturbationes facit, calidus vero nidorose. Quum vero citra corruptionem perfecta cruditas oboritur, vt quales assumti sunt cibi, tales permaneant iuxta omnem suam qualitatem: ex hoc cognoscere datur vitium esse ventriculum, aut ab immoderata ciborum quantitate, aut per vehementem insiti caloris refrigerationem. Vt ne quis igitur in cruditate incidat, cautione in omnibus prædictis est vtendum, vt neque in multitudine, neque in qualitate eorum quæ in cibo accipiuntur, neque in acceptionis opportunitate, neque in ordine delinquit: & vt quæcunque concoquere valeat, ea tantum ingerat, & non quæ appetitus expostulat. Mentitur itaque maxime omnium diligentem curam habere oportet, appetentiamque refrenare, & neque plus quam vires tolerant, assumere. Ordinem etiam præpositum cauere oportet, ne scilicet mala cotonea, aut pnnica, aut aliquid aliud tale in primis ingerat: deinde vero olera assumant ex oleo & garo, aut etiam alia quæ aluum emolliunt. Intempestiuam quoque assumptionem euitare conuenit, ne scilicet antequam vel ipse modice fuerit exercitatus, vel hesternus eibus probe descenderit, prandeat, aut etiam præter consuetam horam. Fugienda etiam omnia quæ natura difficulter concoquuntur, veluti sunt carnes natura duræ, bubulæ nimirum, & ceruinæ: aut ætate, vt sunt omnia seniores. Cauendum etiam a pinguibus, salisque condimento seruatis, ac vetustis. Ex olenibus quæ calidioris sunt naturæ, valdeque frigida: item quæ statim pariunt, incommoda existunt. Ex piscibus qui duras carnes habent, & repositione arefacti. Abstineant quoque a cibis corruptis, & foetidis ac graue olentibus, Vitent fructus dulces, aut statim generantes, & immaturos. Bellaria item quæ difficulter concoquuntur. Non minus autem vitandi cibi peregrini & in consueti, ac medicamentariam vim habentes, quales frequenter placen-

Signa.

Vitium.

E

F

- A** placentis ac panibus immiscetur. Iuxta tempus vero accipiendi cibi neque impetuose, neque aceruatim, neque solidis partibus, aut absque commanducatione eos ingerere oportet. Neque etiam potus cibum interpellat: id enim vnitionem ciborum impedit, singulosque innare facit. Post assumtum cibum, motus inæquales ac conturbantes vitandi, item zitus & refrigeratio: hæc enim concoctioni ciborum resistit. Adiuuant autem eandem, calefactio hypochondriorum, & frictio pedum. Quod si grauitas adsit circa ventriculum, & ex ea molestia quædam in vniuersum corpus diffundatur, ex passa manus ventriculi apprehendendum est, ut puerulus carnosus ad-mouendus. Confert siquidem amplius Galeno *lib. 5. De simpl. med. facul. cap. 5. auctore*, magisque multo familiaris est eo calore, qui a fomentis paratur. Eiusdem vtilitatis
- B** gratia, quidam paruos catellos per quietem vntri imponunt, copiam coquentis cibos caliditatis adaugentes. Somnus etiam nocte imperturbatus & æquus procurandus. Ad hæc erector decubitus apparetur, & ea quæ capiti subiciuntur sublimius insternantur, & reclinatio ipsa in sinistrum latus fiat: atque si quis vigiliis infestetur, citra corporis vexationem commotionemve petmaneat, eandemque decubitus formam obseruet: frequentes enim agitationes cibos perturbant, intestinaque inflata reddunt. Curandis pro causis diuersitate variatur. Aliam enim intemperies ventriculi calida, aliam frigida requirit. Aliam item phlegmone, aliam scyrrhus & abscessus, quas omnes e propriis capitibus petent studiosi. In præsentiarum hæc dixisse satis sit: quum iniucundus ructus proueniens manifeste ciborum corruptionem
- C** esse factam indicat, citra concoctionem, modo supæ natura æger facile vomere possit, ad vomitum veniendum erit, atque aqua copiosa tepida paucio terapio acido permixta, ingesta, omnia corrupta ad excretionem cogenda. Si enim in ventre permanerint, & torsionum, & grauitatis capitis causa existunt. Aliquando autem bilis superne ac inferne effusionem aut profluuium ventris, aut etiam febres inducunt. Quare eos qui difficili concoctione apprehendi solent, longo ante tempore adsuæ faciemus ut facile vomant. commodissimus enim in plurimis periculis existit. Quod si quis natura difficulter vomat, & ob nullam causam male dispositum sit, frigida potum, non inconueniens erit cyathum vnum aquæ frigida puræ absorbere. Corroboratus enim ventriculus celerrime quæ in ipso hærent extrudit, & ad subiectas partes demittit. Sequenti deinde die in quiete æger asseruetur, frictionibusque pedum vtatur, & hypochondriorum concalcatione, donec murmura & flatus circa intestinum rectum eruperint, erudationesque cum qualitate manifestiori recurrerint. Et tunc tunc exsurgere conuenit, ut primum aluæ & quæ corrupta sunt egerat: deinde ad deambulationem moderatam æger procedat, atque ocium agar, propter commotos vapores ex corruptione in caput delatos. Post hæc autem ad quotidianas actiones mens applicanda est, citra perturbationem ac indignationem. Deinde rursus venter cogendus est ad eorum quæ relictæ sunt excretionem. Postea quiescere iubebimus, atque aqua calidior pedes perfundere ac fouere: frigida vero pura, facie proluta, in lecto quiescere, omnibus conatibus somnum illiciendo. Post quem modica deambulatione, deinde balneum suscipiatur. A balneo cibum capere conuenit moderatum, & cui concoquendo corpus sufficit. Non prætereunda tamen sunt medicamenta, quæ concoctionem iuuare possunt: veluti est piper, maxime longum, quod vniue concoctionem adiuuat. Si tamen id ipsum non adsit, albo vtendum erit: quod si neque hoc adsit, nigro. In eundem vsu antidotus diacotone non conuenit, & diosporiticum Galeno & alijs veteribus dictum. Sunt etiam alia tum simplicia tum composita ventriculum roborantia intra & extra corpus exhibenda, quæ in superioribus capitibus recensuimus. Debent autem omnia hæc medicamenta, potissimum quæ oxypora, hoc est, cito penetrantia, ac ipsiunt, vt sunt *careum, funiculum, apium, ligusticum, petraselinum, ammi, piper, zingiber, & similia, duabus ante cibum horis dari*. Acibo vero nunquam
- F** assumenda: distribuntur enim simul cum ipsis aliquid crudorum ciborum, & obstructionem operatur. Quare vsus illorum maxime sit post matutinam frictionem, & duabus ante exercitium horis.

Cazatio.

Vomitus.

Piper longum concoctionem iuuat.

Oxypora quando laudat.

Causa.

De inflatione ventriculi. C A P. X.

A

VENTRICULVS ex flatibus in eo generatis inflatur, vocaturque vitium hoc GRÆCIS *νεύρωσις* proprie, & *ισχίμωσις*. Generantur autem ex humoribus in ipso pituitosis, aut ex cibis in vapores per deficientem & imbecillum calorem resolutis. Etenim absoluta frigiditas nullum omnino flatum efficit: propterea quod neque extenuare, neque coñficere, neque dissolvere cibum possit. Vehemens autem calor, magna ex parte vincens ea quæ comprehendit, plus quam pro vaporis generatione eibum extenuat, nisi is suapte natura facile in statum transeat, verum flatu ita genitus & turbidus erit, & nebulosus: quin etiam paucus, & parum duraturus, ut ad vnum aut alterum ructum statim euanescat. Calor vero in eibos agens, si parum validus fuerit, ut eos quodammodo dissolvit, ita non omnino coñficit: unde sane flatuum generationem fieri

Signa.

B

neceffe est, ut capiti lib. 3. De symptom. causis cap. 7. Galenus docet. Accedit ita laborantibus ventriculi gravitas & distentio: aliquando etiam tumor & eminentia quædam iuxta os ventriculi, & ipsum adeo ventriculū efficitur, ructusque inanes fiunt modice allevantes, inhibitiōque flatuum qui per alium ex eorum consueverunt. Malum etiam ipsum aliquando quidem iuxta totum thoracem, aliquando vero retro iuxta spinam ad dorsum ipsasque vertebra irruit: sæpe autem & vtrinq; occupatos tenet. Ultra hæc vehementis difficultas spiritus ob septi transuersi compressionem adeit, ut aliqui non dissimile quiddam suffocationi se perpeti æstiment. Leuantur autem cibo inferne subeunt, & flatibus siue per ructus, siue per alium exclusis. Murmura denique intus audiuntur. Si itaque ex cibis pituitosis sit ventriculi inflatio, videtur sane ratione exte-

Curatio.

C

nuante vtendum erit, & medicamentis iis quæ pituitam dissicant & vacuant, de quibus cap. primo huius libri diximus. Sin ex deficiente & imbecillo calore orta fuerit inflatio, cibis certe vtendum erit concoctis facilibus, & boni succi. Parum etiam comedendum: siquidem inedia huic vitio summe coufert. Post omnem cibum, vinum meracius exhibendum. Multum tamen potum, tanquam infestissimum hostem deuident. Fructuum quoque atque olerum humidorum, dulciumque omnium esum, semper suspectum habent. Solis etiam calidioribus vtantur: hæc enim Paulo lib. 1. cap. 32. testis, mitigant, emolliunt, flatu vbicunque fuerint, dissoluunt, somnumque conciliant. Vbi vero somnus accesserit, non parum leuat ægrotantes, quod scilicet euncoctionem mirifice iuuat. Ceterum quod ad medicamenta ipsa atinet, bibant hoc deco-

Solis calida.

D

coctum, quod habet: Calamintha, menta stri, chamamel, origani, mentha, pulegii, singul. manipulum vnum. Absinthii, manipulum dimidium. Seminum anisi, api, cumini, dauci, periselinii, feniculi, sing. drach. tres. Seminū vrtice, carei, vrtisq; drach. duas. Radici heleni, vnc. duas. De-

Decoctum.

coquantur in aqua iuxta quantitatē, donec tertia pars absumatur: dein transfundantur, adiectoque saccharo sufficientius decoctū dulce reddatur, addanturq; setapii de calamintha vnc. tres, & fiat potio, de qua æger in aurora singulis diebus sumat vnc. quatuor. Vel vtendum medicamento hoc quod accipit: Specierum dianisi, diacumini, diacalamini bes, sing.

Tritura.

serup. duos. Seminū anisi carei dauci feniculi singul. serup. vnum. Cubebarum, garyophyllerum, vtriusq; serup. duos. Zingiberis, serupulum vnum. Piperis, drach. vna. Sacchari lib. dimidiam. M-

Glandes.

isceantur singula & fiat tritura, vel vt barbari loquuntur, drangea. Eos qui nō ita diu ante cibum sumperunt, primum vomere oportet, Glandes quoque coñfident & citra dilationem supponendæ sunt, ex rebus flatu prolestantibus, in hunc vel similem modum formatæ: Atellæ cocti, vnciæ duas. Seminū rutæ, cumini, feniculi, singulorum serupulum vnum. Seminū carei & anisi, vtriusque drachmam dimidiam. Salu serupulos duos. Ati-

Chylis.

secantur singula, & fingantur glandes. Alio autem vehemēter adstricta, chylis infundendus, qui accipit decocti paulo ante descripti libram vnam, Benedicta laxatiua, drachmas septem. Oleum absinthii, ut acetum, anethini, singulorum vnciam vnam. Pinguetia asferis & gallina, salu expertum, vtriusque drachmam vnam & dimidiam. Salu vulgare, drachmam vnam. Commixtus omnib. fiat chylis. Extrinsecus vetriculus in hoc vitio cū oleis iam dictis inungendus est: aut lina in fasciculum conuoluta, oleis prædictis leuiter calidis madefacta, imponenda. Lanz vero sic conuoluta, cuminum tritum, aut api semen, aut anethi inasper-

Ceratum.

gendum. Perleuerant autem diutius malo, cataplasmata ex semine lini, bordsæceæque & soliacæ farina, cumino, anethi semine, aut api, aut feniculi tritu, centaurei coma, & id genus alii parata, imponenda. Aut hoc ceratum, quod habet: Olerum rutæ, anethini, nardini, laurini,

A *laurini singulorum vnciam vnam. Ferina feminis lini sanagraei, utriusque drachmam vnam & dimidiam. Semenis epii, carei, melanthii singulorum drachmam vnam. Baccarum lauri, centaurii minoris, utriusque drachmam vnam & dimidiam. Gummi ammoniaci, opopanaxii, utriusque drachmas duas. Ceræ & resinæ quod satis est, fiat ceratum. Porro cucurbita b. n. a magnitudinis umbilicum vndique comprehendens, cum flamma copiosa admodum, præfidi in hoc vitio est quod nec tantum menti cuiuspiam simile, Galeno etiam lib. 12. The. metho. ad ipsum resiliante, efficit. Castoreum quoque ex posca potum, tum extrinsecus cum oleo anethano appositum, prodest.*

De singultu. C A P. XI.

- B** *A* *triplici Græce, singultus Latine, est motus ventriculi violentus, qui est veluti eius convulsio. Singultus quid*
ab expultrice facultate naxia violento extrudere excitatus. Neque temere a sicco cum sit, Singultus non causatur
veluti eius convulsio. Neque enim absoluta convulsio est, licet enim solis musculis inesse solet. Atqui neque ventriculi si ipse, neque ipsius ostiolum muscularis est, ut copiosius Galenus libro 3. De sympt. causis cap. 2. ostendit. Accidit magna ex parte, vel ex plenitudine, vel inanitione, Hippocrate etiam teste, qui sic scriptum reliquit: Convulsio fit vel ex plenitudine, vel inanitione ita vero & singultus. Interdum etiam fit ob acrimie humorum, & mediocritate præditorum, mordacitatem. Cibus quoque in mordacem qualitatem mutatus atque adeo corruptus, aliquos singultire facit. Frigiditas etiam oris ventriculi, & alimenti corruptio singultum inducunt: quo sane nomine pueris omnium maxime frequenter singultus eveniunt. Fit denique in febribus singultus, stomacho præsertim, aut aliquo alio viscere phlegmone oblecto. Causæ externæ facile de sermionibus ægri & assidentium cognoscuntur. Plenitudo ex gravitate, inanitio autem ex iis quæ præcesserunt. Cibus corruptus e nidore eius: acrimia vero ex vellicatione atque erotione. Singultus itaque ubi a frigidityte ortus fuerit, oleum in quo ruta, cumminum & absinthium decocta sint, lana exceptum, ventriculo imponendum, Oleum etiam mastichinum, & e castoreo inunctum prodest. Pueros calefactorum linteorum admenio non raro iuvat. Adulterioribus & integræ ætatis in potu vinum, aut apium in aqua multa decoctum, aut cumidum tritum, aut alarum, aut pulegium, aut dictamnus, aut nardus celtica, quodlibet eorum per se, aut simul mixta in aqua multa decocta exhibeantur. Utile & acetum scylliticum, sorbendo acceptum. Castoreum etiam iis, tum ob frigiditatem singultientibus, tum ob humorum multitudinem similiter affectis, drach. pondere ex posca dandum. Quin & ventriculo extrinsecus imposuimus, utriusque commodum existit cum oleo antiquo. Præterea qui ob frigiditatem singultiant, iis spiritus retertio, quæ calorem augeat. quemadmodum copiosius lib. 2. De sympt. causis cap. 8. Galenus docet, præcens est remedium. Quando vero ex plenitudine obortur singultus, vomitus optimum remedium fuerit. Crassis autem humoribus existentibus, cum oxymelite scyllitico, & calaminthes marrubii, ac similibus iam sæpius commemoratorum decocto extenuandi & incidendi erunt. Deinceps ea, quæ in contrarium humorum copiam trahunt & auerunt, sunt adhibenda. In quem usum conueniunt ea quæ per interitum purgantissimum vero clysteres, extremarum partium frictio

E & constictio, cucurbitula cum plurima flamma thoraci, ventriculo, & dorso affixa. Conuenit etiam iis deambulatio longa & concitata, gestatio, atque adhuc magis equitatio. Præterea si eructatio etiam conuenienter eis concitatur. Nam Hippocrate teste, a singultu comprehensum sternutatio superueniens liberat. Quando enim a plenitudine fit singultus, violente opus est motu, ut veluti concussio ipsius efficiens humiditates, dissiliantur atque vacuentur. Sic quoque vociferatio concinna cum plurimo clamore, & detentio spiritus illis conferunt. Ventriculus denique per medicamenta quæ intus in decus & extrinsecus adhibentur, roborandus erit. Intrinsecus per antidota corroborantia, de quibus lib. 2. De comp. med. cap. 4. abunde diximus. Extrinsecus vero vnguentis, emplastris & ceratis antea productis. Porro singultus ex vacuatione finatur per alimenti conuenientis assumptionem, & per ea quæ defectum explent: quæ partim sunt supra dicta, & copiose infra in curatione hæcicæ febris dicuntur. Non mediocriter autem in hoc genere singultus conducit, vertebrae ceruicis & dorsi humectante oleo, nempe violaceo & amygdalarum dulcium perungere. Ceterum mordacibus rebus singultum excitantibus, primum sufficiens remedium vomitum

Cucurbita.

*Singultus quid
Singultus non causatur
Sic ventriculi
Causæ.
Aph. 39.*

Signa.

*Curatio singultus ex
Singultus.*

*Singultus ex plenitudine
Curatio.*

Auerio.

Aph. 39.

*Singultus ex vacuatione
Curatio.*

*Singultus ex mordacitate
Curatio.*

Pilula un-
de cyno-
glossa vna.

Obrunden-
tia morda-
citate.

Pastillus.

ipsum reperiemus: deinde sensus etiam stupefactionem, & morsum inferentiam alie-
rationem. Stupefiunt autem sensus per refrigerantia: in quem usum *Philonium* exhi-
beri potest, aut pilula de cynoglossa, quæ in hoc vitio mirifice conferre solent. Ea-
rum vero is usus est. Debent ex vna drachma confici sex catapotia, quorum vnum
antequam cubitum eat ager, sumat. Alteratur autem mordacitas & discutitur per ob-
tundentia, attenuantia & exsiccantia medicamenta. Obtundit autem mordacitatem
intybi sativi succus potatus, cucumeris semen decortatum, tritumque bibitum. Lactuca semen co-
dem modo sumitum. Item portulaca succus potatus, ipsaque portulaca in cibo sumita. Attyxarum
etiam decoctum in potu acceptum. Maxime tamen omnium præstat *lac asinum*: aut si hoc
non adsit, bubulum, recens multum, potatum. In eundem usum exhibendum *saccharum*
rosaceum, aut violaceum, aut nymphaea, antidiatus diarrhædæ, diarrhædæ santalæ, eupasium viola-
ceum, nymphaea, & eiusmodi. Obtundit verò, attenuat, & exliccat is pastillus, qui acripit:
Cestri, croci, spicanardi, rosarum viridum, mastiches sing. vna dimidia. Asari, albes, triusque
drachmas duas. Opii, drachmam vnam. Cum succo psyllii fiant pastilli, de quibus detur
drach. dimidia aut drach. vna. Porro *opium, & rosa & psyllii succus* ex refrigerantium
genere existunt, ideoque acrimoniam obtundunt. *Nardi autem spica* ex discutiendi
vitio & corroborantium. *Asaram* vero, per urinas vitiosos deducit humores, *Aloe*
vitiatos humores expurgat, & inferne per ventrem propellit. *Crocus* concoquit, &
particulas corroborat: per temperamentum quidem caliditatis concoctionem effi-
ciens: per adstringendi vero vim, quæ ipsi adest, robur addens. *Castus* autem sufficien-
ter calefacit, moderate vero adstringit, quod & ex gustu eius percipitur. Commendat
hoc medicamentum pluribus verbis Galenus libro 8. *De comp. medice secundum locos, cap.*
3. estq; ordine decimum tertium.

De cholera. C. A. P. XII.

Cholera.
Cholestici.

Causa.

Signa.

Curatio.

XOLERA Græcis, cholera Latinis etiam appellatur, est ventriculi immodica perturbatio, in-
fra & supra per vomitum facta. Barbaram sectantes medicinam, cholicam & cho-
lericam passionem nominant. Qui hoc malo afficiuntur, Græcis *cholæstici*, & Latinis
choleries vocantur. Accidit ob multam cruditatem, quæ nonnunquam e magna ali-
mentorum, peponum nimirum, pinguium, dulciumque prapitate & corruptione, in-
terim etiam ex viriosorum humorum copia oritur. Signa quibus vitium deprehendi-
tur, manifesta admodum sunt: nam infra supraque excernunt. Sitis etiam sequitur, &
sudor, & pulsus concisus, musculorumque manuum ac pedum, maxime vero lorarum
contractio & tensio. Quapropter cum hoc vitium acutissimum sit, & grauissimam
synopam, si paulo diutius duret, inducat, accurata opera danda erit, quo conse-
ssim & sine mora huic succurratur. Nemo autem Medicorum, vbi copia vitiosorum
humorum vitium hoc conciliauerit, mox initio, aut confertim ea, quæ effertuntur
cohibere aggreditur: inutilia enim cum sint, vacatione indigent. Quare si nausea-
bundus est ager, & turbatur, cibis etiam num crudis in ventriculo manentibus, a-
quatepida propinari debet: deinde vomere, modo ad vomendum non sit difficilis,
oportet, digito vel pinna ori indita. Neque tamen cum aqua multa, neque aqua cum
oleo mixta vomitus ciandus: quod hæc fluxiones augeat, illa vero mordacitatem
operetur, & torsiones augeat. Aduuare etiam oportet per inferna excretionem:
alienum enim velut venenum insidens, & ventriculum ac intestina rodit, & humo-
res ex vniuerso corpore attrahit. Propinanda vero sunt leuissima medicamenta
purgantia, vt est *aloe, casia fistularis, myrobalenorum decoctum, & similia.* Postquam autem
superuacua educta fuerint, tum quiescere oportet, atque hypochondria oleo ma-
stichino, vel nardino, vel abinthire fouere conuenit, somnumque accersere. Præ-
dictis oleis admiscenda interdum alia quæ ventrem roborare possunt, de quibus su-
pra dictum est, & ex iis consicienda vnguenta. Vbi iam exacta apparuerit concoctio,
balneo aquæ dulcis, & cibis boni succi vtendum est. In quorum numero est *insculum*
pulsi gallinacci cum omphacio. Carnes auicularum montanarum, perdicum, turdorum, & simi-
lium, oua sorbilia, & eiusmodi. In potu vtendum succo malorum granatorum, aut sera-
pio rosaceo, aut aqua in qua chalybs ignitus ter aut quater exstinctus sit. Ceterum
cum malum persueuerit, & gracilitas per ambitum corporis fiat, & maxime si ven-
ter confidat, pulsus minor denique euadat, tunc sane plus adstringentis, veluti
melspi-

A mēspila, sorba, cytonia, & cornā dure, & extremas corporis partes vinculis adstringere, ac oleo multo impinguare oportet. Cataplastmata etiam & emplastra ex adstringentibus & roborantibus composita ventriculo imponenda. Sunt autem eius farinæ quæ ex palmulis, hypocistidibus, acacia, rhacobysmorum, bolo armenio, thure, balastis, resis, ac myrti fructibus componuntur. Efficax quoque remedium est, si linteum in sicco malorum fluëstium madefactum, ventriculo imponatur, aut hoc ceratum, quod habet: *Oleum rufæ, myrtini, cotoneorum, singulorum unciam unam. Mastiches, thuris, acacie, singulorum drachmas duas. Hypocistidis, drachmam unam & dimidiam. Santalorum alborum & purpureorum, drachmas unam. Balastis, sanguinis draconis, utriusque drachmam dimidiam. Boli armenii, drachmam unam.* Ceræ & resinæ quod satis est, informet.

B tur ceratum, quod ventriculo adhibeatur serico obductum. In potu vero frigida aqua cyathi mēsurata, hoc est, vna & dimidia, absorbenda præbeatur. Cautionem tamen ne hiemum frigida sit. Hæc enī acuatim exhibita reuomitur, & aliquid innatum calorem suo stupore extreme offendit, aut phlegmonem stomachi, aut viscetis alicuius efficit. Instilletur vero hinc interdum mali punici acidi succus exiguns, aut rosarum, aut pampini vitis decoctum. Quod si acriora sint ea, quæ excernuntur, vetex sitis & ardor, cucumeris semen cum aquæ cyathis tribus præbeatur. Datur quoque vititer cum amylo. Tum etiam antybi & lactuæ in posca coctæ exhibeantur. Post vero somnus procurandus & quies omni modo: Verum si fluxio sisti nequeat, & pulsus intercidatur; apprehendaturque frigiditas & sudor, aliquando etiam singultus, ad vinum transeundum est mediocriter adstringens, neque vitibus validum, dulce tamen, non autem odorum. Interant autem in ipsum calidum, si fieri potest, si vero non, frigidum, micas panis: aut alicam iniciant, atque ita paulatim & per intervalla absorbeant. Vini tamen multitudo vitanda est, ac omni ante coquendum ut ipsos sopiamus, erosus; pampinus, rubo, & similibus antea sæpe dictis, domus paulitimo constricto. Odoramenta quoque nasibus admoueantur, rosæ, mala cotonea, & eiusmodi. Illitiones etiam soporiferæ, circa frontem adhibeantur. Alio autem adhuc egeritæ, amyli cum decocto capitum papaueris per clysterem infundatur: simul enim & e. hibet & refrigerat, & somnum inducit. Ad vomitiones vero coercent das succum mēspilorum, malorum cotoneorum, punicorum, pyrorum.

C quando etiam singultus, ad vinum transeundum est mediocriter adstringens, neque vitibus validum, dulce tamen, non autem odorum. Interant autem in ipsum calidum, si fieri potest, si vero non, frigidum, micas panis: aut alicam iniciant, atque ita paulatim & per intervalla absorbeant. Vini tamen multitudo vitanda est, ac omni ante coquendum ut ipsos sopiamus, erosus; pampinus, rubo, & similibus antea sæpe dictis, domus paulitimo constricto. Odoramenta quoque nasibus admoueantur, rosæ, mala cotonea, & eiusmodi. Illitiones etiam soporiferæ, circa frontem adhibeantur. Alio autem adhuc egeritæ, amyli cum decocto capitum papaueris per clysterem infundatur: simul enim & e. hibet & refrigerat, & somnum inducit. Ad vomitiones vero coercent das succum mēspilorum, malorum cotoneorum, punicorum, pyrorum.

D commanducare & deuorare conuenit. Si ne his quidem auxiliis, & aliis quæ supra cap. 2. huius libri exposita sunt, cibum retinent agrotantes: extrinsecus ventriculo cucurbita levis quam maxima admoueatur. Ad eōtractiones autem in musculis factas, linimentum oleo calido lumbi musculis citro imponere oportet, & cerata humida seu vnguenta, quibus adiectum sit aliquid castorei, & olei iuni, quorum copiam cap. De resolutione & consensione offendit. Vbi malum inclinauerit, cibis resciciendi sunt agri, pulvis gallinæ, columbæ, gallinæ, perdicibus, palumbis, turdus, & consimilibus.

De diarrhæa. C A P. XIII.

Δ iarrhæa Græcis, Latini vero diarrhæa, copiosum est sine exulceratione & phlegmone alui profluuium: Accidit propter imbecillitatem instrumentorum concoctioni seruientium, alimenta item copiosa humidiora & viscosiora, eorumdemque corruptelam, mordicationem denique in ventre contentorum, & defluxum quorundam & sopernis ad ventris spacia, imbecillitatemque rectoris facultatis. Notæ signa: quibus discernuntur causæ, manifestæ admodum sunt. Si enim propter imbecillitatem diarrhæa sit instrumentorum quæ concoctioni seruunt, ventriculi (verbi gratia) intestinorum, iociuoris & lentis, ex propriis de his capitibus petenda signa erunt. Sin ob alimentorum prauorum multam ingestionem accidat, partim de agri sermonibus, partim etiam ex his quæ excernuntur, cognosci potest. Si enim biliosa fuerint, flavo colore infesta erūt, neque citra mordicationem & caloris sensum eiciantur. Aderit etiā oris amaritudo, sitis, tenuis corporis habitudo, & alia quæ biliosam constitutionem ostendunt. Si autem pituitosa fuerint, contraria iam dictis prorsus erunt ea quæ per alium excernuntur. Quod si a capite in ventrem confluxerint humores, egestionis spumose apparebunt, cerebrique temperies humida admodum erit. Si a plenitudine totius corporis oriatur aut iudicatorius sit alui fluor, signis quæ in aliis locis a nobis commemorata sunt, & a Galeno in lib. De plenitudine, & crisi deprehenduntur. Cæ.

114 Operum Leonhard Fuchsi Pars. III.

Alui pro-
fluuium no-
temere cu-
rendum.

terum si ab imbecillitate instrumentorum alui profluuium excitabitur, intemperies
que hanc ipsam parit, suo contrario, quemadmodum *cap. 1.* huius libri monstrauius,
corrigena erit. Si autem propter alias causas fluere aluus laborauerit, & natura per
hunc quæ noxia & superuacua sunt in corpore expellere tentaerit, & ii qui eo cor-
repti sunt facile tolerauerint tum vsque quo natura omnem suam curam impende-
rit expectare, aut ipsius etiam motus adiuuare conuenit. Etenim obstruere & excre-
tionis cohibitionem moliri, maiorem motum facit. Siquidem quæ cohibentur, sur-
sum petita dolore capitis, aut phreniticum, aut lethargum, aut parotidas, periculo
haud vacantes, inferunt. Quare initio ea quæ in corporis commoditatem vtiliter ex-
cernuntur, minime cohibere oportet. Postquam vero iam diutius perseuerauerit
fluor, non solum superuacua expellens, verum etiam habitum corporis veluti col-

Biliose diar-
rhoeæ cura-
tio.

liquans, viresque consumens, tunc sane ei resistendum erit, tum per ea quæ per os
sumuntur, tum iis quæ per anum infunduntur, atque etiam iis quæ extrinsecus ventri
imponuntur. Si itaque pure biliosa excrementa prodierint, in magis salubria permo-
tare ipsa oportet, non tamen per cohibitionem statim eos curare. Biliosum enim ex-
crementum tum in ventriculo, tum in ieiuno intestino aggregatum, atque post coa-
cervationem retentum, maxime perire letet. Nam & ventriculorum subuertit, & visce-
ribus inflammationes infert, & sicim accendit, & febres instaurat, omniaque prædicta
in capite vitia, efficit, atque in totum grauius malum reddit. Quod si itaque humores
biliosi in corpore copiosi fuerint, natura per medicamenta purgantia leuia, vti est ca-
sia fistularis, cortices myrobalanorum luteorum, aut mel æterium, quod recentiores

Lacem fi-
liosis de-
coctum.

Græci *mennum* vocant, item rhabarbarum vltum, iuuanda venit. Lac deinde bubulum
aut caprinum tepidum, recens multum, exhibendum, aut sano ad ignem decoctum,
assidueque agitata, donec ad tertias sit reductum: quod ipsum & perfluuias
siles, ferrique aut chalybis laminas igni candefactas, & in lacte extingui fieri pos-
test. In decoquendo vero superstantem concretionem siue spumam auferre opor-
ret. Hoc sane nullum compendiosius remedium ad fluxiones biliosas reperire po-
teris. Quandoquidem autem febricitantibus lac ipsum in nidorem aut etiam acor-
em conuerit, maiusque nocuumtum quam commodum inferte consuevit, præstat
tunc sane, si simul febricitent, ipsam non exhibere. Aquæ vero quarta parte ad lac
ipsum affusa, decoctionem faciemus, donec dimidium eius consumatur, atque hoc mo-
do exhibebimus. Si autem in intestinis coaceruata bilis fuerit, clysteres ex *herode de-
cocto, saccharo rubro vocato, oleo rosaceo, citrum lactis, & similibus* patatos iniicere ope-
ret. Biliosis tandem variatis humoribus, intrinsecus ea quæ adstringunt & robo-
rant, exhibenda vti sunt *saccharum rosaceum, diacotanon citra species, diatrion, santaloni, passilli
essentia, hydromelon, & similia*. Qualia vero esse debeant ea quæ extrinsecus im-
ponuntur medicamenta, paulo post dicemus. Sedes etiam ipsa ex decocto quoptam
adstringentium foueatur. Ceterum in diarrhoea ex humoribus crassis, pituitosis &
lentis nata, ac eorundem corruptione facta, baud secus quam in priore, a purgatio-
ne auspicanda curatio erit. Exhibendum itaque tunc agarici dilutum, non obitante
quod quidam Medici illud in diarrhoea vitandum esse censent; cū myrobalanis myr-

Diarrhoeæ
ex pituita-
se biliosa
curatio.

pelicitis, aut simile aliquid, quod prædictos humores educere possit. Conueniunt et-
iam clysteres, potissimum vbi in intestinis viscidotum humorum copia coaceruata
fuerit, e *centaurii minoris decocto, oleo rutæ, & similibus*. Intra corpus exhibenda *diacota-
non cum speciebus, zingiber coctum nominatum, & alia quæ calefacere & expicare valent medi-
camenta*. Extrinsecus etiam quæ robur addunt, ad mouere oportet. Quod si ob reten-
ticiis facultatis imbecillitatem orta fuerit diarrhoea, ea sunt sane adhibenda medica-
menta, quæ ad alias immodicas alui fluxiones ad mouentur. Irrigationes itaque ex *oleo
amphacico, aut rosaceo, aut melino cum vino aliquo austero adhibeantur*. Efficacius autem per
ritum est, si vehementiori indiget adstrictione, tertia aut quarta vini parte ei admix-
ta. Quod si robustiora sint corpora, *gallas, malicorum, & balsamum in ipsa irrigatione*

Diarrhoeæ
ex imbecil-
litate coen-
ticis facul-
tatis cura-
tio.

incoquere licebit. Perseuerante autem adhuc fluxione, cataplasmata, emplastra, & ce-
rata ex adstringentibus & exsiccantibus composita, quorum mentionem in capite
sequenti faciemus, imponenda erunt. Parabile vero & efficax hoc est, quod habet:
Mora præ immaturitate adhuc acerbiore & albicantia septem: quibus vbi probe confusa fuerint,

Gargarium.

addun-

- addantur olei rosacei, uncia dua. Cera, unc. vna. & fingatur ceratum.* In potu vero accepta, post inuulium euacuationem, ventris fluxiones sanantur *cuminum, aduanti decoctum spina alba radix, api similiter semen drachma pondere datum.* Vrinam enim irritat, fluxionesque a intestinis factas eo diuertit. Mora quoque immatura, & adhuc acerbata, ad solem pluribus diebus exsiccata, deinde repolita, vsque expetere trita & bibita, mirifice aluum restringunt. Contunduntur etiam & obfunis admiscuntur, quemadmodum rhus consuevit, qui interdum vnicæ vnius pondere eum pullo gallinæ decoquitur. Magis tamen aluum cohibent tubi mora immatura & acerbata, eodem modo exsiccata, & in pota exhibita. In numero compositorum medicamentorum mittitæ confuerunt *pallia & spodio, e lemnis sigillo, diacoteneon, diatriosfantalon, sberiaca, & hæc compositio.* quæ accipit: *Specierum diatriosfantalon, diarbodon abbasii, vtriusque scrupulos duos. Coralliorum ruberorum, rhuris selectis, rosarum purpurearum, singul. drach. dimidiâ. Spodii, drach. vna. Seminum exalidii, rhois obfensorum, vtriusque scrupul. vnum. Balsamii storacii, acacia, vtriusque drach. dimidiâ. Mastiches, scrupul. dimidiâ. Bolus armenii, drach. vnam. Sacchari candidissimi, vnc. octo, dissoluti in stillatiu liquoribus plantaginis & rosarum, fingantur in mofu. Item hoc eclogma, quod habet: Sacchari rosacei veteris, diacoteneon sine speciebus succi medicati e ribes, de oxyacantha sing. vnc. dimidiâ. Hydromeli, drach. tres. Diamoron, drach. dimidiâ. Specierum diatriosfantalon, scrupul. duos. Coralliorum ruberorum, scrupul. vnum. Spodii, balsamii storacii, vtriusque drach. dimidiâ. Bolus armenii, drach. vnam. Serapi myrtini quantum ad excipendum sufficit, fiat eclogma. Porto hanc aquam nunquam non paratam habebis, quæ habet: Rheu obfensoris quartam vnam, aquæ pluuialis libr. tres, in quibus die ac nocte sumach maceretur, dein bulliat.*
- C* & rhus bene ac valde exprimitur. In ea siquidem aqua oryza, milium, & alii cibi coquantur, aut saltem aliqua eius portio iis affundatur. Si præter defluxum ab aliis corporis partibus diarrhoea accidit, curatio ex propriis capitibus petenda erit: verbi gratia, si ex capite in ventriculum defluxio fiat, ad ea quæ in cap. De curatio de distillatione dicta sunt, reuertendum erit. Et sic in ceteris etiam corporis partibus faciendum.

De lienteria. CAP. XIII.

- Ætymologia Græcis, quemadmodum ipsum nomen indicat, labor quispian intestinorum est, qualis etiam extrinsecus in corporis cuticula ex cicatrice contingere solet.* In hoc siquidem vitio intestina cibos non retinent, sed antequam per mutationem & perfectam concoctionem admittant, dilabuntur idque ea quæ fuerunt assumpta forma. Cuius rei testis est Galenus, qui libro de Aphorismis sic definit lienteriam: *Leuitas intestinorum, in qua citè & exilis exitus eorum quæ comeduntur & bibuntur, quæ talia deiciuntur, qualia fuerunt demorata.* Neque enim tantisper retinentur donec concoquantur. Quare Latini recte *leuitas*, seu *labor intestinorum* dici potest. Oritur autem frequenter graui præcedente dysenteria atque adeo ex profunda intestinorum exulceratione, cicatricibus densis & leuibus succedentibus, quæ deinde propter densitatem quidem suam ciborum per corpus distributionem fieri non permittunt, quod venarum quæ alimenta ex intestinis ad se auellunt, ora sint veluti obdurata. Ob leuiorem autem, *ut dictum est*, cibum antequam perfecte concoquatur, dilabi sinunt. Fit etiam nonnunquam lienteria ex imbecillitate & languore facultatis cibos in ventriculo retinentis. Hæc nimis firma & imbecilla, nec concoquantur nec distribuuntur alimenta: sed cruda, humentia, nihilque immutata excernuntur, aluo continenter fluida. Interdum quoque post longum ventris pressulum oboritur. Aliquando etiam aqua intercutem per ventrem vacuata, lienteria consequitur. Ex quacunque itaque causa lienteria orta sit, ægri cibum non sentiunt, & malum corporis habitum acquirunt. Succedit itaque ægris assidua excretio eruda, colore subalbida, inæqualis, & aquosissima, citra sanguinis & bilis complexum. Adest autem simul & ardor per tota hypochondria se dilatans quæ cibi concomitatur fastidium. Est autem bonum & amicum signum in iis, qui lienteria longa laborant, si eis acidus tuæus accidat, iuxta id Hippocratis dictum: *In longi leuitatis labori intestinorum si acidus tuæus fiat, qui prius non erat, signum bonum.* Significat enim, cibum in ventriculo aliquandiu contineri, donec principium mutationis accipiat. Ceterum quum eiusmodi vitium sit, facile est intelligere, quod facultatem retentivam & concoctivam tum ventriculi tum intestinorum omni modo refocillare oportet. Id quod in primis per ciborum conuenientium exhibitionem, & vitæ rationem restituendis & refocillandis viribus aptam, fieri potest. Conueniunt

116 Operum Leonhard. Fuchsi Pars III.

itaq; carnes auiculatum montanarum, pulli gallinacei assi, in quorum ventre thus, aut mastiche etiam imponi debet, & alia quæ capite sequenti commemorabuntur. Cibus qui exhibetur quantitate paucus sit, & concoctus facili. Et si acris & biliosa sit electio, ex *oryza, alia, & similibus*: quibus cum adstringens aliquod decoquatur. *pyram, malum cotoneum, mespilum, & id genus alia*, parabitur. Item *lac calidum & recens multum*, postea vero ad medietatem, aut etiam tertias decoctum eis proderit. Sin autē pituitosiora excernunt, contrarius ipsis cibis adhibetur. Nonnulla quoq; ventriculo grata, anisum (verbi gratia) *suminum, vel dancifemen* admiscentur. Potus erit vinum aquosum & renue in priore, in altero vetustius & calidius. In vniuersum vero potus sit exiguus, multas enim non solum lienteriz, verum etiam omnibus reliquis ventris fluxionibus in festissimus existit. Somnus potissimum nocturnus, solito longior præcipiatur. Quod ad curandi rationem attinet, si ex imbecillitate facultatum ventriculi creatur lienteria, ad caput *De imbecillitate ventriculi* recurrédum, atq; illinc curandi ratio petenda. Summatim vero exhibenda intra & extra corpus quæ adstringunt, & tam ventriculum, quam intestina roborare possunt. Exhibendum igitur serapium de *absinthio, de menta*, aliaque antidora, quæ ventriculor obur adiacere possunt. Extrinsecus vero ea sunt admotenda medicamenta, quæ in capite *De diarrhæa* sunt commemorata, & sequenti dicentur capite. Sed in primis hoc medicamentum conueniet, quod accipit: *Oleum masticchini de absinthio, de menta, myrtini, sing. vnc. dimidia. Pulueris cinnamonis selecti, garyophyllorum galanga, sing. scrup. duos. Balsamorum, reserum purpurearum, vtriusque scrup. vnum. Cera quod satis est, singatur vnguentum.* Vel hoc ceratum, quod habet: *Oleum masticchini, de absinthio, cotoneorum, sing. unciam vnam. Olei de menta, unciam dimidiam. Calami odorati, garyophyllorum, thuris, sing. drachmam vnam. Ligni aloei, scrupul. dimidiam. Reserum purpurearum santalorum alborum & purpureorum, singul. drachmam dimidiam. Masticches, camini, vtriusque drachmam vnam. Hypocistidii, acacie, rhois, sing. drachmam vnam & dimidiam. Gallia moschata, scrup. vnum.* Cum cera & resina terebinthina, quod satis est, informetur ceratum. Porro quib. cicarricem, quod leuis & lubrica sit, factam esse consilimus, iis acris rerum, *sinapi, videl. sepe, & id genus aliorum*, comestio, velut refrigerationem quandā cicatricum operatur, atq; adeo utilis est. Quin & insitum calorem reuiuificat, & concoquendi facultatem quodammodo refocillat. Nec obstat, quod Rori delectus hanc curationi rationem implet, quod puret, acris, vbi humiditatib. corporis permiscetur, acrimoniam suam amittere, nec asperitatem inducere. Nam ficti nequit, vt acria iam dicta comesta, quum statim ingerantur, atq; sine fere omni mora in ventriculum perueniant, tantillo tempore acrimoniam suam omnem amittant. Eri veto priusquam ad intestina perueniant acrimoniam aliquo modo amittunt, tamen si paulo maiori copia ingeruntur, tantum acrimoniz obtinebunt, quantum ad inducendam asperitatem satis erit. Conuenient itaq; in hoc casu, *Galeno c. 93. Artu medica aullere*, quæ sufficienter abstergunt, & parum adstringunt. Quapropter admiscenda semper adstringentib. medicamentis abstergentia. In reliquis causis lienteriz omnib. eodem curationis modo vtendum est, quo in diarrhæa & dysenteria affectis vtitur.

De dysenteria. C. a. v. XV.

Δ *Termeia* Græcis, proprie nihil aliud est, quam exulceratio intestinorum. Latini placuit hoc vitium appellare *termina*, eo quod in eo intestina dolore admodum torqueatur. Neque temere in dysenteriz descriptione adiectum est *proprie*: sunt n. Græcis quatuor cruentæ dysenteriz species, quemadmodum testatur *Galenus libr. 3. De sympt. causis*: quarum prima est, in qua sanguis propter aliquam partem corporis præcisam, aut prius visa exercitationem intermissam, per circuitus excernitur. Altera, in qua sanguis aquosus, hoc est aque, in qua carnes cruentæ & recens mactatæ sunt ablutæ similes, deicitur: id quod ob incinerio imbecillitatem accidere solet. Tertia, in qua & nigrior & splendidiore qui naturalis est excernitur, ex sanguine & atrabile commixtus. De iis certe nobis in præsentia non est fermo. De quarta vero, in qua paulatim & breuib. intervallis nonnunquam sanguis, necnon quædam etiam granulosa cum pure, vel ramentis intestinorum, sæpenumero etiam densum stercore cruentu guttus repleti deicitur, nunc agimus. Hæc quidem, vt dictum est, ob intestinorum exulcerationem fit, quæ interdum a causis externis, frigidityte scil. æstu, & humiditate accidit. Item perniciosiorum medicamentorum potu, *scammoneis, scilicet, & similibus.*

Afr-

Cursio lienteriz ex imbecillitate facultatum ventriculi.

Vagatum

Ceratum.

Si a cicatrice indurata lienteria oritur.

Dysenteria. Termina.

Cruentæ dysenteriz quatuor species.

Causæ.

- A** A fructuum comestione, & cruditatibus. Interdum a causis internis, nempe a trium ciborum acceptione, ab humorib. mordacib. & acribus siue bilis siue ex vniuerso corpore ad ventrem confluentib. aut in ipso natis. Hæc quidem nunc a tenefmo, nunc p-
 te incipit. Excernuntur primum biliosa, varia, subpinguia: pingui nimirum, quod in-
 transeus intestinis adheret, paulatim citi cum liquefacto. Quum vero superficies in-
 testinorum perfecte fuerit denudata, exulceratioq; superne cõsistit, feculentra & cru-
 enta deliciuntur. Vbi autem altius penetrauerit exulceratio, etiam sordes mēbranul-
 as admixtas habentes expelluntur. Quod si non colubeatur, breui vicinos locos de-
 pacitur: saniosa vero quedam excernuntur, qualia a mortuorum cadauerib. defluere
 consueuerunt. Vbi igitur tenuia intestina exulcerantur, dolores circa vmbilicum cõ-
 sistunt, biliosaq; & porri colorem habentia, atq; omnino variegata stercore plurimum
 comixta excernuntur, cum labore & torminib. mordacitateq; ac exolutione, vt nō
 procul ab animi deliquio agri absint: a sitique infestantur, & febricitant, stercus quo-
 que crudius prodit. Exulceratur autem, verum raro admodum, & ieiunum intestinū,
 quod si contingat, egestionis crudiores apparent; sanguinem nigriorem veh. mēter
 implicatum habentes, b. lemq; abunde flauam. Sitis multa, itemq; nausea affligunt.
 Vomunt etiam aliquando, & cibos auersantur: dolor quoq; vehemens supra vmbilicū
 cõsistit, quandoq; & febres malignæ oboriuntur. Atq; ita affecti decolores fiunt, &
 ad animi deliquium vsq; exsulant. Vires ipsorum cito deficiunt, neq; procul ab inter-
 itu absint. Sin crassa intestina exulceratione laborant, tum stercorea quæ egeruntur
 sincera & multa sunt, & coaceruata, & cum flatib. produnt, aliquando etiā ipsumosa.
 Pingua quoq; iis comixta sunt, & cruor supernatur, veluti latius *libr. 6. De laborantib.*
loci Galenus ostendit. Id ipsum autem nosse, non mediocriter ad curationē conducit.
 Nam si in supetiorib. intest. n'is vlcus est, ab epotis medicamentis præsid. um petendū
 est: si vero in crassis & humiliorib. clysterem iniicere magis conuenit. Principium
 curationis dyssenteria laborantium a quiete & modico cibo, propter ventriculi & inte-
 stinorum imbecillitatem, fiat, vnde tunc tandem fluor procedat. Permittente itaq;
 febre, lacte recens multū adhuc calido vtendum est: aut pro eo lac coctum, quod in
 capite *De diarrhoea* descripsi mus, exhibendum. Hoc enim primum depurgat, atq; si-
 mul ea quæ sunt in corpore cõtemperat, ac postremum aluum silit. Oportet vero in-
 super & panem madetactum, a lactis acceptione offerre. Pulres etiam ex lacte appa-
 ratæ, tum medicamenti rationem habent, tum nuttimentum optimum præbent: velut
 est *oryza cum lacte amyli, & oua lactis admixta*. Sorbitiones quoque aut pulres ex *alica,*
milio, adiecto rhoe, conueniunt. Apparatū itē *pul. ex succo panib. affusa posca, aut palmula-*
rum, aut malarum cotinorum, aut pyrorum, aut rhois succo. Lenticula quoq; probe assata cū
plantagine aut malū cōmeis contusis decocta exhibenda. Olerum vltus non est necessarius, at-
 ramen degustandas exhibebis *ferin, seu intyburū satiuam & syluestrem coctas, plantaginem,*
brassicamque hū coctam. Damus & ouorum aliatorum lutea. Cuius dyssenteria corre-
 ptis, quod alimenti valentioris sint, & concoctioni renituntur, non valde commodè
 existunt, dandæ tamen eis, qui diuturno malo vexantur. Ex iis autem præ ceteris vo-
E luerium eligendæ. *perdicū nimirum, palumbiam, merularum, & montanarum aniculorum.*
 Ex pedestribus *carne capræ & leporis conueniunt.* lumentorum, & omnium aliorū qua-
 drupedum carnibus interdiceret oportet. Proponi a principio quidē aqua pluuiæ, quæ
 non sit ex ædibus plumbo tectis delapsa, vtendum est. Talis enim aqua sanis etiam po-
 tata dyssenteria m conciliat. Quod si pluuiæ optima non adsit, fontana, in qua chalybs
 ignitus exstinctus sit, aut in qua oxalidis, plantaginifq; folia decocta sint, vtetur. Lac
 propinandum, præsertim si per febre m licuerit, quod Galen. *lib. 20. de simpl. med. fac. & li.*
3. de alimen. fac. dyssenteria optimum remedium sit, & omnium ventris acrim. fluxio-
 num, præsertim vbi aliam quampiam deficcantem facultatem habuerit adiunctam a
 lapidib. ipsi præcocto iniectis. Si vero laborauerit ventriculus, aut vbi vires fuerint de-
 fectæ, etiā vinū præbendum. Sit autem adstringens, & non valde vetustū, & aqua cha-
 lybata dilutum. Somnus sane optimum dyssenteria laborantib. præsidium. In curandi
 ratione medicamenti purgantib. vix pote quæ mordacium humorum confusus augēt
 & intestina exulcerata infestant, haud vtendum erit. Priusquam tamen dyssenteria &
 intestinorum exulceratio fiat, proderit vt *myrabalanū flauis, xypenicis, & aliis qui-*

Signa.

Nec emb-
ecationis
reuerum in
testinorumNec emb-
ecationis
reuerum in
testinorum

Vidum

Potus.

Curati;

118 Operum Leonhard. Fuchsi Pars III.

bus adstringendi facultas coniuncta est. In dysenteria igitur magis uti oportet remediis adstringentibus, obtundentibus, resiccantibus, & vrinam mouentibus, atque ad eo fluxionem alio transferentibus. Quæ adstringunt, hæc quidem sunt, *leptodismen*, *rhiz*, *galla*, *malicorium aridum*, *rubi radix*, *ladanum*, *acacia*, *hypocistidis*, *balanistum*, *folia salicis*, *symphyti radix*, *folia & semen*: *rheum ponticum*, si haberi poterit, *alibea radix*, *equisetum*, *corallium*, *massiche*, *coagulum leporis*, *sanguis draconis*, *cortex thuris*, *lemnia terra*, *verbasci radix*, *plantaginis semen*, *bellum minus*, *alibea*, *oxyzanicula*, *ophrys*, *aphroglissum polygonum bursa pastoria*, *solidago sarracenica vocata*, *perleoni*, *numularia*, *solidago media*, *bistorta*, *senferpentaria mai*, *geranium sextum*, *herba diui Iacobi hodie nominata*, *sine verberna recta*, *mora acerba*, *acini vine*, *maceris cortex*, & alia eius generis. Obtundunt autem & contemperant humerum moistum & acrimoniam, *amylum*, *tragacantha*, *gummi*, *adeps caprini*, *hircinus*, *suillus*, *anserinus*, & *gallinae accus*. Resiccant *coagulum leporis*, *cornu ceruinum*, *osium*, *petite cancerorum stimalium*, & *salvia*. Vrinam mouentia suo loco inuenies. Quæ si crassiora intestina exulceratione laborant, clysteres adhibeantur, primum quidem in quibus abstergerendi vis inest, qualis est qui habet: *Decocti herdei integri*, *lib. vnam*. *Acellus rosacei celati*, *vinciam vnam*. *Sacchari rubei vocati*, *vinciam dimidiam*. *Vitellus oui numero duos*. *Olei rosacei*, *vinciam dimidiam*. *Commixtis omnibus fiat clyster*. Facta primum abstersione, ea quæ glutinare possunt infundantur: quale est quod accipit: *Rosarum purpurearum plantaginis foliorum symphyti polygoni verbasci sing. manipul. vnum*. *Gellarum*, *rhiz obsoniorum*, *utriusque drach. duas*. *Bursa pastoria*, *manipul. dimidiam*. *Balanistiorum*, *drach. vnam*. *Oryza tosta*, *vinciam vnam*. *Radici symphyti*, *vinciam dimidiam*. *Decoquantur singula in aqua chalybeata*, donec tertia pars absumatur. Dein colo transfundantur, accipianturque iuris decocti, *vinc. duodecim*. *Succi plantaginis*, *vinc. duas*. *Acacia*, *hypocistidis*, *utriusque scr. duos*. *Boli armenii sanguinis draconis*, *utriusque scr. vnam*. *Seni caprini*, *vinciam vnam*. *Oleorum rosacei myrtini cotenorum singulorum drachmâ vnam*. *Commixtis omnibus fiat enema*. Interdum vehementia doloris non tantum obtundentia, verum etiam stupefacientia medicamenta requirit. Quare tum conuenit hoc uti clyster, quod habet. *Lactis caprini aut vaccini libr. vnam*. *Buri salis experti*, *vinc. vnam*. *Adipis caprini*, *vinc. vnam* & *dimidiam*. *Tragacantha gummi*, *utriusque drach. vna*. *Vitellus quoru numero tres*. *Catapoteriu de cynoglossa*, *drach. vnam*. *Olei rosacei*, *vincias tres*. *Commixtis omnibus formetur infusum*. Si vehementiore stupefactione opus fuerit, pondus pilularum, de cynoglossa augendum: aut prior portioni aliquid opii grana, tria nimirum, aut quatuor, vel minus aut plus, pro vehementia doloris, & corporis constitutione, adicienda. Ceterum si in tenuibus intestinis exulceratio consistit, tum remedia quæ superne & per os assumuntur, magis desiderat. Conuenit itaque decoctum ex adstringentibus supra commemoratis, admixtis serapiis *rosaceo* & *myrtino*, cum aliis quæ in capite *De diarrhoea* dicta sunt medicamentis, exhibere. Neque temere quis hoc propinabit medicamentum, quod habet decocti radicis *symphyti*, aut alterius ex adstringentium numero, *vinc. tres*. *Serapii rosacei*, *vinciam vnam*. *Serapii myrtini*, *vinciâ dimidiâ*. *Pulueris plantaginis & spadii*, *seminis plantaginis*, *boli armenii*, *singul. scrupul. duos*. *Miscantur omnia*, & fiat potio. Extrinsecus præter ea quæ commemorata sunt in capitibus *De diarrhoea* & *hænteria*, imponendum ventri hoc ceratum, quod accipit: *Oleorum massichini, rosacei, myrtini, cotenorum*, *singul. vnciam vnam*. *Farina hordei feno-graci*, *utriusque drachmam vnam* & *dimidiâ*. *Rosarum purpurearum plantaginis*, *utriusque drach. vna*. *Hypocistidis*, *acacia*, *massiches*, *singulorum drach. duas*. *Cum cera & resina quod satis est informetur ceratum*. Possunt & alia multa ad exemplum iam dictorum prætidiorum componi, quæ singula commemorare & superuacaneum, & inutile esse iudicamus. Veteres quidem in deplorata dysenteria arsenicum *sendaratham*, *calcem vnam*, & alia *crustam inducentia* iniiciebant. Quia vero hæc curandi ratio periculo non caret, & immodicos excitat cruciatus, temere vsurpanda non erit.

De teneismo. C. A. P. XVI.

Teneismus est assidua, & quæ differri ac evitari non potest, desidendi seu egerendi cupiditas: quæ tamen nihil præter modicam cruentam vel mucosam, egeritur. Latius teneismus appellatur. Plinio vero & nostri temporis medicis *teneismus*. Nomen vero sumit ab ipso symptomatico,

De medendis morbis Lib. III. 119

Amate, Galeno lib. 2. de medendi ratione auctore, quod in eo tenfio quædam circa intestinum rectum fiat. Fit nonnunquam propter frigiditatem extrinsecus occurrentem, ac partem iam dictam immodice constringentem, item humores acres & biliosos, expultricem partis facultatem stimulantem, pituitam falsam, vlcus phlegmonemque in recto intestino obortam. Nonnunquam etiam stercoris in intestino recto ubi colo alligatur coadæ obstruendo, tenesimur efficere potest. Causam externam frigidam facile de sermonibus ægri cognoscer Medicus, quia nimirum pedice res frigidas verbi gratia lapidem frigidum, attingit, aut hyberno tempore frigus nimium pertulit, aut in aqua frigida diutius commoratus est. Humores ex his quæ excernuntur cognoscere licebit, quæ vel biliosa, vel pituitosa erunt. In vlcere purulenta ac saniosa excernuntur, & in ano pungentis sensus inest. Phlegmone tñmorem recti intestini, & dolorem grauiatuum vna cū febre efficit. Stercoris multitudinē, grauis distensionis sensus circa sinū ventrē sequitur. Curandi ratio, p̄ causarum diuersitate variatur. Quapropter si tenesimū frigus præcesserit, vinum meracum calidum p̄pinandum erit ac pectinem, inquina, inter femineumque, Græci *ἀνισον* vocant, oleis ac fomentis culdis irrigare & fouere oportebit, cuiusmodi sunt: *rutaceum & lilaceum*. Furfures autem in vino decocti, & faculo excepti, cōmode sedi adhibentur. Clysteres quoque decocto mentastri, virgini, calamintha, chamamelis, abratona, femine anisi, feniculi, & similibus paratos, adiectis oleis anethi, chamamelis, lilaceisque, nitete conuenit. Potro mirtice confert, si statim ab excretionē admoventur later perquam vetustus, & a fumo denigratus, vna cum paleis in eo

Causa

Signa

B complexus tufus, dein aceto feruenti subactis linteoloq; illi garus sedi subditus. Ceterum si ab iliosis humoribus in ano & intestino detentis fiat tenesimus, clysteres quibus abstergerendi & abluendi inest facultas, iniciendi sunt, qualis est qui accipit: *Iuris decocti hordei, lib. 1. Sacchari rubri nominati, vnc. vna & dimidia. Mellis rosæci, vnc. vna. Linteæ eorum duorum, olei rosæci, vnc. dimid. Commixtur omnib. fiat enema.* Aut ex caprillo lacte, saccharo rubro, & oleo rosæci. Vitanda omnia acrida, & vtendum mediocriter trigidis & humidis, & omnibus his quæ bilis acrimoniā contemperare possunt. Si a pituitosis humoribus procreetur, curabitur instar illius qui a frigore factus est, adiectis tantum ac commixtis ipsis clystetib. quibus vacuat si pituitam facultas inest medicamentis, *antidoto nimirum Indi, aut diaphenico, aut benedicta laxatiua vocata.* Quod si a phlegmone tenesimus

Causa, Tenesimū a frigore oritur

D oriatur, prius hæc succus, pancis rosas purpureis simul cum eo decoctis infundatur. Aut vehementiori phlegmone infestante, hoc vtendum infuso, quod habet: *Iuris decocti plantaginis, vnc. dimidia. Olei rosæci, vnc. duas. Ovi vnius candidum. Cremiscentur singula, & fiat clyster.* Extinctus inter femineum, seu perinzon, hoc est locus inter penem aut anum, oleis rosæci & myrti o irrigandus. Vel adhibeatur tale fomentum, quod accipit: *Rosarum purpurearum, plantaginū, vtriusque manipul. vnum. Balsamum, drach. tres. Sidorum, vnciam vnam. Baccarum myrti, drach. duas. Foliorum rubi, vnciam vnam.* Decoquantur singula in aqua sufficienti, donec tertia pars absumatur. In huius decocti iure imbuta spongia sedi admoventur. Potro ubi opusest suppuratione aut discussione, fomenta ex decocto radicis albeæ, sanograci, chamamelis, meluleis, & furfurum composita adhibeantur. Si ab vlcere fiat tenesimus, primum abstergerendi facultate præditis infusis, dein vero glutinantibus, haud secus quam in dysenteria, vtendum. Vnguentum præterea hoc sedi inditum confert, quod habet: *Olei rosæci, vnc. vnam & dimidiam. Lenti cremoris tragacanthæ, gummi, vtriusque drachmas tres. Cerasi plumbi vsti, vtriusque drachmam dimidiam. Aloës, storacis, vtriusque scrupulum vnum.* Cetera quod satis est, singatur vnguentum, quod linamentum imbuta sedi indantur. Si dolor immensus admodum fuerit, prædictis opii scrupulus vnus adici potest. Si a stercoris multitudine oriatur tenesimus, tum initio clysteribus mioribus ac lenientibus paulatim stercora educi debet, cuiusmodi est hoc quod accipit: *Malua, albea, mercurialis, beta foliorum viola nigra singul. manipulum vnum. Seminū sanograci, lini, vtriusque, vnciam dimidiam.* Ebulliant omnia in aqua sufficienti ad tertias. Dein accipe *iuris decocti, libr. vnam. Medullæ cassie fistularis, vnciam vnam & dimidiam, Olei vulgaris, vnciam dimidiam. Salis triti, drach. vnam, fiat clyster.* Insuper hoc vnice cauendum erit, ne purgantia medicamenta deuoranda exhibeantur, quod inde summum ægotanti exitum immineat, attractis nimirum aliunde & ex vniuerso corpore ad priorem stercorum copiam excrementis, vt *fusus alibi docuimus:*

A pituitosis humoribus.

A phlegmone.

Clyster. Incestum. Fomentum

Diffinitio

Curatio tenesimi ab vlcere.

A stercore copia.

E buntur. Si ab vlcere fiat tenesimus, primum abstergerendi facultate præditis infusis, dein vero glutinantibus, haud secus quam in dysenteria, vtendum. Vnguentum præterea hoc sedi inditum confert, quod habet: *Olei rosæci, vnc. vnam & dimidiam. Lenti cremoris tragacanthæ, gummi, vtriusque drachmas tres. Cerasi plumbi vsti, vtriusque drachmam dimidiam. Aloës, storacis, vtriusque scrupulum vnum.* Cetera quod satis est, singatur vnguentum, quod linamentum imbuta sedi indantur. Si dolor immensus admodum fuerit, prædictis opii scrupulus vnus adici potest. Si a stercoris multitudine oriatur tenesimus, tum initio clysteribus mioribus ac lenientibus paulatim stercora educi debet, cuiusmodi est hoc quod accipit: *Malua, albea, mercurialis, beta foliorum viola nigra singul. manipulum vnum. Seminū sanograci, lini, vtriusque, vnciam dimidiam.* Ebulliant omnia in aqua sufficienti ad tertias. Dein accipe *iuris decocti, libr. vnam. Medullæ cassie fistularis, vnciam vnam & dimidiam, Olei vulgaris, vnciam dimidiam. Salis triti, drach. vnam, fiat clyster.* Insuper hoc vnice cauendum erit, ne purgantia medicamenta deuoranda exhibeantur, quod inde summum ægotanti exitum immineat, attractis nimirum aliunde & ex vniuerso corpore ad priorem stercorum copiam excrementis, vt *fusus alibi docuimus:*

F hoc vnice cauendum erit, ne purgantia medicamenta deuoranda exhibeantur, quod inde summum ægotanti exitum immineat, attractis nimirum aliunde & ex vniuerso corpore ad priorem stercorum copiam excrementis, vt *fusus alibi docuimus:*

Causa.

DOLO R qui in laxiore intestino, quod *colon* græce vocatur, accidit, multas, quatuor vero præcipuas, causas obtinet. Interdum n. propter crassos ac pituitosos humores intra coli membranas subsidentes oritur. Interdum etiam ob crassos flatulentos spiritus in colo retentos, quibus non est exitus. Fit quoque propter phlegmonem intestinum crassum distendentem, ac molestantem. Solet etiam accidere ob acres & erodentes humores, qui intestinum prædictum, cui illi immerse sunt, vehementius affligunt.

Signa. Crassi humoris.

Quibus crassus & pituitosus humor dolore excitatus, hi per totum abdomen in alto excruciantur, præsertim ubi coli situs est, ibi enim quasi tundi & perforari intestinum sentiunt. Tormina quoque hos affligunt, ructus, nausea, vomitio varia, potissimum pituitæ. Alius graviter impedita nihil reddit, ac ne spiritum quidem transmittit. Stercus autem quandoque excretum, bouino simile videtur, leve, & flatus plenum. Præcedit hos quam maxime frigidorum & crassi succi ciborum assiduus usus, satietas, cruditas, ocium, & is finitima. Qui autem ex flatulentis spiritibus dolent, tensionem magis experientur, atque rugiunt sentiunt. Qui autem propter phlegmonem, is interni feroris sensus accidit, & febris non ignava: urinæ denique, simul & stercoreis retentione, pulsus quoque iuxta ventrem molestus, sitis, ætus, nausea, & vomitiones bilis potissimum, quæ nihil levant malum, vigent. Hæcque simpliciter inter colicas affectiones gravissima est, quæ in ileum transiitionem minatur. Quibus acres rodentesque humores dolorem movent, sicut etiam qui phlegmonem expetuntur, hos ardor, sitis & vigilia torquent, imo febricitulæ, sed minus quam illos. Urina redditur acris, & biliosa deiciuntur. Sæpius autem alui deiectione maiorem excitat et cruciatum, graviusque irritant calidiores cibi potusque assumpti. Quo vero pacto coli & renum dolores discernendi sint, docet copiose Gal. lib. 6. De affectibus loci c. 2. Ad eum itaque locum lætorem ablegamus. Videtur accurandi ratio pro causarum diversitate variari. Quam itaque crassi ac senti humores doloris causa existunt, victus vniuersa ratio extenuans sit. Panis igitur, quo vescitur æger, recens, ac in cibus aut futo probe coctus sit. Carnes conveniunt in primis volucrium, gallinæ nimirum, perdicum phasianorum, palumborum, surturi, turdorum, & columbarum. Fugienda omnia volucrium genera, quæ in aquis degunt, tanquam ea quæ superfluitatibus multis abundant. Ex quadripedum animantium genere conveniunt carnes vitulina, & bordinæ. Legumina omnia vitanda, quod huic malo minime incommodent. In olerum genere vitendum feniculo, apio, asparago, palegia, origano, serpyllis, & similibus. Aliæ quoque cruda, & cepas assumere haud nocebit, maxime his qui talibus non offenduntur. Ideoque hoc Galenus thieriacam russicorum appellat. Quid multa? alimenta sint coacta facilia, & boni succi, atque satietas & cruditas vitetur. Bibendum vinum subadstringens, album, tenue, pellucidum, mediocriter etate, temperatura dilutiore, bibaturque modice. Quod vero ad curandi rationem attinet, medendum sic, ut non vehementer calefaciamus: quippe ab huiusmodi præsidii diffunduntur & in flatu vertuntur omnes frigidi & crassi humores, qui intestina distendendo, dolores vehementiores efficiunt. Conveniunt itaque eos dissecare & concoquere citra vehementem calorem, & per visum eorum, quæ minime inflant. In acerbationibus igitur irrigationes fiant ex oleo rutaceo, chamæmelino, & anethino. Fomenta item, & sacculi e floribus chamæmeli, anethi, meliloti, feminibus lini fenograci, altheæ, milii, & surfuribus. Mirifice quoque conducunt clysteres ex oleo iam commemoratis, & prædictarum herbarum decocto, aut radicis cucumeris fistulæstris, adiectis camini, vel ruta, cum adipe asferino vel gallinæ, in eum quidem modum parati. Malua, althea, chamæmeli, mercurius, anethi, sing. manip. vñ. Origani, chamæmelis, palegiæ, sing. manip. dimid. Seminum lini fenograci cumini fenugreci sing. drach. tres. Decoquantur singula in aqua fontana iuste quantitates ad tertias. Deinde accipe iuris decocti per colum transfusi, lib. vnam. Hieræ pieræ, vñ. dimid. Benedicte laxativa, vñ. dimid. Antidoti indi drach. vnam & dimid. Mellis rosæ colasi, vñ. dimid. Oleorum chamæmelini, anethini rutæ, variisq. vñ. vnam. Luteæ oui duo numero. Salis communis dr. vñ. commixtio omnib. fiat enema. Glandium enim ad

Accis & mordentis.

Vitus coli qui doloris crassi & pituitosi humoribus.

Curatio eisdem.

Clyster.

Glans.

Vomitus.

monitiones, illis neque fedis & succo cyclamini cum melle & nitro, vel sale fossili sue gemmæ, vel centaurio minore cum melle ac nitro profunt. Exemplum glandium est hoc: Accipe mellis cocti, vñ. vnam cum dimidia. Specierum hieræ pieræ, drach. vnam. Colocythides, scrupul. vnam. Salis fossili, scrupulam dimidiam commisceantur & fiantur glandes oblongæ. Vomitus etiam

iam

- A** iam ante cenam, si quis facile vomat, præ omnibus auxiliatur. Porro ubi dolores, facta iam vacuatione, ad plures dies producantur, in solium olei calidi: aut si hoc haberi haud queat, in hydrelæum descendere alienum non est. Intestus quoque vitilis ex decocto alibea, pulegii, foliorum lauri, fenogreci, chamamelis, arthemisia, anethi & similibus. In balnei tamen usu id vnicæ cauendum erit, ne temere iis, qui ad resolutionem, aut arthritidem proclives sunt, admoveatur. Quippe balnei vsu & calore humores liquefcunt, atq; funduntur, & in partes inbecillas decumbunt. Conuenientissimum vero ad collicos medicamentum, vinum absinthites existit, si prælibatione a balneo seu exercitio indigent. Estq; etiam non siccantibus valde cōmodum. Decoctum quoq; herbæ ipsius ubi semel tantum ebullierit, pari modo ad vinum, quod alias pro cōsuetudine bibunt, Vomitus.
- B** admixtum, vitiliter a balneo præbetur. Castoreum deniq; assidue potatum, vitium prorsus demolitur, omnibusq; medicamentis præstat. Datur ægrotantibus drachma una in tribus aquæ mulse cyathis. Quod si dolor non conquieuerit, propinandum e: it medicamentum diatrion piperæon, vel theriaca. Si vero dolor est vehemens, mediocriter lenientibus ac mitigantibus vti conuenit medicamentis inferne inditis, aut potis. Nam quæ valenter stupefaciunt vitare oportet, quod paulisper quidem leniant, sed diuturniorem affectum faciant, dum humores crassiores reddunt, mætuusque intestini condensant. Anodynis itaque proprie vocatis medicamentis, quorum aliqua initio huius capitis dicta sunt, iterum vtendum. Porro si flatulentus spiritus doloris causa fuerit, clysteres qui flatus discutere possunt iniiciendi, qualis est qui accipit: Abroso- ni, origani, pulegii, calamintæ, chamamelis sing. manip. vnum. Ruta, mentha, menta stri, singul. manipulum dimidium. Seminum anisi, feniculi, cærei, cumini, anethi, fenugreci, dauci singul. drach. duas. Coquantur omnia ad tertias, dein accipiant iuris decocti colati, libr. vna. Hiera picra, benedicta laxatiua, vtriusque vnciam dimidium. Castorei, drach. vnam. Specierum diacumini, drachmas duas. Oleorum rutæ, anethini, vtriusque vnciam vnam & dimidium. Salu communis, drach. vnam & dimidium. Commixtis omnibus fiat clyster. Potest etiam prædictis ad compositione de bacis lauri appellata, qua ad discutien dos flatuosos spiritus nihil est efficacius. Proderit quoque eius cōpositionis quantitatem nucis auellanz in decocto aliquo incidentiũ & extenuantũ medicamentorum indies propinare. Extrinsecus autem abdomen iis, quæ flatus dissipant fouendum & irrigandum erit, cuiusmodi sunt, præter ea, quæ paulo antediximus, nigella, ammi, petroselinum, amygdala amara, piper nigrum, menthastrum, bacca lauri, absinthium, semen vrtice, acorus, maiorana, cinnamomum, & alia quæ libro primo De compositione medicamentorum commemorauimus. Ex his itaq; cataplasmata, tomentata, aut facculos parabis. Quod vero omnia reliqua vincit, & incantamento cuiusdã simile quid efficit, Galeno libro duodecimo Ther. meth. cap. vii. teste, est cucurbita maxima leuis cum copiosa flamma toti abdomini affixa. Eger etiam a diluii vini, & frigidæ, quæ potu, lactis & aliorum refrigerantium, ac flatuosos spiritus gignentium aliue ntorum vsu, sibi caueat. At vini potius meracioris potu, victusq; ratione reliqua calefaciēte ac incidente vtatur. Præterea phlegmone intestinum exerceente, vena in cubito aperiēda est. Si vero vrinz difficultas superet ac dominetur, ex malleolo sanguis detrahendus erit. Prædictis etiam vtendum remediis, exceptis acribus, & vehementer purgantibus. Clysteribus vero potius lenientibus, item cataplasmatibus, & irrigationibus, & in oleum descensu vtendum. Cucurbitulas etiam his affigimus. Victus autem ratio tenuis sit, & fere febricitantium, donec phlegmone solutur. Atqui si propter acres rodentesque humores dolitant ægri, per sedem infundere conuenit ea, quæ humores eluere, atque cit a mordacitate purgare possunt: cuiusmodi est pitinæ succus, aut decoctum fenogreci, seminis lini, malua, herdei, chamamelis & alibea, cū adipe recentis anseris vel gallinæ, & rosæco oleo. Conuenit autem hoc potissimum enema, quod habet: Foliorum viola, intybi domestici vtriusque foliorũ alibea chamamelis singul. manipulu vnum & dimidiũ. Seminis fenogreci, lini, vtriusque vnciã dimidiã. Bulliam in aqua iussa quantitatē, donec tertia pars absumentur. Dein accipe iuris decocti colo trantysu, vncias tresdecim. Castæ fistularis, vnciã vna. Hiera picra, drach. tres. Olei rosæci, vncias duas. Olei anethini, vnciam vnam. Pinguedinis anseris, gallinæ, vtriusque drach. tres. Vitellos qui numero duos. Commixtis omnibus fiat clyster. Potro non solum vacuare, verum etiam temperare infestantem humorem oportet. Quapropter balneis ex dulci aqua vtendum: ea enim mitigare, & so-

mnium conciliare possunt. In quem etiam usum exhibenda serapia *violaceum & rosa-*
ceum, aliaque eiusmodi, quæ contemperare, ac vim mordacium humorum obrunde-
 re valent. Vrendum etiam cibo sobili, prisana nimirum, ac piscibus laxatilibus. Ab-
 stinendum acris omnibus & calidis tum cibis, tum medicamentis, fomentis, irri-
 gationibus, cataplasmaris calentibus, necnon vini potione, potissimum veteris. Er-
 rem omnem paucis perstringam, tota victus ratio humidior & frigidior sit. Quam au-
 tem dolor nihil remiserit, sed vehementius subinde seuerit, ad stupefacientium usum
 confugere oportet. In hoc enim vitio, non solum, quod sensum stupefaciunt, sed &
 quia humores tenues crassiores reddunt, caloremque immodicum extinguunt, ea opi-
 tulantur. In horum vero genere *Philonium* potissimum conuenit, de quo integrâ ma-
 gna ex parte drachinam exhibere licebit. Catapocia quoque de *guzoglossi* inscripta, mi-
 rifice conducunt, *ut antea etiam monstratum est*, ex vna drachma lex conficiuntur: pi-
 lula, vnaque antecubitus deuoratur. Ceterum multa admodum sunt, quæ a tota essen-
 tia colicis auxiliantur cruciatibus. Inter quæ non postremum locum obtinet *lapis ster-*
cus albus, ex aqua, aut vino albo tenui sumtum. Melius autem stercus censetur, quod in ter-
 ram non delabitur, sed in fruticem aut herbâ excernitur. Ea enim est luporum natu-
 ra, quæ canum, ut suspensio albero posteriorum crurum & merant & cacent, in emini-
 ti quoque iam ex terra. Itaque in spinis sæpe æstate stercus lupinum reperitur, & fruticib.
 vepribus, herbisque procerioribus. Amuleni etiam instar colicos dolores iuuat idem
stercus lupi, iulis vinculo & lana ouina confecto alligatum. Quod Galenus etiam verum esse ex-
 perientia cognouit. Menti a vitidis, *dicto li. q. c. 31. auilore*, aliquandiu decocta, & ad tres
 dies pota, dolorem profus e medio rollit. Plura alia eodem in loco reperies.

Desico. C. A. P. XVIII.

Ileos. **E**ius vitium est *tenuium intestinorum, grauissimos & letales dolores inferens*. Sic dictum
 a doloris circumstatione, *quæ enim Græcis est circummalus, & circummagi*. Quare re-
 æte Latinis *volvulus & conuulsus* appellatur. Barbaram sectantes medicinam, *illacum*
passionem & Meserere mei nominant. Contrahitur id vitii cõtinaua ciborum corruptio-
 ne ac cruditate, maxime vero ex pinguibus carnibus, quæ subinde corruptionem ex-
 pertæ & retentæ, obstructionem in tenui intestino creant. Oborturetiâ ex plagis &
 ictibus quibusdam iis locis, in quibus tenue est situm intestinum, factis. Item ex frigo-
 re vehementi constringente, ac excrementa retinente. Exaceruata præterea frigida
 potione, maxime si a sudantibus plurimum accipiatur. Contingit & iis, quibus intes-
 tinum in scorum vna cum stercore delapsum est, indeque violentè retrusum, ex eo-
 que inflammation existit. Fir quoque ob leralium medicamentorum porum, & propter in-
 duratū stercus, circa tenue intestinum impactū. Magna vero ex parte vel a phlegmo-
 ne, vel obstructione aridi stercoris, virium hoc oritur. Familiare quidem est hoc ma-
 lū pueris, euadunt tamen naturalis humiditatis beneficio. Senib. non admodū accide-
 re solet: si tamen eo tententur, fere nunquā conualescunt. Accedit sane huic vitio cor-
 reptus dolor vehementissimus, & tumor aliquis in tenui intestini parte eminet, ut
 videatur id ipsum ad ehorde similitudinem conuolutum: vnde etiam *Chordapson* nō-
 nulli id genus mali appellauerunt. Adest etiam stomachi nimia humiditas, exolutio,
 ructus inanes, & nihil alleuantes, murmura intestinorum, cohibitio perfecta stercor-
 is & flatuum. Si vitium intendarur, omnia fursum feruntur: ob idque & vomitus pi-
 tuitæ ac bilis accedit, frigiditas totius corporis, dolorque, pluitimis etiam spirandi diffi-
 cultas. Morituris autem amplius sudor frigidus, vrinx difficultas, podex ita adstri-
 ctus, ut neque specilli extrinsecum suscipere possit. Aliquando & stercus vomitu reici-
 tur. Quod ad curandi rationem attinet, pueros quidem irrigationibus, cataplasmatibus,
 clysteribus, glandibus, & fomentis, sicut in capite De colicis doloribus est comprehensum, curare
 oportet. Adultis vero pro cassarum diueritate medendi. Si igitur cruditatibus, ac
 multis variisque cibis ingestis, qui ventriculo adhuc insident, vitium accedit, vomitus
 cum iis, quæ supra dicta sunt, concitandus erit. Si vero nihil crudorum ciborum in ven-
 triculo continetur, omni conatu enitendum, quo tum flatus, tum stercora infra tra-
 hantur: idque per clysteres, glandes, & illitiones, magna in singulis adhibenda diligentia,
 efficiendum. Quare potest iniici clyster eiusmodi, qui accipit: *Atercurialis, rutæ, foliorū*
altheæ centaurei minoris, singul. manipulum vnum. Hyssopi, calaminthæ, absinthii singulorum
manipul. vnum cum dimidio. Radicis altheæ, vna. vnam. Radicis cucumeris, sive stris, drachmam

Stupefaci-
entia.

Philonium
Catapocia
de cyno-
glossa.

Quæ a tota
substantia
conferunt
colicis do-
loribus.
Stercus lupi

Menta vi-
ridis.

Ileos.

Volvulus.
Ileos.
Causa.

Quibus ma-
lū hoc fami-
liare sit.
Signa.

Chordapso

Curatio.

Si a crudita-
tib. accedat.

Clyster.

- A** *unam & dimidiam. Seminum lini fenugraci, utriusque drach. tres. Seminis cumini, drach. duas.* Ebulliant in aqua iuxta quantitatē, donec tertia eius pars absint sit fuerit. De naccipe intra decocti colata, & duas quatuordecim. *Benedicta laxativa, ut vocant, unam.* Butyri recentis, mellis rosacei colo transfusi, utriusque unam dimidiam. Oleum rutacei, anethi, utriusque unam & dimidiam. Salu vulgariū, drachmam unam. Conmixtis omnibus fiat clyster, qui ante cibum infundatur, malo autem virgente acibo etiā. Præcipiendumq; ut quādiu quidem queant, hunc agrotantes retineant. Prodest vero vniue ut principio inciantur clysteres emollientes, leuiter detergentes, atq; excrementa inferorum intestinorum vacuantes, atque ne illa ad locum affectum trahantur, impediētes. Postea paulo vehementiores iniiciuntur, lenientibus tamen ac dolori mitigantibus adiectis, qualis est cuius iam compositionem præmissimus. Glandes, Glandes, que madmodum in eoli doloribus parantur, adiectis *femine rutæ, cumini, & brassicæ caulibus.* Longiusculas quoque facere oportet, ut profundius penetrare possint. Præterea cyclamini succo, aut melle cum nitro podex illimendus. Cataplasmata & fomenta, Mitiones. Fomenta. Cataplasmata. Cucurbitule. *Cucurbitule affigantur, primum quidem ad remotos locos, leues; deinde ad ipsos etiam dolore affectos, scarificationesque profundiores fiant. Purgationes etiam assumere conuenit, potissimum si prius per ea quæ dicta sunt, stercorea ad inferiora tracta fuerint. Minime ipsis conducit, si vomuerint, anethum collum potumque. A potu vero panem in aquam feruentem conice, eiusque frusta calida confestim edenda præbe. Qui ex venenato medicamento in ileon inciderunt, his aqua tepida multa bibenda detur, vomereque cogenda. Deinde oleum calidum in potu dandum, aut pinguius iura, ut rursum vomant. Postea diebus aliquot interpositis, theriacæ, cum vino dissoluta, detur. Cibus vescantur boni succi. Quod si obstructio perseverauerit, alius lactis scisso cum modico scammonia, vel aloes, vel alio quodam purgante medicamento inanenda erit.*
- D** *De phlegmone ileos oria fuerit, venæ sectione aulpicandum erit: deinde cucurbita phlegmone affectis partibus per ambitum scarificatis affigenda. Clysteres etiam ex decocto malæ fenugraci seminum lini, cum oleo & butyro iniiciendi. Extrinsecus quoque ea quæ phlegmoni obducunt, & dolorem leniunt, apponenda. His et à tenuissima victus ratio præscribenda. Si ex intestini in scrotum delapsus ileos acciderit, eo scilicet tērandum est, ut decubitu sursum versus vergente adornato, delapsum intestinum ad inguinum partes retrudatur, atque leniter citra violentiā ac compressionem, ligatura salicivæ adhibita contineatur.*

De lumbricis. CAP. XIX.

- L**UMBRICORUM, quos Græci *apures* vocant, tres sunt in vniuersum differentia. Prima *teretes* seu rotundorum, altera *laterum*, tertia eorum quos *ascaridas* nominant. *Teretes lumbrici*, speciem habent omnibus peripicuam: secundum enim crassitudinem rotundi sunt, longitudine vero palmares, & aliquando longiores, aliis que sunt frequentiores. Græcis *apures* & *apures* nominantur. In gracilibus plerumque intestinis consistunt, & ventriculum subeunt, ideoq; crebro per os reiciuntur: quibusdā etiam e narib. redduntur. Atq; hoc genus in infantib. & pueris, atq; iis, qui ad pubertatē accedunt, peculiare est. *Lati*, qui a Græcis *apures* & *apures* vocantur, in scrotum & fasciarum sint lati & longi, appellantur. Incredibilis vero longitudinis sunt, ut Plin. l. 11, c. 33, testis, tricennum aliquando pedum visum, aliquando etiam plurium. Nihil autē est latus lumbricus. Paulo & Aetio autem *apures*, nisi permutatio intrinsecus tenuia ambientis intestina membranz, in corpus quoddā viuum, & animalis modo mobile. *Ascarides* tenuis ac brevis, vermibusq; similes lumbrici sunt. In recto intestino, & in extremo ani magna ex parte reperiuntur. Omnium generū origo est ex cruda, crassa, pituitosaq; materia, & putredine accommoda, qualis in pueris maxime, & aliis voracib. colligitur. Eos, qui rotundi lumbrices habent, sequitur incredibilis intestinorū & venterculi motus, tussiculæ tenues & exiguz, ac frequēter irritatæ, & socæ. Nōnullos comitatur singul-

tus, & ſomnus cū palpitatione, ſi etiam præter rationem exſurgunt. Nonnulli & cum clamore erpergeunt & proſiliunt, & iterum ſopiantur. Quidam vero & lingua ex-
 tus, oculusq; claudunt ac taciturni ſunt, excitantibusq; indignantur. quod ſc. ob im-
 becillitatem vigilare nequeant. Quidam autem oculos ſanguine ſuſſuſos habent &
 pulſum inæqualem, obſcuram, deſicientem & recurrentem. Nonnulli quoq; appet-
 tentiæ amiſſio accedit. Pueris dum dormiunt manducatio linguæ cui accedit cōfor-
 m. tio oris in modum lactentium, aut accipientium cibum: aliquibus etiam dentium
 ſtridor accedit. Verum hæc paulatim, & ex interuallis fiunt. Quibusdam ad ſtomachū
 procurrunt, nauſearumque & eroſionum cauſæ fiunt, & laborantes cibum reſpuunt.
 Compulſi enim ad cibum nauſeabundi, vix quod aſſumitur deglutiunt, vel etiam re-
 uomunt. Plerique vero alius cibos cotrupos deſicit, & tympani modo inflatur: re-
 liquum vero corpus ſine ratione contabescit, neque inedia præcedente, neq; immodica
 euacuatione facta. Contingit etiam aliquando faciem fieri rubicundā maxime
 circa malas: verum color hic rurius in liuorem tranſit. Alii inſtar delirantium abſurda
 in ſomnis loquuntur. Alii decubitus tranſmutant, & ex loco ad locum ſefe viciffim
 proiciunt. Febres in eis ſine ordine augeſcunt, cum vehementi extemarum partiū
 refrigeratione, tertiam, interim quartā, die vel nocte ſine ratione acceſſionem habē-
 tes. Ceterum non in omnibus omnia quæ nunc commemorauimus ſigna ſunt ſingula-
 ritate inſequenda, ſed quæ reliquis præpollent, ac principatum tenent: aliquando etiam
 plurima. *Lati* lumbrici conſuetos ſtomachi morſus inferunt, & ad cibos impotentem
 & incorrigibilem appetentiam, Nam quod animal euſit in inteſtiniſ obiectum
 rapit alimentum, vt alio ſtatim opus ſit: & niſi aſſumeſcit, in inteſtina rodantur. Eos
 qui ſic patiuntur, conſequitur corporis gracilitas & imbecillitas cum inæqualitate.
 Infallibilis autem ac certiffimum iudicium, ſi cum recrementis quædam ſemini cucurbitæ
 ſimilia excrementantur. *Aſcarides* vehementem in ano pruritus excitant, aſſidue
 que a leg. rendum irritant. Et qui hoc vitio aſſiciuntur, vt plurimum ab excretionibus
 melius habent. Vitio ratio calida & ſicca ſit, poſſiffimum ſi febre a groſſis vacauerint
 cibisq; vtantur probi ſucci, & qui facile in totum corpus diſtribuantur, nec lumbrico-
 rum effectum cauſam adaugeant. Quare omnia quæ pituitoſos humores pro-
 creare poſſunt alimenta fugienda. Præterea qui lumbricorum vitio aſſiguntur, libera-
 tius ſunt nutriendi, famemq; minimè terant: quod lumbrici, niſi cibum habeant quē
 abſumant, ſtatim ſubinde ſolida corpora atrodant. Dabitur vero tum præcipue cib⁹,
 quon non proſuſ inani fuerint. Vinum bibant aquoſum. Potro curandi ratio non
 diſſerenda, & interdum ſimul febris, ſi adeſt, & lumbricorū habere curam: interdum
 autem purum de febre ſollicitos eſſe oportet, ac ſtudioſe lumbricos de corpore exi-
 mere. Quare cum multi hoc iplum non animaduertent, factum eſt vt nulla lumbrico-
 rum ratione habita, corroſi ab iſdem ſint, & conuulſi interierint. Curatio vero iā
 rotundorum quam larorum in hoc conſiſtit, vt hos prius occiſos, expellamus. Occi-
 duntur autem amaris maxime medicamentis, inter quæ vbi febris adeſt, ſimpliciora
 hæc ſunt: *abſinthium, ſerphium, abrotanum, calamintha, marrubium, diſſamnus, hyſſopus, ru-
 ta, folia perſice, cortiſidis ſemen, cornu cernuum, lupini, menta, pulegium, origenum, centaurium*
minus, filix gentiana, arſiſolechia rotunda, alia, braſſica ſemen, & helentii radix. Hiſ ſi fe-
 bris adeſt, iungenda ſunt *intybi* vtriuſque ſemina, itemque earundem herbarum ſucci, *myx-
 trique.* Inter omnia autem laudatiſſimum eſt remedium *aloe.* Quia vero infantes
aloe grauiter propter ſuam amaritudinem admittunt, ſupinis faiſciola iſtis deſen-
 tiſ, ore adaptato ac diſſuſo, per ſiſtulam quandam valido munitione canali, inuiſiſ il-
 lam inſiciemus. Ex nunc autem comprehenſis ſimplicibus medicamentis, varia
 compoſita effici poſſunt, nimirum *decoſta, pulueres, cataplaſmata, emplaſtra & unguenta.*
 Inter reliqua vero iſ pulvis vnice conſert, qui habet: *Seminis ſantonici, quod lumbricorum*
vocant, drach. duas. Centaurii minoris abſinthii cornu cernui vſſi, ſing. drach. vna. Calamintha,
pulegii, origani, ſingul, drach. dimidiam. Abrotani, menta, lupinorum, foliorum arſiſolechia ro-
tunda ſingul, ſcrupulum vnum. Aloe, ſcrupulos duos, commixtis omnibus ſingatur pulvis,
 de quo detur pondus drachmæ vnus, aut ſemis, pro ætatis & habitus corporis ratione
 in l. æte, aur melle, aut ſerapio & dulci radice. Nā debent ea quæ lūbricos enecant, cum
 dulciſ liquonb. propinari, quo citius medicamenta dulcedine illa alloſi lumbrici
 amolo-

- A** amplectantur. Extrinsecus etiam umbilicus *felle taurino*, aut hoc unguento illinendus, quod accipit: *Olei amygdalarum amararum & absinthii utriusque unciam unam. Felis taurini unciam dimidiam, Centaurii minoris absinthii lupinerum singul. scrupulos duos. Foliorum persicae, cornu cervini cysti, aloes, abrotani singul. scrupulum unam. Cera quod satis est, fiat unguentum.* Aut imponatur regioni totius ventriculi hoc ceratum, quod habet: *Aloes, absinthii farina lupinerum singul. drachmas duas. Nigella, menta, origani, pulegii, marrubii singul. drachmam unam. Centaurii minoris, calamintha, utriusque drachmam dimidiam. Olei absinthii & amygdalarum amararum, utriusque uncie duas. Olei castani unciam unam. Felis taurini unciam dimidiam. Cum cera & resina quantum sufficit, fiat ceratum.* Adeorundem exempla facile quispiam emplastra & cataplasmata componet, ita ut necessarium non sit singulorum formulas adscribere. Porro ab inferioribus etiam partibus multam inicere copiosorem expedit, quo lumbriei mellis dulcedine illecti, deorsum repant. Enecatosis vero lumbricos per praedicta medicamenta, citra dilationem expellere oportet. Vitiola n. ex ipsis exhalatio procedit, quae & appetitum deicit, concoctionemque laedit: sursum etiam delata vertigines, aliaque mala creat. Expelluntur autem, magna ex parte, per glandes & per purgantia medicamenta, potissimum vero per hieram picram, & catapota *pestilentialia*, aut *Rufi* vocata, quae sane miram & in enecandis & educendis lumbicis efficaciam obtinent. Ceterum qui cum lumbicis alui etiam profluuium intestantur, eos fluorem inspissando, & concoctionem tum per cibos, tum per cataplasmata in melius permutando, curare oportet. Quantum enim profluuium inualecit, tantum etiam lumbicorum generatio augetur: vicissimque fluxu cessante, lumbrici interquiescunt. Quapropter summa diligentia annitendum, ut alius adstringatur, firmusque ei adiciatur. Propinandus itaque plantaginis succus, vel ipsa etiam arida plantago assumenda: ex quo enim utriusque & fluori & lumbicis, efficax est. Cataplasma quoque, cerata & unguenta ex *eruda bordeacea farina, malicorio, hypocistide, & similibus adstringentibus*, componenda, adicitis tamen iis, quae ad lumbricos inter meduos idonea, sunt. Conferunt autem adstringentia medicamenta extrinsecus admta hoc etiam nomine, quod ventriculum ex amarorum medicamentorum frequentu usu laesum, iterum corroborant. Licebit etiam in hoc casu vermes terrenos exsiccatos, & in puluerem redactos, cum *hyadromela* exhiberi. A scarides in infantibus educendi sunt cum gladiis.
- D**ibus ex melle & sale paratis. In proectionibus, aut clysteribus ex *acris muria, aut decocto absinthii, centaurii minoris, calamintha, lupinerum, pulegii, & aliorum supra commemoratorum, adiectis oleis*, paratis. Post clysteres rectum intestinum simplicibus quidem *acacia, hypocistide, ribis succo, aut alio adstringente* subliniendum est. Coacta enim ab adstringentibus caro corroboratur, habitatemque ad animalculorum generationem amittit, atque ascarides ipsos excludit. Hoc vero quod sequitur, & pueris, & qui proeucti sunt aetatis conducit, efficacissimumque existit. Carnem veterem salitam, pinguedine derafa, sublongam & rotundam formabimus, atque ita adaptatam podici intrudemus, ligamentoque adhibito, quam diu sustinere possint, inditam sinemus, deinde soluemus, simulque ascarides illi adhaerentes educemus. Post haec, quae praedicta sunt, infundemus, atque illinemus.

De hemorrhoidibus. CAP. XX.

- A** *apostemae* Graecis venarum in sede sunt explicationes, dilationesque, a crebro sanguinis deluxu sic appellatae. Harum quidem aliae sunt caecae, quae scilicet intumescunt, & nihil aut patum admodum sanguinis excernunt. Aliae apertae, quae nimirum certis quibusdam temporibus panduntur, & sanguinem emittunt. Fiant autem hemorrhoides, propter copiam sanguinis ferulenti & melancholici, quem iecur ad ipsas reponit. Signa per quae vitium deprehenditur, non admodum requiruntur. Oculis non conspiciuntur caecae, & dolorem vehementem, potissimum in excernendo stercore, excitant. Apertae vero sanguinem fundunt, ideoque latere aegrotantes haud possunt. Quum itaque caecae apparuerint hemorrhoides, & magnos in ano cruciatus excitauerint, corpulque plethoricum fuerit, vena poplitis aut malleoli incidenda erit. Alius etiam affatum mollienda, ne arida stercora dum excernuntur, dolorem pariant. Apponenda quoque ubi vehementer dolor fuerit, quae illum mitigare possunt. E quorum numero est *mica panis in lacte macerata, & cum oui vitello decocta, ac missa emplastri admta*. Prodest etiam solus

126 Operum Leonhard. Fuchſii Pars III.

Hæmorrhoides ap-
puncta.

Glandæ.

Aperiarum
florantiq;
curatio.

4 Epid.
par. 3. apd.
19.

Vitæ.

Cucurbit.

Medicam-
ta Galeni.

Sacculi.

Caulis.

ex decocto malua, foliis violæ purpureæ, meliloti, ſanogregi chamæmeli altheæ foliis, ſini ſemine
verbaſci floribus, & ſimilibus apparatus. Quod ſi quis eo vti non poterit, lauz aut ſpon-
giam decocto iam dicto irrigatz & madefactæ, dolenti loco adhibeantur. Quod ſi
prædicta nihil contulerint, ſanguinem ab eis elicere oportet. Quapropter cyclami-
ni ſuccum, aut cepa, aut ſilbulum lana illitum intra anuum imponere oportet. Idem eti-
am p- tei centaury minoris ſuccum, ſtercus columbinum, ſtaphyæ agriæ, ſolum ſicur, ſicum & ſim-
centur. & medulla colocyntidii in oleo amygdalarum amararum macerata. Inter reliqua ve-
r- alia multa hoc emplaſtrum vnice confect, quod habet: Stercoris columbini vniciam
dimidiam, Seminii ſtaphydis agriæ, lupinarum, utruſque drachmam vnam & dimidiam. Amy-
gdalarum amararum, drachmam vnam. Medulle colocyntidii, drachmam dimidiam. Sacci
cyclamini, cepa, utruſque vniciam vnam. Commiſceantur ſingula, & ad formam emplaſtri
redigantur, adiectione ſi opus fuerit, oleo amygdalarum amararum. Glandes etiam oblon-
gæ ex radice cyclaminis paratz in anum indi poſſunt. Hirudines quoque in harundine in-
cluſæ, ita vt caput duntaxat exerant, hæmorrhoidibus, vt aperiantur, imponi ſolent.
Haſ ſi deinceps amouere haud potens, c- nere illarum capiti inſperſo, decidere ſua ſponte
facies. In mollibus & delicatis panno aſpero podex confricari poterit. Ceteri ſi aper-
te fuerint, & ſanguine modice per certa intervalla fuderint, minime ſupprimendæ
ſunt: quod huiſcemodi ſanguinis erupcio homines hoc vitio detentorosa multis aliis
morbis tutos reddat. Id quod in primis: ſtatut Hippocrates, qui in Epidemiis ita ſcrip-
tum reliquit: *Hæbentes hæmorrhoidas neque laſcerum dolore, neq. palmarum phlegmone, neque*
de pſeſcenti vlcere, neq. furnuſculis, neque terminibus, pariter neque lepra, neque viſcidiginibus cor-
ripuntur. Hæc ille. Quod ſi vero immodice ac iuſto longius ſanguinem adſtrungunt, ſic
quod ægri hoc vitio contabefcant, ac illorum robur deiſtatur, ſupprimendæ confe-
ſtum: quod alias periculum ſit, ne aqua inter cutem, iocinore propter immodicam
vacuationem refrigerato, ſequatur. Cibis itaq; qui ſupra modum inanijunt, vrâtur
pauci ſanguinis, effracib. & minime recrementiciis, quique ſiccant, & adſtrungunt: cu-
iſmodi eſt alica & oryza. Ex olerib. intybum, echiorium, portulaca, & ſimilia. Cibi rhu ob-
ſenſiorum, aut ſucus immaturarum vinarum admiſceatur. Si vires plurimum proſternantur,
e carnis expreſſo ſucco, cui cotoneorum ſuccus permixtus ſit, alendus æger erit.
Vina bibenda adſtr- gentia. Ceterum quod ad curandi rationem ſpectat, ſi pleniru-
do corporis affuerit, vnice interioris in gibbero dextræ manus ſectio proderit. Sin
minus, auerſioni per cucurbitulas hypochondriis & iocinori affixas ſtudentum. In
quem uſum manib. & brachijs etiã vincula iniicere, & frictiones aſperas adhibere cõ-
uenit. Præterea intra corpus affluenda erunt ea quæ adſtr- ngunt, vt eſt ſerapium roſe-
ctum myrtinum, cotoneorumq; corallia rubra. balus armenius, paſſilli de ſuccino, & ſpodio, de terra
leuiffima, & alia quæ in capite de cruento ſſuſi ſunt commemorata. Extrin- ecus etiam ea appo-
nenda, quæ ſanguinem promanantem ſtiltere poſſunt. E quorum numero, Actio etiam
iſto libro 4 capite 5, auſtore, aloë exiſtit, cum poſca impoſita. Idem qu- q. potest ſquamæ
ferri, au plumbum uſum. Vnice autem confect medicamentum, quod deſcribitur a Ga-
leno libro 5, Ther. method. & accipit: *Thuriæ partem vnam, aloë partem vniuiſiſſim.* Hæc cõ-
oui candido donec ad mellis craſſitudinem redeant ſubiguntur, & molliſſimo lepo-
ris pilo excepta vaſis ſanguinem effundentibus imponuntur, ſcilia ex tenui linteo fo-
tinſecus alligata. Proderunt quoque *unguentum balnea, inſeſſiones, ſomenta, & alia huius*
generis ex medicamentis adſtrungi diſtribuitur p- æditis compoſita: quorum ſane multa ſupra in
cap. De diarrhæa, ſienteria, dyſenteria & tenefmo diſcimus. Quod ſi ſacculorum uſus erit, præſtat
eos in vino rubeo & adſtrigente, priuſquam admoveantur, bullire, aut ſaltem irrigare.
Reliquæ medicamentorum formulæ ex capitib. nunc citatis petantur. Quod ſi vero
dolor vna cum caliditate vehemens acceſſerit, oleo roſaceo, violaceo, chamæmelino, vtendũ
erit, in quib. interdum cogimur opium diſſoluere, & vna cum mucagine ſanogregiæ,
& paucocroco adhibere.

De prociſſentia ani. Cap. XXI.

Accidit interdũ, vt ppter reſolutionem, aut imbecillitatem muſculorum lato-
rum, & tenuium ſedem ſurſum reuellentium, anus p- cidat. Quare cum a prædi-
ctis nunc muſculis an- retrahi ac ſurſum euelli nõ queat, ſit vt manib. aut medicamētis
opem ferentibus egeat. Fit autem reſolutio eorum muſculorum poſt diuiniam in a-
qua

Aqua frigida natationem. Fit etiam malum hoc propter præcedentem dyſenteriam, & tenefmum, in quo ob nimiam contentionem in reddendis excrementis anus procidit. Quum vero prociderit anus, diligenter confiderandum erit, num a phlegmone liber ſit, nec ne. ſi enim nulla phlegmone occupetur, ſtatim manibus ſenſim impuſus in priſtinum locum protrudi ac reponi debet. Ne autem intraſus ac in ſe cum ſuum repoſitus iterum excidat, adſtringentia extrinſecus medicamenta apponenda ſunt. Primum itaque oleo roſaceo calente circumlinendus, aut vino adſtingente detergendus anus, ac ſubinde in ſuum locum repoſitus deligandus erit. Idque ſtatim ſimulatque æger excrevit faciendum, ne quum ipſum ad egerendum iterum neceſſitas vrget, denuo procidat. Linimentum autem ex *acacia* & *hypociſthide* cum vino adhibendum. Incoquenda quoque in aqua donec rubelſcat, *galla*, *balauſtrum*, *glandium caſtyes*, *malacorum bellii minor*, *rhuiſyſiorum*, *cortices cotoneorum*, & ſimilia, ac deinde ex eulmodi decocto inſeſus & ablutiones parentur. Poſtquam vero vino aut decocto adſtringente ſedes abluta fuerit, tum arida admouere ac inſpergere medicamenta licebit. In quem uſum *bolus armenius*, *thuiſis*, *ſanguis draconis*, *galla*, *acacia*, *myrrha*, *hypociſthia*, *cornu ceruinum*, & eius generis adſtringentia medicamenta, de quibus iam ſepe dictum eſt, adhiberi poſſunt. Quod ſi vero propter phlegmonem anus in tumorem elatus impelli & reponi nequeat, ubi plenitudo fuerit, venæ primum ſecanda erit, vomitumque ciendus. Secundæ etiam apponenda quæ adſtringunt & reprimunt, ſed ſtatim inter initia. Si vero nulla adſit plenitudo, æger inſeſione vtatur ex decocto *chamaemeli*, *malua*, *alibea*, *ſeminis lini*, *ſanograci*, & ſimilibus concinnata. Aut in aquam calidam conſcendar, & illic ad tempus immoretur. Spongiam quoque aut lanam in decocto prædicto madefactam admouere licebit. Anus denique oleis *chamaemelino* & *canethino*, quouſque reponi poſſit, illinendus. Prompte autem cum illis inſit diſcutiendi vis, tumorem auferunt, atque adeo vt reponi nulla difficultate poſſint, efficiunt. Poſtquam vero iam reconditus eſt, tunc ſupra commemoratis medicamentis adſtingentibus, ne ſcilicet iterum procidat, vtendum erit. Quod ſi autem manus propter muſculorum prædictorum reſolutionem procidat, poſtquam ille in priſtinum locum repoſitus fuerit, remedia quæ reſolutioni debentur, ſacco & coecygi oſſibus adhibendo erunt.

De rimis ani. C A P. XXII.

Rimæ ſedis, quas Græci *τρυπαδα* vocant, ſunt ſciſſura, quæ in muſculo *anum* claudente, *perforatio* nominant, aut in circulo, & extrema ani corona ſunt ſimiles iis quæ in labiis, ab *Heræ* ſtatim aperiariem, accidunt. Eucniræ ſolent propter actum humorum deſluxum, aut phlegmonem, aut condylomatam extensionem. Sunt autem condylomata, rugæ ſeu eminentiæ quædam in ano, reduplicatis eius corpufculis, præter naturam inſurgentes. Malum ipſum oculis obuium eſt, ideoque notis non indiget quæ in eius nos cognitionem ducant. Quod quidem ad curandi rationem attinet, ſi rhagades ab acerbis humoribus oriuntur, tum ſi omnium primis purgandi ac contemperandi erunt. Si vero propter condylomata acciderint, itidem purgationibus medicamentis inter initia vtendum erit. Alius etiam toto curationis tempore cibis humectantibus & pinguibus mollienda, ne aridum ſtercus conglutinationem remoretur. Huius autem generis ſunt *malua*, *ſpinachia*, *lac amygdalarum dulcium*, *ona ſorbila*, *inſcula pinguis*, & id genus alia. Ceterum in iſis ipſis hoc adhibendum unguentum, quod habet: *Oleum roſacei*, *myrtini*, *atriſque vne. vnam*. *Thuris*, *maſtiche*, *ſitibargyri ſanguinis draconis ſing. ſerup. vnum*. *Aloes*, *plumbi viſſi*, *ceruſſæ*, *balauſtrorum*, *boli armenii ſing. ſerup. dimidium*. *Cera alba*, quod ſatis eſt, fiat unguentum. Aut tale quod accipit: *Olei roſacei*, *vne. vnam* & *dimidium*. *Galla*, *myrrha*, *terra Alindemſia ſing. ſerup. vnum*. *Radici ſymphiti maioris*, *aluminis ſciſſili*, *plumbi viſſi ſing. ſerup. dimidium*. *Oui aſſati vitellum*, *cera* quod ſatis eſt formetur unguentum. Iam commemoratis unguentis ter die ritimas circumungere oportet, lotas prius decocto *roſarum*, *gallarum* & *ſidiorum*. Quod ſi locum male affectum ardor & phlegmone affligat, unguento candido, ꝑ *caphuræ* hodie vocato, illinendus erit.

De imbecillitate iocinoris. C A P. XXIII.

IMBECILLITAS iocinoris a nuda intemperie ipſa producitur calida, frigida, humida, vel ſicca. Calida intemperies tū eos, qui prius adſunt, humores, tū hos etiam, qui per venas meſenterii ad ipſum iecur feruntur, aduſtat, & veluti comburit. Frigida

128 Operum Leonhard Fuchsi Pars. III.

Hepatici
qui.
Signa, cau-
lode.

Frigida.

Sicca.

Humida.
Curatio.

Calide in-
temperiei.

Orbiculi.

Vaginati.

Epithema.

vero intemperies pituitosum & crassum humorem, qui iam in iecore continetur, A
crassum & lentum ætque mobilem reddit: eum vero, qui ad ipsum defertur, *semia-*
thum relinquit. Ceterum sicca intemperies sicciores & densiores humores facit. Hu-
mida autem tenuiores, & magis aquosos. Qui itaque facultates & vires iocinoris ha-
bent imbecillas, & nullo alio vitio iecoris laborant, ut *hepatici* vocantur, ut testatur Gal.
lib. 5. De affectu loci, cap. 7. Calida autem intemperie iecur occupante, colliquationes
fiunt, primum quidem humorum, deinde carnis etiam ipsius iocinoris, & hi si for-
tens & crassa per ventrem evacuetur, abundeque colorata, febris ingens urget, cibi
fastidium, & vomitus biliosus. Linguam scabrem habent, corpus siccum, & gracilius.
Sitis denique infestat, urina est rufa, pulsus celer. Vbi vero frigida intemperies affu-
erit, neque assidue excretiones, neque multe fiunt: quippe vitum diutius prolonga-
tur, & certis diebus venter maiori copia profluat: sed que egerantur, minus secunda
sunt: ita quæ per calorem sunt colliquata: neque color etiam, neque consistentiam,
sed speciem præ se ferunt sanguinis putrefacti, & in grumos coacti. Et si quis diligen-
ter consideret, neque sanguis niger est, neque grumus, sed veluti limus & fex quædam
sanguinis crassi, proxime ad atram bilem accedens. Quin etiam plures & varij excre-
mentorum colores frigidam intemperiem monstrant. In ea quoque febris languida
apparet, facies non concidit, malorque ciborum appetentia adest. Harum intem-
periarum quæcunque fuerit, si illi accedat siccitas, excrementa adhuc sicciora & pau-
ciora erunt, ætque magis sitient. Sin humiditas, liquidiora & copiosiora, sicutque
minus infestabit. In curandi ratione is præcipuus scopus erit, ut intemperiem per co-
C
eal facere, similiterque humidam resiccare, & siccam humectare. Ceterum in cura-
tione hoc etiam vniçe considerandum erit, ut omnibus iecorariis, tum iis quæ per os
sumuntur, tum iis quæ extrinsecus imponuntur, aliquid ex astrigentibus admiscea-
tur, quo firmitas & robur visceris conferuetur, ut *viscus* docet libro 12. The. metha. Gal.
In calida igitur intemperie, quod ad victus rationem attinet, vitendum erit ut panis cre-
more, & alijs cibis mediocriter refrigerantibus, lactucis, intybis, cicorio, feniculis, & pane
ex aqua. Pullis item gallinarum, perdiciis, anibus montanis, carnibus vitulinis cum omphacis,
aut limonibus vocatis, elixis. E fructibus ægti vescantur passule, limonibus, & amygdalis
dulcibus. Vinum omnino circumcidendum, nisi aliam ob causam, nempe ven-
D
triculi imbecillitatem, hoc requirant: tum enim tenue & aquosum exhibendum.
Bibant pro vino succum malorum puniceorum, & serapium acidum simplex appel-
latum, oxofæcharumque cum decocto hordei, aut intybi domestici. Ascendi et-
iam sunt ab omni cibo & potu melle condito, & admodum calido, & incidendi vi
prædito. Quod ad curationem spectat, per os sumendum saccharum rosaceum, diar-
rhodon abbatis, diatriosantalum, & id genus alia antidota. Proderit etiam hoc, quod ha-
bet: Specierum diarrhodon abbatis, diatriosantalum, utriusque drachmam unam & dimidiam.
Seminum intybi sativi utriusque, rosarum purpurearum, singularum scrupulos duos. Fuarum
passarum, unciam unam. Santalorum alborum, cassia, floris iunci odorati, singularum sera-
pulum unum. Sacchari, uncias sex. Diluti in liquoribus stillaticijs cassia, & intybi sativi la-
E
tisfolii, singantur orbiculi. Quin & Philonis antidotus semel tantum exhibita, omnem
aliquando calidam iecoris intemperiem mirabiliter sanavit. Extrinsecus adhiben-
da fomenta ex rosaceo, chamamelino, catoneorumque oleis parata. Aut abinthium, aut
palmule prædictis oleis incoquantur, & in iis deinde lana vel sponsia madefacta,
illud locum iecur esse situm imponatur. Proderit etiam eius vnguenti esse visus, quod
accipit: Olesum rosacei, catoneorum, nymphae sing. unciam unam. Santalorum alborum, & ru-
beorum, rosarum purpurearum, singul. scrupulum unum. Ramentorum eboris, scrupulum unum
& dimidium. Seminum intybi sativi, utriusque scrupulum unum. Acti, drachmam unam & dimi-
F
diam. Caphura, grana duo. Cere quod satis est, fiat vnguentum. Epithema etiam in hoc af-
fectu non parum conducere solent, quæ in hunc vel similem confici possunt mo-
dum. Accipe stillaticij liquoris intybi sativi latifolii, lactuca, oxalidis, rosarum, nymphae, sing.
uncias tres. Succus semperuius, unc. unam & dimidiam. Acti, unc. unam. Rosarum purpurearum,
santalorum rubeorum, ramentorum eboris sing. drach. unam. Specierum diarrhodon abbatis, dia-
triiosantalum, utriusque drach. unam & dimidiam. Caphura, scrup. dimidium. Commixtis
omnis

- A** omnibus fiat epithema. Adhibenda vero sunt epithemata aestate quidem actu frigida, hyeme vero tepida. Vbi vero frigida in iocinore fuerit intemperies, calefacientibus & robur ac firmitatem addentibus medicamentis utendum est. In victus ratione, cibis concoctu facilibus & calefacientibus. Ex oleis sane *satureia, hyssopo, feniculi, petroselinis, abrotano, salvia, & similibus*. Cibi quoque aromatis sunt condicti, *cinnamomi* scilicet, *garyophyllis, pipere, & id genus aliis*. Vinum bibendum tenue, fulum, & odoriferum, fugiendus piscium etus, fructuum frigidorum, ocium, & in summa quicquid refrigerare potest. Intra corpus sumendum hoc decoctum, quod habet: Radicum apii, feniculi, petroselini, singularum vnciam vnam. Eupatorii, hyssopi, mentae, absinthii, cichorii, cassiæ, origani, calaminthæ, asari, sing. manipulum vnum. Seminum anisi, feniculi, dauci, cumini, cæres, singul. drach. duas. Lunci odorati, drach. vnam & dimidiam. Mastiches, drach. vnam. Florum chamæmeli, rosarum purpurearum, vtriusque manipulum vnum. Cinnamomi selecti, drach. vnam & dimidiam. Coquantur omnia in lib. vna & dimidia vini, & lib. vna aqua fontana ad tertias, deinde colo transfundantur, eductis serapii de eupatorio, vnc. tres. Et serapius de absinthio, vnc. vnam. Et commixtis omnibus fiat potio, de qua mane in aurota, & a prandio iam confecta concoctione, vnc. tres & dimidia sumantur. In eundem vsum exhibenda veniunt antidota calefacientia, nempe *diacinnamomi, dianisi, saccharum saluæ, acornus conditum, radices pimpinellæ saccharo obductæ, & alia eiusmodi*. Extrioleus illi nenda olea calida, ut est *marinum, chamæmelinum, absinthiæ, & similia*. Vniue vero confert vsus eius vnguenti quod accipit: Oleum absinthii, nardini, vtriusque vnc. vnam & dimidiam. Succus eupatorii, drach. duas. Cinnamomi, garyophyllorum, ligni aloës, sing. scrup. duas. Spica iunci odorati mastiches, vtriusque scrupulum vnum. Cera quod satis est, vtriusque vnguentum. Poterit etiam adhiberi hoc ceratum, quod habet: Farina feniculi, lupinorum, vtriusque drachmas duas. Radici iridi, asari, vtriusque drach. vnam. Eupatorii, absinthii, meliloti, lunci odorati, singul. drachmam dimidiam. Galli mofchatæ, scrupulum vnum. Seminum anisi, feniculi, vtriusque scrupulum dimidiam. Mastiches, scrupulos duos. Asyrriæ, thuri, vtriusque scrupulum vnum. Oleum mastichini, nardini, rosæ, anethini, singularum vnc. vnam. Cera & resina quod satis est, informetur cerarum iocinori imponendum. Epithematis quoque illius vsus minimè aspernendus erit, quod accipit: Seminum anisi, feniculi, ammi, sing. drach. vnam & dimidiam. Cinnamomi, garyophyllorum, iunci odorati, singul. drach. vnam. Decoquantur in lib. vna & dimidia tantisper dum medietas relinquatur, deinde colentur, & tunc per colam transfuso admisceantur liquorum stillaticorum absinthii & eupatorii, vtriusque vnc. dua. Specierum diacinnamomi, diagalangi, vtriusque drach. vna. Cassiæ, scrup. dua. Aëti, drach. tres. Commixtis omnibus fiat epithema. In humida vero iocinoris intemperie visus ratione desiccante utendum, carnis nimitum volucrum assis, vino tenui: iis quæ sudorem mouent, laconico, & baloeis etiam sua sponte prouenientibus. Parum in vniuersum bibendum ac comedendum, pisces omnis generis, & fructus quibus humectandi vis incutitur, intra corpus sumendum serapium de absinthio, antidotus dialachæ & diaeureumæ. Extrinsecus autem quæ exsiccant citra insignem calorem adhibenda, de quibus omnibus dicemus copiosius infra in capite De anasarca. Sicca iocoris intemperies haud
- E** iecus atque alix per contraria curanda erit. Quare ut rem paucis perstringamus, victus ratio conuenit humectans, ptisana ius carum, lac amygdalarum dulcium, & balnea aquarum dulcium, & alia quæ humectare possunt, de quibus suo loco fusius dicemus. Hoc tamen, quod antea quoque monuimus, minime interim negligendum erit, ut humectantibus semper admisceantur, quæ visceri robur addere possunt. Ceterum inter ea, quæ a proprietate totius substantiæ componere videntur, optimum est lupinum iecur, si diligenter exsiccatum & tritum drachmæ vnius pondere cum vino dulci aqua diluto præbeat. Hoc enim multiplex experimento cognitum, omnibus iecoris intemperiebus commodum existit: utpote, quod diximus proprietate totius substantiæ hanc efficaciam habens, non calefaciendo aut refrigerando.
- F** De obstructione iocinoris. C A P. XXIV.
- I**OCINORIS obstructio fit a flatibus vaporosis ac crassis, conestitque difficilibus, in eius visceris ventis, quæ structura sua parua ac veluti capillares sunt, coactis. In eisdem vero a crassis & viscosis humoribus, in sinibus venarum ex summa iocinoris parte enatarum, per quas ex ventriculo, & intestinis alimentum ad iecur distribuitur. Potro si vaporosi & crassi flatuum multitudo coacer-

Frigide iocoris
intemperiei
curatio.

Vnguentum.

Ceratum.

Epithema.

Humida iocoris
intemperiei
curatio.Sicca iocoris
intemperiei.Lupinum
iecur.

Causa.

Nota.

uatur, quæ exitum liberum non habet, atque adeo obſtructionem parit, non graui-
ratis ſolum iuxta dextrum hypochondrium, ſed & diſtentionis ſenſus oboritur. Ob-
ſtructionem vero a craſſis viſcidisque humoribus, conſequitur grauitatis cum do-
lore ſenſus, aliquando quidem obtuſe, aliquando etiam vehementiſſe: & quando-
que quidem abſque febre, quandoque cum febre. Craſſa enim, viſcoſa, & multa, o-
mnino reliquis plus obſtruant, & maxime quando ægri a cibo vehementiori inotu
viuntur. Si vero acria ſint, & multa quæ in cibo ſumuntur, dolor ex obſtructi-
one ve-
hementiori fit: quum obturata corpora ſimul & tenſionem perferant, ſimulque pun-
gantur. Cibi bis qui ſic laborant, dandi ſunt calidiores, & qui tollendi obſtructiones
facultatem habent. Cuiusmodi eſt porrum vel ſcepe ex oxymelite, aſparagi, feniculum, petro-
ſelinum, capparos, & alia olera & obſonia caſſia, aut cum condimento aliquo calefaciente obſtru-
cti-
onesque auferente ſumta. Vitanda ſunt omnia craſſiottiſ ſucci alimenta, balneatitem,
& exetetica a cibo. Vino in potu vten- dum tenui, ac veteri. Præter vidus rationem
attenuantium quoque & obſtructiones tollentium medicamentorum quam ce-
lerrimus requiritur viſus. Siquidem obſtructio inueterata non tantum in iocinore,
ſed & in omni corporis parte putrefactionem operatur, febremque accendit. Pæ-
clare autem & citra omnem moleſtiam ab obſtructione ſeuant inter ſimplicia medi-
camenta, lupi ſecur, ſumaria, eupatorium, chamamelum, radix acori & dracunculi, aſarum, ani-
ſum apium, abſinthium, caſia iris, glycyrrhiza, rha ponticum, lupini, capparos, ammi, caſſia, petro-
ſelinum, piſtacia, amygdala amara, ſpitæ nardi, ſtæchas, gentiana, plantaginis radix, ſemen, & ſa-
lia ſicca: anagallidis ſemina ſucci, euthorium, helleborum, mityba varaque, aſparagus, & ru-
ſcus. Ex quibus ſubinde varia medicamenta compoſita concinnari poſſunt, po-
tiſſimum autem in decocta, admixtis oxymelite ſimplici, ſeyſſitico, ſerapie acido compoſita, de
abſinthio, ſeyſſopo, calaminta, marrubio, & id genus aliis. Ad eundem viſum licebit exhibe-
re piſtillos de eupatorio, de abſinthio, rhabarbato ſciſcentico, & iis ſimiles. Conſentit quo-
que antidota diſtacha, diacereuma, dianſi, & huius generis alia quadam. Inter cetera au-
tem medicamenta ſimplicia ſupra commemorata ad auferendas obſtructiones
vni-
ce conducunt piſtacia. Quapropter non ſolum vtile, verum etiam iucundum
erit, ſi piſtacia decem aut duodecim per noctem in vino Atriuſio, quod hodie de-
prauata voce Atalmaſinum vocant, macerata, in aurora perfectis iam coctionibus ſu-
mantur. Extrinſecus quoque admo- uenda epithemata, vnguenta, emplaftra, & ce-
rata, quæ in capite ſuperiore Deſtrigida intemperies iocinoris curatione dicta ſunt. Atque nunc
quidem commemorata medicamenta ſufficient, ſi vitum nondum inueteratum
fuerit. Nam vbi in vetuſtatem abiit venæ etiam ſectio, & purgatio, ſi nihil aliud pro-
hibeat, adhibenda erunt. Purgationem autem perficient catapona de rhabarbato, de
agario, aut alia antidota quæ craſſos & lentos humores per aluum purgare poſſunt.
Purgandum autem per aluum tum maxime, quando caua iocinoris laborant. Per vi-
rina autem trahere oportet, vbi gibba eiufdem male habuerint, quod Gal. libr. 2. ad
Glanconem cap. 3. monet, multiſque aliis locis. Vacuato corpore per venæ ſectionem &
purgantia medicamenta, ea ſubinde, quæ ſupra comprehenſa ſunt medicamenta,
propinabuntur. Hoc potiſſimum antidotum, quod habet: Radiciſ iridis & chamapityas,
ſeminiſ anifi apii ſing. drach. duas. Aſari, drachmas duas & dimidiam. Cinnamomi, zingiberis,
cerei, chamamelis ſing. drachmam vnam. Stæchadis, gentiana, marrubii, ſingul. drachmas duas.
Cum oxymelite ſeyſſitico quod ſatis eſt fiat antidotum liquidum. Hoc ſane mirifice obſtructio-
nes, non tam eas quæ in cavo, quam quæ in gibbo iocinoris ſharent (per vrinam enim ve-
hementer expurgare ſolet) penitus tollit.

De phlegmone iocinoris. C A P. XXV.

IN iocinore, perinde atque in aliis viſceribus, & ob eandem cauſas, fit phlegmone.
Phlegmone vero laborante iocinore, omnibus quidem ex æquo in dextro hy-
pochondrio dolor & grauitas eſt, ſupra ad iugulum viſque, infra vero ad ſpurias co-
ſtas perurians. Tumor quoque dextri hypochondrii conſequitur, præſertim ſi gib-
boſa pars ſit phlegmone affecta. Febris accedit acuta, quæ plerumque ad velperam
& noctem exacerbatur, tuſſis exigua & ſicca, ſitis inextinguita, cibi vehemens ſati-
dium, difficultas ſpiritus. Lingue color in primis quidem ruber, deinde veto niger ap-
paret. Vomitus tum ſynceræ bilis, tū eius, quæ ouorum vitellis aſſimilatur, poſt autem
& etu-

- A** & eruginoſe. Alius adſtingitur. Color etiã corporis mutatur in arquati morbi ſpeciem, ſingultus quoque conſequitur. Acceſſionis autem tempore quidam delirio apprehenduntur, & acrem vrinam excernunt. Porro quæ in ſiniſi iocinoris partibus ueniunt phlegmoneſ, faſtidium, nauſcam, vomitum bilioſum, ſitum ingẽtem magis inducunt. Quæ vero in gibbis partibus oriuntur, maiori quam priore inter ſpirandum dolore laborantem excruciant, magiſque ruſſim excitant, atque dolore viſque ad dextræ partis iugulum, adeo vt detrabi videatur, exiunt, *vt copioſe Galen. lib. 6. De affectu locis, cap. 5. docet.* Accidit autem interdum, vt muſculi iocinori incumbẽtes phlegmone inſeſtentur, quare non nulli decepti, iocinotiſ eam eſſe phlegmonem ſuſpiciunt. Neceſſarium itaque inter ſe haſ iplaſ diſtinguere. Iocinore enim phlegmone obſeſſo, tumor ſecundum lineamenta rotundus, figura, videlicet iecinotiſ, luccumbit, quique ad corporis decubitus ſimul conformatur. Maior enim apparet corpore ad ſiniſtrum latus reclinato, minor autem ruſſus ad dextrum deuoluto, nimirum iocinore ſub ſpurias coſtaſ cedente, neque viſui, neque tactui ſimiliter luccumbente. Amplius autem in iocinotiſ phlegmone incumbens cuticula, naturali modo habere conſpicitur. Muſculiſ autem phlegmone obſeſſiſ, cuiſ circumtenditur, vt ſi quiſ digitiſ apprehenſum attrahere velit, ea minime ſequatur. Tumor præterea iuxta litum muſculorum iocinori incumbentium oblongum apparet, & viſui & tactui maniſeſtus. Cæterum vbi iecuriam phlegmonem contrahere cœpit, conſeſſim ſanguiniſ detractiõnem, ſi ætaſ & virtuſ permiſerint, experiri oportet. Ergo *Galen. lib. 13. Ther. meth. capite.*
- C** 9. auctore, pariter tum reuellendus, tum vacuandus qui ad ſecur ſluit, ſanguis erit, interna in dextro gibbero ſecta vena: propterea quod & e directo ſit, & ampla via cum vena quæ caua dicitur, locietatem habeat. Hac non comparente, media ſecanda eſt, quod ſi nec caſe oſtenſerit, reliqua quæ ſuperior ac tertia eſt, ac humeraliſ dicitur, incidenda. Copioſiſ autem, & quantum ſatiſ eſt, ſi vires ferre queant, educendus. Si vero non, per vires partiendus. Miſſione ſanguiniſ facta, poſt exiguum interuallum ſimplici ac leui clyſteri aliuſ eluenda: præſertim vbi ſponte non egerat, qualiſ eſt iſ, qui ex malua, althea, viola ſoliſ, & chamameli, & oleo violaceo conſicitur. Sequenti a vena ſeſſione die cucurbitæ cum ſcanticatione affigendæ ruſſumque poſt vnam diem apponendæ: non pauci enim a ſecunda earum adhibitione opem ſenſerunt magiſ,
- D** quam a priore. Fomentis quoque vtendum ex leni oleo imbutiſ, cataplaſmatiſ, ceratiſ, & epithematiſ. In quibuſ omnibuſ admouendiſ vniçe hoc obſeruandum erit, vt cæteriſ medicamentis emollientibuſ & diſcutientibuſ, ſemper adſtringentia commiſceantur. Fomentum itaque fiat ex oleo cotoneorum, aut maſſichino, aut roſaceo, aut myrſino, adiecto vino odorifero. Vel admoueatut ſpongia in decocto abſinthii, meliloti, roſarum purpurearum, chamameli, anethi, plantaginii, intybiſ ſatiſ, & idigeniſ aliorum. Cataplaſmata vero, & emplaſta e ſeminibuſ lini & ſenograti, farina hordeacea, meliſ cotoneiſ, melilotiſ flore, abſinthio, & ſimilibuſ in hunc vel ſimilem modum ſunt paranda. Emplaſtrum quod habet: Farina hordeacea, vnc. dimidiã. Carniſ cotoneorum contuſa, drach. tres. Abſinthii, ſtorum meliloti, iunci odorati, ſingul. drachmaſ duaſ. Semiſiſ lini, drachmam vnam. Oleorum roſacei, cotoneorum, chamamelini, abſinthiiſ, ſingulorum vnciam dimidiã. Aceti, vnciam vnam. Commixtiſ omnibuſ fiat emplaſtrum. Cetatum quod accipit: Carniſ palmulariſ, drachmaſ tres. Atyrthe in vino veteri adſtringente macerata, ſtyraciſ, maſſicheſ, ſingulorum drachmaſ duaſ. Florum meliloti, abſinthii, chamameli, ſingulorum drachmam vnam & dimidiã. Croci, drachmam dimidiã. Oleorum cotoneorum, maſſichini, roſacei ſingulorum vnciam vnam. Cum cera & reſina quod ſatiſ eſt, ſingatur ceratum iocinori imponendum. In eundem ruſum epithemata quoque ex decocto roſarum, plantaginii, abſinthii, chamameli, aut earundem liquoribuſ ſtillatiſ compoſi poſſunt. In quibuſ ſane omnibuſ conſtruendiſ vniçe ſtudentum, vt adſtringentia vbi vehemens adhuc eſt phlegmone relaxantiſ & emollientibuſ præualeant, contra veto vbi caloriſ vehementia remiſſior fuerit,
- F** emollientia adſtringentibuſ. Cauendum præterea, ne prædicta actu frigida admoueantur, ſed priuſ modice calefacta. Porro in iocinotiſ phlegmone, vbi magni & vehementer circumſtant doloreſ, etiam medicamenta dolore leuantia in potu ſunt exhibenda ita tamen, vt æſtidiuſ eorum uſuſ deuideatur. Simplicibuſ autem potionibuſ frequentiuſ vtendum. Senecioniſ itaq; decoctum, tãquam maxime com-

Simarum
partium ioc
cinotiſ in
flammatio
niſ ſigna.
Gibbarum.
Muſculoruſ
abdominiſ

Curtiſ.

Vena ſe
ctio.

Clyſter

Fomentuſ

Catapla
ſmata.
Emplaſtriſ.

Cetatum.

Epithemaſ

Nihil actu
frigidum. I
cote iuſſam
marione la
borante ad
hibendũ.

modum, aut luccus glycyrrhizæ cum aqua calida exhibendus. His non minus confert **A**
intyborum succus, adiecto medico melle. Ad hoc enim, quod refrigerat, ac fitmitatem
 vilceri addit, etiam ora venarum iecoris expurgat. Ceterum alius etiam irritan-
 da est vtriusque vel mercurialis coctæ eſſe. In declinatione etiam morbi, alius per cly-
 ſteres inaniri poſtulat. In quem uſum polipodium & epithymum ex muſſa portigun-
 tur: idque poſſimum, ſi in cauo vilceris fuerit phlegmone. Caua enim iocinoris,
 ut antea quoque diſtula eſt, per alium: gibba vero, per vrinæ expurganda ſunt. Porro
 in iocinoris phlegmone exquiſitiſſimo victu, *Gal. lib. 3. The. meth. teſt.* opus eſt. Poſcit
 autem iecur ipſum cibos poſſimum, qui obſtruſta recludere poſſunt. Eiſmodi ve-
 ro omnes ſunt tenui conſiſtentia, & quæ citra roſionem detegunt, qualis eſt *piſana,*
muſſa, & ſimiles. Alimentum igitur optimum eſt ſic laborantibus *cremor piſana,* ut qui **B**
 vim habet detergendi, & obſtruſiones tollendi, in quo apium decoctum ſit. Ius et-
 iam *pulli gallinacei,* in quo petroſelinum decoctum ſit, dari poteſt. Bibenda vero *muſſa,*
 aut *hordei decoctum,* vel *intyborum ſaturum.* Quod ſi phlegmone principium permu-
 tationis ad ſuppurationem iam obtinet, rum omnia prædicta augebuntur, *dolores ni-*
mirum, febres delirium, anxietas, cibi que ſuſſidum. Adiuuare permutationem ac pu-
 ris eruptionem oportet, ut ſcilicet quam celerrime puris generatio fiat, ne mai-
 ora inde corpora contampantur, idque per uſum cataplaſmatis, quod aeci. it: *Radi-*
cis alibæ, vnciam vnam & dimidiam. Seminis ſenegraci, ſini vtriuſque drachmas duas. Fe-
liorum alibæ, malæ, vtriuſque manipules duos. Caricarum numero ſex. Ebulliant in aqua
donec molleſcant, deinde contendantur, & ſingatur cataplaſma. Neque temere fecerit, **C**
 qui emplaſtrum quod puris permutationem iuuare poteſt adhibuerit, quale eſt,
 quod habet, *Farina hordeacea, & ſenegraci, vtriuſque drachmas tres. Radicis alibæ, vnciam*
dimidiam. Radicis liſiorum alborum, drachmam vnam & dimidiam. Seminis lini, drach. vnam
Florum chamæmelis, melileti, vtriuſque manipulum dimidiam. Bulliant omnia in aqua, donec
ad craſſitudinem iuſta coeant. deinde admiſceantur olei chamæmelini, vnc. vna. Olei ſi-
tiacei, vnc. vna & dimidia. Bulliant denovo, & formetur emplaſtrum. Ex iam dictis etiam ſin-
 gi poteſt ceratum, adiectis nimirum butyro, ladano, reſina, & cera. Quum autem
 perfectæ iam ſuppurationi fuerit, dolores remittent, omneſque acceſſiones mitiores ap-
 parebunt, iuxta hoc Hippocraticum: *Dum pur conſicitur, dolores ac febres accidunt magis,*
quam iam conſecto. Rupturæ autem empote dolor ruſum magis augetur: quate etiam **D**
tunc rupturam adiuuare oportet, per ſtercoris caprini & columbini ſeminis vtriuſque, ſimpi a-
liorumque ad ſuperficiem attrahentium uſum: & per potiones calorificas: ut eſt polii, ſumaria, ra-
dicis chamædrys, & ſimilium decoctum. Facta ruptione, aqua meliſſi, aut cicuri decoctum, ali-
 que quibus abſtergendi facultas ineſt, quæ infra in capite De renum exulceratione commemorabi-
 mus, propinanda. Er ſi puris tranſmiſſio per venas ſit, vrinam mouentia admiſcenda
 ſunt: qualia ſunt *ſium, aſerum, caſia, & cinnamomum.* Sin per alium, ea quæ leniter ſubdu-
 cunt ſerum nimirum caprinum, oxypheica, & ſiſtularis caſia exhibenda. Licebit etiam tum
 clyſteribus & decocto hordei conſectis vti. Peracta abſterſione, quæ glutinare poſſunt
 medicamenta propinanda erunt.

De intemperie lienis. C A P. XXVI.

QUEMADMODUM reliquæ corporis partes octo intemperierum generibus af-
 ſiguntur, ita etiam lien. Atqui frequentiffime frigidam & humidam ſuſtinet in-
 temperiem. Singularum vero cauſas non attinet hic reſerre. Eadem enim ſunt quæ
 aliarum partium corporis. Petendæ itaque ſunt ex capitibus 1. 2. & 3. libri Galeni de
 morborum cauſis. Iudicium autem certum & compendioſum intemperie lienis, ea
 quæ eduntur & bibuntur exhibent, quæque forinſecus cuticulæ iuxta ſiniſtrum hy-
 pochondrium admouentur. Si enim frigida intemperies lienem moleſtauerit, omnis
 cibus & potus qui efficaçiter refrigerat, facile & manifeſte ipſum lædet. Omnia quo-
 que frigida extrinſecus adhibita offendunt, atque adeo frigidam eiufdem arguunt
 intemperiem. Eam vero ipſam, contra omnia calida iuuant. Quod ſi calida fuerit
 lienis intemperies, a nullis quæ in cibo aut potu exhibentur, aut etiam extrinſecus ad-
 mouentur frigidis male afficitur. Quod ſi caliditas augeſcat, non ſolum nihil tu-
 mori apponitur, ſed & contractionem amplius ſuſtinet, præterit ſi febris adſit.
 Ceterum & cibi & potus calefacientes, & quæ extrinſecus calorem corpori addunt,
 cali-

Viſcus.

Si phleg-
mone ad
ſuppurationem ten-
dat.Cataplaſ-
ma.

Emplaſtri.

1 Aph. 47.
Ruptura.

Cauſæ.

Signa inſe-
perici nodæ
qualitatis
lienis
Frigida.

Calida.

- A** calidas etiam intemperies augeat & exacerbant. Solatio autem eis sunt omnia refrigerantia. Similiter etiā sicca intemperies in lieni notas colligere oportet, maxime quum pro magnitudine propriæ naturæ non eminet. Ea item quæ extrinsecus corpori adueniunt, atque intra ipsum deorantur, si exsiccandi facultate prædita sunt, lienem exsiccant. Porro ubi humida intemperie lien laborauerit atque ea amplius indualuerit, tum eius incrementum efficit, ut etiam ventriculum & iecur pertingat. Species quoque doloris una cum prædictis signis, infestantem intemperiem demonstrabit. In calida enim & frigida intemperie minus dolet, aut nihil omnino, neque quicquam etiam in humida: minimum vero in sicca. Ex prædictis etiam coniecturam facere licet compositionum in liene intemperierum. Fere enim in totum ubi calida intemperies fuit intensa, sicca eam consequitur, & ad frigidam inueteratam, humida concomitatur. Quandoquidem vero & humores in lienem confluentes tumores producant, eorum quodque diligentem considerationem habere oportet. Biliofo enim fluore existente, vniuersum corpus calidius apparebit, etiamsi non adest febris: oculique & vrinx per bilem coloratur erunt. Siccitate semper accusabit æger, & de siti conqueretur, ac bilis infestante. Cibum fastidit, & vigilis infestatur, frigidamque desiderat, una cum hoc quod linguam sublauiam obtinet. Exacerbationes tertianæ fiunt, suntque ipsi ægri moribus iracundi, & qui precipitanter excandescunt. Si vero atræ bilis sit fluore, eius color tum in lingua, tum in reliquo toto corpore apparebit: & appetentia ad erit ciborum non naturalis, mœstique ac subtristes ægri sunt, reliquaque atræ bilis indicia eis adsunt. Exacerbationes vero quatto quoque die affligunt. Vbi vero pituitosus humor in lienem defertur, consimilis pituitæ aderit color, ægrique minime sitiunt, & cibum appetunt, nisi falsa fuerit pituita: tunc enim cibum fastidiunt ægri, potiusque magis sunt appetentes & sitibundi. Quin & diebus singulis exacerbationes ingruunt. Vrinæ quoque candidæ sunt, ipsique ægri moribus pigri & segnes. Quidam vero ex eis qui frigidam affectionem habent, magnum & durum lienem acquirunt. Quod si sanguineus existat in lienem confluens humor, possibile est ipsum colorem tum iuxta linguam, tum circa cutem permutari. Quod autem ad appetentiam ciborum & fastidium attinet, medio quodammodo habent ægri, reliquique magis languent, quamquam non parem visceris tumorem habent. Venæ vero vniuersi corporis sanguine plenæ apparent, & vrinx sublaue. Hæc indicia prolixius ex Aetio commemorauimus, quod nimirum communia, & omnibus fere reliquarum partium intemperiebus cum affluxu humorum adaptari queant. In vniuersum quidem lienis intemperies nudæ qualitas, fere citra tumorem fiunt. Eas autem tum per cibos & potus, tum per simplicissima medicamenta, ac fomentorum irrigationes, olea & vnguenta, & id genus alia, quæ intemperiei contraria sunt, corrigere oportet. Calidam itaque intemperiem lienis eutabis, perinde atque iocinoris, per cibos nimirum ac potus refrigerantes, inunctiones ex rosaceo & melino, atque alia quæ cap. 23. huius libri comprehensa sunt. Frigidam similiter, ut iocinoris, per ea quæ moderate calefacere possunt emendabis. In humida lienis intemperie, præter ea quæ cap. paulo ante citato commemorata sunt, proderit *quinquefolij radix, & plantago sicca, fluma & florsalsu, ammoniacum, succus salicis, & similia*, si ex his, affuso sufficienti aceto, vnguentum aut ceratum conficiatur, qualia paulo post describemus. Conuenientissimæ etiam huic sunt frictions, quæ discutendi facultatem obnunt. Siccam lienis intemperiem balneum dulcium & calidarum aquarum curat: item inunctio ex oleo dulci. Cibi citra refrigerationem humectantes, velut est pitulæ succus. Porro si lien intemperie cum fluore substantiæ afficitur, tunc ubi sanguinea fuerit, ex vena cubiti interna liquisti brachii, lienarem vocat, sanguis mirandus erit. Aut si ea inueniri haud potest, ex ea quæ inter annularem & auricularem appellatos digitos sita est. Deinde intrinsecus & extrinsecus adhibenda, quæ lieni robur adicere possunt medicamenta: ut sunt *cortex radicis capparidis, scolopendrium, sine ceterachium vocatum, hamionitis, adiantum, stru, calamimiba, & si similia, quæ iecoris quoque robur & firmitatem conferuare valent. De quibus infrequentibus capitibus fusius dicemus*. Si reliqui humores ad lienem confluxerint, primum redundans humor purganti medicamento vacuandus erit: dein reliquo tempore quæ intemperiem reliquam corrigere, & lienem etiam corroborare possunt ad-mouenda.

Sicca.

Humida.

Nec intemperies cum fluore sublauiam biliosa.

Atræ bilis.

Pituitosa.

Sanguinea.

Curatio intemperies lienis nudæ qualitas.

Calida.

Frigida. Humida.

Sicca.

Curatio intemperies cum fluore sublauiam.

De lieni phlegmone. CAP. XXVII.

Causa.

Indicia.

Vidua.

Curatio.
Vena scilicet
Clyster.
Quicquid
adde lieni.

Fomenta.

Nihil adu
frigidum
lieni im-
ponendum.Lienis me-
dicamenta
valentiora
sunt.

Lien, ut reliqua viscera, phlegmone corripitur, quoties sanguis crassior, & calidus præter naturam ad eum confluit. Cognoscitur gravitate, & tumore sinistri hypochondrii, qui ad tactum non cedit: dolore, & distensione loci, febre, & fervore. Irruentis vero humoris copia, ex magnitudine & velocitate generationis ipsius phlegmonis deprehenditur. Victus ratio eorum qui phlegmone lienis laborant, simplex sit, atque ea quæ facile concoquantur in cibo exhibeantur: velut est pisanæ succus, panis madefactus, & alia, quæ supra in aliorum viscerum phlegmonibus sæpe a nobis dicta sunt: Quod si phlegmone diutius duret, a vascularum etiam carnes eis concedendæ, & pisces salsos aquis degentes. Potus ægri sit cinnamomi decoctum, aut vinum tenue aquosum. Cura-
tio ipsa a venæ lienaris, aut eius quæ inter minorem & annularem digitum est, incisione aufpicetur, modo nihil sit quod eam fieri vetet. Venter per clysterem assidue eluatur, potissimum si venæ secundæ medela relinquatur. Deinde imponantur lienis medicamenta adstringentia, quæ id quod insuit reprimere, & lienis firmitatem conservare possunt. Neque tamen sola adstringentia sunt adhibenda, sed illis admisceantur quæ citra evidentem calorem extenuant, incidunt, & relaxant: ne scilicet crassus in eo succus obturatus vehementius in crassescat, quemadmodum Galenus lib. 13. The. method. diligenter acervite monuit. Quapropter si moderata fuerit phlegmone, vinum vetus ac austerum tenuiumque partium oleo dulci permixtum, & lana succida exceptum imponemus. Si vero maior sit caliditas, rosaceum sit oleum, aut melinum, & chamæmelinum cum aceto. Miscebis autem illa inter se hunc ad modum. Olei rosæ, cotoneorum, sing. vnc. duas. Olei chamæmelini, vnc. vnam. Aceti optimi, vnc. dimidiam. Commisceantur omnia pro fomento, ac irrigatione. Quod si iam dicta olea non adsint, folia rubi, aut mala cotonea in oleo decoquantur, & quædam etiam tenuium partium addantur, ut est absinthium & pulegium. Cavendum etiam, ne aliquid actu frigidum lienis imponamus, sed quicquid est eorum medicamentorum quæ extrinsecus admoventur, tepido calore præditum sit. Post fomenta & irrigationes ad cataplasmata transeundum: in quorum compositionem bordeacea & liliacea farina, cum carui, lini semine, oleo in quo absinthium ac pulegium sint decocta, assumentur. Cetetum cavendum, ne post irrigationes & cataplasmata locus denodetur: sed ubi hæc fuerint oblata, mox setata aut emplastra eiusmodi, qualia in capite De icterii phlegmone descripsimus, imponenda. Siquidem simili genere medicamenta ambo viscera postulant: tanto autem valentiora lienis sunt, quanto crassiore vitur alimento. Quare ex capite De icterii vitio, medicamentorum formulas huic loco convenientes, petes: hoc tantum oblatum, ut siis semper acetum, & quippiã quod lienis gratum sit, eiusque robur peculiariter tueri possit, admisceas. Quod si in supurationem ipsa lienis phlegmone tendat, quod tamen raro contingit, adjuvare eam oportet, ne plura corpora putrescant, per cataplasmata, quæ pus producant, de quibus in icterionis phlegmone diximus.

De lienis scirrho. CAP. XXVIII.

Causa.

Signa.

Vidua.

Curatio.

Medicamē-
ta.

Phlegmone lienis minus recte curata, lien tumorem durum, quem Græci scirrhus vocant, contrahit. Cuius mali causa est humor quidã, qui veluti limus est, & lienis pertinacius adhæret. Est vero, quando citra phlegmonem oboritur durities, puta in tumore nimio. Tactu facile vitium, ex quacunque fuerit occasione, deprehenditur. Viduus ratio debet esse extenuans, quare in cibo sumenda ea, quæ concoctu facilia sunt, & succum bonum ac tenue generent. Fugienda omnia, quæ duræ carnis sunt, & crassos generant succos, quæque concoctioni reniruntur. Bibendum vinum substantia tenue, colore fulvum, ætate non admodum vetus, omnique adstrictione vacans. Plurimum etiam fiduciam in exercitationibus ponendum, quibus ante cibum uti convenit, corpore superuacuis non abundante. Manifestum autem est, quod vociferationes quoque oportune & in tempore factæ, in hoc malo summe opitulentur. Quod ad medicamentorum rationem attinet, certe valentioribus admodum, non solum extrinsecus, verum etiam intrinsecus utendum erit. Intra corpus itaque validissima potiones, nam eas si ne molestia tolerant, exhibendæ. quarum numero primas sibi partes vendicantes ceteræ radicum capparidis, cetrachium sive asplenos, hamimelitii, tamaricis radix & germina, in aceto

v. l.

- A** vel oxymelise cocta. Item ceni turij minoris succum epotus, & lupinorum amarorum decoctum, cum ruta & pipere assumptum. Anagallidis semina scrupulum cum posca, aut oxymelise potus, misce confers. Conuenientissimum etiam lieni indurato remedium exsistit ferrum aqua, aut vino, aut posca sapine subinde exstinctum. Ea ipsa enim aqua, aut vinum, aut posca in principio exhibitae, iucunda & vtilissima existit, & per plures ex ordine dies datur. Itaque febrilentibus aquam, aut poscam praebeo: eis vero qui teneram carnem habent, ac febrem carent, vinum. Sit autem ferrum quod in ipsis exstinguitur, *stomoma*. Est autem ferrum *stomoma*, quod in usum aliquem formatum est, hoc est instrumenti alicuius formam redactum, ac chalybe toboratum: a verbo *stoma*, quod *robore*, ac quasi os & *aciem gladij firmo*, significat. *Stomoma ferreum.*
- Ipsius quoque stomomatis ferri squama, agrestioribus hominibus vtiliter exhibetur.
- B** Praclare enim haec lienem liquefacit, ut quae consumendi facultatem habeat. Tamen ne inde ventriculus male afficiatur, aliquid ei ammiscere conuenit roborantium medicamentorum: ut est *scelopendrium*, *abiny coma*, *casta*, *anisum*, *serpillum montanum*, aut *id genus alia*. Extinctus fomentum hoc admoventur, quod habet: *Centaury minoris*, *aspleni*, *Fomenest. ceterachium vocant*, *hamionitidis*, *ruta*, singulorum manipulum unum. Radici corticis capparum, *vinc. vnam*. Decoquantur omnia in aceto, & simulatque cocta fuerint, spongia in decocto irrigata lieni calida imponatur. Præterea mirum effectum ostendit hoc etiam *vinguentum*, quod habet: *Alcorum & capparibus*, *lilacei*, *irini*, singulorum *vinc. vnam*. *Medulla osium crurii bubulini*, *drach. duas*. *Lenis cremoris radici albae*, *sanograci*, *seminis lini*, singulorum *drach. vnam*. *Pinguetinis taci*, *gallinae*, *ea*, *anserina*, singulorum *drach. duas*. *Corticum radici capparum*, *tamaricis*, *casti*, *centaury minoris*, singulorum *drach. vnam*. *Ammoniaci*, *bedelij*, *galbani*, singula *drach. dimidiam*. Gummi prius in aceto dissolutis, cum cera quod satis est, formetur *vinguentum*. Plurimum quoque conferre solent emplastra & cerata, ad eum composita modum: *Accipe alcorum lilacei*, *irini*, *de capparibus*, singulorum *vinc. vnam*. *Farina berdeacea*, *sanograci*, *seminis lini*, singul. *drach. vnam*. *Corticum radicum capparum*, *hamionitidis*, *utriusque* *drach. vnam & dimidiam*. *Radici albae*, *drach. vnam*. *Bedelij*, *ammoniaci*, *galbani*, singulorum *drach. vnam & dim. diam*. *Opopanacis*, *myrrha*, *thuris*, *utriusque* *drach. dimidiam*. Cum resina verobenehina & cera quod satis est, infermerur *ceratum*. Porro oportet medicum diligenter ad affectum respicere, & pro eius ratione tum addere, tum adimere ea quae aut emolliunt, aut attenuant, & discutiunt, aut quae robur addunt. Profunt denique non parum cucurbitulae cum scarificatione affixae.

De lienis obstructione. CA P. XXIX.

- A**ccidit interdum, ut non solum propter attracticis quae est in liene facultatis imbecillitatem, verum etiam meatus, per quem attax bilis feculentus humor ex iocino re in lienem deriuatur, obstructionem, impurus ac vitiosus sanguis deinde in vniuersum distribuatur corpus. Quod si contigerit, tunc color corporis vitiatas ad nigredinem vergit: nonnunquam etiam immedicabilia ulcera hoc modo affecti obinent. Causae ex his quae in cap. De iocinoris obstructione diximus, facile sciri possunt. Malum vero cognoscitur ex grauitate quae est circa finistrum hypochondrium, viato præterea rotius corporis, præteriti invero faciei, colote: spiritus difficultate, turbulentis somniis, & aliis quae ex his quae supra dicta sunt, sua sponte innotescunt. Curatur is affectus, victus ratione extenuatoria, & medicamentis obstructionem tollentibus, quorum magnam copiam studiosi in capite De iocinoris obstructione inuenient. Vtraque enim viscera similibus genere medicamentis indigent. Lien tamen tanto fortioribus eget, quanto crassiore vitur alimento. Quapropter quatenus ad humorum crassiorum ut vacuationi promptius obediunt præparationem attinet, istidem certe medicamentis opus erit: hoc dumtaxat obleruato, ut hic sint omnia validiora, & sibi commixta habeant quae robur visceri addere possunt. Preparati humores deinde vacuandi sunt per ea medicamenta, quae crassos & feculentos humores purgant, quorum iam crebro facta est mentio. Polthæc & intrinsecus & extrinsecus ea sunt adinouenda medicamenta, quae cap. precedente, & cap. De iocinoris obstructione comprehensa sunt. Quapropter hæc loca abunde satis medicamentorum vobis suppeditabunt.

Dieters. CA P. XXX.

Icterus.
Causa.

Icterus nihil aliud est Græcis, nisi *bilis, modo flava, modo atra, per vniuersum corpus effusio*. A
 Celsus *auriginem* appellat hoc vitium, alii *argutum, & regium*. Harum vero appella-
 tionum omnium causas diximus *libro Inſtit. tertio ſect. 1. cap. 30*. Fit interdum iocinore
 nihil patiente bilis effuſio ad cutem, in indicationibus morborum. Nonnunquam vbi
 citra febrem ſanguis ab extranea aliqua occaſione corrumpitur, ac bilioſus efficitur,
 ſicut a venenatarum beſthiarum morſibus contingere conſuevit. Ita quidam quum mor-
 ſus a vipera eſſet, vniuerſum corpus porraceo colore maculatum habuit. Quinetiam
 fieri poteſt, vt propter phlegmonem, aut naturalis intemperiei iocinoris permutatio-
 nem, eiufmodi humorum corruptio accidat, vt aliquando herbis pallore albicantibus
 totum corpus manifeſte aſſimiletur, aliquando etiam plumbi colorem induat. Quem-
 admodum etiam eiufmodi colores nigriores ſiunt, ſi ob lienem male aſſuſum accidat. B
 Fit etiam nonnunquam propter imbecillitatem veſicæ bilis ſuſceptricis, quæ bili-
 ſum humorem, veluti conſuevit, in ſeſe ex iocinore non attrahit, atque adeo impurum
 ſanguinem relinquit. Flava igitur bilis, vbi non omnino, vel non rite ſegregatur, & ex-
 purgatur, per totum corpus cum ſanguine diſſuſa, huius vitii cauſa eſt. Aliquando etiam
 propter obſtructionem & debilitatem vaſorum, quorum ora ex ipſa ad ſecur detra-
 hantur, humorem biliſum non attrahit. Nonnunquam etiam propter meatus, qui ad
 inteſtina vadit, obſtructionem. Ceterum vt icteri cauſas probe diſcernamus, excre-
 mentorum figura & color neceſſario conſideranda erunt, quam in aliquibus multum
 colorata pti flauam bilem appareant, perinde atque in aliis etiam vrina. In quibus igitur
 ratione indicationis bonæ in febribus biliſus humor ad cutem prorumpit, iis & ex-
 crementa & vrinx naturali modo ſe habere videbuntur. Si autem cum febris & biliſus
 delectionibus inuadat, & in dextro hypochondrio grauitas adſit, feruens icterici
 phlegmone ſignificatur, cuius vi ſanguis in bilem mutatus, per vniuerſum corpus de-
 fertur. Sin feruor citra grauitatem in ipſo ſubſiſtet, ex ſola calida icterici intemperie vi-
 rium oritur. Quibus vero citra febrem vna cum grauitatis alicuius ſenſu circa dextrum
 hypochondrium alba excrementa deſciunt, in iis veſicæ bilis ſuſceptricis meatus
 obſtructionem eſſe factam putandum eſt. Si vero citra grauitatem talia deſciantur, vires
 horum eſſe infirmas exiſtimandum eſt: vel attrahitricis, quæ humorem biliſum
 ex iocinore elicit: aut expulſtriciſ, quæ ad inteſtina eundem propellit. Statim etiam iſ
 vrinx biliſiſſimæ aſſectum excernuntur. Porro quibus atræ bilis humor vna cum ſan-
 guine ad cutem delatus eſt, hi omnino grauius patiuntur. Conſequitur enim ipſos tri-
 ſtitia præter rationem, & mordacitas eorum quæ circa ventrem ſunt, difficultasque
 ſpirandi, & cibos auerſantur, & nigras vrinas excernunt. Stercora vero chalcanthi co-
 lorem referunt, & alius iis magis reſiccatur. Ceterum eos, qui ex flaua bile icterum
 contrahunt, nulla mordacitas eorum, quæ circa ventrem ſunt, conſequitur: neque etiã
 tantopere auerſantur cibos. Stercora candida egeruntur, vrinx autem crocei coloris,
 turbata tamen permanent. Communiter tamen omnibus icteris pigrities ad motum
 accidit, & ad dulces cibos animum habent alienatum. Pruritus etiam vniuerſi corporis
 comitatur. Candida oculorum, & partes faciei temporibus propinquæ, itemque malæ
 pallorem oſtendunt. Venæ etiam ſub lingua repletæ repenuntur, & abundatæm humo-
 rem ſignificant. Ictero itaque ratione bonæ indicationis, febribus perfectæ ſolutis cor-
 reſcepti, facillime curantur, ſi lauacris aquarum dulcium vtantur, ac olei diſcuſſorii per-
 frictione, ac omnibus, quæ cutem rarefaciunt, qualia ſunt oleum chamæmelinum, a-
 nethinum, innum, aut ſimilia. Roſmarinus etiam herba oleo incocta, plurimum diſ-
 cutit. Viſus ratio vniuerſa in iſ vitio humida, & humorum craſſitatem moderate ex-
 tenuans, oportet. Qui ex virulentorum animalium morſibus, & letbalis veneni potione,
 ictero corripuntur, curandi ſere ſunt alexipharmacis, ſicut ii, qui a rabido cane morſi
 ſunt, de quibus ſuo loco abunde ſatus diximus. Hiſ qui ob calidam iocinoris intemperie,
 aut phlegmonem eiufdem aſſecti ſiunt, curationem, quæ ſupra *De icterici phlegmone* di-
 cta eſt, adhibere oportet. Quæ propter quæ illic commemorauimus, huc transferenda
 erunt. At ſi propter obſtructionem veſicæ fellis ſuſceptricis fiat icterus, tunc duo ma-
 xima remedia principatum obtinent, venæ ſectio, & purgatio. In quibus igitur mul-
 titudo ſanguinis vna cum bile in vniuerſo corpore abundat, & quos circa ſecur aut
 lienem grauitas aut diſtentiõ inſeſtat, nihil venæ ſectione vilius fieri poteſt, modo

Signa.

Icterus ater.

Curatio
icteri indi-
cationis
ratione
accidentis.Ex morſu
virulentorum.
Ob iocem-
periem &
phlegmonem
iocinoris.
Ab obſtru-
ctione.

- A** non sit quod hanc fieri impediatur. Secunda vero vena est in dextro gibbero, interna, idque iecore male habente: liene autem laborante, in sinistro, sanguisque particulatim & per vices detrahendus, ne per coaceruatam vacationem vires ægri prosterantur. Quod si a venæ sectione excludi mur, commodissime clyster adhibet. Comode autem & a venæ sectione clyster indicitur, utpote qui propter stercoreorum vacationem spirandi facilitatem efficit, intestinaque irritando, ac mordendo humores ad cutis superficiem delatos, ad ipsa retrahit ac reuellit. Sit vero ad eum compositus modum. Accipe *intybi* *virgij*, *marrubij*, *eupatorij*, *adianti*, *origani*, *absinthij*, singulorum manipulum unum. Seminum *anisi*, *feniculi*, *petroselinij*, *asparagi*, singul. drach. duas & dimidiam. Radicum *glycyrrhizæ*, *apij*, *feniculi*, singulorum vnc. unam. Bulliant in aqua sufficienti ad tertias, & colo transfundantur, accipianturque iuri decocti, vnc. tredecim. *Cassia fistularia*, vnc. vna. *Hierapicra*, vnc. dimidia. Antidotus de succo rosarum, drach. dua. Oleorum *anethini*, *irini*, *virgij*que vnc. vna & dimidia. Salu drach. vnc. Commistis omnibus fiat clyster. Verum purgationes huic vitio magis propriæ & familiares sunt, sic tamen ut edulis & potionibus itemque medicamentis humores prius attenuentur. Obisigitur vrendum concoctum facilibus & extenuantibus, volueribus montanis, piscibus saxatilibus, oleribusque vrinam cientibus, præsertim *intybi*, *asparagi*, *smyrniæ*, *feniculi*, & similibus. Carnes ferinæ mansuetis magis sunt aptæ, potissimum capreæ. Pro intestinæ seu embammate valet acetum, in quo aristolochia macerata sit. A fructibus abstinendum. Bellaria tamen sint amygdalæ, sed modice sumantur, & ciccer modice torrefactum. Eius etiam decoctum allidue potatum, non parum confert. Vinum conuenit album & tenue, non valde vetustum. Quod ad medicamenta ipsa attinet, sumenda ea quæ in capite De obstructione iecinoriæ, & libro primo capite duodecimo dicta sunt. Præ aliis autem maxime confert *apij*, *petroselinij*, *adianti*, *calamintibz*, *verbenacæ*, *rellæ*, *rubia radici*, *aristolochia*, *serpylli*, *hypericique* decoctum. Extenuatis & præparatis tandem humoribus, medicamentum quod flauam bilem purgat exhibendum. Sunt autem ictero laborantibus purgationes dandæ fortiores: ob ventriculi enim siccitatem imbecilliores, minusque efficaces in ipsis cognoscuntur. Quæ vero præ aliis conferunt, est dilutum rhabarbari lib. i. cap. 12. descriptum, ac hierapicra, antidotus de succo rosaceo, de psilio, & diaphoricon. Quod si primo medicamento purgante nihil proficias, rursus ad ea quibus tollendi obstructions facultas inest reuertendum, & post triduum rursus violentius purgandum. Si liene laborante vitium oriatur, ad caput De melancholia, & lienis obstructione recurrendum. Purgatione facta per aluum, deinceps ea quæ viscera expurgant exhibenda sunt medicamenta. In quem usum vnice confert radix cyclaminis trita & pota. Hæc enim non solum viscera repurgat, verum etiam ad bilem in vniuersa cute excludendam per sudorem aptissima est. Quare post eius potionem, sudorem exclusionem, per velamenta ac concalescentiam in lecto iuuare oportet. Dantur autem ex ea *drachma dua*, aut tres, ex aqua mulsa. Præclare quoque facit *artici raphani succus*, vino meraco dulci permixtus, aut vino mulso, sic ut succi vncia dua. *Pini*, vnc. vna contemperetur. Vermes etiam tetreni exsiccati ex vino multo per triduum dati, icterum per lotum euacuant. Datur item valde commode *ichorii* & *intybi succus*, febrientibus quidem per se, febree carentibus cum vino. Cassiuthæ quoque succus mirifice prodest. Commodissimum etiam est *chamelam*, quæ & *leucanthemum* appellatur, itemque *euphthalmum*. Ceterum medicamenta quæ in potu accipiuntur omnia, si fieri potest in balneo exhibeantur, ubi nimirum ægri in calidum solum in quo decoctæ sint herbæ *chamelam*, *feniculi*, *petroselinum vulgare* sine *apium*, & id genus aliz conscenderint. Plurimum quoque viuaturationi virium refocillatrici hoc tempore in tenrum esse oportet, per quam facultas excretrix reparetur, et si quæ pars laxa sit corroboretur, atque præiens coloris corruptio repurgetur. Quapropter conueniunt exercitia, gestationes, inunctiones ac exsudationes. In hunc vltimum *pyrit ateria*, seu *vapor ateria sicca* conferunt, in quibus oleum in quo *serpyllum* aut *rosmarinus* herba decocta sit, corpori illinendum. Quod si vero quippiæ ex ictero circa faciem & oculos relinquunt vrinæ autem apparent puræ, aliusque consueto more egerit, narium infusus vrendum. In quem usum cyclamini succus, item nigella cum aceto, anagallidis & beræ radici succus infunditur. Acetum etiam acerrimum naribus attrahat æger in folio desidens, contineatque pressis naribus paulisper, & rursus vacuabitur.

Venæ sectio

Clyster

Vicia

Purgatio

Que viscera expurgant

Succus artici raphani capite

Solum calidum

Viciares eos facies & oculos ut sanabuntur

138 Operum Leonhard. Fuchſii Pars III.

De malo corporis habitu. C A P. XXXI.

Ανδρ. & Γυν. Canis.

Sign.

Vitium.

Curatio.

KΑνδρ. Græcis nihil aliud est, nisi malus corporis habitus. Eiusmodi vero est, qui in aquo-
sitate diffunditur, & in quo vniuersa corporis miscella laxior fit ac mollescit. Hoc
malum vt plurimum ex longo morbo congregatur: iam vero & ex viscere quopiam in
scirrhum indurato consequitur, potissimum iecore & liene. Neque raro in dysenteria
diuturna, & affectionibus cœliacis contingit, ob consuetam item aliquam cohibitionem
excretionem. Corpus ipsum totum cum virore albicans redditur, ac inualidum, ita vt
crura inter eundem vacillent. & in principio quidem concoctiones impediuntur, ma-
nente etiam dum appetitu: postea vero & fastidium accedit, & respiratio ipsis fit rara ac
debilis, quæ motibus & actionibus condensatur. Alius etiam in æqualia recrimenta ex-
cernit. Capiuntur hoc malo maxime senes, & pueri, qui facile pereunt propter vitalis
facultatis imbecillitatem, & quod ob cutis raritatem succi in eis prompte transpirent.
At vero qui in vigore sunt, raro incidunt, & facile se inde extricant. Vitium hoc si diu-
tius durat, in aquam inter cutem transit, ideoque eius curatio non erit differenda. Vi-
ctus in vniuersum fit tenuis, & siccus. Cibi itaque eorum sint simplices, & qui facile co-
coqui possint, ac optimum procreare sanguinem. Vitent bellaria omnia, item nidoro-
sa, humores crassos & viscosos generantia, & quæ difficulter concoquuntur. Vinum
conueniens album, tenue, odorum. Quod vero ad curationem attinet, si quidem ex
consuetæ excretionis cohibitione vitium accidat, irritare ac prouocare eam ipsam ex-
cretionem oportet. Quapropter sanguinis detractione, si nihil sit quod eam impedi-
at, quæ paulatim & partitis vicibus sit, ad tertium vsque aut quartum diem vtendum, in his
qui ob hæmorrhoidum, aut mensium retentionem vitium inciderunt. In his autem qui
copia vitiosorum humorum laborant, sanguinis missio noxia est, quare conuenienti
potius aliquo medicamento purgante ex *Hiera*, *Rhabarbora*, *velagarico* vacuandi sunt.
Corpori vacuato, aquarum sponse nataram visus sit, maxime aluminosarum & nitrosarum,
mox sulphurearum. Hæ namque aquæ robori & viribus reparandis conducunt.
Varie quoque exercitentur deambulationibus, gestationibus, vociferationibus, fric-
tionibus, per lintheola, & alia moderata exercitia. Deinde inunctione ex oleo absin-
thii maxime vtantur, cui quædam quæ humores resiccant, vt sunt nitrum & sales, sint
infarta. Ad lassitudinis autem curationem, balneum per intervalla quædam adhibea-
tur. Mirifice quoque ipsos iuuat absinthii potio, & adhiberi dropaces. Quod si iecur
male afficiatur, aut aliquod aliud ex visceribus, mederi his ipsis per remedia ad singula
ipsorum supra præscripta conuenit. Iecori autem in primis succurrendum erit, ipsum-
que roborare oportet, quam sanguinis generandi sit organum. Si malum in hypopona
deciderit, aquæ inter cutem curationi subiicietur, quemadmodum exponemus.

De aqua inter cutem. C A P. XXXII.

Aqua inter
cutis species
duæ sunt.

tympa-
nicar.
ἀνασφορα.

Canis.

Hydrops, seu aqua inter cutem tres sunt species: vna enim Græcis ἀνδρο, alia τυ-
πανική, & tertia ἀνασφορα, ὑπὸ τῆς cutis, & ἀνασφορα ὑπὸ τῆς cutis dicitur. Ascites fit, quæ in-
ter membranam peritonæam appellatam, & intestina, plurimus aquosus humor coarctatur. Sic
autem Græcis dicta est, quod ἀνδρο, hoc est vari modo membrana ipsa repleta esse aqua viden-
tur. Tympanites accidit, vbi flatus ac spiritus superuacui plurimus in prædictis ventris
locis colligitur. *Anasfores* contingit, quando per vniuersam corporis molem humor
disseminatur, vt instat spongiarum aut papyri vniuersa caro per humida & madefacta
protus appareat. Fit hydrops ob insignem iecoris frigiditatem, aut propter alias par-
tes impenitus refrigeratas, quæ iecur in eundem deducere affectum possunt. Coarctatur
vero iecur lienis refrigerato, ventriculoque & intestinis, maxime his quæ sunt iuxta in-
testinum icium, pulmone denique & renibus, ac septo transuerso. Contingit etiam
ex immodica hæmorrhoidum vacuatione, aut effluxu muliebri, aut ob menstruum
retentionem, aut propter alium quandam magnum vteri affectum. In his enim omni-
bus nullum præter naturam tumorem iecur habet, & tamen aqua inter cutem corpus
corripitur, ex sola refrigeratione iecoris in principio affecto, post vero aliquando & du-
rum fit. Quod palam in illis videre est, qui ex intempestiua frigida aquæ potione iecur
aceruacim refrigeratum obtinent, vt statim hydrops consequatur, prorsquam ipsum in
scirrhum tumorem eleuetur. Multi autem & a podagra, & coxædico dolore vexati,
aquana

- A** aquam inter cutem inciderunt. Frequentissime autem eos qui cibum non sentiunt, & malo corporis habitu præditi sunt, iteinque ictero infestatos, hydrops consequitur. Cæliacam item affectionem, & dysenteriam. Communiter oronis hydrops spirandi signa difficultatem, & tumorem, & grauitatem, & viciatum colorem inducit, ex virore nimium albianctibus ægris. Fastidiant etiam cibum, potum autem largiorem appetunt, maxime qui ex ascite laborant. Etenim humor qui in locis prædictis detinetur, falsus est, & putrefactus: quare febris etiam sequi vi plurimum solet. Aqua inter cutem minus foemine, quam viri tentantur. Pueri vero magna ex parte hydropæ anasarca corripiuntur.
- B** minus ea scites, anasarca. Viçtus autem omnium hydropicorum communis est, vt ci-
bus sit concoctus facilis, & sufficienter coactus, atque aridus. Exsolutus enim & humi-
dus, aptus est vt in aequifacitatem commutetur. Panis itaque optimus splanianus, qui salé,
ammi, feniculum, anisum, aut cuminum habeat admixtum. Debet etiam probe
fermentatus esse, sic enim minus adstringit, aut obstruit. Ex auiibus conueniunt sic-
ciores, velut *phasiani, perdices, turtures, turdi, merula, & similes*. Ex terrestribus, *caprea, le-
pus*. E manuæti & cicuribus, *pall. gallinæci affi, extrema suum partes*. Ex aquaticis, *canceri
fluminales*. Quæ etiam affata prolunt. Olerum rarus sit vltus. Quæ veto eis exhibentur,
acriora sint, & extenuandi calefaciendi que vi prædita: velut *est apium, petroselinum, asa-
nuc, cruce, pulegium, brastica, allia cocta, cepa, porri capitati*. A leguminibus vero abstinendū
in totum. Pro liquamine vtantur aceto cum pipere, cinnamomo, & similibus. Sales
sint *ex fenicula, hyssopo, rosmarino, epioque compositi*. In potu tantum præbendum, quantū
ad frangendam aliquo modo situm sufficit: supra modum enim incommodat hydropi-
cis plurimus potus. Bibendum autem vinum tenue, & quod vrinam ciet. Uulcia vero
vipa, & mulum, vitanda. Acetum vero minime illorum situm restinguit. Porro maxi-
mam quoque ciborum partem in cena accipiant. Plurimos fructus, & secundas men-
tas vitent. Concedendæ tamen *nucis, amygdala, mala punia, palmula, vna passæ, pyra cocta,
& ceræca*. Omnia tamen sumant moderate, nec quotidie. Lectus non valde mollis sit,
præteritum eorum qui anasarca laborant. Substernantur autem herbæ resiccantes, velut
est pulegium, calamintus, origanum, & similia. Mitum est enim, quantum huiusmodi re-
siccant per solum: vt consistit, iam quoddam frumenti aceruis obuolutos & abscon-
ditos, a somno surrexistis firmos. Exercitationes etiam, si æstas & dies siccus fuerit,
in sole fiant, capite tamen velato. Sin frigus sit, in domibus per subiectum ignem con-
calefactis, aut iuxta ignem. Exedit vero in primis equitatio, & huc atque illuc in sella
circumferri. Ceterum pedibus si per vires laborantis heri potest, deambulare multum,
& quandoque currere, quam gestari, satius est. Obuoluendi etiam ægri in pellibus sole
vitis, aut in arenam calidam defodiendi. Post exercitia, sudores per lintea asperiora ex-
tergantur. Optime quoque conducit, si quotidie ter quaterve frictione vtantur. Hæc
enim mearus conuenientes aperit, humores quoque detrahit, extenuat, atque dissicit.
- E** Valde itaque celeriter & sudores elicit plurimos, & carnem cogit. Perficiendū vero sunt
manibus aridis, aut ex sale in aqua aut oleo calefaciente trito. Posthæc cum aqua alumi-
nosa, aut sulphurea, aut salia lauandi. Nonnullis enim qui anasarca correpti fuerunt, &
huiusmodi balneis affueverunt, ea ipsa ad deterendum morbum, tum ad habitum va-
lenriorem reddendum suffecerunt. Atque hætenus victus rationem in speciebuz aque
inter cutem communem commemorasse satis sit. Quantum vero ad curandi rationem
atrinet, omnium hydropicorum commune remedium statim inuio est, humoris re-
dundantis vacuatio. Hæc vero nunc per venæ sectionem, nunc per purgantia, & per ea
quæ vrinam mouent medicamenta perficitur. Quæ autem speciatim huic vel alteri cõ-
uenit speciei, in sequentibus docebimus capitibus, in quibus particulatim singularum
curaciones prosequemur.

F De anasarca. CAP. XXXIII.

In anasarca quidem totius corporis moles, & vniuersa caro, vt dictum est, instar spon-
gæ madida & laxa apparet, atque adeo totum corpus intumescit, ac mortuo simile
enat. In ea curandi ratio a sanguinis detractione aufpicanda, vbi scilicet mali origo
ex iuppessis hæmorrhoidibus, aut mælibus existit, aut ab alia plethorica causa incepta sit.

140 Operum Leonhard. Fuchſii Pars III.

& virtus atq; ætas permiferint. Eius rei teſtis eſt *lib. 4. viſitatio aucto. commun. 104. Galenus*, A
vbi ſic ſcriptum reliquit: *Sola anaſarca interdum ſanguinis detractione indiget, quum ſcilicet ex
retentione hæmorrhoidum, vel muliebrium, vel ex quapiam, qua ita ſit plethora cauſa, inceperit.*
Idem etiam Paulus, qui ad verbum ſua ex Galeno tranſcripſit, *libro tertio cap. 48. tradit.*
Quod commemorandum nobis eſſe duximus, ne quis nos in omnia anaſarca ſanguinẽ
mittendum eſſe præcipere putet. Eleganti autem ſimilitudine, Galenus locum citato
vitur, dicens: *Propter plenitudinem prope accedente calore nativo ad exſtinctionem, ac vi igni
ſentit.* Vt enim appoſitis lignis tum humidis, tum multis prope exſtinguitur, niſi quis
multitudinem ſuſtulerit: ſic & in frigidiore ob copiam ſanguine ubi calor nativus fere
extinguitur, ſanguinis miſſio præſentiſſimum remedium eſt. Hac namque ratione B
plenitudo quæ inleſtat exhauritur, & languentis natura exonerata alacrior fit, & mali
cauſa minuitur, ac deinde minore negotio redir ſanitas. Licet enim ex ſanguine frigi
diori naſcatur, & frigiditatis ratione illa non indigeat, tamen quoniam copia de
tractio naturam leuat, vt hæc minorem illum affectum facile ſuperet rationi conſenta
neum eſt. Prauiſ humoribus per ſanguinis miſſionem detractis ac vacuatis, ad purgan
tium medicaminum prædiã veniendum. Quid ſi tamen extenuatione ac humo
rum ad expulſionem præparatione opus ſit, decocta & alia quæ ſupra in capitibus De
iccorum tum imbecillitate tum obſturbatione dicta ſunt, exhibeantur. In quem ſane uſum etiam
ſerapia ex abſinthio, intybo ſatiuo laſioſo, eupatorio, & calamintha, hyſſopo, &
byzantino propinanda. Purgantia vero medicamenta ſimplicia ſint, rhabarbarum & C
agariacum. Compoſita autem, catapota de rhabarbaro, de hiera ſimplici, de agarico, & ſi
milis. Initio etiam hiera picra conueniet, quod hæc ipſa obſturbationes auferat, ac vi
ſceribus robur addat. Cauendum igitur vnicẽ erit, ne validiora, quæque nullum ro
bur iccori adiciunt, medicamenta purgantia exhibeantur. Quin infeſtans humor
ſenſim & paulatim per leuiora medicamenta educendus. Semel enim & conſpectum
vacuantes, mitiſſe vires deiicimus, iecurque refrigeramus. Singulis igitur ſeptimanis
alvus ſubducenda, ſemperque a mitioribus ad valentiora ſenſim tranſeundum. Con
uenit itaque antidota diaphænicon, & indi in hac hydropis ſpecie. Præclare etiam
purgat, radix ſambuci in vino decocta. Prodeſt itidem & ebulli radix: eadem namque D
vitarumque vis eſt. Porro reliquo curationis tempore, quo putgantibus medicamen
tis abſtinet, exhibenda quæ iccori robur addunt: quorum multa ſupra ubi qua ratione
eiuſdem tum imbecillitas, tum obſturtio curanda eſſent docuimus, dicta ſunt: & quæ
vtrum mouere poſſunt. In quem uſum non abſurdè antidotus diarrhodon abbatũ, aro
maticum roſaccum, dialacha, diacurcuma, poſtilli de eupatorio, rhabarbaro, abſinthio, theriaca,
& ſimilia exhibebuntur. Ceterum vnicẽ prodeſt hoc medicamentum, quod habet: *Spe
cierum diacurcuma, dialacha, vitarumque ſcrupulum vnum. Specierum diatrienſanalen, diar
rhodon abbatũ, vitarumque drachmam dimidiã. Specierum aromatici roſaces, ſcrupulum v
num. Rhabarbari ſelecti, drachmam dimidiã, Seminum intybi ſatiui laſioſi, melonum ſeni
culi, ſingularum ſcrupulos duos. Abſinthij, chamamelis, caſſiũ, ſingularum ſcrupulum vnum.
Nuci moſchata, iunci odorati, ſpica nardi, ſingularum ſcrupulum dimidiũ. Sacchari candidiſſi
mũ, vnciam vnam. Miſceantur ſingula, fiatque triura. Mititice quoque conſect hoc, quod
accipit: Seminum carci, ſeneculi, aniſi, ſingularum ſcrupulos duos. Seminum cumini, & hype
rici, vtriuſque ſcrupulum vnum. Seminum ammeos, petroſilini, danci, ſmyrni, ſingularum dra
chmam dimidiã. Radicum iridiũ & aſuri, vtriuſque drachmam vnam. Abſinthij, ſcrupulum
vnum. Glycyrrhizæ, drachmam vnam. Sacchari aquali omnibus pondus. Commixtu ſingulis ſer
meſur triura. Et ſane danda opera, vt in anaſarca magis ſint ſicca, quam humida medi
camenta, propter totius vdeliet corpotis habitum aquoſiorem. Porro extrinſecus
plane adhibenda ſunt ea medicamenta, quæ humores deſiccare poſſunt, vt ſunt cata
plaſmata, emplaſtra & vnguenta, aliaque quibus deſiccandi facultas ineſt. Conuenit
ita cataplaſma ex bardacea farina, ſabaceaque ſenograce, radice ebulli, bacis lauri, abſinthio, E
& origano in vino decoctis conſectum, & toti ventris capacitati impoſitum. Item ſtercoris bubulũ
canenienter reſiccatum, non inſuper campofa, aut oxymelice impoſuit, inſaricta et ſuperuſa
ſulphuris quarta parte. Cateus quoque recens multum coaguli habens, optime ad omnes
tumentes partes impoſitus facit. Denique ſtercoris columbini & caprini, bupthalmi,
& chamamelis æquales partes tuſæ, in acerrimo aceto & melle coctæ adhibeantur.*

Empla

Purgantia

Purgantia
ſimplicia

Radix ſam
buci.
Robur ad
dicum ieo
ri. Rurum
moſchata.

Tricium

Alia

Barriſſecus
que ad me
nem da me
di camia.
Catapla
ſma

- A** Emplastreis infuper vtendum ex fermento, caricio, nitro, iride, meliloto, salua, pulgrio, cardamomo, sulphure vino, bacis lauri, flaphyde agria, sale ammoniaco, mastiche, thure, abrosiano, aristolechia resanda, simo columbino, cum oxymelise compositis. Verum cerata pingua & resinosa, vt pote quæ insistent, & tumores, eo quod distillationem impediunt, distendant, vniuersa vitanda sunt. Debent tamen crura, manus, alique corporis partes in tumorem sublatæ in sole, aut iuxta ignem, hoc medicamento crebro iniungi, quod habet: *Vnguentum* Vnguentum
Agrippæ, vnc. vnam. Axungie suille, vnciam vnam & dimidiam. Farinarum seminis lini, fenograci, fabarum, hordeacea, sing. drachmas duas. Seminum alibea, nigella, danci, sing. drach. vnam & dimidiam. Sulphurii vini, drachmas tres. Olei armicij, drachmas duas. Radici iridis, drachmas duas & dimidiam. Aluminis scissæ, iuris, vtriusque drachmam vnam & dimidiam. Euphorbij, drach. vnam. Oleorum irini, biliorum alborum, chamamelini, sing. vnciam vnam & dimidiam. Cum cera quod satis est, lingatur vnguentum, quo liquefacto ad prunas, creberrime partes tumidi illinantur. Quæ ad vicius rationem attinent, ea ex præcedenti capite sunt petenda.

De ascite. C. A. P. XXXIV.

- I**N ascite venter totumque abdomen intumescit, eoque concussio talis auditur sonus, Signa
 qualem vter aqua non omnino plenus reddere solet. Reliquæ vero partes corporis, Vicius
 superiores præcipue, minime inflantur. Vicius ratio in hac aq̃ue inter cutem specie fit
C ex montanis auiculis, & aliis concoctu facilibus, & bonum procreantibus succum, Curatio
vt dictum est supra capite trigesimo secundo. Cutandi ratio a purgantium medicamentorum vsu
 auspicabitur. Sint autem talia, qualia capite præcedente commemorauimus. Reliqua
 vero omnia superat brassica marina, quam Soldanam & Soldanellam hodie vocant, in potu Brassica
 assumta. Hæc enim in educenda hydropicorum aqua mirificum ostendit effectum: marina.
 ita vt non pauci solius eius vsu sanitati sint restituti. Dantur ex ea drachmæ duæ, plus aut Soldanella
 minus, pro corporis diuersitate, in vino, aut lactis fero. Conferunt etiam plurimum catapota *de sagapeno, & drachma dua aut tres succi radici iridis, adiectis facchari vncia vna.* Cly-
 steres etiã adhibendi acres, nisi venter sua sponte humescat: tunc enim ex succo ipsius Signa
 magis conuenit. Inter alios autem is potissimum commendatur, qui habet: *Florum daph- Vicius*
 noideis, drach. duas. Raticij polypodij, agarij, vtriusque drach. vnam & dimidiam. Cassiæ, clyster Curatio
D drach. tres. Decoquantur in vino aut aqua, donec tertia pars absumatur. Dein accipe iuris deco-
 cticolati, lib. vnam. Benedictæ laxatiua vocata, vnciam dimidiam. Anidori indi, drach. duas & Brassica
 dimidiam. Mellis rosacei, vnciam vnam. Olei rutacei, chamamelini, irini, sing. vnc. vnam. Sa- marina.
 lis fossili, drach. vnam & dimidiam. Commisceantur omnia, & fiat clyster. In eundem vsum Soldanella
 colocynthidis, carianis, bacis lauri, semen anisi, ammi & carui, ruta, radix cucumeris fylacstri, alijs Signa
 quibusdam adiectis, si videbitur, decoqui possunt. Post prædicta auxilia, vtri vniuerso aliquid Vicius
 ex præscriptis cataplasmatibus, & emplastris imponatur. Adhibeantur etiam inunctiones, Curatio
 vrinam, & iudores mouentia auxilia, atque exercitia, de quibus ante copiose diximus. Ce- Brassica
 terum ventris punctio, & aquæ in ventre retentæ emissio, qua nonnulli videntur, cõfiteri, marina.
 si fiat priusquam iecoris sanguinẽ efficiẽs facultas penitus emortua fuerit. Iecoris enim Soldanella
E munere pereunte, aqua quoties emissã fuerit, denuo generatur.

De tympanite. C. A. P. XXXV.

- I**N hoc vitio ventet inflatur, distenditurque, & concussus tympani sonitum edit: reli- Signa
 quæ vero corporis partes emaciantur. Vicius rationem prioribus speciebus similem Vicius
 requirit, in ea tamen præcipue vitanda sunt omnia flatuosa. Exercitia etiam multa, & Curatio
 sitis ingens ægrotantibus strenue succurrũt, auxilianturque. Curationis initium a pur- Brassica
 gantibus medicamentis, quorum copiam in superioribus inuenient studiosi, esto. marina.
 Ceterum non temere etiam clysteres, quibus flatus discutiendi facultas inest, infun- Soldanella
 duntur, qualis est qui accipit: *Radiciu apij, feniculi, vtriusque vnc. vnam. Seminum anisi, Vicius*
 feniculi, danci, smyrnæ, petroselinij, camini, sing. drach. duas. Carui, drach. tres. Ruta, anisi, fo- Curatio
 liorum cõbi, meliloti, sing. manipul. vnum. Bulliant in aqua ad tertiam, dein accipiantur iuris deco- Brassica
 cti colo transfusi, vnc. duo decim. Hierapicra, benedictæ laxatiua, vtriusque vnc. dimidia. Anido- marina.
 ris de bacis lauri, drach. tres. Oleorum rutacei & anethini, vtriusque vnc. vnam & dimidiam. Salis, Soldanella
 drach. vnam & dimidiam. Commisceantur, fiatq; clyster. Danda quoq; sic affectis sunt q̃ vrinã Signa
 mouent, atque iis quæ flatus discutiunt tam intrinsecus q̃ extrinsecus vtendũ, quorum Vicius

142 Operum Leonhardi Fuchsii Pars III.

Sacculi. copiam in capite De coli doloribus studiosi reperient. Venter certe quotidie *pauca, m-*
lio, sale, sarfuribus, folijs ruta, feminibus apij, feniculi, anisi, cumini, chamameli floribus, cinere
Ceratum. calido fasciis infusus, fouendus. Potest & hoc imponi ceratum, quod habet: *Florum cha-*
mameli, meliloti, sing. drach. unam & dimidiam. Mentasuri, saturcia, aseri, sing. scrup. unum.
Seminum anisi, feniculi, ruta, cumini, danci, sing. drach. unum. Cardamomi, scrup. dimidiam.
Myrrha, castorei, utriusque scrup. unum. Olei rutacei, unc. tres. Olei anethini, unc. unam & di-
midiam. Resina & cere quod satis est, fiat ceratum. Cucurbitulæ præterea leues, cum multa
Cucurbitu- flamma, crebro toti ventri infixæ minime conducunt. Venter denique aspero liuto
la. tantisper dum tubor excitetur, perfricandus. Intrinsecus vtendum antidotis *dianisi, dia-*
Mediali. *cumini, & e lauri bacis: vel ista qua habet, Specierum dianisi, diacumini, utriusque scrup. unum.*
Specierum antidoti de bacis lauri, drach. unum. Specierum diagalanga, drach. dimidiam. Seminũ
anisi, carci, danci, feniculi, sing. scrup. dimidiam. Foliorum ruta, feminum apij, myrsini, sing.
scrup. unum. Sacchari, unc. sex. Dissoluti in stibulari liquoribus feniculi & apij, fermentur mor-
sali. Reliqua remedia ex capite De coli doloribus petenda.

De renibus cruentam urinam excrenentibus. CAP. XXXVI.

Causa. REnum nonnunquam vitium accidit, in quo tenue sanguinis serum mingitur. Fit
veto propter renum imbecillitatem, urinam subinde secernere nequeuntium. Aut
propter dilatationem & amplitudinem osculorum, ex vena caua urinam ad renes ex-
colantium. Quum enim ampliores ac patentiores meatus fuerint, quiddam etiam **C**
sanguine venæ, emittit, aliæque idem crassæ. Sæpe etiam renes iuxta circuitus quosdam
sanguinem excernunt, simili modo vt ex hæmorrhoidibus fieri consuevit. Quidā deni-
que sanguinem ex renibus excernunt, propter venæ rupturam in renibus factam: veluti
contingit iis qui graue onus leuatur, aut valde saltant, aut ex alto ceciderunt, aut aliud
Signa. quippiā tale violentum pertulerunt. Aliquando autem & ob acres & superius defluentes
humores erosio venarum euenire solet. Porro si malum propter renum imbecillitatem
accidit, sanguis qui excernitur, serosus admodum est. Sin propter osculorum ampli-
tudinem, tum nihil dolent. Si certis circuitibus excretio sanguinis fiat, tum vel plenu-
do totius corporis, aut consuetorum exercitiorum neglectus, aut membri cuiusdā refe-
ctio præcessit. Quod si ob venæ rupturam eueniat, tunc sanguis copiosissime excernitur. **D**
Cura. Sin aberosione, tunc sensim & paulatim exernitur, dolorque renes excruciat. Cura
bit itaque eam tuentæ urinae excretionē, quæ propter renum debilitatem, aut ampli-
tudinem osculorum urinas ad renes excolantium accidit, quiete, cibis adstringentibus,
potione vini nigri, & aliis quæ in capite De cruenta spina sunt comprehensa. Ab iis vero po-
tissimum quæ urinam cient, & a coitu omnino abstinendum. In potu autem præter ea
quæ capite iam citato dicta sunt, exhibendum *symphyti maioris radicis decoctum, & traga-*
cantha in vino nigro macerata. Sistit etiam sanguinis ex renibus eruptiones cornu cerniti
drachma vna ex vino. Folium item salicis trita cum vino, byssimachia succus, lapidis hamatidis dra-
chma vna, radicis spina alba, & polygoni decoctum. Bilius denique armenius, drachma ponder-
sumptus. Scapium rosaceum, myrsinum, pastillo de succino, de terra lemnia, & de spodio nominati. **E**
Localis. *Ovillum præterea las vnice commendatur, si ieiunio vincta quatuor, quibus drachma vna boli arme-*
nij commixta sit, propinetur. Extrinsecus autem in renibus & lumbis imponantur ea quæ ad
sanguinis per spatum reiectiones, & in capite De dysenteria, aliisque sanguinis eruptio-
nibus descripta sunt, & quæcunque vna cum eo quod adstringunt & siccant, robur et-
iam addere possunt: qual a sunt *rubi solia, & quercus glandes, myrti bacca, malicorium, ba-*
laustia, & similia. Post hæc habitus corporis cibis boni succi, lacte, & auicularum carni-
bus, suillis quoque, ac macris, reficiendus est, vt vniuersum corpus ad pristinas vires re-
ducatur, & renes corroborari proprium munus obeant, & serosum humorem a sangui-
ne fecerant atque excolent. Ceterum si renes secundum circuitum sanguinem excer-
nunt, aut propter venæ rupturam, aut erosione acrimie & supernis defluentium hu-
F motum, tunc statim vena quæ in cubito est eiusdem lateris secanda erit. His quidem
qui per circuitus sanguinem excernunt, paulo ante circuitum, reliquis vero statim a
principio. Sanguinis tamen detractionem pariri melius erit, vt paulatim eius reuulsio
& auersio fiat. Loci autem circa renes spongiis postea imbutis cooperiantur, aut lanis
succidiis cum rosaceo & aceto. Post hæc vnguenta, emplastra, & cerata locis paulo ante
CITATIS

Cura. Sin cruentam
per circuitum
excrenentis,
aut propter
venæ ruptu-
ram, aut e-
rosionem.

A cū ita descripta, imponantur. Commode quoque cucurbita adhibetur, præsertim si suspicio sit phlegmonem adesse in iis, qui ob venæ rupturam sanguinē mingunt. Conueniunt etiam potiones supra in capite *De spūto cruento* commemoratæ. Ager interea etiam a salis, & acris omnibus arcendus. Vbi vero iam sanguinis excretio cessauerit, victus ratione vtendum est, vnde non multus sanguis gignatur, maxime in iis qui per circuitum excreuerunt. Supernæ quoque corporis partes assidue exercendæ. In iis vero qui ob venam ruptam sanguinem mingunt, si exulceratio in locis relinquatur ipsam post sanguinis suppressionem curabimus per ea quæ in capite *De renum exulceratione* dicentur.

De renum phlegmont. C A P. XXXVII.

- R**enes plurimis de causis phlegmone corripiuntur. Nam vt humores corrupti, & *Causæ* *plagæ*, & attritiones, & medicamentorum potiones phlegmonem eorūdem procreant: præsertim autem equitationes assidue & vehementes. Accedit agris dolor pul- *signa* *facilis* retro iuxta ptinam dorsi vertebam, paululum supra lumbos costas. Dolor vero sursum vsque ad iecur descendit, præsertim dextro rene male affecto. Deorsum vero vsque ad vesicam & pudendum, lumbosque & coxendices, pectinem item & femora. Consequitur etiam stupor propinqui cruris, & neque recta erigi possunt, neque pedibus ingredi. Et siue sit tnutatio, siue aliqua alia concussio irruat, vehementi dolore lancinantur. Frigent eorum extrema, & magis suræ ac pedes. Adest vrinæ emittendæ difficultas, minguntque assidue ac laboriose: initio quidem tenuia & aquo a, in quibus nihil subsidet: phlegmone vero in peius proficiente, rubicundiora: deinde etiam crassa & mucosa, adsuntque febres vehemētes. Quod si amplius phlegmone augeat, hæc omnia sunt vehemētia. His accedit nauis, & stomachi mortis, vomitusque bilis. Quādam vero ipsorum vsque ad animi deliquium anguntur, & exsulant. Sistitur ipsis venter adeo vt insentiant, & assidue ructus emittant. Sequitur fastidium vehemens, & quibusdam continuæ sunt exacerbationes, quibusdam vero per intervalla. In vniuersum autem ventris egestio, & vrinæ multæ excretio dolores ipsos præcedunt. *Videtur* Aegrum in lecto molliissimo decumbere oportet: ac primo die a cibo abstinere, non tamen in multis dies in ediam extendere. Vrinæ enim puriores & actiores per inediam redditæ, vehemētissimos morsus infligunt. Itaque in principio forbitio nibus tenuibus morsus lenientibus nutrire oportet, vt est ptisanæ succus, aut hordei alica. Malua etiam inter olea summe confert. Potus sit aqua, in qua parum cinamomi vulgaris decoctum sit. Quid multa: victus ratio sit tenuis, & talis qualis in aliis phlegmonibus. Quod ad *Curationem* curandi rationē attinet, initio statim detrahendus sanguis est. Secūda v. erit vena, *Galeno in lib. De ratione curandi per sanguinis missionem teste*, quæ in poplite est, aut certe quæ iuxta malleolum, idque in crute & directore renis laborantis. Interdum etiam, eodem auctore, misso ex cubito sanguini auscultant, vbi videlicet recens fuerit phlegmone, & reuulsione magis opus erit, copiaque sanguinis affuerit. A venæ sectione ad localia *Localia* vocata progrediendum medicamenta, cataplasmata videlicet, fomenta, linimenta, emplasta, & similia quæ mediocrem refrigerandi & leniendi vim obtinent, *ex oleis rosaceo, vitellis ouorum, ciconiorum, chamamelino, farinis hordeacea, sabacea, fenograci, lini semine, & similibus, quæ in capitibus De iccoris & lenuis phlegmone dicta sunt, parata.* Quod si per ea quæ extrinsecus admoventur, dolor non leuabitur, cucurbita lumbis ac illis est adhibenda, & hiluris impactis plurimus sanguis est extrahendus. Deinde spongiatum fortu vtendum, & aliis quæ dolorem leuare possunt. Cauendum autem vnice, ne hoc tempore ea quæ vrinam mouent medicamenta bibenda dentur, Galeno etiam nostro monitore, qui *libro de cimetis Ther. meth.* ne id ipsum fiat, studiose & diligenter prohibet: oblat dunt enim vehementer, mordaces humores phlegmone obiectis paribus inducendo. Cauendum quoque a purgantibus medicamentis erit initio phlegmonis. Clysteribus tamen mollibus, potissimum si venter nihil deiecerit, *ex malua & mercurialis decocto, aut seminis lini, & fenograci, aut succo prunæ confectis, adiecto oleo violaceo, aut chamamelino, vtendum.* Vt venter cauendum, ne magna copia infundatur, quod alias intestina, repleta & distenta renes comprimât. Ceterū vbi perfectè iam sedata ac cōcocta fuerit phlegmone, id quod cognoscit omnimoda doloris remissione, tunc etiā per vrinam

Suppuratio
nae.Signa pri-
orū lup-
purationis.Ruptura
foris indi-
cia.

prouocantia purgandum erit. A concoctis enim phlegmonibus vrinx prodeunt multæ & crassæ, ac in his quod subſider bonum est, atque adeo morbum prorsus iudicat. Quæ autem ſint medicamenta vrinam mouentia, diximus libro ſecundo De compoſ. medis. cap. 7. Potiſſimum vero inter olera conferunt fœniculum, apium, & paſtinacæ probe perco-
q̃z. Quod ſi vero per prædicta medicamenta malum non propellitur, & neque dolor, neq; febris, neq; grauitas horum vſu conquieuerint, vrinxque difficultas ac frequens ſub-
licidium ægrum moleſtauerit, puſ hac in parte colligi indicium eſt. Tunc itaque quam celerrime luppurationem ac puris eruptionem adiuuare oportet. Quæ in re ſpongiæ a-
quæ & oleo aſidue imbutæ proderunt, foris gratia ad motū. Eundem etiam vſum ca-
taplaſinata præbent, quæ ex farina hordeacea, furfuribus, ſicubus pinguibus, althea, &
ſimilibus ſupra in capite De icteris phlegmone dictū, conſtant. In ſolium quoque ex emolli-
entibus herbis, malua, althea, chamæmelo, lini ſemine, ſcenogræco, paratum, de-
ſcendere ſumme conſert. Quod ſi vero perfectæ iam luppuratione (id quod cognō-
ſcitur, ſi febris & dolo- es minores fuerint, grauitatis autem ſenſus circa renem laborē-
tem remanerint) ruptura moretur, in potu exhibenda quæ vrinam ducunt, vt eſt fœ-
niculi, pulegi, origani, & ſimilium decoctum. Hæc enim rumpunt interdum luppu-
rationem, & puſ per vrinam expurgant. Quod ſi autem vſu ſillorum nihil contulerit, cu-
ribus clyſteribus alius ſubluenda erit, veluti cucumeris ſylueſtris radicis decollæ & dilani-
vel alliorum, vel raphani. Macerare autem hæc in muria oportet, parumque olei admi-
ſcere, quo inſuſa lubrica reddantur. Hæc ſane per clyſterem inſundenda, iubendique
ægrī vt plurimo tempore apud ſe detineant. Conſueuerunt enim ſæpe ipſam luppura-
tionem rumpere, vna cum hoc quod ventrem emolliunt. Remorantem quoq; ruptu-
ram iuuat cum inum cum paſſo, ruta cum vino mulſo. Porro ruptura facta, caruncula
parua, oblonga cum vrina excernuntur. Et ſi maligna fuerint vlcera, humores fortiſſi,
luidi & mucoli: ſi vero benigna, puſ ipſum album, æquale, leue, & abiq; odote graui, ac
paucum excernitur. Poſt puris eruptionem lac euni melle præbendum, & alia quæ in ca-
pite De renum ulceribus commemorabuntur.

Decalculorum. CAP. XXXVIII.

Cauſa.

Lapidum
diſſerſio.

Signa.

Cauſa.

Renum calculis proſectæ ætatis homines frequentius, quam pueri apprehenduntur. Cauſæ autem generationis horum calculorum ſunt aſſiduæ cruditates, vnde hu-
moris craſſi & terre multitudo coaceruatur, & ardor igneæ circa renes caliditas, quæ
humores ad aſſum, eos cogit, & in lapidem indurat, ad modum toſorum qui in aquis
putrunt, quæ in æreis, præſertim balnearum, vaſis coquuntur. Conſiſtunt autem la-
pides in renibus iuxta ventriculoſiporum, aut parui, aut maiores: & aliquando qui-
dem pauciores, aliquando autem plures, & magnitudine, & forma, & colore, & aſpe-
ritate inter ſe differentes. Nigri enim, & ſubalbidi & pallidi reperiuntur. Accedit æ-
gris grauiſ in renibus dolor, aculeique infixi ſenſum præbens, tumore tamen nuſquam
foris apparente. Spina ægre ſecti poteſt. Crus quod e directo eſt renis laborantis ob
nerui a vertebraſ lumborum orti compreſſionem ſtupet, adeſt falſidium & vomitus.
Vrina circa obturationis principium propter obſtructionem pauca, & aquoſa mingi-
tur. Poſtea vero perfectæ carum ſuppreſſio contingit, aliusque nihil excernit, verum
promptitudines multas ad egerendum facit. Excernitur autem aliquando ſanguis, pro-
pter violentiam calculorum, præſertim aſperiorum. Vrinam etiam arenoſam ſubſi-
dentiam habet, potiſſimum vbi lapis ex renibus fuerit emotus. Quas ſingulas fere no-
tas Hippocrates libro ſexto Epid. par. 1. aph. 5. iſ complexus eſt verbis: Interim dolor grauiſ,
quando cibo replentur, innadit, piſuitaque vomunt. Quum vero dolores intentiores fuerint, æ-
ruginofa: atque tum leuioreſ quidem ſunt. Dolo- autem leuantur, quando cibo vacui fuerint. Are-
na ruſa ſubſident, cruentaſque mingunt. Stupor crurū, quod e directo eſt. Hæc ille. Porro leues
& rotundi facile excernuntur: non item, qui alia quacunque forma præditi ſunt: ma-
xime tamen oblongi & aſperi diſſiculter excernuntur. Ceterum quum lapis in reni-
bus obturatus vehementiſſimos dolores inrulerit, ne ſcilicet ſanguinis multitudo in-
tenſione & dolo- in laborantem particulam præcumbat, in corpore plenitudine aſſu-
cto & robuſto, conſeſſim poplitis vena, iuxta Hippocratis loco iam citato conſilium, inci-
denda erit, eius nimirum cruris quod ſtupet, & e directo renis laborantis eſt. Qui vero
caco-

- A** cacochymia vitioſe humore ægri laborant, iſ purgatio redundantis ſucci conuenit. Neque ſane hæc omittenda eſt, niſi aliud quidpiam id fieri prohibeat. Id quod etiam Hippocrates iubet, dum iuuenes elleboro purgandos eſſe docet. Quod ſi vero ſectio-
nem venæ, aut purgationem adhibere minime licebit, alium per clyſteris inſuſionem
eludere oportet. Quod rurſum maxime faciendum erit, vbi multa in inteſtiniſ excremen-
torum copia fuerit. Cauendum tamen vnice erit, ne ſint validiores, atq; adeo ne alun-
de humorum copiam ad inteſtina trahiāt, ne meatus vrinarii angantur & compriman-
tur: ſed ſint tales, quæ duntaxat excrementa in inteſtiniſ detenta vacuare poſſint, vt eſt
iſ qui habet: *Malua, albea, mercurialis, trichomanis, parietaria, ſingularum manipulum vnum.* Clyſt.
B *Sifymbrii cardamini, manipulū vnum & dimidium, ſeminum petroſilini, apii, ſeniculi, lini, ſin-
gul. drachmas tres. Radiciſ acori, vnciam vnam & dimidium. Furfur, vnciam vnam.* E bulliant
in aqua ſiſte quantitatē ad tertias, & ſubinde colo transfundantur, accipianturque nu-
ris decocti, vncias vndeſcim. *Cafia ſiſtularia, vnciam vnam. Hieræ picra, vnciam dimidium. Mellis
roſacci colati, vnciam vnam & dimidium. Oleorum anchini, rutæ, chamæmelis, ſingularum
vnciam vnam. Salu, drachmas duas. Conmixtū omniū ſiat clyſter.* Nulla tamē ratione com-
mittendum, vt clyſteribus, aliis ſere omnibus remediis neglectis, vt plerique medicorū
hodie faciunt, aſſidue vtamur, ſed bis aut ter: ſic tamen, ne vitra conſuetum tem-
pus retineantur. Retenti enim diutius quam par eſt, compreſſionem atque anguſtiam
renum, ac vrinariū meatuū efficiunt, vt copioſius lib. 2. *Paradoxorū, cap. 15. diximus.*
C Potro excrementis alui expurgatis, quæ laxare meatus poſſunt medicamēta, adhiben-
da erunt. In quem ſane vſum hoc vnguento renū & lumborum regio inungenda e-
rit, quod accipit: *Oleorum anchini, amygdalorū dulcium, vtriuſque drachmas duas. Olii cha-
mameli, drachmā vnam & dimidium. Adipis gallinæ, anſerini, vtriuſque drach. duas. Buſyri
ſalu experti, drachmam vnam.* Cera quod ſatu ſiat vnguentum molle. In ſeſſionibus quoque v-
tendum ex decocto calamintheſ origani, ſifymbrii cardaminiſ, braſſicæ, ſoliorū albeæ, maluæ,
& ſimilium. Aut æget in ſolium repidum aquæ dulciſ frequenter demittendus. Fomen-
ta item ex ſuſſuribus cum ſolitiſ albea decoctiſ loco dolenti admotæ mirifice conferunt. Cataplaſ-
mata quoque ex farina tritici, ſeminibus lini & ſenogræci, lupinorum, pœuſcedani radice quam
miniſſimiſ trita, & chamamelis parata. Bonum eſt, & panem paſſo decoctum circa lumbos
ac ventrem imponere. Neque temere quidem fecerit, qui cataplaſmata & alia paulo
ante commemorata veſicæ & peſtini adhibuerit. Oportet vero coaceruatim alia ſu-
per alia cataplaſmata adferre, priuſquam ſcilicet primum frigeſcat. Siquidem frigus
contrahit & conſtringit, atque adeo in renibus & vrinariſ meatibus lapidem retinet,
eiuſque exitum impedit. Quod ſi non lubet totiſdem cataplaſmatiſ vi, caleſtorio alio
extra contingere oportet, ne refrigerentur: id quod commodè fieri poteſt per ſacellos,
aut alia vaporatoria quæ cataplaſmatiſ imponantur. Hæc interdum, idque non raro, ad
lapidiſ per vrinam eiectionem ſufficere ſolent. Quod ſi vero malum non abegnent, ea
etiam, quæ vrinam ciunt, bibenda dabiſ. Vrinam autem multam hæc quæ ſequuntur
ducunt: *acorum hypericum, petroſelinum, orcoſelinum, liſtoſpermum, ammi, danci ſemen, & ſeni-
culi, aſarum, radix bryonia, & rubia tinctorum, cortex radicis capparidis, aſparagus, & iſ ſimiliſ.* Vrinæ du-
E Hiſ autem admiſceantur ea, quæ deducūt ad reneſ: vt ſunt *radix pœuſcedani, bryonia, apium,
& radicuſ.* Item qua calculoſ in renibus confringunt, & aſcerunt: ſicut ſcilicet, *adiantum, bœdium,
agni ſeu viticiſ ſemen, ruſci radix, ſaxifraga, betonica, damaſceniſ radix, cicera inſculum, radix cy-
peri, liſtoſpermum, ſcolothroſ (lapidem iudaicum officina vocant) xanthium, albea ſemen, & ra-
dix pruni gummi, vermes terreni cocti & ex martuiſ ſpongiæ lapilli.* Horum ſingula partim de-
cocta, partim tenuiſſime trita præbetō bibenda. Ceterum ea quæ vrinam ciunt, ac la-
pidem frangunt, tunc exhibere conuenit, quum vehementē dolorē remittunt: id
quod accidit, lapide iam tranſiſſo, & ſe de ſua agitato. Quod ſi tamen obſtricti ac
vehementer impacti ſint in renibus lapideſ, plurimū potuſ vitandū, itemque ea quæ
vrinam ducunt. Nam cum ſecum excrementorum non contemnendam copiam ad
renes deducant, ſit vt meatuſ vrinariuſ obſtruant, & calculorū e renibus tranſitum
impediant. Fomentis autem & cataplaſmatiſ, inſeſſionibuſque reneſ & meatuſ vri-
nariū, vt dictum eſt, relaxandi. Venter quoque per inſuſa leuiſa vacuandū, ne vrinariū
meatuſ comprimatur. Poſt hæc vero doloſiſ aliſquantulum lenitiſ, cucurbitæ etiam
vtiliter iſiſ adhibentur, & præſertim preſſiuſ affixæ, phlegmone videlicet id non im-
N N

Vena ſec-
tio.
Purgatio.

Clyſt.

Clyſteribuſ
crebriſ non rita-
dum.Lazania
meatuſ.
Vnguentū.

Inſeſſionem.

Cataplaſ-
mata.Vrinæ du-
centia.Deducen-
tia ad reneſ.Quando v-
rinam ci-
unt & lapideſ
frangunt
adhibenda.

146 Operum Leonhard. Fuchsi Pars III.

Lep's ficin
ca collum
vesicę dete
tus fuerit.

pediente. A deo enim coaceruatim transmouent sæpe cucurbitæ ipsos lapides, vt repente dolores supprimant, lapide nimirum in vesicæ amplitudinem transueto. Quapropter in principio superne a tene cucurbitæ sunt affigendæ, & ad inguina attrahendæ oblique secundum meatum vrinarij situm. Porro delati ex renibus in vesicam lapides, & præ magnitudine circa collum vesicæ detenti, sæpe in extremum periculum ægrum deducunt, tum propter dolorum acumen, tum quod vrinam excernere non permittunt. Decubitus igitur formam in talibus moliri oportet, ita vt supini colloquantur, & longe altiores coarum vertebrae habeant. Deinde multiformiter eos commouere, quo omnibus machinationibus adhibitis lapidem ex ipso vesicæ meatu excidete faciamus: post vero ægros iubere, vt alacriter vrinam eiiciant, & ea eiecta sinere. At vero vbi lapis non fuerit eiectus, rursus mouere, atque hoc ipsum sæpe repetere. Quod si hac ratione nihil profecerimus, catheter instrumentum proliciendæ vrinæ aptum immittendum, eoque lapis a collo vesicæ propellendus, & vrina educenda. Post vero per portiones lapidem in amplitudine vesicæ existentem confringere per medicamenta conuenientia annitemur. Si vero ex vesica quidem accidat calculus, iuxta medium autem meatum ipsius pudendi ossifmetur, & vulnerando exulcerationis periculum inducat, aqua calida paulatim ab alto pudendorum partibus, donec rubore suffundantur, instillanda: aut pendendum in oleum calidum quod relaxandi vim obtinet, demittendum. Decoctum etiam quoddam ex iis quæ vrinam ducunt, plurimum exhibendum est, iubendusque æger, vt multam vrinam congreget, eamque postea excernat, ac diligentiù expellat. Ita enim detractus lapis celeriter excidere consuevit. Quum vero neque hoc modo eum extrahere licebit, secandum erit pudendum, vulnuculo superne iuxta glandis magnitudinem in cussio. Inferne enim secare non expedit, quãdoquidem fere semper in fistulam proficit, ac postea per ipsam fistulam vrinæ excernitur. Lapide tandem amore præferuare hominem, ne rursus renes lapide infestentur, oportet. Maximi autem ad lapidis generationem præcauendū momenri est cibus boni succi, concoctus facilis, & moderatus. Quare cauere sibi ab omnibus cibis duræ substantiæ conuenit, & quæ ægre manducatione arteruntur. Exercitia etiam mediocritia sunt, rarusque omnis generis leguminum frumentaceorumque vñus: casei maximè lactis, & quæ ex ipso præparantur obsoniorum: vini denique nigri, copiarum carniū, & omnium summatim crassi succi, nimisque calidorum & acrium. Eos autem quos calculosa affixit, admonere oportet, vt a cena sæpius vomant, & ab sinu huius assidue bibant: & certis temporibus, si quidem sanguis abundare videatur, venam secet: aut si vitiosi humores coaceruentur, conuenienti ipsorum temperamento purgatorio medicamento vtantur. Oportet etiam ipsam aquam per omnem vicium esse purissimam & percolatam. Vinum item tenue, album, neque valde vetus: hoc enim vrinæ ciendū idoneum. Vrinam quoque cientibus tum cibis tum medicamentis vtendū. Quare indies pastinacam admodum percolatam, foeniculum, fenum, pulegium, & similia edere oportet. Inter medicamenta vero is pulvis multæ est efficaciar, qui habet Radicum fœniculi, asparagi, ananthes, singulorum drach. vnam. Radicū rubia tinctorum scrup. vñū. Radicis aristolochia rotunda vocata, aliis ben, vtriusque drach. vnam. Glycyrrhizæ asæ drachmas duas. Lapidis & spongiæ marinis, scilicet, hoc est iudæi, vtriusque scrupulum vnum. Seminū ammeos, dauci, petroselinis saxifragæ candidæ, fœniculi, anisi, lithospermis singulorum drach. dimidiū. Seminū melonum & citruli excorticatarum, vtriusque drach. vnam & dimidiū. Seminū halsicabi drach. dimidiū. Helicines seu parietaria, malua, vtriusque drachmam vnam. Poli montani, ad instar pueri, asari singulorum drachmam dimidiū. Sanguinis hircini assecti & præparati, drach. vnam. Idellii ammoniaci, vtriusque drach. dimidiū. Oculorum cancri, cinnamonis scilicet, iunci odorati, singulorum scrupulos duos. Contusa omnia redigantur in puluerem minutissimū, de quo deit pondus drachmæ vñius quarto quoque die, aut singulis septimanis in aurora ex vino tenui. Porro sanguinis hircini, cuius in prædicto puluere mentio fit, præparationem tradit Actius lib. 11. cap. 12. Plura alia remedia dicemus in cap. de calculo vesicæ.

Pulvis ad
calculosus
tenuis.

De vlcerebus renum. CAP. XXXIX.

Causa.

Renum vlcera accidunt propter venarū, quæ in iis sunt, rupturam. Item suppuratio-
nē phlegmonis, & acres ac mordaces humores huc delatos. Deprehendunt renes
exulcerati

- A** exulcerati dolore in lumbis cum grauitate, & sine impedimēto vrina redditur, id quod in vesicæ vlceribus non fit. Vrinæ quoque pus commixtum reperitur, carnis partu-
Signa.
 lis, aut pilis innatantibus iuxta Hippocratis sententiam, quia scriptum reliquit: *Sus-
 guinem aut pus mingant, aut renum, aut vesicæ exulcerationem significat.* Et statim post hæc: *+ Aph. 75*
Quibus in vrina crassa existente caruncula, parua aut veluti capilli una exierunt, his a renibus excer-
nantur. Permissum vero etiam cum vrina in vesicæ vlceribus pus est, sed dolor ipse, mox
 locum, vnde illud procedit, demonstrat. His itaque apparentibus æger studiat vixit
 & sarietatem. Ne quid igitur crudum in cibo accipiat, & neque quod ægre concoqui-
 tur, aut facile cortumpitur, aut inflationes parit. In primis autem ab his abstinere, quæ
 facile acescunt. Item omnia acra & feruentia, & quæcunque bilem gignere possunt;
- B** vt est si quis, multa abstinencia, inedia, labor, ira, sollicitudo, exercitatio, vigilia, & immo-
 dica condimenta. Vitanda vero maxime erit immodica equitatio, & omnis vehemens
 concitatio: non minus tamen his perpetuum otium, & balneorum assiduitas. Vten-
 dum pane recenti, & decenter apparato. Carnibus volucrium montanarum, hædis
 quoque, & similibus teneram carnem habentibus. Piscibus saxatilibus, squamosis, in
 craticula assis. Cancris præterea fluuiales, sorbitio ex priscana, & amyllum cum lacte co-
 ctum mirifice confert. Dandum & lac ouis permixtum, iusculumque gallinacum pin-
 gue. Oua etiam forbilia per se conueniunt. Ex oleribus autem *malua, inijys, ramiers, por-*
toluca & lactuca conducunt. Omnia tamen hæc cocta, crudi enim nihil, vt dictum est, æger
 sumere debet.
- C** iam, decorticatæ tamen, & probe mundatæ. Mulius potus, & metacior vitandus. A fri-
 gidæ quoque potu in totum abstinendum. Frigidum enim, vt ait Hippocrates, vlceri-
 bus inimicum. Pro potu vtatur vino diluto, ac parum adstringente: aut lac caprinum, *+ Aph. 80.*
 aut ouillum, aut amygdalinum bibat. Coitus non solum vlcenbus, verum etiam omni-
 bus aliis renum malis infestissimus, potissimum vbi senes, & natura imbecilliores eo vsu
 fuerint. Vitanda ea, quæ vrinam ciunt. Balnei, vt dictum est, rarus sit vsus. Naturales ve-
 ro, & sponte natas aquas experiri non inutile fuerit, maxime aluminosas, sulphureasq;
 Frigida lauare commodissimum est: supra modum enim vlcerationes ægre sanabiles
 tum externas, tum internas destruit. Conferent etiam naturales aquæ post maruinatam *Constit.*
 deambulationem potatæ. Curandi ratio, vbi propter acres & mordaces humores vlcera
 renum accidunt, ab eorundem humorum vitiosorum & erodentium putgatione au-
 spicienda. Qui vero sic afficiuntur, eos vomitu quoque vacuare oportet. Non autem ad
 vitiosos duntaxat humores vacuandos confert vomitus, verum etiam si quis singulis
 mensibus audacter vomuerit, is renum vlcus, & quicquid inde mali accidere potest, dis-
 soluet: humorum liquidum motum in contrarium auertet. Sunt etiam interea propi-
 anda medicamenta, quæ morus actuum humorum obtundunt, vt est *malua, inijysum,*
rumex, portulaca, semen melonum, cucumeris, & cucurbita, serapium violaceum, resacum, nym-
phaea, & eorundem sacchara. Ceterum vitiosis humoribus vacuatis, aqua multa bibenda, aut
 decoctum scænogæci cum melle, aut cucumeris, aut maluæ, aut melonum semen cum
 hydromelite. Lac præterea cum melle præbendum, recens mulctum & calidum: ad
- E** vlcera enim purganda conducit. Serum item captinum, decoctum hordei, vuarum
 passarum, & glycyrrhizæ: quæ quidem, perinde atque eius succus, mirifice confert.
 Quum vero iam purgata & munda fuerint vlcera: quod inde tibi palam fiet, si neque
 tectorium vlceri obdurum cum vrina excretum apparet, neque pus excretum est fœ-
 culentum, sed subalbum, leue, æquale, & paucum: tunc ea quæ resiccant, adstringunt,
 & glutinant medicamenta adhibeantur. In quem sane vsum datur bolus armenius,
 gummi, tragacantha, amyllum, terra lemnia, & similia alibi commemorata. Præter ce-
 tera tamē mirifice confert is pulvis, qui accipit: *Terra lemnia, boli armenii, vtriusque drach-*
mam vnam & dimidiam. Tragacantha, spedis vstri, vtriusque drachmam vnam. Amyli, nucum
pinarum, sostrarum, vtriusque drachmam dimidiam. Seminam lini, cucumeris repurgati, melo-
ni, singularum drachmas duas. Seminam apii, serpyllus duos. Sanguinis draconis. Conterantur
 singula, inque puluerem redigantur tenuissimum, de quo dentur quotidie ægotanti
 drachmæ duæ cum lacte recens multo. Porro extrinsecus quæ tenes exsiccare ac
 roborare possunt, admoventur emplastra, cerata & vnguenta ex oleis rosaceo, myr-
 tino, farina hordei, thure, mastiche, rosæ purpureis, similibusque composita, quorum

148 Operum Leonhard. Fuchſii Pars III.

formulas e ſuperioribus petent ſtudioſi. Plura remedia alia infra in capite de ulceribus A
veſicae recenſebimus.

De Diabete. C A P. XL.

Diabetes
quid.
diſſe.

Diabetes diſtinctum eſt vitium circa renes conſiſtens, multam ſcitim inducens: unde quoque diſſe-
nunt Græci idem vitium nominant: vna cum hoc quod quicquid bibitur, ſimul vi & quale af-
ſumtum eſt, per urinam redditur. Quidam hoc vitium, vi ſeſſatur Galenus caput. vltimo libri de

Cauſa.

matulam vocant. Origo ipſius ex retentricis renum facultatis imbecillitate contrahitur, attracticis vero iſto robore, vt totum corpus ob immodicum calorem exhauriat. Immodicus itaque calor, vt renes attrahant efficit, idem vero relaxando retentricem
B
ipſorum facultatem, diſſoluit. Renum itaque proprium malum Diabetes exiſtit, quo videlicet immodice humorem appetunt ægrotantes, ipſumque propter debilitatē reſententi-
æ in eis facultatis continere non poſſunt, ſed eum acuatim in veſicam excernunt.

Signa.

Concomitatur ægros pertinax ſitis, neque vlla ſatietas ex alicuius liquoris exhibitione
contingit: ideoque aſſidue potum aſſumere coguntur, propterea quod citiſſime per urina-
m expellatur id quod ingeſtum eſt. Viſcera etiam ægrotantibus vri videntur, intum-
meſcunt lumbi, teſtes, & coxæ. Quod ſi amplius adhuc mordens caliditas in viſceribus
augeatur, ſuperior venter corrugatur, & venæ in ipſo eleuantur, vniuerſum habitum
gracilem habent, & tabes totius corporis grauis accedit. Ceterum curationis ſcopus in
tis conſiſtit, vt humorum acredinem obtundamus, ſanguinemque, ac cum eo pexmix-
tum ſeroſum humorem ad motum tardiorem reddamus, & renum intemperiem cor-
rigamus. Mox itaque vbi ceperit vitium, nondum ad perfectionem progreſſum, opti-
mum eſt gibbeti venam ſecare, teulſionis gratia, & moderate ſanguine auferre. Vten-
dum etiam mediocriter urinam cientibus, quæ vitiatum, inque renes imbibitū humo-
rem expurgent. Quod ſi vero inueteratum ſit malum, neque venæ ſectiōne vtendum,
neque quicquam quod urinam mouet exhibendum. Hæc enim corporis tabem & colli-
quationem, quæ ſponte ſua in hoc malo accidit, accelerant. Concidunt enim inue-
teratis vires, & ex venæ ſectiōne totū corpus acius redditur, & urinam cientia in ipſis
multiplicant, augentque malum. Maximum vero ac præcipuum eius vitii remedium
eſt, vt quod potum eſt, ſtatim remoueat. Sic autem per quam frigidus potus ipſe,
D
quandoquidem reliqua etiam vitia ſtudioſius frigidiore vi conueniat. Cibi igitur ex-
hibendi boni ſucci, quiſque diſſiciliter commutari poſſunt, & mordacitate careant,
aut qui mordacitatem & acrimoniam obtundere valeant: vt ſunt oua ſorbilia, alia ad
ſorbitionis modum apparatus, carneſque porcine maceræ plurimum coctæ. Neque
vero incommode exhibetur eis caſeus recens compaſtus, ſalis expertus: & lac per ſilice-
ces, aut ſetrum ignitum ſciſſum, ſeroſo adempto humore. Pro ſorbitione etiam, pti-
ſanæ ſuccus frigidus ptohat. Ex oleribus autem intybum, lactuca, & portulaca. Ex fru-
ctibus pyra, poma, mala punica. Inter piſces, ſaxatiles conueniunt. Vinum bibendum
ruſum, craſſum, aqua amplius dilutum, ad ſaluſuginoſorum humorum, qui ſitum infe-
runt, proſolutionem. Vinum enim corporis temperaturam ad dulcorem permutat. In
E
potu quoque exhibendus ſuccus malorum granatorum, ſuccus medicatus e ribes,
aut oxyacantha. Quod ad medicamentorum rationem attinet, polygoni ſeu ſanguin-
ariæ ſuccus recte ſeipſi, ex vino nigro propinatur. Symphytum item, palmarumque
& baccarum myrti, pyrorumque decoctum. Serapia roſaceum, myrtinum, & ſimilia.
Paſtilli quoque e ſpodio, ex polygoni ſucco, aut vino nigro propinandi. Extrinſecus hypo-
chondriis, lumbis, & pectini illitiones, cataplaſmata & cerata refrigerantia adhiben-
da: qualia ſunt quæ ex aceto roſaceo, polenta, lactuca, lenicula, paluſtri, parietaria ſolis vi-
tis, portulaca, & ſimilibus conſciuntur. In quem etiam vſum proderit inuinctio, ex oleis, ro-
ſaceo & myrtino: aut illitio e ſucco ſolani, aut pampinorum vitis ſecta. Farina quoque hordea-
cea, aceto & roſaceo ſubacta, cataplaſmatis modo hypochondriis imponenda. Vten-
F
dum denique hoc emplaftrum, quod habet: Farina hordeacea vnciam dimidiam. Pampina-
rum vitis extremitatum ſalicum, buſſa paſſoria, ſingul. manipulum dimidium. Corſicum gra-
natorum, drachmas duas & dimidiam. Portulaca, manipulum vnam. Semini cotoneorum, drach-
mam vnam. Roſarum purpurearum, manipulum vnum & dimidium. Ebulliant ſingula in
aqua

Curaſio.

Viſſa.

Medica-
menta.

Localia.

Emplaftra.

A aqua, donec ad mellis crassitudinem, perveniant. Deinde addatur *olei rosacei, uncia dua*, *Sudorum Olei myrrini, uncia una. Denique bullant, & singatur emplastrum.* Ex iam commemoratis potest fieri ceratum, adiectis *hypocistide, acacia, bolo armeno, resina & cera.* Porro sudores quoque excitandi erunt, ut scilicet vitiosi humores ad exudationem vertantur. Optima vero est in dolio facta ex herbis aut aliis rebus calidis evaporation ad sudandum, eo modo facta, ut caput extra dolium prominat. Vel vas aqua calida plenum pedibus xgrotantis, inque lectulo decumbentis admoveatur, atque sudor eliciatur.

De vesica calculo. CA P. XLI.

- B** Generantur in vesica lapides pueris frequentius, quam xtrate procreantur: voraces enim sunt pueri, & perpetui motus, ac cibis utcumque oblati & nocivis utuntur, neque horam cibum capiendi servant certam & ordinatam. Quinetiam priusquam prius aliumvis cibis concoquatur, alium ingerunt, ideoque cum vehementius a cibo moucantur, fit ut crudus & incoctus in venas cibis distribuatur. Mollia autem cum sint adhuc illorum corpora, & quæ facile cedant, ob id obturationem circa renes non perferunt. Quum vero crassissima vrina in vesicæ amplitudinem perferatur, ibidem veluti sex vini & limus aquæ subsistit, ac postea propter caliditatem, qua pueri præditi sunt, deliquata & firmata lapidescit, id quod extrinsecus etiam in aquis suprà natura calidis, & in vasis in quibus quotidie calefit aqua, accidere conspiciamus. Hinc est quod aquæ impuræ, & multo limore fertæ, item quæ duriores & vehementer frigide sunt, lapidis in vesica generationem adiuvant. Dux itaque potissimæ generationis lapidis in vesica causæ sunt, crassities vrinæ, & puerorum calor. Quod Hippocrates etiam lib. 6. epid. par. 3. aph. 11. iis verbis innuere voluit, *Considerandum*, inquit, *an a melle facta concretio puerilis magis, eo quod calidiores sint, accidat.* In cuius quidem sententiæ explicatione quæ annotauimus in nostris commentariis, sane multa ad institutum facientia reperient studiosi. Erro vero quorundam qui perpetuo lapidem vesicæ a renibus initium capere putant, dictis Hippocratis verbis exploditur. Experientia etiam constat, multos pueros calculo vesicæ laborare, qui renem lapide antea nunquam affecti sunt. Quare Fernelium, & eos, qui huius sententiam sequuntur, in errore versari notius est, quam ut pluribus a nobis ostendi debeat. Pruriti laborantes calculo vesicæ crebro, & vrinas crudas emunt, & sub albidis, sedimentum arenosum, atque contrectant pudenda, quæ etiam inrenduntur, ac continuo ad mingendū vruntur, stillicidioque vrinæ vexantur. Curatio huius vitii eadem fere est, quæ renem quum calculo laborant. In eotamē diuersa, quæ val diora requirant medicamenta lapidis vesicæ: & quæ vesicæ adhibenda sunt, quæ renibus alias admoveantur. Lapides autem in vesica oborti, iis potissimum medicamentis atteruntur, *semine nimirum & radice feniculi, semine trinito, graminis paonia nigri, artemisia, chamamelæ, althea radice & semine, sio adianto, rumicis radice, lapidibus spongiarū, seculubo, loto spermo, rusci radice & semine lapide, quæ ab ægri cū latio elictus est, uris & putato semine xanthi, cortice capparis, abrasioni semine, hyacinthi, viola alba, apii, petrasidinis, & aliis iis similibus, quæ vrinā ciere possunt, & qua in capite de renū calculo sunt commemorata.* His coniungendū laudatissimū remediū, pallei troglodytes, qui minimus passerculus est, iuxta sepes & muros victū queritans, ut *Actius & Paul. tradunt*, caudā semper subrectā & albo colore retro inter punctā habēs: iuxta summū alæ lineamentū cinerei coloris. Hic sane totus sale conditus, & crudus in cibo sumtus, morbum perfecte sanat. Calculos enim tam creatos per vrinam expellit, in posterumque generari prohibet. Sanguis denique hincinus ad calculos tum renum, tum vesicæ præfens remedium est. Nam præexistentes soluit, atque per vrinam excernit, & ut alit amplius non generentur prohibet, ac dolorem sedat. Præterea si vesicæ lapides per vrinæ meatum excerni haud possunt, sed illic sunt obturati & impacti, atque adeo vrinæ suppressionem efficiūt, xgrum supinum decumbere oportet, ita ut coxarum partes magis sursum vergant, indeque huc atque illuc multiformiter commouere, quo ex meatu excitat lapis, post vero ita adhuc supinum & positu sursum vergentem mingere iubere. Si vero neque sic excernere queat, per catheterem instrumentum vrinam prolecare: deinde ea, quæ lapidē in vesica atterere valent medicamēta exhibenda. Quod si neque per hæc curatio procedat, ad sectionem veniendum erit. Lapidē igitur hac vel

Pueri lapide vesicæ magni laborant quum. renem. Cauet.

Retor quod eandem refulsit.

Signa. Curatio.

Lapides in vesica oborti.

Passer troglodytes.

illa ratione exacto, viſus ratio conſtituenda eſt eiſmodi, ne ſubinde renaſcatur, quam A
in capite de lapiderum deſcripſimus.

De ſanguinis ex veſica eruptione, & grumis eiſdem. C A P. XLII.

Caſus.
Signa.

Cura.

Sanguinem
eductis
medicam-
to.
Grumos
ſanguinis
diſſoluen-
tia.

Cera.

Amber ſub-
albidum.

Rumpi nonnunquam in veſica venam accidit, atq; cum partim quidem ſanguis for-
as mittitur, partim veto intus condenſatur. Sanguine vero condenſato, & grum-
miſiam coactis, æger animo linquitur ac palleftit, pulſusq; exiguus & obſcuros & dem-
ſos habet, mœtore angitur, refrigeratur, viriſque deſtituitur. Quum vero grumus a-
liquando in vrinarium meatum inciderit, tum iſetiam vrinæ excretionem ſupprimat.
Porro quam celerime, velut etiam in aliis ſanguinis eruptionibus, auxilium ferre o-
portet. Quapropter ſi nihil prohibeat, venam in gibbero ſecare, partita ſanguinis de-
tractione convenit, ut hac ratione ſæpe & paulatim ſanguis detractus teuellatur. Ægi
vero in decumbendo ſurſum verſus collocentur, & coxendicibus iſorum levandis, &
ſimul refrigerandis ſpongæ poſca imbutæ ſubdantur. Extremæ quoque partes con-
ſtringendæ, & peſtem ex ſpongis poſca imbutis irrigandus. Vrgente malo ſumme pro-
ſunt cucurbitulæ iliis ac lumbis affixæ. Poſt irrigationes cataplaſmati ex poligono, ru-
bo, plantagine, balanſtis utendum. Item ceratis ex hypocyſide, acatæ, bolæ armenio, terra
lemnia, ſanguine draconis, & iſiſimilibus in capitis, de ſanguinis ſputo, & dyſenteria commemo-
ratur. Veſicæ in fundendis polygoni, plantaginis, aut millefolii ſuccus, commixtis acacia,
bolæ armenio, peſtiliæ & ſpædio, & ſimilibus. Inleſius etiam ex conſimili materia conſtructi
conveniunt. Nam & poſca, & lentifci decoctum, itemque rubi, ac ſimilium eis conne- C
nit. Danda quoque in potu medicamenta eductioni ſanguinis apta, ut ſunt rheum poſi-
cum tenuiſſimum triſum, & pœonia grana rubra duodecim, terra lemnia, hippuris, centaurei magni ra-
dix, thori cortex, & ſimilia. Ceterum quibus ſanguis in veſica in grumos cogitur, pri-
mus tentandum eſt ut medicamentis convenientibus diſſoluatur ac diſfundatur. In
potu itaque præbenda eſt artemiſia, elichryſum, abſinthium, abrotonum, tamenta vitis,
raphani ſemen, leporis aut hœdi coagulum, vnumquodque cum oxymelite. Imo
ipſum oxymeli perſe exhibitum, mirifice prodeſt: grumos enim diſſolvit, ut ſubinde
paulatim cum vrina prodeant. Extrinſecus autem balnea, vnguenta, irrigationes, & a-
lia quæ relaxandi vim obtinent adhibenda, quæ ſane ſingula ex capite, de renum calculo D
ſunt petenda. Præter cetera veto ceratum hoc plurimum conſert, quod accipit: Oleo-
rum ſiliaci & chamæmelini, utriuſque vniſiam unam & dimidiam. Calaminthæ, camini, ſilvo-
rum ſambuci, ſingulorum drachmas tres. Bituminis iudæici, ammoniaci, utriuſque drachmas duas.
Coaguli leporis, drachmas tres. Abrotoni ſarina ſemini ſenegraci, utriuſque vniſiam dimidiam.
Amber ſubalbidus ſperma ceti vocans, drachmam unam. Cum reſina & cera quod ſatis eſt, fiat
ceratum, quod peſtini imponatur. Quod ſi hoc modo nihil proficiat, ſed vrina ſupprimatur,
neceſſitatem inducet catheteris adhibendi. Per quem ubi vrinam eduxerimus,
rurſus quæ dicta ſunt in potu exhibeamus, & extrinſecus quæ grumos diſſoluant ad-
moveamus. Si vero neque ſic grumi diſſoluantur, ad ſectiōnem haud ſecus, quam veſi-
ca calculo laborante veniendum.

De phlegmone veſicæ. C A P. XLIII.

Signa.

Cura.

1 Aph. 15.

Morborum qui circa veſicam oboriuntur graviffimus, & maxime mortalis phleg-
mone exiſtit. Conſequuntur ægros hæc ſigna. Febri acuta inſeſtantur, vigilant,
delirantes aliena loquuntur, vomunt bilioſa pura, & vrinam reddere non poſſunt. Du-
rus ſit peſtem, & pubes cum rebementi dolore, & egerendi appetentia, veluti in teneſ-
mo fieri ſolet. Quod veto egetitur tenue eſt, & ſubſidentiam non habet. Aliquando et-
iam inflationes ſequuntur, & alvus adſtriſta eſt, in teſtino recto a phlegmone veſicæ cō-
preſſo. Sic laborantibus, ſi nihil aliud prohibear, citra cunctationem venam poplitis ſec-
cato, vel ex malleolis ſanguinem detrahit. Viſus quoque ratio eſt, perinde atq; in aliis
phlegmonibus, tenuem adhibeto. Vino denique abſtinendum, atq; aqua in qua parum
cinnamomi decoctum ſit utendum. Extrinſecus ea ſunt adhibenda, quibus leniendi ac
mitigandi dolores poteſtas in eſt. Quapropter oleo in quo anethum, lini ſemen, inter-
dum etiam ruta & althæa incocta ſint, veſicæ locus irrigandus. Frigida autem & reprimen-
tia medicamenta prout admoveere non oportet: idq; primum, quod veſica ner-
uoſa admodum ſit, frigidum enim, Hippocrate teſte, inimicum nervis. Dein, q; frigida
occludant

- A** occludant & stringant, atq; adeo urinæ suppressionem, quæ huic vitio sua sponte accidit, augeant. Postremum, quod frigida, ne humores phlegmonem efficientes discutiantur aut concoquantur, prohibeant. Quare porius mediocriter calida sunt ad mouenda, quæ quidem dolorem leuare possunt, urinæ fistulam & meatum laxare, atque phlegmonem discutere. Clysteribus quoq; lenibus ac mollibus aluus subluatur, & post ster-
Clysteris
- corum educationem oleum anethinum, aut tale aliquod, leniendi doloris gratia iniiciatur. Præter autem & papaueris calycem simul cum oleo incoquere, & adipem anserinum aut gallinaceum recetem in ipso oleo eliquatum simul infundere. In vehementiori dolore solutam in oleo anethino drachmam vnam pilularum de cynoglossa infundere oportet: aut opium cum myrrha & croco lanç illitum in podicem indere. In deco-
- B** ctu ite seminis lini, scænuæ græci radicis althææ seminis dauci, & similibus insidat æger, admoventurque quo in aqua decocti desidens mingat. Vesica enim non satis robusta est ad amplectendam expellendamque urinam: quare ipsum egrum, aut aliquem ex adstantibus scite ac placide petinam premere oportet, neque id ultra modum, ne dolor inde intédatur. Ceterum post clysteres & infusos, fomentis etiam pet aquam calidam, & oleum in vesicis bubulis aut aliis vasculis semiplenis admotis, vtendum: aut sacculus, *Femina.*
- vt in cap. de pleuride est ostensum. Quod si neq; sic vitium cesset, cucurbita vna cum scarificatione locis afflictis affigenda erit. Porro abstinendum ab iis, quæ urinam vehementer citant, potioque multa vitanda. Vbi euident declinatio apparuerit, ad ea quibus discutiendi & emolliendi vis inest, de quibus iam sæpe dictum est, transeundum. Catheteris
- C** immiffione vesicæ phlegmone laborante non facile vtendum, in viris potissimum: cum enim non nisi laboriose immitti queat, dolores exaquit, & phlegmonem auget, verum in mulieribus ipsum adhibere nihil absurdum: brevis enim ipsis urinæ meatus exsistit, & recta sitis: vt citra dolorem hoc molimen admittant. Si vero urinæ suppressæ periculum admodum vrgeat, necessario in viris etiam ad catheteris vsum confugimus: non sane quod mali molestiam tollat, sed vt potius urgentem urinæ suppressionem corrigit, & a præcipiti periculo liberet. Post urinæ profectionem rursus ad auxilia, quæ dolorem leuant, veniendum, vsquequo phlegmone soluatut aut suppuretur. Solet autem sæpe phlegmone repente solui, erysipelate iuxta cutis superficie oborto, & petra auenire, neq; rursus intro recurrente. Imo & vrina multa eiecta sæpe iudicatu est malum. Nihilominus tamen etiam si hæc apparent, iisdem remediis insistere oportet: quandoquidem vt plurimum tensione perfecta cõtinaua oborta, cõtinue exacerbationes sunt, & mali cõstitutio diuturna. A vero vbi periculose accessiones cessarint, & morbi cõstitutio iam fuerit inueterata, ad vnguenta quæ humores ex profundo euocant, & transferunt, & ad emplastra, quæ cutem rubefacere possunt, transeundum est. *Catheteris immiffio.*

De vlcerebus vesicæ, & eius cernicis. CA. P. XLIV.

- E** xulceratur vesica aut propter abscessum, aut tuberculum quod præcessit, aut ruptu-
Causæ.
ram, aut fluxionis erosionem, aut aliam simile ob causam. Egrus comitatur dolor
Signa.
vesicæ acutus omni quidẽ tẽpore mictionis, & excretionis puris. Et vbi sordida fuerint vlcera, fœculenta simul excernuntur, & mucosa, & quæ crassam subsidentiam instar
- E** farinæ habent. Interdum autem & pelliculæ tenues instar foliorum & lanarum cum vrina excernuntur. Si vero serpendo depascant vlcera, subruenta excernuntur, & saniosa, & fetentia. Ad hæc accedunt difficultas emittendæ urinæ, & pudendi arrectio ac petulantia. Dolor vero non solum cum urinæ meatus fuerit exulceratus, sed & quum in profundo exulceratio consistit. Cognoscetur autem num in profundo exulceratio sit, aut iuxta urinæ meatum, fistulamue, ex eo, quod si in amphitudine vesicæ fuerit, dolor circa pubem consequatur. Sin iuxta ceruicem vesicæ vlcera existant, tempore mictionis tantum, & maxime vbi mingere inceperint ac desierint, dolor sentitur: atque id amplius contingit, si vrina sit acrior. Qui hoc vitio affliguntur, si aut assidue decubant, aut erecti stare nequeunt, neque reclinati quiescant. Ab immenso
- F** æ continuo dolore febribus, vigiliis & colliquatione perimuntur, alii quidem citius, alii tardius. Ceterum insanabilia, aut saltem curatu difficilissima sunt vesicæ vlcera, tum quia ipsa neruosa est, tum etiam, quia vlcera eius vrina, quæ natura acris est, assidue contingat, habet quæ adeo erodant, nec glutinare permittat. Et si enim plurima excernitur vrina, tamen vniuersa vesica vacuari non potest, sed semper ex vrina quippiam in ipsa relin-

Curatio.
Lactis po-
tusAdstringen-
tia medica-
menta.Decubi-
tus foveas
etiam oculi
cylindri ad-
hibetur.Dolorem
leuantia
medica-
menta.

Mistura.

quitur, quod assidue vlcerata contingit. Imo cum vrinx copia vacuatur, tum vesica con-
trahitur atq; concidit: vt quod in ea relictum est quantumvis exiguum, id ipsum omnes
eius partes contingit. Verum cum saepe etiam praeter expectationem quaedam eveni-
ant, cura aggredienda est, per quam, si nihil aliud certe accessori dolores minuentur.
Primum igitur persuadendum est laboranti, vt decumbat, & in lecto quiescat, id quo
maxime vbi febres simul adsunt. Deinde remedia febribus intermittentibus adhiben-
da. Maximum vero hic fuerit lactis praeteritum asinini, aut caprili, pauco ad recto melle
potus, neq; post vltimum aliud remedium secundo loco id habendum. Nam & asperitates
lenit, & vlcerationes eluit, malumque extergit. Reliqua vero visus ratio talis sit, qua-
lis ea quae in renum exulceratione adhibetur, per medicamenta etiam xgrum consola-
lari oportet, ne vrina acris generetur, quae mordeat & irritet vlcera. Et si quidem cum
phlegmone exulceratio consistat, cataplasmata ex lini semine, & foenugraeco, alia quo-
que supra in capite de vesica phlegmone dicta sunt, apta erunt. In hunc vltimum in vesicam,
Paulo auctore, nulla diluissima infundenda est, vel lac cum paulo mellis, aut cum cucu-
meris semine, seu candido ouiliquore, tum pompholyge. Porro si exulceratio pascen-
do serpat, subadstringentia extrinsecus imponenda sunt medicamenta, atque haec qui-
dem calida, vt scilicet ob calorem partes circum dolitantes leniendo iuuent, ob po-
tensatem vero ipsorum vicinos locos exulcerationem depascere prohibeant. Sunt autem
adstringentia medicamenta galla, malicorium, alumen, acacia, hypocistis, & similia. saepe autem
& alibi nobis commemorata. Utendum etiam iis, quae per catheterem infunduntur medi-
camentis. Infundendum autem exulceratis, atq; adeo exasperatis locis lac recens mul-
ctum, aut optimum rosaceum tepidum. Si vero nihil horum ad sit, aqua dulcissima tepi-
da assidue infundenda, mordacitatis potissimum tempore instante. Per sedem quoque
pituitae succus, aut decoctum ex semine lini, cucumeris decorticati, foenugraeci, malua, aut lac
cum rosaceo infundendum. Porro vbi clysterem adhibere vis, ei qui vesicam habet affec-
ctam, non supinum ipsum decumbere oportet: non enim permittit vesica infusum in-
tra transire, vt pote recto intestino incumbens: verum in genus primum reclinate homi-
nem oportet: atq; ita infusum adhibere. In hac enim situs figura vesica secedit, & inte-
stinum laxat quo infusum assumere queat. Frequenter autem & in aquam calidam de-
sident xger, & in decocta relaxantia: nam haec dolores leniunt. At qui vbi vlcera iam pa-
scendo serpunt, per catheterem in vesicam iniicienda sunt, quae depansionem sistere
possunt: vt sunt acacia, hypocistis, terra lemnia, bolus armenius, & alia paulo ante commemorata.
Quod si vero fordida sint vlcerata, medicamenta infundenda sunt, quae expurgandi & abster-
gendi facultatem obtinent: velut est mulsa diluissima, vel lac cum paulo mellis, vel cum cu-
cumeris semine decorticato. Si vero acrimonia consequatur, & mordacitas, lac recens mul-
ctum cum optimo amylo infundatur, aut Pompholyx pluribus aquis elota & exsiccata,
atq; subinde cum lacte diluta. Cum vero exurgata fuerint vlcerata iuuare oportet vt ad cicat-
ricem perducantur, atq; id per inessus adstringentes, & eiusdem facultatis emplasta, fomen-
ta, & irrigationes. Ceterum si multo tempore exulceratio duret, quemadmodum magna ex
parte accidit, tunc sane & exacerbationes, & intervalla, siue remissiones xgrum apprehen-
dunt. Quare in exacerbationibus quidem cataplasmata & irrigationes leniendo vim
habentia admoveantur. Remissionis vero tempore, iis quae malum destruere possunt
utendum. Peritini itaque rubefacientia ac sinapiis imponantur, ac visus ratione viribus
reparandis idonea eger vtatur. Quod si non mansuecit vitium, crustas circa pubem in-
fligere oportet, aut per medicamenta, aut per ferrum, sinere: vt multo tempore vlce-
ra se per effluxionem expurgent. Non inepte vero medicamenta dolorem leuantia in
potu exhibueris, si vehementes insint dolores. In hunc sane usum, praeter cetera quae alibi
produximus, conueniunt pastilli de halicacabo cum opio. Plurimum etiam exulceratio-
nis dolorem mitigat semen cucumeris, malua, papaueris albi, fragariae, amyli, nucis pinis,
& amygdala. Potest itaque hoc medicamentum exhiberi, quod accipit: Sacchari violacei, un-
cias tres: Seminis malua, drach. duas. Quatuor seminum frigidarum materum sing. drachmam v-
nam. Glycyrrhizae rasa, drach. vnam & dimidiam. Gummi, sirup. duas. Bolus armenius, drach. dimi-
diam. Pistillatum & terra lemnia, drach. vnam. Cum scrapio & glycyrrhiza unitatem coquant. De co-
quodine in aurora exhibeat quantitas nucis auellanae. Porro in vesicam quoque iniici-
enda, quae dolores leuant, & exulcerationem sanant medicamenta.

De stillicidio vrina. C A P. XLV.

- A** *Terræveia* Græcis, *stillicidium vrina* Latinis dicitur: & nihil aliud est, quam *vbi paulatim* *et guttatim vrina destillat*, atque *assiduam ad mingendum irritationem facit*. Accidit propter vrinæ acrimoniam, vel exulcerationem velicæ, vel abscessum iccoris aut renum, qui ruptus, pure ad vesicam translato, propter acrimoniam eiusdem, assiduam ad mingendum irritationem inducit. Porro acrimoniam esse causam iudicabis, si vrinæ bilio-
Signa.
siores sint, totusque corporis habitus, vel etiam reliquæ notæ, bilem testantur, & mordacitas circa vesicam contingat. Vesicæ autem exulcerationem, perinde atque renum
Curatio.
& iccoris abscessum ex notis in superioribus commemoratis cognoscēs. Si utraque ob acrimoniam vrinæ stillicidium accidat, tum sane exsuperantem viriosum humorem quam celerrime purgare oportet. In quem usum præter ea, quæ iam sæpe dicta sunt, mirifice confert serum lactis cum calida fistulari, aut aliud medicamentum, quod bilem educit. Humore bilioso vacuato, cibis contemperantibus, & acrimoniam obtundentibus vtendum: vt est *pisana cremor, malua, lactuca, portulaca, viola, cucumeris ac melonis semina, et eiusmodi, nempe aqua hordei, aut palmularum, siue radicis glycyrrhizæ decoctio*. Ab omnibus autem acerbis & salis omnino abstinendum, vino præterea, exercitiis, ita, & tarda comestione: hæc enim omnia bilem in corpore acervant. Piscibus vtendum saxatilibus, & balneo aquæ dulcis, quod mirifice humores vitiosos contemperare solet. In potu plurima aqua dulcis calida exhibenda, aut decoctum hordei, cum serapiis violaceo & rosaceo. Vinum vero, vt dictum est, non præhendendum, nisi dulcis, & dilutum. Optimum est etiam ipsum lac calidum potatum. In summa, quod ad vitiosam irritationem, vtendum cibis humectantibus, ac aluum emollientibus iusculis. Oleribus igitur lactuca, buglossa, malua, & portulaca vescendum. Ceterum æger assidue ad mictionem cogendus. Si enim acre rectementum diutius in vesica moretur, partes ipsæ erodit, & exulcerat. Quinetiam ad obtundendam humorum acrimoniam medicamentum, quod in fine capitis præcedentibus descripsimus, porrigendum. In eundem usum præbendum decoctum *glycyrrhizæ, sum serapio violaceo, nenupharino, et intybacko, aut pulvis ille qui habet: Seminum melonis excorticati, citruli, cucumeris sing. drach. tres. Seminum cucurbitæ, portulacæ, lactucæ, singul. drach. duas. Rosarum purpurearum, drach. unam. Succus glycyrrhizæ, glandium, vtriusque drach. unam et dimidiam*. Tetantur singula, & fiat pulvis tenuissimus, de quo detur quotidie pondus drach. unius et dimidiæ in aurora, ex serapio & glycyrrhizæ, aut zulapio violaceo, aut rosaceo. Supra modum etiam conducit terebinthina resina, lota in aqua stillatitia rosacea, aut intybi, nucis ponticæ magnitudine, aliquando duarum trumue accepta. Hæc enim, vt testatur Galenus lib. 5. de tuenda sanitate, non solum alvum citra noxam solvit, atque adeo acres humores ab vrinariis meatibus auerit, verum etiam viscera, renes potissimum, abstergit. Et fuerunt qui huius tantum vsu sanitatem recuperant. Non parum etiam profunt clysteres ex decocto hordei, malux, violarum, althææ, foliorum salicis, nymphææ, & aliis supra commemoratis parati, adiectis cassia fistulari, sacharo, & oleis violaceo & rosaceo. Quod si vero acrimonia adhuc augeatur, etiam per colem lac ipsum cum amylo in vesicam iniiciendum. In eum etiam usum decoctum papaveris albi iniicere oportet. Extrinsecus pubes oleis, violaceo, nymphææ, adiecta succi semperuius exigua quantitate inungenda. Si vero stillicidium vrinæ ob vesicæ exulcerationem, aut aliam corporis partem male affectam, & se per vrinam expurgantem accidat, manifestum est illis priorem curam deberi, sicut tamen vt præsens malum haud negligatur. Curationes autem vniuscuiusque partis ex propriis locis accipitibus studiosius petendæ erunt.

De difficultate vrina. C A P. XLVI.

- A** *Trenis* Græcis, *vrina difficultas* Latinis appellatur. Et est vitium, in quo vrina ægre & & difficultat excremitur. Fit ob vesicæ imbecillitatem, atque adeo frigidam eiusdem intemperiem, quæ actionem eius laedit. Inrerdu etiam propter pituitosos atque adeo crassos humores vesicæ ceruicem obstruentes accidit. Frigidam intemperiem, si
Signa.
a causa extrinseca facta est, ex ægri sermonibus cognoscere oportet, & vrinæ tenuitate & albore. At si præter alborem etiam crassities in vrina appareat, pituitosus humor censendus est qui vesicæ ceruicem, vt dictum est, obstruxit. Frigida intemperies per ea, quæ calefaciunt curatur. Cibis itaque calefacientibus vtendū, vino quoque calido, & odora-
Curatio
frigida intemperies

mentis coudito. Medicamentis præterea urinam cientibus, ut est *paſſinacæ probe collæ, ſaniculum, apium, aſparagus, hyppoſſinum, & ſimilia*. Urinam etiam commodè cient cancri, & herinacæ terreni. Carnem enim illorum exſiccare oportet, & drachmæ pondus in potu accipere. Aromatum denique decocta in potu exhibenda, aut antidota ex his confecta, atque adeo ab illis denominata. Præter alia vero ſumme conferunt antidotus ex anifo, dialcalaminthes, dialachæ, & diacurcume. Theriaca quoque in potu data mirifice conducit. Extrinſecus peſtinem oleis calidis, *rutaceo, nimirum, anethino, irino, ſiliceo, ſcorpionum, & de caſtoreo ſumere oportet*. Admouenda etiam fomenta, & taceuli ex chamæmele, *abratono, betonica, artemiſia, ruta, calamintha ſabina, & ſimilibus herbis compoſiti*. Ægrotum etiam oportet in prædictarum herbarum decoctum deſidere, acimum ventrem contingere, & calefacere. Interdum etiam proderit per ſedem earſdem herbarum decoctum, oleis admixtis calidis infundere. Si vero frigidus & pituiſoſus humor difficultatem urinae fecerit, tunc oxymelie vtendum erit, & de coctis byſſuri, pullegii, origani, thymi, & ſimilium ſupra ſæpe commemoratorum. Item vſus ſit quoque fomentorum, irrigatorium, & ſacculorum calidorum, de quibus paulo ante, & in præcedentibus capitulis, diximus. Proderit etiam in cacoehymia totius corporis, pituitam purgantia exhibere medicamenta. Præterea ſine craſſus humor, ſive calculus, ſive grummoſus, ſive aliud eius generis obſtruens urinae tranſitum impediatur, catheterem indere ex vſu eſt, niſi particulæ, quod ſupra etiam monuimus, phlegmone impediatur.

De ſuppreſſione urinae. Cap. XLVII.

Iſchia. Græcis, *ſuppreſſio urinae*. Latinis, vitium eſt, in quo *agrus in totum urina ſupprimitur, ac cohibetur*. Accidit hæc interdum propter veſicæ imbecillitatem, ea quæ in ipſa continentur arte completi ac exprimere nequeuntis. Interdum etiam obſtructio inferiori eius meatu, aut a craſſis humoribus, aut lapide impacto. Nonnunquam vero ſuperuenire ſolet vel a phlegmone, vel ſcyrrho, vel alio quopiam tumore præter naturam, anguſtiorē reddente meatum, vel etiam omnino obſtruente. Quandoque etiam ob carunculam, aut callum in meatu natum. Sanguis quoque in grumos concretus in veſica, ſuppreſſæ urinae cauſa exiſtit. Puſ item per ipſam veſicam a renibus, aut iocinore, aut alia quapiam ſuperiori parte excretum, urinae ſuppreſſionem efficit, perinde atque humor, craſſus atque lentus. Accidit etiam interdum propter obtuſum veſicæ ſenſum, ut non reddatur urina, citra tamen expulſivæ facultatis læſionem, ubi ſcilicet proprii eius nerui patiuntur. Sic Galenus cuidam, torpente ob affectus nervos veſicæ ſenſu, ſuppreſſam fuiſſe urinam tradit. Quum enim inter dormiendum non ſentiret homō veſicam impleri, ipſa extenſa, nihil excernere potuit. Sic ſanis etiam quibuſdam acciſit, aut vrgentibus negotiis, vel in concionibus, vel ſenatu, vel foro, vel conuiuio: tum enim tenta longo tempore urina, extenditur veſica, atque urina cohibetur, contraſcit, & facultate læſa propter immoderatam tenſionem. Imo quantum ipſius veſicæ amplitudo repleta circumtenditur, tanto anguſtior ſeipſo fit meatus. Quæ omnia ſuſius præequitur Galenus lib. 1. de locis affectis, cap. 1. & lib. 6. cap. 4. Ceterum ſi propter veſicæ imbecillitatem fit urinae ſuppreſſio, ex iis quæ frigidam eiſdem intemperiem notis monſtrantur, gnoſcitur. Si a craſſis humoribus ex viciis ratione quæ præceſſit, deprehenditur. Sic etiam in otio educatus multis cibis, qui craſſos & lentos humores generare poſſunt, vicius eſt. Si a lapide, ex notis quæ ſupra in peculiari eius capite dictæ ſunt, agnoſcendum. phlegmone, aut alio tumore, dolore, febre, ac viſu dignoſcitur. Vbi ob carunculam, quam, aut callum ſuppreſſio urinae orta fuerit, ex præcedentibus vlceris notis, & ex quo traiecto cathetere urina vacuatur, intelligi poteſt. Immiſſus etiam catheter in videlicet meatus parte, ubi antea vlcus eſſe conſiciebatur, dolorem mouet, fracta ſub cathetere carne ſequuntur cum urinae excretionē & cruor & carnis fragmenta. Si grumi obſtructionē fecerint, ſanguinis præceſſit excretio & effluſio. Vbi vero puſ obſtruxit, ex præcedentium notitia ſcire licebit. Nam vel veſica, vel renes antea vicio quo laborauerunt, per quod tale tantumque puſ colligi poterit: aut in parte aliquanibus ſuperiore fuit abſceſſus, quo erupto puſ in renes, & ſubinde in veſicam tranſiit, tum eſt. Reliquæ cauſæ & ſermonibus ægro tantis poſſunt cognoſci. Curandi ratio cauſarum diuerſitate variatur. Si enim propter veſicæ imbecillitatem urinae ſuppreſſio contingat, calefacientia, ut in ea præcedenti eſt dictū, adhibenda erunt. Omnino

Cura-
tio.
Si propter
veſicæ im-
becillita-
tem.

- A** nim frigida intemperies, quæ actionem vesicæ deficit, amouenda. Si autem a crassis & lentis humoribus vrinæ retentio oriatur, fomentis, infussionibus ac cataplasmaris ex herbis calidis & incidendi facultate præditis compositis, similique victus ratione curanda erit. Præter ea autem quæ in capite præcedenti de vrinæ difficultate commemorata sunt, ad vici amolitionem vnice confert hoc vnguentum, quod habet: *Oleum scorpionis, nardini, lilijacei, sing. drach. tres. Sagapeni, bellidii, opoponacis, sing. scrup. duos. Pinguedinis anise, anastis, vtriusq. drach. dimidiam. Radicis helentis, scrup. duos. Pulegii, calamintæ vtriusque drach. dimidiam. Dissolutis gummi in vino, cum cera quod satis est, fiat vnguentum.* Vesicæ etiam iniiciendum per syringam oleum scorpionum, aut liliaceum, aut aliud quod crassos humores dissoluere ac incidere potest. Si a lapide aut grumi suppreffa vrina fuerit, curatio ex propriis capitibus petenda erit. Lapis enim qui meatum vrinarium obstruit, e loco mouendus, quemadmodum dictum est cap. 41. huius libri. Grumi vero dissoluedi, vt dictum est, cap. 42. Si propter phlegmonem vel alium tumorem præter naturam vrina supprimitur, curatio in eodem ex propriis petenda capitibus erit. Quod si ob carneculam aut callum retenta vrina fuerit, balnea, & alia remedia relaxantia, ac vrinæ fistulam dilatantia admoveantur, quorum formulas ex capite de calculo renum petantur. Quod si ita non procedat, ad cathetrum vsum confugiendum, perq. hoc ipsum instrumentum inmissum vrinæ prolestandæ. Si propter obstruam vesicæ sensum vrina supprimitur, irritando admonere ac excitare eius actionem oportet, & per infusos, fomenta, & alia calida medicamenta, quæ torporem eius auferre possunt succurrendum. Vitanda tamen sunt vnice ea, quæ vrinam mouent, ne scilicet copia eius vesica distendatur, atq. adeo contritus eius facultas lædatur. Nitro præterea, aut pediculo viuo, vrinario mactui imposito, aut alio quod excretoriam vesicæ facultatem irritare potest, vrina prolestanda. Excretoria etiam facultate affecta, Galeno lib. 1. de affectu loci, cap. 1. velle, æget sic figurandus, vt de cluiis sit ceruicis vesicæ positus, ac manibus supra pubem admotis, vrinam sensum, comprimendo tumorem præter naturam, expellenda. In sanis autem, quum ob negotiorum importunitatem vrina diutius retenta vesicam imbecillam ac debilem reddiderit, auxiliari ipsi oportet ambabus manibus supra pubem, vt iam comprehensum est, admotis, & vrinam sensum ac paulatim exprimenda.

De exulceratione pudendi. C. A. P. XLVIII.

- D** Naturalium ac pudendorum vlcera citra phlegmonem oborta, tam externa, quam interna medicamentis indigent, quæ vehementer & citra morsum resiccant, quod partes ille corporis sint humidiores, & excrementis per eas expurgandis parata: cuiusmodi sunt *herba combusta, anethum, aridum vscum, & aloë arida in puluerem redacta*, quolane remedio vix aliud præsentius repeties. Radix etiam pistolochia, quam vulgus herbariorum rotundum appellat aristolochiam, præfens exulcerans pudendi remedium adfert. Porro inter composita medicamenta hoc est efficacissimum, quod habet: *Aloës socinoraria, drach. duas. Galle, drach. vnam & dimidiam. Sanguinis draconis, boli armeni, pompholygi, sing. drach. vnam. Radicis pistolochia, drach. dimidiam. Atyrrha, scrup. vnum. Gummi arabici vocati, drach. duas. Aluminis vsti, drach. dimidiam.* Contritis omnibus fiat pulvis subtilis, qui partibus exulceratis inspergatur. Quod si humidiora ac sordidiora vlcera fuerint, primum delutiore mulla, mox lacte caprino abstergantur. Quo peracto, puluere iam dicto vtendum, aut lapide hamatite, aut malicorio, aut lemoia terra, in puluerem redactis. Si simul phlegmone accesserit, hæc primum remouenda erit, lintheis in aquæ stillatitiarum purpurarum, aut solani, aut auzoi, aut portulacæ, adiectis omni candido, madefactis, & loco laboranti admotis. Reliqua remedia ex aliis petenda capitibus erunt.

De Priapismo. C. A. P. XLIX.

- P**riapismus, auctore Galeno libro 6. de affectu loci, capite 6. & 13. meden. method. est, quum genitale membrum & in longitudine, & in latitudine augetur, nullo stimulante ad libidinem aut desiderio, aut acquisito calore. Quod si pudendi accidat palpitatio, tunc Satyriasis dicitur. Appellationem autem hoc vitium accepit Priapo, quem suapte naturæ huiusmodi pudendum habentem finxerunt & pinxerunt homines impii. Fithoc vitium, vt eodem in loco testatur Galenus, vel ob arteriarum ora immodice patentia, vel vaporem spiritum in fistuloso nervo ortum. Crebrius tamen ora arteriarum patentia sequitur. Quippe facilius est hæc distendi, quam statuosum spiritum in nervo

fiſtuloſo generari. Nam calefactis lumbis, par eſt vt arteriæ calidiores reddantur, & magis etiam pateant ipſorum ora: quomobrem non exiguum tunc ſpiritus eſſentiam in fiſtuloſum neruum effundunt, qui paulatim impletus colem extendit, ita vt tota ipſius eſſentia in fiſtuloſo neruo conſiſtere videatur. Aliquando vitium hoc accidit iſis, qui longo tempore præter conſuetudinem a concubitu abſtinent: atque hoc poſſiſſimum iſis euenit qui plurimo ſanguine abundant, & nõ ſtudent vt multa exercitatione ſanguinis abundantia diſſipetur, vt *copioſius loco iam citato Galenus oſtendit*. Qui hoc vitio laborant, perinde atque ii qui diſſenſione neruorum correpti ſunt dolent: inflatum enim & diſtenſum pudendum conuulſionis modo aſſicitur. Sic conuulſi celeriter pereunt, niſi conſeſtim eis auxilium feratur. Quum vero moriuntur, ventre inflantur, & frigidum exſudant. Curandi ratio pro cauſarum diuerſitate variatur. Si enim propter patientia arteriarum ora, atque adeo earundem caliditatem vitium accidat, protinus vena ſecta ſanguinem mittere conuenit. Quod etiam faciendum erit, vbi vitium hoc comprehendit eos qui ſanguine abundant, & longo tempore præter conſuetudinem Venere abſtinent. Secunda vero eſt vena nigra, quam mediam etiam vocant, non autem poplitis: quod hæc ad pudendum ſanguis fluxum magis deducat: illa vero ab eodem magis ſurſum trahat. Vitendum quoque viſtu tenui, & a vino abſtinendum. Cibum autem exhiberi frumentaceum paucum, atque omnino nihil inſanctum, & ſitum indicere, potuque aquæ vi conuenit. Exercitium, friſtioque ſpiritibus recte diſcuriendis adhibentur.

Clyſter. Vacationem etiam per vomitum moliri expedit. Aluum autem obſcuratam & adſtriſtam clyſteri non admodum acri, qualis eſt, qui ex *beta, malua, & mercurialis decocto fit*, ſubmolliſſe oportet. A purgantibus autem medicamentis in totum abſtinentium, ne deoſum trahantur humores. Eadem de cauſa cauenda quoque vrinz ciendæ facultatem habent. In ſumma annitendum, vt ea medicamenta adhibeantur, quæ redundantiam, vacuare, & ſurſum trahere, atque adeo a pudendo auertere humores poſſunt. Quod ſi diutius vitium durat ac prorogatur, cucurbitulæ cum ſcarificatione aſſigendæ ſunt. Si vero plenitudo adfuerit, hirudines adhibendæ. Lumbis vero quæ euidenter refrigerant imponenda, vt eſt *ſolanum, portulaca, hyoſciamus, & ſemperviuum*. Neceſſariò etiam pudendū, & intercapedo inter anum & pudendum ex aliquo ſucco & liquore herbarum leniter reſſigerante illinitur. Optime autē facit in ipſis ceratū ex roſaceo optimo apparatus, & frigida aqua ſæpe elutum, ſi tum pudendo, tum lumbis imponatur. Eius autem cerati, quod liquidum vocatur, conſtructionem docet Galenus *lib. 1. de ſimp. med. ſacul. cap. 6. Et lib. 10. Ther. Meth. cap. 9.* Ceratum hoc conferet, quod habet: *Cera alba decies in aqua frigida lota, quartam vnam. Succus ſempervini, drach. duas.* Commixta redigantur in formam cerati. Quid multa: adhibenda, atque in potu etiam exhibenda ea medicamenta, quæ ſemen exſtinguere poſſunt. De quibus copioſe in *cap. ſequenti de profluio ſeminis* dicemus. Porro ſupino cubitu conqueſcere nociuū, at in latus decumbere ipſos ex re eſt. A ſpectaculis vero & narrationibus, ac cōmemoratione eorum, quæ ad Venetem excitāt, penitus ſunt arcendi. Si vitium hoc ob vaporoſum ſpiritum in fiſtuloſo neruo natum accidat, ad eiufdē diſſolutionem tota curatio conuertenda erit. Quare ad caput de curatione inflationis ventriculi, & coli doloris ſtatuoſi recurrendum, illic n. remediſorū copiam reperire eſt.

De ſeminis profluio. C A P. L.

Gonos- itea. **Caſſe.** **Signa.** **F**

Gonorrhœa Graecis *ſeminis profluuium* Latinis dicitur. Vox hæc compoſita eſt, ex *γόνι*, quæ ſemen ſignificat, & *ῥῆν*, quod eſt *fluere*. Eſt enim ſeminis præter voluntatem, citraque pudendi tēgiginem excretio. Fit propter tetentricis in vaſis ſeminariis facultatis imbecillitatem, aut ob aliud vitium, quod ſeminariorum vaſorum partes eodem modo, quo expultrix ſecū dum naturam facultas mouet: veluti in comitialibus, & aliis violentioribus conuulſionibus cōtingit. Oboritur autem aliquando etiam ex ſeminariorum vaſorum fluxione. Semen quod profluuit aquoſum eſt, tenue, citra coeundi appetētiā, & vt pluriſimum quidem, citra ſenſum, quandoque vero cum voluptate quadam promanat. Corruptur hoc vitio affectis ſenſim vniuerſum corpus, ac gracileſcit, præſertim circa lōbos. Conſequitur & debilitas multa, non ob ſeminis multitudinē, ſed ob locorū principum. Et ſi pudendo non intento euenerit, tetentricis in ſeminariis vaſis imbecillitatē ſequitur. Si vero intento pudendo contrigerit, cōuulſioni quodammodo ſimile malum erit. Non viris tantum, ſed & ſceminis vitium hoc accidit, & in ſceminis quidem ægre tollitur.

- A** tollitur. Curandi ratio communis est cum ea, quæ in omni fluxione adhibetur. Primum ^{Causa.} igitur in quiete, paucæ cibo, atque aquæ potu ægros adferuare oportet. Deinde etiam lûbos & pubem contegere lanis vino & rosaceo, aut melino madefactis. Neque vero ineptæ sunt spongiz poscæ imbutæ. Sequentibus vero diebus cataplasmaris, emplastris & vnguentis ex *palmo, cotoneis, acacia, hypocistide, rhoe & similibus*, supra sæpe commemoratis, vitendum est. In febribus quoque adstringentibus ex *rubi, plantaginis, myrti*, & id genus aliorum decoctis paratis uti oportet. Decoquenda vero prædicta in vino austero, aut etiam aqua. Ciborum qui ægre corrumpuntur, & difficulter permutantur, & resiccandi vim habent vltus sit. Varent iunio studio alimenta statulenta. Dandum etiam cum cibis ac potu, *agni seu viticis, & cannabis semen, præsertim testum: rui autem semen & folia, lactuca semen & calus, ac nymphaeæ radix*. In potu vero quotidie pro aqua communi, aquam quæ scitum sæpe extinctum est, præbeatur. In summa, acritum rerum vltus, & multum vltus potum, & oborū exhibitionem vitare oportet, vltusque ratio vltus resiccatoria & adstringens constituta est. Ea quoque medicamenta, quæ semen exstinguunt, propinanda, ut *elagni semen testum & persicillum. Folia item & alii flores, Venereæ colubæ creantur, non comestantur autem, sed & in potu sumta, & substrata. Peritidaca comesta, & lactuca semen potatum, & nymphaeæ radix & semen in cibo accepta semen refrigerando exstinguunt. Ruta vero comesta calorem semen corrumpit. De quibus Galenus lib. 5. de simp. med. facul. cap. 23. Calamintham autem assidue edentes, generandi potentiam amittunt: id quod similiter & violæ albæ semen facit. Ceterum aqua fabrorum ferrariorum, in qua ferrum sæpe extinctum est, assidue potata, citra molestiam imminuit semen. Porro etiam commemoratis medicamentis simplicibus varia componi remedia possunt, hæc in primis tritura, quæ accipit *Specierum diacumini, diacaleminthæ, utriusque, drach. unam & dimidiam. Seminii agni, ruta, utriusque, drach. unam. Calaminthæ, drach. duas. Seminii lactucæ, peritidacæ, utriusque, drach. unam. Sacchari æqualis omnium pondus. Miscantur singula, & fiat tritura, de qua drach. una, aut drach. una, & dimidia in vino austero diluto exhibeatur. Optimum quoque, quod tenes lætant. Vehementes namque refrigerationes eorum, quæ lumbis subduntur, renes iniuria efficiunt. Præterea stratum ipsum non valde molle sit. Decubitus ut plurimum in latus fiat, iurata forma decubitus supina, ne lumborum arteriæ inde caleant. Post prima autem, morbi tempora exercitiis egræ committere oportet, quibus totum corpus, & præsertim partes laborantes, confirmetur. Bonum etiam fuerit, si nihil aliud impediatur, ad frigidam lauationem de fugere, quæ omnem morbum ex fluxione ortum abigere consuevit: idque maxime, si medicamentaria aliqua qualitate aqua sit prædita. Conuenit item per intervalla quædam iis, quæ rubefacere, eaq; quæ in profundum sunt ad superficiem transire possunt, uti. Omnem insuper de rebus Venereis cogitationem excludere oportet.**

De iis qui re Venerea uti non possunt. C. A. P. I. I.

- E** Quæ mariti existunt, & re Venerea uti, ac debitum vxoribus exigentibus persolvere ^{Causa.} cupiunt, ignaua vero & impotentia membra, propter frigidam qual laborant intemperiem, aut aliam ob causam pudendi resolutionem efficientem, obtinent, si infernas partes exercere debent: & cibis calefacientibus, instantibus, nec non seminis gignendi ^{Vitæ.} facultate præditis, bonum quoque succum generantibus, carnibus nimirum gallinarum, caporum, perdicum, phasianorum, iuuenum columbarum, aucularum montanarum, sturnorum, passerum maxime gallorum testiculis, & similibus uti. Edulia vero non solum bene nutritia, sed etiam staturosa ipsis cōueniunt, ut est cicer, faba, bulbi, porrum, pastinacæ radix & semen, nuces pinæ, amygdalæ dulces, rapi semen, & id genus alia. Quæ item perdicis, ad Veneream ignauos excitant. Vinum bibant odoratum, rubicum, & ab aquæ potu abstineant. Dormiant in mollioribus lectis, legantque, quæ ad coitum cohortantur, aut lectionibus assideant. Naturalia continuo ex oleis, vnguentis, aliisque calefacientibus medicamentis confricent. In quem vltus hoc vnguentum trêdum, quod habet: *Olei liliacis, unc. unam & dimidiam. Olei castorei, unc. dimidiam. Piperis, nigellæ, pyrethri singul. scrup. unum. Myrrhæ, drach. dimidiam. Euphorbii, grana tria. Cera, quod satis est, ut vnguentum, unc.*

Simplicia
medica-
menta co-
itum con-
trahantia.

Antido-
tum liqui-
dum.

Cele, Ra-
mex, Her-
nia.

et ingui-
na.

et ingui-
na.

et ingui-
na.

et ingui-
na.

et ingui-
na.

et ingui-
na.

et ingui-
na.

et ingui-
na.

et ingui-
na.

et ingui-
na.

et ingui-
na.

et ingui-
na.

et ingui-
na.

et ingui-
na.

et ingui-
na.

et ingui-
na.

et ingui-
na.

et ingui-
na.

et ingui-
na.

et ingui-
na.

et ingui-
na.

et ingui-
na.

et ingui-
na.

et ingui-
na.

et ingui-
na.

et ingui-
na.

et ingui-
na.

et ingui-
na.

et ingui-
na.

et ingui-
na.

et ingui-
na.

et ingui-
na.

Ceterum medicamentis etiam, quæ feminis copiam efficiunt, ac calfacere possunt, veniendum. Inter simplicia hæc potissimum coitum concitant, *eruca, sinapi, nasturtium bursifolium, urtica, et lini semen, ari, radix, piper, satyrium, arminum, anisum, scylla, archa*; cuius quidem maior bulbus cum lacte potarius tentiginem cit, minor vero cum aqua potarius tentiginem remittit: fœniculum & anethum. Testes vulpis sicci triti bibi, in nocuum & minime vanam membri tentiginem faciunt. Partes etiam scinci renes amplectentes, ad tentiginem pudendorum excitandam bibuntur. Præterea pudendum ueris aridum vrito, & de eo pondus drachmæ vnius ex vino meraciotè præbe. Inter composita hoc medicamento vti licebit, quod accipit: *Antidoti diamben, pleres arihen, diambena singul. drach. tres. Disatyrion, drach. sex. Nucum penearum, amygdalarum dulcium, pistacorum singul. drach. duas. Satyri, drach. unam. Radicis ari, scrup. unum. Seminum eruca, urtica, nasturtii bursifolii, singul. drach. unum. et dimidiam. Scinci, drach. dimidiam. Nucis Indica, drach. unam. Piperis longi, zingiberis, variegati, drach. unam et dimidiam. Scobis pudendi ceruini, scrup. unum. Scorpilæ mentha, et fabari quantum ad excipiendum satis est, fiat antidotum liquidum, de quo ante coenam, aut ieiunis per se, vel ex vino datur pondus drachmæ vnius, aut doctum.*

De Ramex. C. A. p. LII.

Kum Græcis, *ramex* & *hernia* Latinis, *ruptura* barbaris medicinarum scriptoribus dicitur, varisque sit modis, ac varias propter adiectiones accipit appellationes. Si enim peritonæo rupto intestina in scrotum deuoluuntur, *hernia* Græcis, *ramex* autem *intestinarum* Latinis vocatur. Quando vero intestina supra inguibus hærent, *epiorrhoea* Græcis, *ramicem* autem *inguinis* Latinis nominant. Quod si oculos & aquosus aliquis humor in parte aliqua membranarum scrotorum implicantium colligitur, *epiorrhoea* Græce, *ramex aquosus* Latine dicitur. Quæ vero intra testum tunicas dura increuit cato, *epiorrhoea* Græcis, *ramex* autem *ramex* Latinis nuncupatur. Quid multa? ramicis generis nomenclaturam semper a rebus opplentibus accipiunt. Proinde si omentum in scrotum descendat, *epiorrhoea*, hoc est, *ramex omenti*, vocatur. Si intestinum quoque delabatur, Græce *epiorrhoea*, id est, *ramex intestini*, *ramex* nominatur. Ita ubi venæ, quæ testiculos nutriunt, varium more dilatantur, & vitta modum repletæ glomerantur, Græci vitium hoc *epiorrhoea*, hoc est, *varicosum ramicem*, appellant. Ramices intestinarum & inguinis sunt, vel quod peritonæum plus æquo extenditur, vel quod ruptum. Vtrunque vero ex violenta quadam occasione præcedente, nempe ictu, aut saltu, aut elamore, aut immensa molis sublato, ne accidit. Aquosus vero ramex, quandoque ex occulta, quandoque ex manifesta contingit causa. Ex occulta quidem, quando ad auctis vas in scroto contextis, aquosus humor propulsus, & sanguini permixtus ad eas partes decubuerit. Ex euidenti autem, quoniam propter ictum collisus aut fractis vas, sanguis subinde alimentum ratione defluens, in aquosam serosamque substantiam mutatur. Colligitur autem humor vel intra tunicam erythroidem, vel exterius inter ipsam & tunicas adiacentes: vel in peculiari tunica tantquam in quadam vesica, comprehenditur. Carnosus sane ex latente causa nascitur, testiculo fluxionem exerto, induratoque, aut ex ictu, aut imperita post ramicis succissionem curatione. Reliquorum ramicum causæ ex eorundem descriptionibus patent. Notæ utriusque, intestinarum nimirum & inguinis ramici, communes sunt. Conspicui enim in scroto aut inguine tumor est, qui in exercitiis, itinere, spiritus retentione, aliisque occasionibus maior, quam prius euadit: compressus tarde quidem recurrit, celeriter autem rursus deuoluitur. Peculiariora ramicis ad extensionem relati indicia sunt, quod non vniuersim, sed particulatim temporis spatio, & ob causas quaslibet intestinum deuoluatur, tumor squabilis & profundus appareat, intestino quod deuolutum est peritonæo confixito. Ex ruptura facti ramicis signum est proprium, quod vniuersim ab initio intestinum deuoluatur, idque ob causas violentas duntaxat: tumor immente magnitudinis, inæqualis, & per summa protinus in cute emineat, quod scilicet intestina extra peritonæum elabuntur. Aquosi ramicis communis nota est tumor dolore vacans, firmus, ac stabilis in scroto, quacumque tandem occasione non euanscens, sed in iis, qui modicum continent humorem cedens: in illis qui copiosum habent, non item. Ac in quibus erythroides tunica humore distenta est, tumor rotundus paululum, & oui modo longiusculus apparet. His testiculus in conspectum non venit, ut qui vndequeque sit implicatus. Si extra erythroidem membranam sub darto habet, per pauca corpora sublabitur, testiculusque intra notas tactui occurrit.

At si

- A** At si humor ex superuenienti coierit, propter contractionem ex omni parte & rotunditatem, tumor alterius testiculi imaginem exhibet. Et cum aquosus humor extiterit, tumor concolor pellucet: cum foeculentus, aut sanguineus, aut rubicundus, aut luidus apparet. Cum vero in vtraque scroti parte hæ apparuerint notæ, duplicem ibi ramicum cognosces. Carnosum ramicem color ubique sui similis cū duritia subsequi ur. Si autem tumor in scitrum coalescat, nullus nec color, nec sensus adest. Si maligni referat naturam, dolor vrget punctorius. Ceterum ramicem intestinorum & inguinaum curamus hunc in modum. Ego resupinato diductis cruribus intestina sensim reducere, atque reducta deinceps idoneis ligamentis retinere oportet. At si loca scroto aut inguini adiacentia vehementissimis doloribus cum phlegmone affligantur, torminaque & flatus superuenerint, atque adeo intestina reductioni minus obtemperent, emollientia, ac phlegmonem doloremque leuantia, & flatus dissoluentia fomenta, linimenta, balneaque adhibeantur: qualia sunt quæ ex malua, chamæmelo, anetho, seminibus lini, fœnæ græci, carei, anisi, cimini, & similibus componuntur. Lana quoque succida vino & oleo madefacta, loca doloribus exagitata foueantur. Reductis intestinis, conandum, ut eadem idoneis vinculis retineantur, impositis primum ceratis aut emplastris conitrigentibus ac glutinantibus, quale est hoc, quod habet: *Piciæ nussii, mastiches, vitriusq; drach. tres. Thuris, drach. duas. Hypocistidiû, sarcocolla, acuta sing. drach. unam & dimidiam. Lapidis hamatidis, sanguinis draconis, alios singul. drach. duas. Bals. armenii, symphitis radicis, gallarum, melicarii singul. drach. tres. Visci quercini, drach. unam & dimidiam. Aristolochiæ vitriusq; drach. duas. Rhois, balsamitiorum, vitriusq; drach. unam. Sopi hircini, drach. duas. Resinæ ceteri stachina, & cera, quod satis est. Gummi prius in aceto aut vine dissolutis formetur ceratum, quod in pelle aretisi impositum alligeretur, nec ante diem septimum soluiatur. Interea æger in lecto triginta diebus maneat, & ea cibis flauolis abstineat, vinoque copiosiore, motu vehementi, cursu, saltu, clamore, & id genus aliis. Interea autem bibat hoc decoctum, cuius accipit: *Sanicula vitriusq; solidaginis sarraceniæ, opbioglossi, pedis leani, euphorii, nummulariæ, singul. manipulum unum. Polyconi, elemæstis, daphnoidis, prunellæ, plantaginis maioris, singulorum manipulum dimidiam. Radicis symphiti iniusculi, hyssopi, pentaphylli, cyroglossi officinarum, vitriusq; drach. dimidiam. Radicis geranii secti generis, drach. sex. Seminii myrsi, drach. tres. Balsamitiorum, drach. duas. Foliorum lauri, drach. unam & dimidiam. Ebulliant in vinarumbeo & aqua iustæ quantitatæ, donec tertia pars absunta fuerit. Dein cola transfundantur, & sacchari adiectione vni decocti dulcedem reddat. purificeturque, & fiat potio suauis, de qua quotidie in aurora dentur unc. quatuor. Porro antientendur vniue n alius indurescat. Si enim nimio conatu sterora excernere necellum fuerit, simul etiam intestina iterum prolabantur. Utendum quoque apta & conuenienti deligatura, ut antea monuimus, id quo tum præcipue, ubi occasio aut necessitas motum exigit. Ceterum ramex aquosus per ea quæ calc faciunt, & cæsi ficent medicamentis curandus, & quorū numero sunt fatina fabacea, lauri bacca, lini semen, dauci, aliæ hæ, nigellæ, & id genus alia, quæ in capite desiste, & reliquis aqua inter eorum generibus, enumerauimus. Porro chirurgicam prædictorum aliorumque omnium ramicum curandi ratione Paulo Ægineta petent studiosi, qui eandem copiose tradidit li. 6. c. 62. & sequentibus. Nā eam iis in libris tractare nō est nostri instituti, quare ad vterum præcedimus.**

De suppressis mensibus. Cap. LIII.

- S**upprimuntur mulieribus menses vel naturaliter, vel præter naturam. Si naturaliter, hincprehendemus potissimum, quod mulier nulla inde molestia vel totius corporis, vel vtri afficiatur. Etatis itaque ratione plurimis menses quartodecimo anno fluere incipiunt, paucissimis ante decimumtertium, vel duodecimum, plerisque autem post quartumdecimum erumpunt: ut plurimumque purgatio ad duos trisine dies, pluribus ad quinque, aliis ad septem usque perdurat. Declinunt vero aliis anno quinquagesimo, aut quinquagesimoquinto, paucis autem ad sexagesimum usque extenduntur. Steriles etiam mulieres, in vtero habentes, & saltatrices, naturaliter non purgantur. Nam quicquid in eis est excrementi, exercitationis vehementia absumentur. Et ut summarim dicam, mulieres calidioris temperaturæ, validisque exetictis vrentes, & agrestes, parum aut nihil purgantur. Nonnumquam vero menses præter naturam, ob nimiam scilicet crassitiem aut fragilitatē suppressi solent. Pingues enim reliquis magis ex sanguine sunt, minimaque & angustas venulas habent, quique illis inest sanguis paucissimus, tunc in pinguedinem

Ramicis
intestino-
rum & in-
guinaum
curatio.

Ceratum.

Decoctū
guaiacæ.

Ramicis
aquosū
cunctio.

Causæ.

Quibus
naturaliter
men-
ses suppri-
mantur.

Quibus
præter
naturam
menses
declinam-
tur.

tranſit. Graciliores vero ob diuturnum aliquem morbum extenuatæ, nihil prorsus ſuperuacui ſanguinis continent. Præterea menſes non profluunt, quibus ſanguis vel craſſus, vel lentus, vel per alia loca delatus ac vacuatus fuerit, verbigratia per nares, aut ſedem. Aliis etiam, quod e thorace ſanguinem multum eiectionem. Aliis, quod e diſſecta vena plurimum ſanguinis promanauerit, menſes ſuppreſſi ſunt. Sed & reliqua excretionum genera idem ſæpe effecerunt, vt ſudoris multitudo, aſſidui vomitus, alui profluuiæ, ac puſtularum omne genus, quæ in cute efflorefcunt. Præter cauſas nunc commemoratas non raro etiã menſes detinentur propter acutos maximosq; morbos & alimentorum vel paucitatem, vel multitudinem. A paucis enim alimētis paululum quippiam conſeſſim exſpiraturq; exhalata copioſo autem meatus obſtruuntur, & menſtruum excretioni intercipitur. Atq; eas ob cauſas maxime menſes ſupprimuntur toto corpore laborante, & affecto. Deinentur autem non minus, vbi vterus ipſe peculiari vitio conſiſtitur: id quod ei accidit, interdum propter frigidam aut calidam eiſdem intemperiem. Non nunquam etiam propter callum in ore vteri abortum, aut carnis excrescentiam, aut pinguedinis copiam purgatio menſtrua impeditur. Quibusdam etiam ſtatim ab initio membrana quadam circa vteri collum aut oriſcium adhaeſcit, quemadmodum iſis accidit, quæ *imperforata* appellantur. Aliis cicatrices vicerum, quæ in vtero anteceſſerunt, vaſorum ora, a quibus ſanguis in vterum ferebatur, obſtruxerunt. Quibusdam poſt abortum vteri ore exulcerato, ac deinceps ad cicatricem ducto, coitio vel compaſſio ſuperuenit, quæ præterquam, quod alias omnes vteri tranſpirationes prohibet, ſanguinis etiam excretionem moratur. Curæ denique pertinaces, metus immodicus, & ingens mœror, menſes intercipiunt. Suppreſſos menſes vniuerſi corporis grauitas, nauſea, ſtidiũ, & horridi quidam diſcurſus, quales iſis quæ cœceperunt accidunt, conſequentur. Præterea dolores circa lumbos, femora, collum, ſinciput, & oculorum fundamenta exiſtunt. Item febres continuæ, & vrinæ nigricantes, cum rubra quadam ſanie, perinde ac ſi quis aquæ, in qua nuper maſſatæ carnes ablutæ fuerunt, fuliginē miſcuiffet. Nonnullis etiam vrina aut diſſiciliter redditur, aut omnino ſupprimitur. Cauſarum diuerſitas partim ex habitu totius corporis, partim etiam, idq; magna ex parte, de ſermonibus ægri cognoscitur. Frigidioris tamen intemperaturæ mulieres ex iſis poſſimum dignoſcere licebit, quod ſomnolentiores ſunt, & ad omnem motum ſegniore, ac colore candidiores, ac veluti plumbei coloris, vrina deniq; aquoſa, & ceteris ſignis, quæ iam ſæpe ſupra dicta ſunt. Pituitam quoq; aſſidue exſcreant, interdum etiam pituitoſos humores euomunt. Calidioris autem temperaturæ indicia, iam cōprehenſis plane contraria ſunt. Plentitudinis notæ, præter alias, quæ ex præcedentib; capitulis colligendæ ſunt, eiſmodi poſſimum eſſe ſolent, vt quæ hac ipſa laborant mulieres menſtruum tempore magis grauentur, dolotſq; vehemētioreſ circa lumbos & pubem ſentiant, venæq; illis in tumorem inſignem attollantur. Ceterũ curandi ratio pro cauſarũ diuerſitate variatur. Si n. frigida vteri intemperies menſiũ profluuium impedit, cum cōtrariis, hoc eſt, caleſcentibus, tũ cibis, tum medicamentis, abigenda erit. Cibos itaq; calidos exhibere oportet, vinumq; ſuſulũ, odoratum, & antiquum. Exereitiũ quoq; præſcribenda, & alia, quæ corpus caleſcere poſſunt ad mouenda, quorum aliqua paulo poſt ſubiungemus. Valent autem præter alia, *pulegium, ſthymus, ſalamentrum, abrotonum, diſſemnu, radix tridui, caſia, acorus, aſerũ, & ſanina*, quib; decocta & ſomenta parari poſſunt. Vinũ etiam merum calidum, poſt balneũ ciuiſis propinaudum. Sumendis aut iſis medicamentis tempora maxime idonea ſunt, alterum quidem cum purgationis tempus appetit, alterum poſt balneum, fomentationem, aut inunctionem ſi protinus ſcil. biberit, vt calido adhuc & ſoluto corpori medicamentum occurrens vires ſuas efficaſius oſtendat. Quod de temporibus conſilium Medici, niſi acutata diligentia obſeruet, fruſtra nõ raro in eliciendis menſib; laborant. Porro calidiores & plurimũ exercitatæ mulieres, curatione quidem haud egerēt rectius n. & conſultius foret ad integram ſanitatē tuendam, eam vitũs rationem præſcribere, a qua mulieris corpus ita deteccaretur, vt menſtrua purgationis nõ indigeret, ſed hoc conceptioni aduerſaretur, neq; n. concipiũt, q̃ non purgantur. Cauſa ergo cōceptionis, & quoniam omnes fere mulieres in eo ſuſulo viſitant, purgationes ſunt neceſſariæ. Quate conuenit curationem quoq; ſubiicere, qua menſes ob calidã intemperiem intercepti euocantur. Mulieres itaq; calidiores, & quæ plurimũ exercitantur,

Imperforata.

Signa.

Frigidioris intemperaturæ.

Calidioris intemperaturæ.

Curatio intemperaturæ frigida.

Tempora ſumendorum medicamentorum.

Calidioris intemperaturæ curatio.

- A**tur, quam maxime humectare oportet vberiore humidioresque cibo ac potu: quales pituitae & alicæ forbitiones sunt, & qui e carnis agni, huius, ac piscium teneras carnes habentibus, quibus adhibitis, lacte: aleribus, lactuca, cucurbita, &c. fructibus, sicut recensibus parantur. Vino autem vitendum ita candido, non admodum antiquo, & diluto. Balnes quoque aquarum dulcium: & ut in paucam contraham, victus ratione quæ hæc adhibetur. Porro si plenitudinis ratione, qua mulier laborat, menses detinentur, & nihil aliud prohibeat, a sanguinis missione curandi ratio auspicetur. Secunda vero vena malleoli aut poplitis, idque non ante statum mensium tempus. Neque etiam inutile erit, si cruribus cucurbitulæ affigantur. Vacuato sanguine putiones, quæ menses inouere possunt, fomentationes, balnea, inunctiones, & alia, quæ paulo post subiiciemus adnouēda. Sin plenitudo nulla fuerit, sed qui mensium profluvia morantur humores crassi ac pituitosi fuerint, initio victus ratio extenuandi præferenda, aliaque medicamenta, quæ prædictos humores incidere, & ad expulsionem faciliores efficere ac præparare possunt exhibenda, cuiusmodi est hoc decoctum, quod habet: *Radix acori, tria, perfoliatus, asparagi, singul. vnc. vnam. Seminum apii sanctuli, rufci, ausci, dauci, ammi, vrticæ, singul. drach. vnam. Calamintula, absinthii, variusque, manipulum semis. Origani, abrotani, artemisia, pulegi, asari singul. manipulum vnum. Hyssopi, manipulum vnum & dimidium. Cinnamomi electi, drachmas vna. Decoquantur singula in aqua iustæ quantitatē, donec tertia pars absunta fuerit. Dein colato transfusus, saccharo adiecto iuri decocti dulcedo concilietur, & alio oui purificetur, adiectis serapis de calamintula, de hyssopo, & de marrubio singul. vnc. vnam & dimidium, fiatque*
- C** potio, de qua quotidie in aurora detur pondus vnciarum quatuor. En ex huius purgatorum aliquod sumatur medicamentum, quale est *hierapiera, diaphanicon & indi compositio, catapota de agarico, ebenedicta, aut iis similia*. A purgatione mulieres sunt exercendæ, portitulum deambulationibus, & inferiorum partium frictionibus. Præterea fomentationes & balnea ex chamæmelo, arte nisi tenuifolia, mentaistro, & al. is, quæ in decocto præcedenti commemorauimus parata, adhibenda. Inunctio quoque fiat hoc vnguento, quod accipit: *Oleum lilieæ, ruscei, vtriusque vnc. vnam. Artemisia tenuifolia, pulegi, calamintula, singul. scrup. vnum. Ruta in iridi serap. singul. vnc. vnam & dimidium, fiatque serapis*. Cum cera quod latis est, fiat vnguentum. Post hæc medicamenta, quæ detentis menses euocant protinus, propter causam supra dictam, exhibenda quæ sunt myrrha, castoreum, baccæ lauri, rubia tinctorum, piperis, salvia, ruta, sanina, dictum vnum, & ista, & alia quæ paulo supra, & alibi nobis comprehensa sunt. Vnice autem hoc confert, quod habet: *Cystari, drach. vnam. Mentastri in puluerem redacti, drach. dimidium. Vinum veteris, aut mulsa vnc. quatuor*. Misceantur singula, & a balneo propinetur calidum. Benefaciet etiam decoctum pulegi, artemisia, rusce, cumini, dauci, saluie, anethi, ammi, feniculi, inulæ, & similia. Calamintula quoque in puluerem redacta pondere drachmarum duarum. Aut viua pondere vnius drachmæ in vino, aut mulsa, pota plurimum confert. Mirifice denique conducunt pastille myrrha. A blynthite autem vinum per totius curationis decursum bibendum. Pellis etiam in vterum demissis, necessitate ita exigente, vitendum, qualis est is qui accipit: *Triphera magna apii, expertis, drach. vnam. Ferina, tria, nigelle, rubia tinctorum, artemisia, pulegi, singul. scrup. vnum & dimidium. Succus ruta, vnc. duas*. Commixtis omnibus fingatur pellis, qui cum lana vel gossipio subdatur. Et hic qui habet: *Myrrha, bdelli, styracis, singul. drach. vnam. Calamintula, abrotani, absinthii, singul. drach. vnam & dimidium. Radix acori, rubia tinctorum, variusque drach. vnam. Semini nigelle, ruta arida, baccarum lauri, singul. scrup. duas. Sanina, drach. vnam. Castorei scrup. dimidium*. Redigantur singula in puluerem subtilissimum: & cum melle, aut triphera, aut mithridatio antidoto, quod sauis est excipiantur, & fiant pelli, qui mulieris pudendo inferantur. Mitionis pelli sunt ex *anserino, vel gallinæo adipē, saccharo rubro, & pauco croca*, quibus parum herbe mercurialis contulæ adiciatur, aut tantundem artemisia, vel sanina, & pulegi quandoque. Ac si validioribus opus erit, myrrham, bdellum, galbanum, styracem, aristolochiam, rubiam tinctorum, abrotanum, calamintula, resinam, cerebinthinam, & eiusmodi adicienda sunt, insidem prius contusis, ac ferico lineo, aut lineo tenui ad formam digiti humani inuolutis. Metrenchytris quoque vitendum. In quem usum vtero infundimus olea calida, nempe ierinum, lilieum, laurinum, & similia. Suffusæ etiam ex styrace, galbana, sture, bdello, radice aristolochie, artemisia, garyophyllis, cinnamomo, & similibus paratis vitendum. Quorum formulas in libris nostris de med. temp.

Vitiosum fuerit curatio.

Decoctum.

Purgatio.

Exercitia. Fomentationes.

Vnguentum.

Mitos euocantia.

Medicamentum.

Abynthite vnguentum. Pellis.

Alyth.

Metrenchytris.

monſtrauimus. Euaporandus denique vterus odoratis rebus, *maiorana, ſerpillo, calaminta, chamamela, pulegio, artemiſia, radice iridi,* & ſimilibus in olla decoctis: quam operculo perforato operire oportet, arundinemque aut alium canalem foramini inſertum vndique circumlinere, vt deinde ſedens mulier excepto canali foueatur. Proderit etiam, vt mulier huic decocto viſque ad vmbilicum inſideat, & inde peſſos paulo ante memoratis ſibi admoveat. Pinguiores mulieres viſtus ratione curabimus extenuante, exercitiis velocibus, aliſque medicamentis, quæ exilius corpus reddere poſſunt: vt eſt *aſſidua ventris deiectione, vnguenta euaporandi vim habentia, & ſimilia, quæ copioſe traduntur a Galeno naſtro lib. 14. Ther. meth. cap. 11. & lib. 6. de tuenda ſanitate.* Quæcunque vero propter gracilitatem non purgantur, ſive id per morbum, ſive alia tatione acciderit, eas primo reficere oportet, & corpori carnem per conuenientem viſtus tationem, aliæque medicamenta, quæ Galenus *ſecundum eam etate* recenſet, reſtituere. Si enim carnoſæ euaserint, bona ſpes erit menſes ſua ſponte erupturos eſſe. Quod ſi tamen non eueniet, tunc potionibus, ſomētis, & aliis medicamentis ſupra commemoratis eos euocabimus. Si vero menſes propter aliquod vteri vitium non profluxerint, principio malum, quod detentorum menſum cauſa, fuerit curabimus: quo curato, deinceps ad menſium prouocationem progrediemur. Curatio vero vitiorum vteri e ſuis locis petenda erit.

De redundantiſus menſibus. C. A. P. LIV.

Redundare menſes in mulieribus dicimus, quando vltra conſuetum tempus purgationis magna copia effluxerint. Tempus autem, id eſt, duratio menſium purgationis, nullum ſtatum ac ordinatum eſt. Multis enim ad duos treſue dies, haud paucis viſque ad quintum profluunt: aliis etiam, vt dictum eſt, ad ſeptimum viſque. Rariſſime ad duodecim viſque purgantur. Accidit autem, menſes ſupra modum profluere, propter aperta aut fracta vaſa, vel magna, vel parua. Aperiuntur autem vſu calidarum rerum, & erofione. Immodicæ etiam purgationes mulieribus oboriuntur, interim ob partus grandiores, quæ plerumque etiam ſponte ſua ceſſant. Crebro autem poſt abortus vehementiſſe laborant profluuiis, & præceps interdum periculum aſſert. Amplioribus vaſis ruptis aut aperiſtis, confirmiſſe ſanguis promanat. Minoribus vero aperiſtis, ſenſum, nec magna copia profluunt. Ab erofione, ſi accidit, non ſolum paulatim, verum etiam cum maximo dolore effluit. Porro quum immodice profluxerint menſes, color ſædus conſequitur, pedes molli tumore attolluntur, corporis robur proſternitur, viniatur ciborum, tum appetitus, tum concoctio: atque in totum omnia, quæ immodicam ſanguinis vacuationem, ſive ex hæmorrhoides, ſive alio quopiam ſanguinis fluore euenientem ſequi conſueuerunt. In primis igitur artus & extrema corporis, incipiendo ab aliis & inguinibus, vinculis excipere oportet. Cucurbitulas etiam, leues, magnas, ſubter mamillas, iuxta Hippocratis ſententiam aſſigere, conuenit. Cibis quoque & potionibus auſteris, atque adſtringentibus vtendum eſt, vt eſt *oriza, & ſimiles.* Aſiſis autem potius quam elixis vel ſcæta: carniſus maxime, quibus ſua pte natura deſiccandi facultas ineſt, vt auium montanarum, & agreſtium animalium. Motu & vino abſtinendum, ac pro eo adſtringente aliqua potione aqua pluuiali, in qua ignitum ferrum fuerit & ſtinctum, vtendum, aut poſca non quidem frigida, ſed tepida. Quum item forbile. Porro adſtringentia etiam medicamenta ſimplicia in potu propinanda, qualia hæc ſunt: *balauſthium, hypocyſthiſ, acacia, corallia, lycii, terra lemnia, galla, polygonum, ſymphitum, vtrung, hamatites, calycis glandium, plantago, oxyacantha, & ſimilia.* Compoſita ſunt ſerapia, roſaceum, myrtinum, paſtilli & ſuccino, & terra lemnia. Mirificæ autem in conſtringendis menſibus valent hæc catapotia, quæ accipiunt: *Terra lemnia, boli armenii, thuris, maſtiche, gallarum ſing. ſerap. duos. Sanguinis draconis, hamatitiæ, vtriuſque ſerap. vnum. Cornu ceruini viſti drach. vnam. Hypocyſthidis, acacia, coralliorum ruborum ſing. drach. dimidiam. Balauſthiorum, roſarum purpurearum, vtriuſque ſerap. duos. Succini, ſerap. vnam.* Excipiuntur ſerapio myrrino, & fermentum catapotia, de quibus pondus *drachma vnius, aut drachma vnius & dimidia* propinetur. Extrinſecus loca oleis, roſaceo, myrrino, cotoneorum, & vino auſtero foueantur, adhibeanturque vnguenta, emplaſtra, cerara, & epithemata adſtringentia, qualia multa ſupra in capitibus de *dysenteria, diarrhæa & lienteria diſta ſunt.* Inſeſſus etiam ex decocto paulo ante commemoratorum medicamentorum parati conueniunt. Vti etiam debemus iis, quæ per *metrencyſtas* vtero inſunduntur. In quem vſum mirifice commendatur ſuccus plantaginis, quo ſe Galenus quatuor

conti-

A continuis diebus delatum ab utero sanguinem cum nullo alio praesidio sisti posset, superfluisse scribit. Quantitas autem iniicienda, ad cyathi mensuram accedat. Idem possunt succi polygami, aut solani, aut hypocythidos, aut acacia, aut similes insecti. Pellulorum quoque vltus non contemnendus, inter quos is potissimum laudatur, qui habet: *Thuris, balsamio-rum, gallarum, sing. drach. unam. Gummi arabici, acacia, succini, cornu cervini vlt. sing. drachmas duas. Seminii plantaginis, myrtillorum sing. scrup. unum. Boli armeni scrup. duos.* Redigantur singula in tenuissimum pollinem, & lana rosaceo intincta excepta, in mulieris pudendum immittantur.

De fluore muliebri. C A P. LV.

B **V**teri fluor, qui Graecis *ἰσχυρὸν* dicitur, totius corporis expurgati diuturna est destitutio. Talem vero speciem id, quod euacuatur, representat, qualem humor in corpore superans. aliud enim rubrum, veluti sanguinis ichor, saniesque: aliud candidum, quod pituita sive boles est: pallidum aliud, quod biliolum: aliud vero aquosum, quod quidem serosum est. Atqui si sanguis purus, sicut in venarum dissectione effertur, attēdendum accurate est, ne quaedam in utero erosio sit excitata. His notis fluor deprehenditur. Locum continue madent humoribus, colore variantibus: laborans decolor est, cibum non sentit, eumque fastidit, obambulando difficulter spirat, oculos habet prætumidos, nūc cum dolore, nunc etiam citra illum, aut cum exulceratione, aut sine illa, aut inflammata ulceratione, aut sordida, aut pura. Causarum vero diuersitate, ex colore eorū, quae promanant, ut dictum est, dignosci licebit. Quod si rubro fluore mulier vexabitur initio, ubi etas & aëta permiserint, ad sanguinis missionem vertamur oportet. Si quidem multa incommoda sequerentur, si confestim sanguinis impetum localibus remediis reprimere conaremur: hydrops nimirum, neruorum vitia, aut oris ventriculi, aut capitis. Ablationem vero sicut in iis, quae sanguinem excreant, pariter oportet, ut paulatim prolixiori tempore auersio fiat. Secunda vero in gibbero vena erit. Post hæc lumina corporis vinculis deligandæ, & ea omnia ad mouenda, quae in contrarium fluxum auertere possunt. Quare conueniunt remedia omnia, quae capite præcedentia nobis dicta sunt. Vltus ratio vniueria sitastringens, & crassitudinem inferēs. Porus sit aqua, aut in virium defectu, vinum crassum & adstringens. Ceterum fluore albo, aut seroso infestante, initio quidem resistendum non est, ut aliena e corpore excernantur. Neque etiam præter rationem erit, quando quidem id, quod effluit, a pituita ortū habeat, si medicamentum, quod pituitam purgat, adhibeatur. Toti quoque corpori auxilia quae exsiccant, quum vitium ipsum humidum sit, ad mouenda. Exercitationes itaque, superiorum præcipue partium, & frictiones conducunt. Carnes etiam quibus desiccandi facultas inest, ut aues montanae, & agrestia animalia, deligandæ. In utero etiam mali, ea possunt exhiberi medicamenta, quae crassos humores extenuat, & subinde per vrinam educunt: vt sunt *asarum, feniculum, apium, & iis similis iam saepe commemorata.* Transacto principio utero moderate adstringentia applicanda, ut sunt rosaceum & cotoneorum oleum, & alia præcedenti capite comprehensa. Abstergentibus etiam medicamentis vtendum, ne scilicet ab humore effluente vlcera fiat. Quare aqua calida iugiter serosus humor abluendus. Post absterfionem sordium, oleum rosaceum, aut melinum, aut myrtinum illinendum. Pari ratione, ubi pallido fluore mulier laborauerit, initio non resistendum, sed medicamento bilem educente corpus purgandum. Dein reuulsioni studendum, aliisque medicamentis adstringentibus vtendum, nō neglectis etiam abstergentibus, quibus maxime propter effluentis humoris acrimoniam indigemus. Porro ubi fluor accesserit, a veloci deambulatione, a frictionibus abdominalis & lumborum multis, ab esu acrium, a calefacientibus & iis quae vrinā mouent, diu abstinere oportet.

De vterifafficatione. C A P. LVI.

Suffocatio seu strangularis vteri nihil aliud est, nisi *cinclus* ad superiora retractio. Graecis *ἰσχυρὸν* dicitur, quasi *vterina suffocatio* dicitur. Fit Galeno *lib. 6. de affectis locis, cap. 5. septe* obtensionem, quae creatur a plenitudine, quae ad menstruorum retentionem sequitur. Neque enim veluti animal errabundum, alias ad alium locum discurrit in mulieribus vterus, sed ab extensione retrahitur, ideoque fit ut tum intestina, tum ventriculus, item etiam septum transversum comprimatur, & spirationis difficultatē inducat. Accidit

ſigna.

etiam non raro, eodem teſte, propter cohibitu ſemen. Nonnunquam etiam ob reſſi-
 gerationem, quæ vtero tempore quo menſtrua effluunt purgationes euenit. Inter-
 dum etiam ob difficilem quempiam abortum, vel ubi quis ſanguinis eruptionem ab v-
 tero repente liſtere properauerit. Comitatur hoc vitio laborantes quum accellio propin-
 qua eſt, torpor mentis, pigritia, crurum imbecillitas, faciei pallor, aſpectus mor-
 tuus. Quum vero iam inſtat ſuffocatio, inclinatio ad ſonnum, deſipientia, detentio inſtru-
 mentorum ſenſus, vox obmuteſcit, cruraq; cõtrahuntur. Pulſus parui ac debiles ſiunt,
 ſæpe etiam penitus abolentur. Nonnulli quoq; ſpiratio, quæ ab ore ac naribus prodit,
 manente tamen ea, quæ in arteriis ſit, in totum intercipitur. Quum remittit vitium, cor-
 pus firmari incipit, rubefcere malæ incipiunt, oculi attolli & aperiri: Humiditas etiam
 quædã a locis muliebris atq; perceptibilis exeurrit, ac inſteſtina immurmurât, ipſeq;
 veteris paulatim laxatur, atque ſic ipſus mens, ſenſus, & motus redit. Ceteru malum hoc
 iuxta circuitus mouetur, perinde atque epilepſia: idque nimirum vtero, vt dictum eſt,
 repleto aut ſeminali, aut alia quæ in eo putreſcit materia. Vbi autem vterus ſua ipſius ra-
 tione laborauerit, pro quantitatis vel qualitatis ratione, tamen menſtruatorum tum ſe-
 minis, alias alia ſymptomatum ſpecies oriri ſolent. Etenim lædente cauſa vniuerſum
 corpus refrigerare potente, adeo vehementer inſrigidatur corpus, vt ſpiratio & arte-
 riarum pulſus ſenſu deprehendi nequeat. Quæ ſi vel craſſa fuerit, vel acris, conuulſio-
 nes: ſi vero atræ bilis naturam habuerit, morſtitiam inducet: quemadmodu animi quo-
 que deſectiones, & fortes exienſiones, & refrigerationes, & ſtomachi vexationem ſe-
 qui conſueuerunt. Superuenit id mali genus omni quidem tẽpore, ſed præcipue hye-
 me & autumno. Eoque magis cortipiuntur iuniores, & ad Venerem proclives, ſtemiles,
 præſertim ſi vi medicamentorum tales factæ fuerint. Præterea multæ ſe a malo hoc re-
 colligunt, nonnullæ vero in ipſis acceſſionibus ſubito, aut ſaltem intra paucas horas per-
 eunt: id quod accidit, ubi pulſus crebriores & inordinati ſiunt, ac ſubinde in totum abo-
 leſcit. Poſtremo frigidus & modicus humor ſuperficiem irrorat. In acceſſionibus igitur
 extrema deligare oportet, cumq; deligationibus erura tota, ac vniuerſum corpus per-
 fricare, & veluti animo deficientes recuperare. Ægrotam autem ceruicæ & ſcapulis ac-
 eluioribus collocare oportet, ſuoribus vero & inguinibus decluioribus. Naribus
 foetida admoventur, verbi gratia, ſeniculus luctra nuper exſtinctus, pluma præſertim perdi-
 cana, aut lana laciniæque combuſta, ſolia calcamentorum, aliorum aut ceporum cortices: capilli, præ-
 ſertim ſiſtulus agrotæ ſuſcit, cremati: vel capra cornu combuſtum, pox ſuper carbonem, eliquata, gal-
 banum, ſotumen, caſtorium, & alia eiufmodi. Reliquis deficientibus, matulam ex veteri lorio
 naribus adhibere licebit, aut pannos ſulphuratos veteres combuſtos. Inferius autẽ pu-
 denda ex odoratis ſuffiantur, ſylue nimirum, aloes ligno, cinnamomo, garyophyllis, & ſimilibus.
 Cucurbitulas quoque inguinibus & imo ventri, nequaquam vtero ſuper vmbilicũ, cum
 multa ſtamma, & leues affigere conuenit. Conſeſtim autem accedente acceſſione fo-
 menta, ac ſacculi calefacti imo ventri ac peſtini imponedi, quib. vix aliud in huius ma-
 li acceſſione præſentius auxilium reperies. Patabis autem eõſdem ex artemiſia vtraque,
 origano, betonica, chamamelo, calamintha, abſinthio, pulgrio ſeminibus lini, & ſmyrni, acque id
 genus alia. Quod ſi acceſſio prolongetur, etiam quæ illiſbus educendis conducunt, ſup-
 ponere oportet, quorũ omnium formulas & nomina o capitibus de vetriculi inſtatione,
 & coli doloribus, petent ſtudioſi. In vterum quoque tum vnguenta & olea odoratiſ-
 ſima inſundere oportet: vt eſt amaricinium, & quod ſpicaceum hodie appellatur, irinum, &
 ſimilia. In hæc etiam obſtetrix digitos intingat, aique ſubinde vltque ad vteri os immit-
 tat, leniter & multum defricans, vt eo irritamento craſſus humor excernatur. Præter-
 ea mulier etiam maximis vocibus excitetur, propriumque nomen inſclametur. Hoc
 etiam tempore ea ſunt admoenda, quæ ſternutationes excitant: vt eſt ſtruthium, caſſi-
 reum, piper & ſimilia. Sunt qui inſeſſionibus ex decocto baccharum ſoliorumque lauri, pulgri,
 calamintha, artemiſia, marrubii ſeuina, althea, chamameli, ſerpilli, prudu, ariſtolochia, & ſenograti
 paratis vtendum eſſe putent. Inſeſſionum tamen tempore cerebri curam non omittimus,
 ſed toſaceo & aceto caput irrigabimus. Ego tamen fomētis & ſacculis potius quam in-
 ſeſſionibus vtẽdum eſſe iudico, præſertim quum vt plurimum, quamvis velis maxime,
 inſeſſionibus in hoc vitio locus non ſit. Vbi acceſſio quieuerit, ad vomitum cogantur.
 Omnes enim vomitus leuat, ſed eas præſertim quæ a cibo inſeſtatur. In tertio die, lum-
 bis &

Cautio,

Quæ in ac-
ceſſione fa-
cienda,

ſacculi.

Quæ poſt
acceſſione
ſtam agi-
da.

- A** bis & alijs cucurbitulz cum scarificatione applicentur. A septimo die purgatione vtendum ex hiera de colocynthide, aut catapocis de agarico. mox ad castorei portionem veniendum, quod iugiter potum ab hoc vitio protinus liberat. Dandum autem singulis diebus ad *drachma vnius pondus*, interdum cum mulla, interdum eura artemisiz decocto, nunc eum vino tenui. Hoc sane tempore potius quam in accessione, vt dictum est, in sessionibus & pessis emollientibus ex adipe anserino, styrace, mastiche, amoniac, & similibus compositis vti licebit. Vterus quoque is, quz calfaciendi, statumque educendi vim obrinent, sufficiens. Si autem huius potissimum sufficiens vsus, qui habet *Pastillorum gallia & alipta meschata, vtriusque drachmam vnam & dimidium. Styracis, drachmas tres. Geryophyllorum, maceris, vtriusque drachmam vnam. Ligni aloes, scrupulos duos. Cinnamomi selecti, foliorum lauri, vtriusque drachmas duas. Ladani, unciam vnam & dimidium. Trita in poluere excipiantur stacte, & inferuntur pastilli pro suffitu.* Pastilli pro suffitu.
- B** Cibo interea & potu paucis admodum contenta sit mulier, totaque victus ratio exsiccatoria sit. Atque hæc curatio in huius vitii accessionebus adhibenda. In totius vero corporis restitutione, potissimum vbi malum diuturnum fuerit, plerumque a sanguinis missione inchoandum, præsertim si mensitruæ purgationes detineantur. Deinde ad purgationem ex hiera picra transeundum. Peracta vacatione, cucurbitulz leues quidem, sed cum plurima flamma affigendæ, & violentè detrahendæ. Interdum etiam loca scarificanda, & scarificata sale inpergenda, deinde conuenientibus medicamentis ad cicatricem ducenda. Nec inutiliter linapifini, & dropacæ ex *euphorbio, pyrethro, pipere & synapi* constructi applicantur. Non parum etiam recta victus ratio opitulatur, nempe de ambulationes maturioræ, gestationesque vel in curru, vel in nani, vel iumento. A gestationis motu vociferatio, & lectio clara & concinna vtilis est. Vinctio præterea, frictio, & ex conuenientibus interuallis repetita, eisdem conueniunt. Balneum aquæ dulcis rariius, & non nisi sordium abstergendarum gratia admittendum. Balneis autem naturalibus vti optimè est, atque adeo postremum quasi confugium. Præ ceteris autem conueniunt, quæ sunt in Badenia, Marchionis. Porro si ob cohibitum semen vteri præfocatio euenit, post sedatam accessione, ea quæ semen corruptum ex vtero deducunt medicamenta adhibenda erunt.

De vteri procidentia. CAP. LVII.

- D** Procidere vterum dicimus, quando ita eueritur, vt exterius emineat. Neque enim vterus, vt imperiti suspicantur, a suis solatus propaginibus totus prolabitur & excidit: nam si ita procideret, restaurari haud posset. Quamquam autem vterus raro procidat, nihilominus tamen multæ sunt procidentiz eius causæ. Ab alto enim delapsa mulier, si in coxas deciderit, membranæ quæ vterum continent, ac vicinis partibus connectunt, ruptis, eo vitio corripitur. Accidit etiam nonnunquam, vt in difficili partu procidat vterus, propter secundæ scilicet violentæ extractionem, quam vterus qui illi adhereret, sequitur. Nonnunquam propter negligentem aut inartificiofam sortem, præsertim mortui, extractionem. Præterea ob ictum, vel immensæ ponderis eleuationem, vel animi vehementiorem perturbationem, filiorum nimirum interitum, aut hostium accessum, vel ob periculofam navigationem, aut eiusmodi aliquâ causam, omni eo quod in toto corpore concretum est soluto, atque adeo vtero quoque simul prolapsa. Interdum etiam hoc vitium citra iam dictas causas accidit, tota corporis mole soluta propter resolutionem, aut partium, membranarum scilicet & musculorum, imbecillitatem: id quod senescentibus maxime euenire solet. Procidit sæpe vterus propter humoris plurimæ tenacis defluxum, partuumque frequentiam laxatis ac solutis appendicibus. Procidit autè potissimum secundum os eius, & quod procidit ouo struthiocameli simile est, maioris tantum & minoris ratione differens. Notis pluribus nihil opus est, quod causarum diuersitas partim ex corporis constitutione, partim etiam de ægrotantis, & assidentium sermonibus cognosci queat. Quum vitium adhuc recens est, studendum vt vterus inferatur, ac in suum reponatur locum. Siquidem initio repositioni prompte pareat, & locatus perseuerat, præcipue si ætas conuenierit. Nam in proeuctioribus vterus quidem reponitur, sed rursus qualibet leui causa relabatur. Conuenit igitur, si in recto intestino feces & stercore dura fuerint, vt clysteri educantur. Simili modo si in vesica locum collectum fuerit, per cathete-

Castorei
potus.Pastilli pro
suffitu.Victus ratio.
Totius corporis curatio.

Vides.

Si ob cohi-
bitum semen
accidit.

Procidentia vteri.

Quædam.

Signa.

Curatio.

ſigna.

etiam non raro, eodem teſte, propter cohibituſe men. Nonnunquam etiam ob reſtri-
 gerationem, quæ vtero tempore quo menſtrua effluſerunt purgationes euenit. Inter-
 dum etiam ob difficileſcem quæſpiam aborſum, vel ubi quilibet ſanguinis eruptionem ab v-
 tero repente ſiſtere properauerit. Comitatur hoc vitio laborantes quum accēſſio propin-
 qua eſt, torpor mentis, pigritia, crurum imbecillitas, faciei pallor, aſpectus mœſtus.
 Quum vero iam inſtat ſuffocatio, inclinatio ad ſomnum, deſipientia, detentio inſtru-
 mentorum ſenſus, vox obmureſcit, cruraque cōtrahuntur. Pulſus parui ac debiles ſunt,
 ſæpe etiam penitus abolentur. Nonnullis quoque ſpiratio, quæ ab ore ac naribus prodit,
 manenteramen ea, quæ in arteriis ſit, in totum intercipitur. Quum remittere vitio, cor-
 pus firmati incipit, ruſcere malæ incipiunt, oculi attolli & aperiri: Humiditas etiam
 quædā a locis muliebribus tactu perceptibilis excurrit, ac inſtina immurmurāt, ipſæ
 vterus paulatim laxatur, atque ſicciſſis mens, ſenſus, & motus redit. Ceterū malum hoc
 iuxta circuiſus mouetur, perinde atque epilepſia: idque nimirum vtero, vt dictum eſt,
 repleto aut ſeminali, aut alia quæ in eo putreſcit materia. Vbi autem vterus ſua ipſius ra-
 tione laborauerit, pro quantitatſis vel qualitatis ratione, tamen menſtruorum tum ſe-
 minis, alias aliz ſymptomatum ſpecies oriri ſolent. Etenim lædenre cauſa vniueſum
 corpus refrigerare potente, adeo vehementer infrigidari corpus, vt ſpiratio & arte-
 riarum pulſus ſenſu deprehendi nequeat. Quæ ſi vel craſſa fuerit, vel acris, conuulſio-
 nes: ſi vero atræ bilis naturam habuerit, mœſtitiā inducet: quemadmodū animi quo-
 que deſectiones, & fortes extenſiones, & reſtirationes, & ſtomachi vexationem ſe-
 que conſueverunt. Superuenit id mali genus omni quidem ſæpore, ſed præcipue hye-
 me & autumno. Eoque magis corripuntur iuniores, & ad Venetæ prodiues, ſteriles,
 præſertim ſi vi medicamentorum tales factæ fuerint. Præterea multæ ſe a malo hoc re-
 colligunt, nonnullæ vbi in ipſis accēſſionibus ſubito, aut ſalutē intra paucas horas per-
 eunt: quod accidit, vbi pulſus crebriores & inordinati ſunt, ac ſubinde in totum abole-
 ſcit. Poſtremo frigidus & modicus humor ſuperficiem irrorat. In accēſſionibus igitur
 extrema deligate oportet, cumque deligationibus cura tota, ac vniueſum corpus per-
 fricare, & veluti animo deficientes recuperate. Egrotam autem ceruicæ & ſcapulis ac-
 chluſionibus collocae oportet, ſuſmoribus vero & inguinibus deditionibus. Naribus
 foetida admoſueant, verbi gratia ſaniculus lucerna nuper exſtinctus, pluma præſertim per di-
 eana, aut luna ſaciniæque combuſta ſolia calciamentorum, aliorum aut ſeparim cortices capilli, præ-
 ſertim ſi ſupius agrotæ fuerint, ſeremati: vel capra cornu combuſtum, pice ſuper carbonib. eliquata, gal-
 banum, buſum, caſtorium, & alia eiſmodi. Reliquis deficientibus, marulam ex veretiliotio
 naribus adhibere licebit, aut pannos ſulphuratos veretres combuſtos. Inferius aurē pu-
 denda ex odoratis ſuffiantur, ſyrace nimirum, aloes ligno, cinnamomo, garyophyllis, & ſimilibus.
 Cucurbitulas quoque inguinibus & imo ventri, nequaquam vero ſuper vmbilicū, cum
 multa ſtamina, & leues affigere conuenit. Confeſſum autem accēdenre accēſſione ſo-
 menta, ac ſacculi calefacti imo ventri ac pectini imponēdi, quib. vix aliud in huius ma-
 li accēſſione præſentius auxilium repeties. Parabis autem eodē ex artemiſia vtraque,
 origano, betonica, chamamelo, calamintha, abſinthio, pulgrio, ſeminibus lini, & ſmyrni, æque id
 genus alii. Quod ſi accēſſio prolongetur, etiam quæ ſtatibus educendis conducunt, ſup-
 ponere oportet, quorū omnium formulas & nomina & capitibus de vetriculi inflati-
 one, & coli doloribus, petent ſtudioſi. In vterum quoque tum vnguenta & olea odoratiſ-
 ſima infundere oportet: vt eſt amaricinum, & quod ſpæcerum hodie appellatur, irinum, &
 ſimilia. In hæc etiam obſtetrix digitos intingar, atque ſubinde vique ad vteri os immit-
 tat, leniter & multum deſicans, vt eo irritamento craſſus humor excernatur. Præter-
 ea mulier etiam maximis vocibus excitetur, propriumque nomen inſclametur. Hoc
 etiam tempore ea ſunt admoſuenda, quæ ſternutationes excitant: vt eſt ſtrubium, caſte-
 renum, piper & ſimilia. Sunt qui in ſeſſionibus ex decocto baccarum ſolarumque lauri, pulgrii,
 calamintha, artemiſie, martubii, ſanina, altheæ, chamameli, ſerpilli, pridi, arſtrolechæ, & ſanograci
 paratis utendum eſſe putent. In ſeſſionum tamen tempore cerebri curam non omitemus,
 ſed roſaceo & aceto caput irigabimus. Ego tamen ſomētis & ſacculis potius quam in-
 ſeſſionibus vtēdum eſſe iudico, præſertim quum vt plurimum, quamvis velis maxime,
 in ſeſſionibus in hoc vitio locus non ſit. Vbi accēſſio quæuerit, ad vomitum cogatur.
 Omnes enim vomitus leuat, ſed eas præſertim quæ a cibo inſeſſantur. In tertio die, lum-
 bis &

Curatio.

Que in ac-
ceſſione fa-
cienda.

ſeculi.

Que poſt
acceſſione
ſtatum agi-
da.

F

- A** bis & aliis cucurbitulæ cum scarificatione applicentur. A septimo die purgatione utendum ex hiera & colocynthide, aut catapotis de agarico. mox ad castorei potionem veniendum, quod iugiter potum ab hoc vitio protinus liberat. Dandum autem singulis diebus ad *drachma unius pondus*, interdum cum mullâ, interdum cum artemisiz decocto, nunc cum vino tenui. Hoc sanæ tempore potius quam in accessione, vt dictum est, in sessionibus & pëssis emollientibus ex adipe asserino, styrace, mastiche, amoniaco, & similibus compositis vti licebit. Vterus quoque iis, quæ calfaciendi, flatumque educendi vim obtinent, sufficiens. Si autem huius potissimum suffitus vsus, qui habet: *Pastillerum gallia & alipta masticata, utriusque drachmam unam & dimidium, Styracis, drachmas tres, Garryphylorum, maceris, utriusque drachmam unam. Ligni aloes, scrupulos duos, Cinnamomi selecti, foliorum lauri, utriusque drachmas duas. Ladani, unciam unam & dimidium. Triza in puluerem excipiantur stacte, & in formam pastilli pro suffitu.* Cibo interea & potu paucis admodum contenta sit mulier, totaque victus ratio exsiccatoria sit. Arque hæc curatio in huius vitii accessionebus adhibenda. In totius vero corporis restitutione, potissimum vbi malum diuturnum fuerit, plerumque a sanguinis missione inchoandum, præsertim si menstruz purgationes detineantur. Deinde ad purgationem ex hiera picra transeundum. Peracta vacatione, cucurbitulæ leues quidem, sed cum plurima flamma affigendæ, & violentè detrahendæ. Interdum etiam loca scarificanda, & scarificata sale inspergenda, deinde conuenientibus medicamentis ad cicatricem ducenda. Nec inuuliter sinapismi, & dropaces ex *euphorbia, pyrethro, pipere & synapi* constructi applicantur. Non parum etiam recta victus ratio opitulatur, nempe de ambulatione matutinæ, gestationeque vel in curru, vel in naui, vel iumento. A gestationis motu vociferatio, & lectio clara & concinna utilis est. Vinctio præterea, frictio, & ex conuenientibus intervallis repetita, eidem conueniet. Balneum aquæ dulcis rarius, & non nisi sordium abstergendum gratia admittendum. Balneis autem naturalibus vti optimum est, atque adeo potestremum quasi confugium. Præ ceteris autem conueniunt, quæ sunt in Badenia, Marchionis. Porro si ob cohibitum semen vteri præfocatio euenit, post sedatam accessione, ea quæ semen corruptum ex vtero deducunt medicamenta adhibenda erunt.

De uteriprocidentia. CAP. LVII.

- P**rocidere uterum dicimus, quando ita eueritur, vt exterius eminet. Neque enim vterus, vt imperitii suspicantur, a suis solutus propaginibus totus prolabitur & excidit: nam si ita procideret, restaurari haud posset. Quanquam autem vterus raro procidat, nihilominus tamen multæ sunt procidentiz eius causæ. Ab alto enim delapsa mulier, si in coxas deciderit, membranæ quæ vterum continent, ac vicinis partibus connectunt, ruptis, eo vitio corripitur. Accidit etiam nonnunquam, vt in difficili partu procidat vterus, propter secundæ scilicet violentâ extractionem, quam vterus qui illa adhæret, sequitur. Nonnunquam propter negligentem aut inartificiosam foetus, præsertim mortui, extractionem. Præterea ob ictum, vel immensæ ponderis elevationem, vel animi vehementiorem perturbationem, filiorum nimirum interitum, aut hostium accessum, vel ob periculosa navigationem, aut eiusmodi aliquâ causam, omni eo quod in toto corpore concretum est soluto, atque adeo vtero quoque simul prolapsio. Interdum etiam hoc vitium circa iam dictas causas accidit, tota corporis mole soluta propter resolutionem, aut partium, membranarum scilicet & musculorum, imbecillitatem: id quod senectutis maxime euenire solet. Procidit sæpe vterus propter humoris plurimi ac tenacis defluxum, partuumque frequentiam laxatis ac solutis appendicibus. Procidit aut potissimum secundum os eius, & quod procidit ouo struthiocamelæ simile est, maioris tantum & minoris ratione differens. Notis pluribus nihil opus est, quod causarum diuersitas partim ex corporis constitutione, partim etiam de ægotantis, & assidentium sermonibus cognosci queat. Quum vitium adhuc recens est, studendum vt vterus inferatur, ac in suum reponatur locum. Siquidem initio repositioni promptè paret, & locatus perseverat, præcipue si ætas conuenient. Nam in profectionibus vterus quidem reponitur, sed rursus qualibet leui causa relabatur. Conuenitigitur, si in recto intestino feces & stercorea dura fuerint, vt clysteri educantur. Simili modo si in vesica lotium collectum fuerit, per cathete-

rem euocetur, vt vndiquaque vterus sit liber. Euenit enim alias, vt eorum detentione vterus, qui inter vtrunque, rectum inquam intestinum & vesicam medius statuitur, compressus, & intra locorum angustias coactus, in prolapsu suo impediatur, ne repellatur & in proprium situm reduci queat. His autem rebus peractis, agram supinam figurare oportet, vt coxas habeat sublimiores, poplites flexos, cruribus inuicem dilatatis & diuicatis: deinde prolapsam vteri partem oleo tepido, vel butyro, vel malua, alibea, semograci, seminis lint, aut similibus decocto affatim fouentes, conuoluram lanam præparabimus, figura ex crassitudine sinui muliebri proportionalem, tenui & puro luteo exterius circumdatam: ac deinceps in succum acaciz, vel hypocistidis vino dilutis mersam vtero inferemus, & citra violentiam ac sensum totum, quod procidit sursum torquebimus, quoad integer in sinu tumor excutitur, & vterus in proprium reponatur locum. Deinde alium lanæ salsum vino adstringente imbutum superponemus. Extrinsecus autem pubem sponsia in posca expressa operiemus. Mulier vero iacebit extensis adaptatissimeque inuicem crunibus, vt alterum alteri incumbat. Turtius tamen erit pedes simul vinciri, fasciam vsque ad genua deducendo. At si prolapsus vterus temporis diuturnitate intumuerit, plurimoque humore infartus fuerit, ita vt tumor reductionem impediat, betarum decocto irrigabimus: deinde acetum circumfundemus, saleque tenuissimum inspergemus: & vbi detumuerit, sicut dictum est, reponemus. Deinde cucurbitæ cum flamma copiosiore, vmbilico & vtriusque ilibus affigendæ. Naribus odotata iugiter admouenda, inferne vero quæ grauem odotem habent. Tercio die lana adhuc in sinu persistente, mulier in vino nigro austero, modice tepido, aut in decocto myrri, rubi, malicorii, radices bistortæ, & similibus insidebit. Hisperactis, rursus supina ac cliuius coxis locabitur, sublataque e sinu prior lana, altera in locum prioris eodem medicamento madefacta imponitur. Cataplasmata etiam & emplastra extrinsecus imo ventri ex palmulis, malicorio, lenticula, & similibus composita imponantur. Cerara etiam ex mastiche, ligno aloet, laudano, thure, junco odorato, acore, nucis moschata, gummi, tragacantha, & eiusmodi medicamentis parata conueniunt. Singulis vero tribus diebus hæc vsque ad perfectam curationem permutantur. Toto etiam curationis tempore mulier motum, & ea quibus sternutatio excitatur, euitet. Ceterum vterus ab infernis, scetidis rebus sufficiens est: naribus autem odoratissima, vt dictum est, sunt adhibenda, quod is odorata sequatur, scetida contra refugiat. Cibi etiam boni succi, & vina odorata offerenda. Venter etiam liniendus ac lubricandus, ne si cum difficultate sit egerendum, simul vterus procidat. Cauendum tamen vnice, ne venter nimium subducatur: exsoluitur enim, relaxanturque propinque partes, & vteri loca procidunt. Porro, si pars vteri prolapsa temporis diuturnitate propter incuriam putruerit, obque assiduam vrinæ irrigationem & sordes inherentes exulcerata fuerit, amputandum, aut inurendum, quod inutile fuerit, nullius metu periculi. Constat enim, Pauli etiam testimonio, totum vterum, eo quod computruerat, ablatum fuisse, ac mulierem superuixisse.

De Mola. CA P. LVIII.

- Mola quid.** **M**OLA, hoc est, molam, Aetius & Paulus vocant *induratum tumorem, interum in vteri ostio, interum in toto ipso prominentem, ad tactum fere lapideum*. Galenus autem *libr. 14. Ther. meth.* molam definit esse *carneem informem*. Paulus adicit *tunicis vuluæ adhaerescenctem, ac factus modo in lucem edi*. Nomen a difficultate motus accepit, quam sane quæ hoc vitio premuntur mulieres sentiunt. Informis vero recte dicitur, quod nullius animalis formam habeat. Fit a seminis muliebris, & plurimi sanguinis menstrui crassi in vteri cavitare retentione & affluxu, quem calor immodicus cogit, ac in carnis formam transmutat. Consequitur hoc virium tumor durus cum hypochondriorum contractione, corporis fragilitate, decoloratione, appetentiz deiectione, mensumque suppressione. Item in hoc vitio mamillæ intumescunt, vt conceptionis veræ quibusdam per initia suspicio suboritur. Temporis vero progressu discernuntur: molam enim punctiois sensum inferens dolor subsequitur, nec in ea motus vllus, sicut in conceptione percipitur. Nonnullæ vero præbent aquæ inter cutem suspicionem, a qua tamen vitium hoc distinguitur, quod tumor durus sit, neque sicut in hydrope manuum aut digitorum impulsu cedat, aut excauetur, aut tympani modo sonum edat. Nonnunquam tamē tempore procedente

- A**cedente febre refrigeratur, & hydrops superuenit. Vitium hoc magna ex parte infanabile est, nisi initio remedia adhibeantur. Vtunque tamen accidat, curatio negligenda non est, sed omnia quæcunque conuenite videbuntur, adhibenda. Pitum vero omnium alimenta boni succi offerenda, ac vini potione vtendum moderata. Mulier vehementi motu non vtatur, is enim fluxionem commouet: sed potius gestationibus, deambulationibus, & balneis. Pedes quoque decumbendo elatiores habeat. Interea ubi plenitudo affuerit, vena gibberi incidenda erit, ac subinde purgatione per catapota scitida vocata vtendum. Corpore vacuato, cataplasmata, fomenta, incisiones, pessi, vnguenta, & cerata quæ relaxandi vires habent, ad mouenda: qualia sunt, quæ ex albea, malua, chamæmelo, melisso, sanograce semine lini, & similibus parantur. In hunc vsum non aliena erit vnguenti dialtheæ, aut emplasti diachilon simplicis admotio. Vel adhibeatur hoc quod accipit: Olei amygdalorum dulcium drachmas tres. Olei lilieci, drachmas duas & dimidium. Pinguetinis anseris & gallina, vtriusque drachmam vnam & dimidium. Lentis cremoris seminis lini & sanograce, vtriusque drachmam vnam. Ammoniaci, bdelli, vtriusque drachmas duas. Radicis albea, seminum nigella & danci, singulorum scrupulos duos. Cere quod satis est, singulat vnguentum, gummi in vino prius dissolutis. Pessi quoque subiciendi ex barys, adipe porcino, medulla cerasina, passulis, cortice pinguis, seminis lini & sanograce, confecti. Post hæc, quæ menses euocare possunt, propinanda medicamenta. In quem quidem vsum præter ea quæ in cap. de suppressis mensibus commemorauimus, conuenit hoc medicamentum, quod habet: Specierum diacinnamomi, diagalange, diacuminis, singulorum drach. m. dimidium. Specierum diambæ, scrupulum vnum. Specierum dialtheæ, scrupulum dimidium. Cinnamomi selecti, hyperici, calami odorati, asari, radicis acori seminis anisi, singul. scrupulum vnum. Seminum rutæ, xaniberis, artemisii, marrubii, dictamnii, saluæ, singulorum scrupulum dimidium. Sacchari dissoluti in liquoribus stillatiui artemisii & hyperici, quod satis est tingantur mortuli, de quibus quotidie pondus duarum aut trium detur drachmarum. Proderit etiam hunc subicere pessum, qui habet: Radicum asari, acori, rubia tinctorum, singulorum drachmas duas. Seminum rutæ, nigellæ, vtriusque drachmam dimidium. Meioranæ, nucis moschata, garyophyllorum, baccarum lauri, sing. drachmam vnam. Sæuinæ scrupulum vnum. Castorei, euphorbii, vtriusque scrupulum dimidium. Tufis & cribratis illis, quæ opus est, cum terebinthina resina formentur pessi. Quid multa? vtendum medicamentis relaxantibus & dissoluentibus sanguinem concretum: Sic enim plurima sanguinis attri & grumescens exsiccior sequetur. Mitificæ etiam ad huius vitii amolitionem, potissimum ubi diuturnum fuerit, vt confert balneis naturalibus, & per se natis, quibus dissoluedi ac discutiendi facultas inest. Porro multa etiam remedia huc ex capitibus de aqua inter eadem, transferenda erunt.

De phlegmone vteri. CAP. LIX.

- V**terus plurimis de causis phlegmone corripitur, nempe istu, mensiu retentione, laboru, vlceratione, cœcubitu meras rationis excedente, sellæ nimis duræ in sessione, longissima, intensissimaque deambulatione, sæpe etiam transpiratione, propter frigoris, prohibita. Comes phlegmone vteri est febris acuta, dolor capitis, pubis & lumborum, & radicis oculorum: brachialis, digitoru & colli conuulsio, & in aduersum declinatio: stomachi ex cœsortio dolor, oris vteri coniuenda: pulsus exigui crebrique. Si languida fuerit phlegmone, haud valida prædicta symptomata erunt, maioriq; dolore vterus afficietur. Sin vehemens, & ipse torus pullatilis dolor percipit, omniaq; symptomata vehementia erunt. Vniuerso aut vtero phlegmone laborante vndiquaq; dolebit: parte vero eius aliqua phlegmone obfessa, in ea dolor magis intèditur. Nā si posteriora ipsius phlegmone corripuntur, dolor lumbos magis vexabit, durumque iterus detineat, quod tum rectum intestinum admodum comprimatur. Si anteriora, dolor pubem occupat, & vrinx stillicidium aut difficultas, vesica expressa, excitatur. Lateribus autem phlegmonem expertis, inguina tenduntur, & crura grauantur, ac difficulter moventur. Quum autē os vteri phlegmone affligit, in abdomine dolor est, digitorumque immisso os occurrit durum, rigidum, clausum & feruidum. Initio itaq; curatioem aggressi, si neque ætas, neque habitus corporis, neq; anni tempus obstitit, neq; phlegmone post abortum, aut immentam sanguinis vacuationem superuenerit, venam po-

168 Operum Leonhard. Fuchſii Pars III.

plitis aut malleoli ſecabimus: idque ex Galeni traditione, qui in libro *de curandis ratione* *per ſanguinis miſſionem*, vteri phlegmonem a venis in crute ſectis magis, quam in gibberis ſuauiter ſcribit. Nam vena illa non ſolum ab vtero reuellunt, verſo etiam vacuant, quod in omnibus internis phlegmonib. maxime requiritur, *vt alibi copioſius diximus*. Aegram ſubinde in domicilio obſcuro, & moderate calido ſeu tepido collocabimus, quietem impetantes, ac erura eius ab omni motu prohibentes. Deinde attus & extrema perſcribamus, vt fluoris ad vterum impetum auertamus. In cibo, qui quantitate modicus ſit, vtendum ptiſanæ cremore, & ouis forſibilibus, vno tamen die interpoſito. Poru vini abſtinendum, ac pro eo vtendum iure decocti cinnamomi, aut aqua calida. Alius quoque, præcipue vbi ſua ſponte non deiecerit, leuib. & emollientibus clyſteribus eluenda, & vacuanda. Extrinſecus lana ex oxyrhodino madefacta, publi & lumbis imponenda. *Palmita quoque, aut mala cotanea, in vino aſtetro decocta, & roſaceo admixta, admouenda*. Item ſuccus ſemperniui, vinum aſtetrum, ſarina hordei, balauſtia, & mali granati cortex. Cataplaſmata etiam ex farina ſeminum lini, ſenograci, meliloto, plantagine, leucis, polygono, portulaca ſedo, & ſimilibus compoſita, adhibenda: idque potiſſimum, ſi et tyſipelatis naturam phlegmono forſita ſit. Lana denique cum roſa, eo, aut melino oleo, aut ſucco portulacæ, aut ſedi madefacta, in vteri ſinum immittenda. At vbi phlegmone declinare ceperit, ad ea veniendum, quæ quadantenus remittendi diſcutiendique vires habeant. Aegrotam igitur in ſenograci, altheæ, ſeminis lini, maluæ, interdum etiam artemiſiæ, marrubii, & ſaluiæ decocto, vique ad lumbos ſedere iubebimus. Pubi quoque & lumbis hordeaceam ſarinam cum ſenogracio, & ſemine lini in muſſa elixatam, aut caricarum decoctum illinimus. Peſſi quoque ſubiiciendi ex butyro, medulla ceruina, adipæ aſtetro, gallina, & ſimilibus parati. Vbi curatio proceſſerit, varius magis cibus & leuior vitæ erit. Et quidem in manifeſta declinatione ad balneum etiam ducantur ægrotantes, vinumque aquoſum maxime & tenue detur.

De inſuſione vteri. C. A. P. LX.

Cauſa. Inflatur vterus ex frigore, vel humoribus in eo corruptis, vel ex abortu, vel difficili partu oſtiolo eius conſtante, aut grumo in ipſo obſtruyente. Flatus vero ſæpe in concauo ipſius ſpatio colligitur, ſæpe in ſinu, qui ſenſui patet, nec raro in rariotibus ſenſuque non patentibus partibus corporis ipſius vteri. Vitium hoc ſequitur tumor imi ventris cum dolore & dolore punitionis ſenſum inferente, qui vique ad ſeptum tranſuerſum & ſtomachum peruenit: ac nihilominus vtrinque in lateribus extenditur, ſæpeque alteri inguini, interdum vtrique, interdum & vmbilico lumbiſque ac peſtini dolor communicatur, cui caput quoque aſſentitur. Nonnunquam ſtatus per muliebre pudendum erumpit, & ab ægra percipitur. Si itaque ſtatus in vteri cavitæ collectus fuerit, mutumura & ſonitus quidam in corporis flexu audiuntur, quales in teſtibus accidunt, quæ torminibus vexantur, impulſuque digitorum ſonus tympani modo redditur. At vbi ſtatus in rariotibus vteri meatibus continetur dolores vehementiores, ac curatu difficilioreſ inſeſtant. Auxiliatur huic malo primum, niſi ætas, regio & anni tempus obſtiterint, corporiſque plenitudo ſi aſſuerit, ſanguinis miſſio, inedia, & purgatio ex hiera picra Galeni.

Localia. Quibus peractis, fomentis & inunctionibus ex oleo rutaceo, aut oleo in quo anethum decoctum ſit, vtendum. In teſtibus præterea ex decocto ruta, pulgii, ſalaminthe, marrubii, artemiſiæ, altheæ, & ſimilibus paratæ. Cataplaſmata quoque adhibenda ex ſemine apii, ſaniculi, carei, cumini, ſmyrni, dauci, aniſi, lotuſar. na, & ſimilibus. Vtero etiam inſundenda, quæ laxandi, flatulque diſcutiendi vires habent, vt eſt oleum rutaceum, ammi, origani, & paulo ante commemoratorum decoctum. Et ſi ſtatus tumorum cauſa includantur, poſt prædictorum, inſeſtionum maxime vſum, obſtetrix digitum ptius perundum in pudendum muliebre inferat, ac grumum ſenſim ac leniter diſſoluat & educat. Quod ſi diutius ſe vitium protogauerit, ad efficaciora remedia veniendum erit. Quare vtendum linimentis, emplatris & ceratæ paulo vehementioribus, quale eſt quod habet: *Abrotani, origani, ſalaminthe, ſingul. drach. duas. Seminis agni ſerp. duas. Centaurii minoris, drach. vnam. Seminum carei, ammi, vtriuſque drach. dimidiam. Caſia ſerp. vnum. Bdelli, ammoniaci, vtriuſque drach. vnam & dimidiam. Olearum rutacei & anethini, vtriuſque vnc. vnam.* Cum cæta & terebinthina reſina, quod latius eſt, inſormetur ceratum, quod vtero adhibeat. Interdum etiam vique ad dropaces ac ſinapiſimos progrediendum. Cucurbitæ etiam

A etiam locis in ambitu leues, & quæ violenter auellantur, affigendæ. Nam hæc incantamenti cuiusdam simile, ut nunc sæpe dictum est, efficiunt. Interdum etiam scarificatio adhibenda est. Omninoque iis utendum, quæ vim habent ex alto in summum euo candi. Alimenta quoque attenuantia, & flatum discutientia exhibere oportet, necnō medicamenta quæ idem possunt, ut dianisi & diacumini, ac diacalamentis anedota, & alia quæ in capite de ventriculi inflatione expolita sunt.

De vteri exulceratione. CAP. LXI.

Exulceratur Interdum vterus propter difficilem partum, aut fœtus extractionem, aut eiusdem corruptionem, aut ex acris medicamentis, aut fluxione, aut abfessibus disruptis. Hoc viti affecti in laborante parte dolorem punctiorum percipiunt, signaque ex interuallis foetidi sanioſique humores ab vlcere sordido excernuntur, oetoraque signa consequuntur male habenti vtero peculiaria, ut capitis, & præcipue ſincipitis, tenentum, radicisque oculorum dolor, qui ad manum etiam fundamenta & digitos vsque protenditur, ac reliqua quæ in capite de phlegmone prædiximus. Vlcus itaque in conspectum veniens, specillo oriculario deprehenditur. Altm vero & recenditum, ea quæ excernuntur indicabunt. Humor enim diuersos excernitur. Phlegmone quidem obfesso vlcere, paucos, cruentos, aut fœculentos, cum magno dolore. Sordido autem existente, copiosior, & sanies cum minori cruciatu. Depaſcente vero, foetidus, niger, cum doloribus vehementioribus. Porro vbi cum phlegmone fuerit vlcus, venæ ſectioe & aliis medicamentis ad illam scriptis utendum. In reliquis medicamentis purgantibus, maxime ſi corpus vitioſus redundet humoribus, utendum. Deinde adhibenda quæ reprimunt humorum deſluxum arque calidam intemperiem corrigunt, ut eſt ſuccus aut liquor ſtillicitius portulacæ, plantaginis, burſæ paſtoris, & ſimiles iam sæpe expoſiti. In ſordido ſubinde expurgantium medicamentorum vſus erit, ut eſt priſtanæ cremor cum melle, muſſa cum decocto radiis iſidis, ariſtoloſchizæ abſinthii, aut agrimoniz. Ea vero, quæ depaſcant efferanturque vlcera, equino vel aſinino lacte recenter muſſo abluenda ſunt. Lacti vero mel admiſcendum, & iſidis radix. Hæc quidem, ſi vlcera conſpicua fuerint, ſiſinuntur: ſi profunda inſunduntur per metrenchyas. Vbi vlcera probe purgata fuerint, iis quæ ad cicatricem dneunt utendum, primo quidem mitioribus, poſtea efficacioribus. Placet in primis ceratum Aerii, quod habet: *Cera alba, vnciam vnam. Roſacii optimi, vncias tres.* Hæc ſuper carbonibus liquato, & quadantenus ſubinde refrigerato, tum in mortarium conſicito, lactis que muliebri, aut aſinino, aut caprino recens muſſo, cum piſtillo diſuto, quouſque totum abſcat. deinde eſſuſo priore lacte nouum imponiro, ac ruſus ſubigito, poſtea croci circiter ſcrupulum vnum adſicito. Quod ſi maiorum mitigationem quæſieris, addito roſacii olei, vncias duas. *Adipis & medullæ aſſeris, vtriuſque vnciam dimidiam.* Licebit & pro roſaceo melinum admiſcere. Hoc ceratum abdomini & coxis imponendum. Si quidem eius facultas perlatentes meatus in vterum traditur. Poſſunt etiam eius ſarinz medicamenta vtero iniici, ut eſt deſcoctum malicoriz roſarum, malorum coſonarum, rubi, myrti, rhoſæ coriarii, biſſarte, burſæ paſtoris, ſancie, hypoſiſthidii cum vino adſtringente. Ad hunc locum transferenda ſunt medicamenta ſuperioribus libris, ex capitibus de vtericulis namm, viſſicæ & virgæ.

De phimoſi vteri. CAP. LXII.

Phimoſis, obſturator ſeu coarctatio eſt in ore aut ceruice vteri, qua ea loca tam anguſta redduntur, ut non amplius ſemen admittant: vel ſi admiſſerint, non retineant. Ob calloſam enim duriciem contrahi nequeunt. Interdum tamen ſemen admittitur, & intra anguſtiſſimum os vteri continetur, atque inde fœtus concipitur, conceptus vero prægnanti moriendi occaſionem affert, quum propter nimias locorum anguſtias efferri nequeat. Fit autem phimoſis in ore vteri, aut ex præcedenti viceratione, aut dura illiſic phlegmone. Signis ad mali cognitionem nihil opus eſt: de ſermonibus enim ægotantis, & tactu facilis eſt deprehenſio. Curatio ipſa ſit ſomentis relaxantibus & emollientibus, itemque cataplaſmatis & inſeſſionibus ſimili facultate prædictis. Fomenta itaque ex hydeleo & ſannigræci decocto adhibenda ſunt. Peſſis etiam vteri

dum quæ relaxando emolliunt, ut est is qui ex œſſypo, nitro, & reſina terebinthina conſicitur. Quid multa ad huius vitii amolitionem, & ut ſatis aperiatur vterus, vteodum medicameotis emollientibus, *malua nimirũ, albea, nigella ſerenoſa, lino, ammomiaco, bdelio, reſini, adſipibus, & ſimilibus, & quibus cerata, emplaſtra, poſſi, & omnia generis localia medicamenta compoſui poſſimus.* Quod ſi vitium inueterauerit, ſuſſimeotis vaporibusque aromatum vtendum. At vbi iam loca tactui molliora offeruorur, tunc ſpongiam aridam funiculo appenſam iotra locorum aoguſtias, dilatandi gratia imponemus. Quæ ſi exciderit, aliam craſſiorem immitemus. Quare plures diuerſasque ſpõgias exarentes præparatas habere oportebit. Poſtea aliquod medicamentum ex alumine elaterio, melle exceptis, paratum, ſpongiz imponendæ illinendum, ut ſcilicet locus apertior fiat. Quod ſi poſtea ſublata ſpongia locus non ſatis apertus videbitur, phlegmoneque propter erodentia medicamenta admodum ſuperuenerit, infraſcriptum medicamentum ſpongiz illinetur, quod habet: *Olei irini vnciam vnam. Reſina terebinthina, drach. dum. Adſipis anferini, drachmenum vnam. Radicu iridis, ſphutis, utriusque drachmam dimidiam. Cera quod ſauis eſt, fiat vnguentum.* Porro ſi in phlegmone vehemens fuerit, pro irino violaceum aut roſaceum ſumatur. Vbi phlegmone ceſſauerit, & locus appetus fuerit, ceratum ex oleo roſaceo & adipe anferino conſectum ſpongiz illinemus, & in eo viſque ad cicatricem obductam petiſtemus, lo cum ſolidiorem paulatim reddentes. Spongia tamen viſque ad perfectam curationem nunquam non imponenda, ne os vteri rursus coaleſcat.

De ſterilitate remouenda. C A P. LXIII.

Cauſa. S Terilitas aut viri, aut mulieris ratione accidit. A viro eſt, cum ſemee etius vel calidum, & veluti torrefactum: vel frigidum, tenue, aquoſum, languiſum, quale decrepitorum eſt: vel craſſiſſum quam oportet emittitur: vel quod viſi ſemilpadones ſint, penemque breuiſſimum habeant, ut in vuluæ reſeſſum ſemen iaculari nequeant. Quod etiam interdum nimia obceſſitate contingit. Obceſſi enim tam ventricoli euadunt, ut ſemen ad profundiores vteri partes iaculari non poſſint. Mulier vero ſua ipſius ratione non concipit, quod vterum habeat vel calidum & igneum, vel frigidum & humidum, vel ſqualentem & aridum. Nam, ut Hippocrates ait: *Quæcumque frigidas & denſas uteras habent, non concipiunt: exſtinguitur enim in eis ſemina. Et quæcumque ſiccis magis & torrefactis: nun ex defectu alimenti corrumpitur ſemen.* Ceterum craſſæ admodum & obceſæ haud concipiunt. Cuius rationem Hippocrates ſis verbis reddit: *Quæcumque, inquit, præter naturam craſſæ, non concipiunt vtero, iis alimentum os vteri emprimunt, & priſquam extenuentur, non concipiunt.* Graciles denique & macilentæ non concipiunt: aut ſi concipiunt, ſtatim abortiunt, eodem Hippocrate teſte, qui ſuſcriptam reliquit: *Quæcumque præter naturam tenues exiſtentes, vtero gerunt, abortiunt priuſquam craſſeſcunt.* Quædam etiam non concipiunt, eo quod vterus earum debilis eſt, vel anguſtus, vel brevis: aut quod vaſa eius obſtructa, & clauſa ſint, aut cicatricis ſuperventus excecata: aut quod vteri ceruix in obliquum ducatur: aut quod os eius nimis anguſtum, vel nimis amplum ſit. Sed & inuiti concubitus, inanes & ſteriles magnæ ex parte ſent. amor enim genitricem conciliat: ideoque ſororinæ amanter ereberrime pariunt. Aetas etiam vel iunior, vel prouectior conceptum impedit. Propterea nunc primum pubeſcentes a Venete atcere oportet, ita ut vir trigeliſimum anoum, mulier decimumoctauum ætingat. Præcipue vero inepta mulieris forma ſterilitati occaſioem præſtat. Secunda enim mulier habere debet proceritatem corporis moderatam, lumborum, & pedinis lati tudinem; nares eminentes, cotummodam alui molem, thoracem anguſtum, mamillas amplas. Signa quibus cauſatum diuerſitas cognofcitur, hæc ſunt. Caliditas viri temperamentum facile ex pilorum copia, nigrorum poſſimum in paribus genitalibus, & omnibus quæ circumſtant, a ſu petnis quidem viſque ad media ſuſmora deprehenditur. Petula etiam eſt hæc remperatura, & prona ad libidinem: ſtatim vero ſatiatur. Frigiditas temperamentum monſtrant partes circumpoſitæ teſtibus glabris. Neque etiam hoc temperamento præditi, ad libidinem proni ſunt. Vteri vero caliditas ex reliqui corporis caliditate cognofcitur, quodque pauca menſtræ, & cum dolore deferuntur, ut genitalia interdum mulieris exulcerentur: Sed & quæ educuntur, rariora ſunt. Hanc etiam temperaturam inſignis ſalacitas, & totius corporis ſiccitas ſequitur.

- A** sequitur. Frigidiorē vteri temperaturam monstrat mēstruotum suppressio, stupor in pube, lumbis & crurib. abortus. Veneris etiā vsum aspernantur, & os vteri contrāctum habent, hoc temperamento pręditę. Humiditatis vero vitio fecunditatem frustrari indicat, si in coitu humore admodum profundaatur, & si iis fuerint tenuia, copiosaque mēstrua. Siccitas contrariis planeprehenditur notis. Reliquę causę partium visū, partim de sermonibus agere, vti aliorum cognoscuntur. Communiter quidem ambobus, viro scilicet & mulieri, congruit vniuersum corpus conseruare probe temperatum, laboris, cibi, balnei, & reliquorum omnium mediocritate. Viri igitur, qui propter deprauatam viuendi rationem semen corrumpunt, ad magis compositum salubrioremque victum conuersi, geniturę fecunditatem acquirunt. Mulier autem neque ingenti labore defatigetur, neque prorsus ociosa sit: hoc enim superuacuis excrementis molem corporis replet: illud vero sanguinem desiccatur, & purgationes absumit. Potu & cibis concoctu facilius vtatur, & quos ventriculus probe superet atque conficiat. Illud vero potissimum circa rectam viuendi rationem est obseruandum, vt nec vir, nec mulier ebrietas reddantur. Qui enim tales fuerint, liberis procreandis inepti sunt, eo quod genitalibus matuo se contingere non possunt, & paucum semen emittant. Porro conuenit etiā, vt iis qui liberis procreandis operam dare cupiunt, quędam consuecta, esuque aut potu gratia ante cibum offerantur, quę Veneri excitandę & semini generando aptissima sint, qualia existunt, quę calefaciunt mediocriter, *Galeno libro quinto, de simpl. med. facul. capite 20. esse, & infans.* Vtium itaque in hunc vsum, modice sumtum, aquę pręfertur. *Sine enim Cerere & Baccho, vrille ait: frigit Venus.* Ex oleribus vtendum *crucis, arminio, erysimo, & aliis quales capit. de iis qui re Veneria viti non possunt, commemorantur.* Ruta, calaminta, & menta omnino vitanda sunt. Calaminta enim & menta, etsi plurimum semen, languidum tamen & imbecillum gigaunt. Ruta vero prorsus corrumpit. Ceterum vbi mulier vitio quodam humorum nūc concipiat, eas purgante medicamento vacuare, & proba victus ratione emendare expedit. Peculiariter vero mulieribus conuenit, curam eorum, quę sunt circa vteri, quam fieri potest, maximam habere, & vt iis menses sine omni impedimento promoueant. Quum igitur propinqua est per menses purgatio, cibi potulque quantum fieri potest mediocritatem cura habebunt, & quippiam ex iis, quę mēstruam purgationem irritare & stimulare possunt, assumēt, vt sunt olera odorata & acrida, gingidium, feniculum, apium, smyrnium, & similia, quorum copiam ex capite, *de suppressis mēstruū* petes. A purgatione mēstrua, optimum & oporū vniuersum concipiendi tempus est. Quoniam, *vt ten.*
- D** *Asar Hippocrati mēstr.* post mēstruam purgationem iam dextra, iam vero sinistra vteri pars aperta est. Porro vteri intemperiem frigidam per fomenta, cataplasmata, suffusus, & alia quibus calefaciendi vis inest, corrigere oportet: vt sunt quę ex *artemisia, pulg. g. salina, ruta, aniso, cumino, aceto,* & similibus parantur. Castoreum etiā bibere prodoritur, & semina odorata, cuminum, anisum, iuniperi quoque fructum, & alia quę in capite *de suppressis mēstruū* dicta sunt. Calidiorē vero vteri intemperiem, per ea, quę refrigerant & humectant, emendabimus: cuiusmodi sunt olera quidē *lactuca, malua, cucurbita, portulaca, atriplex, & iis similia.* Vinum bibendum tenue, album & dilutum. Proderit sic laborantibus fomous, & dulcium aquarum balnea. Lumbis etiā ac pubi refrigerantia adhibenda sunt, vt *solani succus rosaceo admixtus*, qui etiā lana exceptus in vteri sinum vtiliter imponetur. Quę ob vteri humiditatem non concipiunt, iis victus siccior vtilis est. Ex ceteris etiā eas plurimum oportet, ac in superioribus corporis partibus pestificari, vacuatisque & auersionis gratia interdum pręstas, interdum ieiunas vomere, & cibiparsumonia exsiccari, carnesque vitare vigentium animalium tostas comedere, vinumque potens & meracius, sed parcius bibere. Arida pręterea fomenta crebro adhibenda. Profuerit & vuluę adstringentia apponere, qualia sunt *rosarum, solanorum rubi, gallorum, rhois obscurorum, myrtis, polygami, malicorvi, & similia deorsum.* Id autem nisi totum aotea corpus purgatum sit, faciendum minime erit. Sicciorē vero vterum contrariis curare oportet, balneis aquarum dulcium, inunctione, & alimentis humectantibus. Vino diluto, non nimis veteri. Quod si a crassioribus humoribus concipere mulier impeditur, siquidem rodentes fuerint, mulierem probe purgare conuenit hiera pica, sero lactis: & victu exquisitiori, cibisque boni succi vtendum. Pitui-

Curatio vi-
ro & mulie-
ri commu-
na.Curatio
mulierum:
coecymia
laborantia.Capit. part.
7. aph. 24.Curatio fil-
ię de intem-
perie vteri.Curatio es-
tioris in-
temperiei.Humida-
na

Siccioris.

Curatio he-
morri cal-
lorum.

Curaſio ſta-
teum.Clausſi vte-
ti.Aperi vte-
ti.Peruerſio-
nis.

toſos vero humores laboribus plurimis, ſudoribus, vomitu, vel per inferna purgatio-
ne ablumete oportet, aliaque omnia quæ in capite de ſuppreſſis menſibus commemorata
ſunt, quæ nihil attinet hic membratim recenſere. Iam vero ſtatus quoque in vtero cõ-
cepti fecunditatem impediunt. Quibus primum parciorẽ cibo medebimur, dein
quæ ſtatus diſcutiunt medicamentis, vteſt *cuminum, ruta, anethum, apii ſemen, & ſimalia,*
quæ in capite de vniulua inſtillatione, & alibi diſta ſunt. Ea autem partim potanda, partim ex-
trinſecus adhibenda ſunt. Clauſum ac conuiuentem vterum aperiemus incoctis clyſte-
ribus odoriferis, fomentisque & inſeſſionibus ex *ſenegraco, ſemine lini, malua, & id genus*
aliet, ſupra in capite de phimoſi vteri etiam commemoratiſ. Poſtea ad validiora progredien-
dum, *artemiſiam nimirum, calamintham, pulegium, & maioranam.* Quibus os vteri nimi-
rum hiæ, iis viciuſ aridus, foeteuta ſicciora, medicamenta adſtringentia, qualia ſunt
gallarum decoctum, rubi radice, myrtus, & euſmodi in curatione humiditatum intemperati recenſita,
conueniunt. Poſtremo peruerſiones vteri emollientibus fomentis dirigemus: id enim
fomenta maxime poſſunt. Sed & mollientes peſſuli vtiliter ſupponentur. Præcipue
vero pulegii & artemiſiæ decocta, & caſtorium e poſca bibitum, vtero auerſo conſer-
re ſolent. Paulus tradit, tum Venerea tergo exercitiam ad concipiendum conduce-
re. Nos hic generatim atque per capita rantium cutandi rationes perſcrinimus. Par-
ticularẽs enim curationes, & proptiis petendæ ſunt capitibus.

De difficultate partus. C A P. LXIII.

Naturalis
ſignis for-
tus prode-
unt.

Signa.

Curaſio
obſta.

Difficilis partus aut vitio parientis, aut ſectus, aut ſecundarum, aut extrinſecus aduo-
nientium accedit. Parturientis quidem, ſi craſſa obſtaque ſit, aut antimo puſillo, &
dolorum imperita: aut vterus totus exiguis fuerit, aut phlegmonem vteri, aut alterius
partis habuerit, aut alio quouis morbo laborauerit: aut naturaliter imbecilla ſit, vt
ſectum ptopellere nequeat, aut ante tempus pariat. Item ſi os ceruicis vteri fuerit ob-
liquum, aut eidem caro aliqua propter vicus quod præceſſit adnata ſit. At ſectus vitio,
ſi vel inuſitata magnitudinis exiſtat, vel exiguis & modicæ grauitatis, vel magni capi-
tis, vel mèſtroſus (verbi gratia) biceps, triepſus, vel mortuus, qui nihil opis parturienti
præſtat, aut intumefcat: aut viuus quidem, ſed imbecillis, vt foras non poſſit progredi.
Vel ſi gemmini vel plures fuerint, & repente omnes ſimul collo vteri impingantur. Vel
ſi figuram naturæ aduerſam & contrariam obrineat. Naturalis ſiquidem figura fortis-
prodeuntis eſt. Prima quidem in caput, manibus ſuper ſcæ moribus porrectis & exten-
ſis, & capite in neutram declinante, ſed recta ad os vteri directo. Proxima huic, vbi in
pedes manibus ſuper vtroque ſcæ mote extenſis, recta deſertur. Aliæ omnes præter has
duas a natura abhorrent: vt ſi caput in dextram aut ſiniſtram vteri partem inclinat: vel
ſi altera aut vtræque manu exſeritur, curaque interius a ſe inuicem diducitur. Aut ſi ſæ-
tus altero pede prodit, altero interius retento. Aut ſi duplicatas alicui vteri parti inniti-
tur. Ob ſecundas partus ted dicitur difficilis, ſi aut non auellatur ob craſſitatem, aut priuſ-
quam opus ſit propter tenuitatem abrumparur. Tunc enim humor in vtero collectus
ante congruum tempus excernitur. quare pudenda ſine humore, ſiccaque in ipſo par-
tus tempore manent, cum neceſſaria eſt humiditas, quæ exitum lubricum & facilem
ſectui præbeat, atque adeo præ ſiccitate ægre ſectus elabatur. Ab externis etiam cauſis
parienti difficultas oritur: a frigore nimirum, quod vterum denſat, & meatus anguſtiores
reddit: aut calore immodico, qui vires diſſoluit. Cauſæ quidem externæ laboræſiæ,
& aſſiſcentium ſermonibus cognoscuntur. Imbecillitas vero parientis, veluti pingue-
do, ex corporis habitu facile deprehenditur. Ex morbis etiam præcedentibus prom-
pte imbecillitatis notitiam, & nonnullorum aliorum vitiõrum veniemus. Fortis im-
becillitas ex debili ac tarda motione cognoscitur. Qui ſi mortuus fuerit, à motu pror-
ſus ceſſat, ventris frigiditas adeſt, atque dolor iuxta vmbilicũ grauis. Spiritus exhalatur
ſectus, facieiq; color prauus. Magnitudo aurem fortis ex parentum corporis conſti-
tutione, ac ventris patientis mole conicitur. Craſſities ſecundæ inde colligi poteſt, q-
prædictorum ſignorum nullum adſit, & parturiens robuſta, facilisque ſectus motus ſit.
Porro quod ad curandi rationem attinet, variatur quidem iuxta cauſarũ diuerſitatem.
Obſta itaque mulierem in lectulo ptonam, hoc eſt in caput propendentem, & vultu
in rectam

- A** in terram directo, figurare oportet, flectentem inclinātemue genua ad femora, quo vterus ad abdomeo tendens, e directo oris sit. Digitis vero pinguedinibus (verbi gratia) butyro, oleo, & xungia anatis, gallina, & similibus delinire os vteri oportet, & sensim dilatare. Timide vero addendus anismus. In expertam autem dolorum partus admonere, vt valididius spiritum comprimat ac contineat, & ad illa validiore conatu proutdat. Si autem difficilis partus ex adstrictione, stupore, aut veluti scetus ad attractionem oritur, relaxatione succurrendum erit, infundendo largiter oleum dulce & calidum. Item decoctum scenogræci, aut maluz, aut seminis lini, aut etiam oua, quod leniendi facultate prædita sint. Dein & pubem cum abdomine & lumbis prædicto decocto, aut alio relaxante medicamento fovere oportet. Proderit etiam in seffionibus calidis & euaporationibus, tum aere domus ad caliditatem vergeote, tum infusionibus, & illitionibus ex oleis tactu & virtute calidis, cataplasmatisque convenientibus vti. Quod si neque febris, neque quippiam aliud obstitit, balnea relaxantia adhibere oportet, mouereque patientem gestatione in sella, in aere medioeriter calido. Nonnulli & in his corporis quassationibus violentis vtuntur. Quod si aliqua debilis fuerit, & difficilem partum ob resolutionem habeat, densantibus & contrahentibus, arque cum quæ resciant, & robur addunt cibis & potionibus refocillanda: quales sunt infusiones, & asperisiones ex myrto, pampinis visis, mala punice, rosis, aceti odore, & illitione ex vino, oleo rosaceo mixto frigido. Vbi infans præmagnus fuerit, ei adhibenda quæ dilatare & laxare os vteri possunt. Si vero ex præternaturali scetus figura difficilis partus contingat, ad naturalem quantum possibile fuerit, ducendus est figuram, partim pellendo, partim adducendo, partim flectendo, partim in rectum ageodo. Et si manus pefue præmittitur, non attrahere membro prehensum oportet: magis enim firmatur ac impingitur: vel luxatur, vel abrumpitur: sed digitis humero vel coxæ scetus innixis, rursus id quod prominet in conuenientem locum diducere. Porro si cum oris vteri compressione, totus infans indecora fuerit figura, sursum prius ipsum ab vteri ore sublimem detrudere consilium est, deinde prehensum iterum ad os dirigere. Si autem gemini, aut terni, pluresque fuerint, ac ceruicem vteri oblederint, reliquos propellere ad fundum vteri oportet, & eum, qui magis paratus videbitur, prius educere. Verum si non procedat, quod infans mortuus sit, aut caput nimis magnum, vel aliam ob causam, ad scetus extractionem seu sectionem, quam Græci *ipocæsalis* appellant, veniendum est. Eam autem copiosissime Aetius libro decimo sexto, capite vigesimo tertio, & Paulus libro sexto, capite septuagesimo quarto, tradunt. Neque enim manualet curandi rationem docere instituiamus. Porro si scetus tunica, seu secunda crassior fuerit ac solidior quam vt rumpi possit, dissecanda erit. Quibus autem humorin tunicis contentus, ante congruum tempus effluxerit, ita vt loca exaruerint, ouorum albuminibus cum maluz aut scenogræci decocto excolato, aut pisanæ cremore tepido perfundemus. Medicamentum vero quod in vniuersum omnes difficulter patientes iuuat, est hoc quod habet: *Cinnamomi electi, drachmas duas.* *Myrrha, cassia lignea vocata, vtriusque scrupulum vnum. Succini candidi, drachmam vnam & dimidiam. Poliorum diuani cretensis, drachmam vnam.* Terantur singula, & fiat puluis excusillissimus, de quo in vino odorifero detur pondus drachmæ vnius. Porro scetu excusillo, frequenter accidit, vt secunda in vtero firmiter adhærescat. Quod si euenit, tum interdu os vteri apertum, interdum clausum reperitur, secundaque ipsa nonnunquam vteri fundo adhuc coniuncta, nonnunquam seiuncta est. Si itaque os vteri diductum fuerit, & secunda quæ inibi relicta est alicui parti vteri orbiculari, ac pilæ modo conuoluta inhæserit, facile educitur. Manu siquidem sinistra calida, & piogique illata in fundum demissa, secundam sublabentem extrahere oportet. Si autem fundo vtero sit connexa, demissa sinili modo manu calida, & piogui inuncta apprehensam secundam trahemus: non tamen in rectum, ne vterus procidat, neque violentè admodum, sed leniter ac placide, primum in obliquum deducemus, huc aquæ illuc circumageotes, deinde paulo validius attrahemus: hoc enim pacto obsequuntur, & a connexu soluuntur. Quod si vuluz os clausum fuerit, perfusionibus vtetur, & sinistra maous digitis leniter aperire, & paulatim dilatare conabimur. Quod si non successerit, mulieris pubi fomenta, perfusiones, vnguentaque emollitæ & relaxantia adhibere conuenit. Si robusta fuerit, eo tempore etiam sternutamenta ex castoreo, pipe-

174 Operum Leonhard. Fuchsi Pars III.

re, & similibus confecta naribus admouenda. Hinc est quod Hippocrates *s. Aph. 29. A* sic scriptum reliquitur: *ut secunda procidas, siervitatorio apposito, & naris apprehendito, & os.* Portiones denique ex earum numero, quæ mentes prouocant, propinandæ. Quæ quidem omnia primo aut altero die peragenda sunt. Præterea suffitus utendum, decoctis in olla *artemisia, pride, sanina, pulegio, calaminta, dellamio, & similibus,* olla sellæ supposita, cui mulier vestimentis vndique circumtepta insideat. Postea si os veteri apertum inuenerimus, manu inserta, sicut prædictum est, educere eamtemur. At si non obediatur, dilaceranda non est, haud multis enim postea diebus putrefacta, & in saniam soluta excideret. Quia vero odoris grauitate & caput replet, & stomachum putrefacta tuerit: odoramenta iugiter suffiendæ sunt, quæ huiusmodi vitii aduerfantur, & secundam subducunt. Ad quos vsus excellunt, *cardamomum, bellum cum sanina, thur, styrax, ladanum, lignum aloes, & id genus alia.* Lapis etiam Gagates per fistulam, quæ ori veteri subditur suffusus, mirabiliter prodest. Conueniunt & simpliciora ex iis, quæ menses ducunt, *artemisia decoctum, & lauri bacca cum vino misce.* Pelluos item conficito ex *myrrha & cyclamino, cum oleo mixti.*

Odora-
mentum.

De Ischiade. C. A. P. LXV.

Ischia. **I**σχίᾱ Græcis proptie dicitur *dolor gravissimus, qui circa iuncturam, quam Græci ἰσχίον, Latini coxam appellant, accidere solet.* Vinum hoc Latinis ischiadæ, atque coxendix, & qui eo affliguntur, ischiadici nominantur. Barbari sciaticæ, & eo laborantes sciaticos vocant. Fit propter crassum pituitosumque humorem, qui in coxarum articulo concretus insidet. Ideoque ischiadis generationem non parum adiuuant assidue crudiates, & immodicus rei Veneræ vsus. Aliquando etiam deambulationes concitiores, & hæmorrhoides suppressæ, & vomendi consuetudo intermissa, & purgationes menstruar, aut etiam alia familiares ac consuetæ excretiones impeditæ, exercitiorumque neglectus. Hæc n. singula pituitosi humoris copiam conciliare possunt. Antecedit autem, & quasi auspiciatur hoc vitium, aliquando quidem vicinorum musculorum dolor, & maxime lumborum. Aliquando vero ab ipsa coxa initium fit. Iam vero etiam contingit, ut coxæ dolore sublati, circa popliteum solum afflicti hæteant: alii autem iuxta talum, quibusdam vero totum cruris æqualiter dolore afficitur. Multis item dolor circa inguina figitur, & tum sane vesica ipsa molestiam transiens, urinx difficultatem inducit: & tunc maxime totum cruris a coxendicibus vsque ad calcaneum dolorem perferit. Initium autem curationis fiat ab affligentis humoris evacuatione. Et si quidem humoribus ex quo omnibus redundat corpus, præ aliis omnibus remediis vena secanda in poplite, aut malleolo externo, si a laborante loco vacuare: sin vero auertete magis volueris in gibbeto, *Galeno libr. 10. de temp. med. secundum locos cap. 2. resste:* idque in latere affligito. Nam interdum ischias vna die per hanc ex crutibus vacationem curatur. Sin pituitoso atque crasso humore corpus refertum fuerit, a purgatione eius humoris auspiciabimur curationem. In quem quidem vsum clysteres crebri exhibendi erunt, in hunc vel similem modum parati, quique habent. *Centaurii minoris, saluæ, verbasculi odorati, ruta, chamæmaptyos, singulorum ꝑ. anipulum ꝑ. unam. Radici acori, ꝑ. unam. Siichadii, drach. tres. Seminum anisi & feniculi, vtriusque drach. duas & dimidiam. Agarici optimi, drach. duas. Radici polipodi, drach. quinque.* Decoquantur singula in aqua iustæ quantitatis ad tertias. Dein accipiantur iuris decocti, *vincia tresdecim hiera picra, ꝑ. unam, dimidiam. Antidoti indi maioris, drach. duas. Olei siliaci, ꝑ. unam. Olei rutæ, ꝑ. unam. Vitellæ ouorum duas solum, drach. unam & dimidiam.* Commixtis omnibus fiat enema. Auxiliantur etiam ischiadicis vomitiones, atque magis vique quam vacuationes infernæ per ventrem, ut quæ humorem deorsum repentem appellant. Elicienti itaque sunt vomitus in principio, statim ab accepto cibo. Postea vero etiam vomitoria medicamenta, initio facto a mediocribus. In quibus autem vehemens humorum coactio, densatioque, quæ ægre dissolui potest, a Medicis intempestiue acris medicamentis vtenibus facta est, iis cucurbitula quam maxima cum scarificatione affixa auxiliatur. Ceterum medicamentis fluxum reptimentibus, in ischiade non vtemur. Quum enim in profundo coxa sita sit, sanguis ex vicinis & ambientibus venis ac masculis ad illam pellitur. Mitigatoriis igitur in principio medicamentis opus est.

Ischiadici.
Causa.

Signa.

Cursus.

Elyster.

Vemitor.

Cucurbitula
magis.
Adhingen-
dum.
medica-
mentis in
ischia-
de non vten-
dum.

A est in hoc dolore, quæ neque refrigerent multum, neque vehementer calefaciant. Ut enim ea, quæ refrigerant, ad coxam impellant: sic quæ vehementer calefaciunt, aliam amplius materiam ex adiacentibus partibus attrahunt. Porro post venæ sectionem, aut per purgantia mediamenta vacuationem ad acria medicamēta, non ante, veniendum est. Si enim quis prius quam corpus vacuet, acria medicamenta ad laborantem partem illam adhibeat, ægre curabile vitium reddet, utpote multitudine ibidem indissolubiler econdensata. Præter alia enim crassa & viscosa sit, & ob acrium medicamentorum caliditatem & siccitatem non dissimile quidpiam affationi perpetitur. Affectum itaque locum primum ex oleo rutaceo irrigare oportet. Postea vero efficaciora ad mouenda medicamenta, quæ scilicet sensum calefaciant, & humores ex alto ad superficiem trahere queant, ut sunt *oleum vulpinum, de piperibus, cassinum, iuniperinum: vnguentum arcegon, martiatum, Griegrippa. Item salvia, ruta, salta lauri, sambuci, ebuli radix, pulgium, farina, opopanax, bellidium, ammoniacum, & similia.* Ex quibus subinde fomenta, vnguentum, emplastra, & cerata componi possunt. Principio itaque spongia in decocto iuniperi, aut saluæ, aut foliorum sambuci madefacta, loco laboranti iterum atque iterum imposita, hoc subinde vnguentum utendum erit, quod habet: *Vnguenti morisati, drach. tres. Oleum irini, blasei, utriusque vnc. dimidium. Succiruta, & chamaepitys, utriusque drach. duas. Mellis drach. unam & dimidium. Salvia, pulgii, piperis, singulorum drach. dimidium. Pyrethri, staphyda agria, utriusque scrup. unum.* Cæteræ quod satis est, fiat vnguentum. Proderit etiam huius cerati usus, quod accipit: *Oleum cassini, vulpini, utriusque vnc. duas & dimidium. Olei de piperibus, vnc. dimidium. Succiruta, & chamaepitys, utriusque drach. duas. Mellis drach. unam & dimidium. Singulorum drach. duas. Fumaria Actis (ratundem hodie arifoloch: am nominant) ruta, utriusque vnciam unam & dimidium. Euphorbii scrup. unum. Gummi in acerrimo dissoluantur aceto, ut cum resina teribini: hinc & cera quod satis est, fiat ceratum.* Quod si vitium adhuc remoretur, clysteribus denuo utendum erit: & deinceps cucurbita quam maxima cum plurima flamma coxæ affigenda, vulnuscule etiam altioribus per scarificationem impatis. Quod si vero neque sic vitium finitur, ad purgationem vomitum, & alia, quæ supra dicta sunt, redeundum erit. Quibus peractis, ad dropaces & sinapismos, adeoque ad aduentum medicamentorum suum veniendum. Inter quæ non postremum obtinet locum herba iberidis radix recens, ætate effossa, & diligenter tusa, ac veteri axungia modica excepta, articulo coxæ, ac vniverſu cruri imposita & alligata. Idem etiam folia possunt. Sic vero admoda incumbere finito, mulieribus quidem non infra duas horas, vitis autem horis quatuor, si possibile sit id ipsum perferre. Excitat enim tumores cum ardore & rubore, ut sinapismus facere solet. Postea in balneum inducito agrotatē, in quo ubi modice exsudauerit, in folium ob feruorem mordacius desidete iubeto, idque fortiter perferre cogito: morfus enim cum ardore initio inferre consuevit: deinde educito, ferre enim semper, *Actis atreslante*, quamuis ab aliis fuerint importati, sua sponte pedibus ingredienti exibunt. A balneo ad oleum mulium, vinum paucum admodum admisceto, & conuulsata illinito: ac humore cum aspero panno deterso, crus ipsum cum leuissimis lanis cooperito. Et sanecōsuevit hoc præsidium nullo alio inde auxilio indigere. Quod si tamen aliquando vestigium vitii relinquatur, vicenis diebus interpositis, rurſus eodē præsidio utaris. Interiectis tamen diebus, ceratum paulo ante descriptum imponi potest. Porro inter medicamenta adurentia hoc etiam locum non postremum obtinet, quod habet: *Mellum anacardini fermenti, utriusque, drach. unam. Cantharidum abietis alii, drach. duas. Actis quod satis est, misceantur.* Er hoc quod accipit: *Euphorbii, nitri, utriusque, scrup. duas. Saponis scilicet vniæ, utriusque, drach. unam. Mellum anacardini quod satis est, ut ad mellis cōsistentiam omnia commixta redeant.* Ceterum vitus ratio sit eiusmodi, ut cibus mediocriter tenuis existat, & cōcōctus facilis. Exercitia sine deambulationes, cōtinuæ flexiones, saltationes, & cursus. Aliud semper probe solui habere expedit. Quod si vero vitum longius durauerit, nec prædictis medicamentis propulsari poterit, vitum in titib. aut quatuor locis adhibere oportet, ad eum quidem modum quæ docet Paulus lib. 6. cap. 76. & Actius lib. 12. cap. 3.

De Podagra & arthritide. Cap. LXVI.

Podagra & arthritidis vitia eiusdem speciei sunt. Differunt itaque non toto genere, sed locis laborantibus. In utroque: n. articulorū est imbecillitas, & humor a natura alienus ad hos ipsos confluens. Quod si in pedibus, hæc constitit fluxio, podagra appellatur. Sin

Actior
vix quā
eo con
ueniens.

Vnguentum

Cassini

Cassini

Vitæ

Podagra

PP 4

176 Operum Leonhard. Fuchsi Pars III.

**Arthri-
tis.** reliquos artus occupauerit, *ἄρθριτις* Græcis, hoc est, *articularis morbus* nominatur. Hoc vi-
tium interdum repente intruit, æqualiter per omnes articulos dispersum. Vt plurimum
vero clanculum & paulatim fluxus irruere solet. Alteri enim cuiusdam magni digiti pe-
dis articulum dolor inuadit: aliis vero calcanei extremum. Rursusq; aliis cauum pedis,
aut ex calciamenti, aut ex consimilis rei affricu. Initium podagra a pedibus sumit, vnde
etiam nomen sortitum est, paulatim ad genua procedit, ad coxendicum item ac fero-
rum iuncturas, deinde ad manus, singulis articulis particulatim affectis. Qui vero ex-
treme ab hoc vitio apprehunduntur, iis & spinæ vertebræ & costarum iuncturæ, & ge-
næ dolent, aliquibus autem & guttur: neq; est aliqua ossium connexio, quæ ab hoc vitio
sit immunis. Generatur autem a cruditatibus assidujs, & ebrietatibus, vini fortioris, præ-
sertim si ieiunus id faciat, potione, immodico rei Venereæ vsu, vehementi & concitatio-
re deambulatione, statione diutius extracta, equitatu crebro, cõsuetarum excretionum
suppressionibus, ac familiarium exercitiorum intermissionibus. Mærores autem, curæ,
vigiliæ, & reliquæ animi perturbationes, non hoc modo vitium suscitant, sed & noxios
quoque succos ptocreat. Nonnunquam etiam colicus dolor perperam curatus, caussa
cur arthriti sequatur, esse solet. Quod palam testantur ea, quæ libro 4. par. 4. *Aphorisme* 3.
scribit Hippocrates in hunc modum: *Cuidam intestinum celum vocatum, simulatque articu-
lari morbo detinebatur, dolere vacabat. Postquam vero ab eo sanatus est vitio, plus doluit.* Cuius
quidem sententiæ vberiorem explicationem in nostris commentarijs offendere stu-
diosi. Ceterum vt plurimum habilitas ad hoc genus vitii a parentibus in filios ac poste-
ros propagatur. In vniuersum autem amplius omnium crudorum humorum copia vi-
tium huius caussa existit. Humores tamen superantes, qui se iuncturis inferunt, vel langui-
nei sunt, vel biliosi, vel pirituosi, vel melancholici. Interdum etiam ex humorum com-
missione vitium contrahitur. Porro causæ externæ facile de fermonib; ægri aut affidẽ-
tium cognoscuntur. Humorum autem discrimina iis notis deprehendere licebit. Sanguis
guineus quidem humor si multus fuerit, plenitudinem efficit & tumorem ingentem,
non venarum modo, sed totius partis affecta, circa cutem, eumque rubentem. Qui hoc
vitio affliguntur, neq; refrigerantia, neq; calefactoria valde præiudicia adhiberi sũsunt,
& assidue exacerbantur, quandoquidem assidue & æqualiter sanguinis defluxus cõtin-
git. Vrinæ eorum fuluæ sunt, & mediocri præditæ crassitudine. Venæ etiam in his co-
piose suscepto sanguine replentur, & in tumorem atrolluntur. *Ætas* vero apta huic
vitio iuuentus. Edulia item boni succi, & copiose nutrientiæ præcesserint, neglectusq;
exercitiorum. Tempus vero, in quo affliguntur maxime ægotantes, est veris ipsam. Porro
biliosum defluxum color cutis suffusus ostendit. Toterum vero rubor cum flauo per-
miscetur colore, vbi videlicet flaua bilis sanguini commixta est. Item caloris sensus, do-
lorisq; lancinantis modo actis. Humor quoq; in cutem subito sine euidenti tumore e-
rumpens. Refrigerantibus medicamentis sic affligi gaudet & iuuantur, a calidis autem
offenduntur. Febris in ipso accessionis statu accedit, validaq; siti conficit. Vrina eorum
subfulua, quoadmodum etiam acris. Curæ autem ingentes, & iræ, & vigiliæ, & fatigationes,
& in summa, vitii ratio bilem ptocreat, præcedere solent. *Ætas*, temperamentum,
& tempus, calida & sicca, ad eum defluxum apta sunt. Quod si pirituosa sit fluxio, ad di-
gitorum impressionem cauus fit tumor, subluxus & moderatus. Color membri male af-
fecti candidus. *Ætas* hoc modo magis afficitur senilis, temperamentum humidum & fri-
gidum, in consimili aeris statu, & tempore hyberno. Vrina tenuis est & aquosa, præceditq;
otium, & vitus ratio, quæ pirituosum humorem progignit. Si autem salia fuerit pituita,
purius maximus & mordacitas partes laborantes inest. Si ex melancholico sicco
fuerit fluxus, q; raro tamen contingit, color tumoris nigrior est. *Ætas* quæ magis hunc
fluxum generat, est vigoris inclinatio. Temperamentum item frigidum & siccum, tem-
pus autumnum, regio frigida & sicca, aeris consimilis status, vitulq; atram bilem gignens.
Porro cum sanguinei humoris fuerit influxus, protinus sanguis mitti debet, non solum
semel, sed iterum atq; iterum, detractio paulatim repetita. Si enim venæ sectione o-
missa, repellentibus medicamentis fuerit vsus, magni mali auctor eris: ex ignobilibus e-
nim partib; ad priores, & vitæ necessarias repulsus irrues. Quapropter lumbæ neces-
saria est sanguinis in sanguineis influxionibus vacuatio, præsertim in his qui sanguine re-
dundant. Secunda est autem vena io brachio inferne & dextæ cruris inflexione instaurari.
Quod

**Hippocra-
tes.**

**Signa
sanguini
nei diffu-
sionis.**

Biliosi.

**Pirituosi
defluxus.**

**Melan-
cholici
humoris
influen-
tia.**

**Cursio
sanguinis
humoris.**

- A** Quod si vero manus dextra dolore afficietur, venam in dextro crure secamus iuxta popliteum, aut talos, aut plantam pedis. Habet enim miram vim vena et directio membri affecti, *Galenus & Actio lib. 12. cap. 83. testibus lecta.* Quod nos alibi etiam copiose demonstravimus. Tum vero potissimum sanguinis missio ieranda erit, cum quempiam vitium hoc primum invadere cepit. Qui enim saepius huiusmodi defluxione sunt confecti, plus noxæ quam auxilii ex sanguinis detractioe sentiunt, præsertim si corpore sint imbecillo ac frigido. Post missionem sanguinis laboranti particulæ remedia adhibere oportet, quæ neque valde refrigerant, hæc enim humores cogunt ac condensant: neque immodice calefaciunt, hæc siquidem caloris ratione ad partes laborantes plus attrahunt. Quapropter aceto veteri cum rosaceo locum affectum rigare oportet, præsertim si in alto herere dolorum causa videatur. Etenim acetum propria sua tenuitate vsque in altum progressum expeditum rosaceo viam exhibet, quod natura sua lenire dolore potest. Si vero in superficie dolor consistat, per vini & olei usum magnopere iuuetur: ætate quidem tepidiorum, hyeme vero calidiorum. Deinde cataplasmatibus quoque utendum, quæ dolores leuare possunt, absque hoc ut fluxiones prouocent, ex farina fœnogræci, hordeacea, fabacea, lupinorum chamæmelo, & similibus. Oportet autem, ut ea semper calida omnino sint: id quod commode fieri potest, si assidue permutentur, & lana foris secus contingantur. Non parum proderit & hoc medicamentum, quod habet: *Lactis capri, aut ovini, vinctum dimidiam. Vitellus amarus duos, olei rosacei, vinctum vni, Croci, drachmam dimidiam. Adæ dactylis panis, quod satis, ut recipias cataplasmati formam.* Hæc itaque terantur, donec vniantur, & vnitæ tandem membro dolenti imponantur. Potest quoque ex oleo rosaceo, aceto, resina, cera, galbano, ammoniaco, thure, croco, & similibus componi emplastrum, aut ceratum. Tale enim repulsoriam vim, propter etocum & acerrimum obtinet: concoctioriam vero, disculforiam & moderate siccantem, rursus propter crocum & aliorum commixtionem. Ceterum cibos ei adhibere oportet, qui extenuant, & parum nutriunt: quales sunt olera. Carne autem, nisi volucrum montanæ, protius abstineant. Piscibus utantur saxatilibus. Vinum si fieri per intemperantiam agrotantium potest, ex toto circumcidendum: nam hæc fere vnicatio est, quæ sanitas consequitur. Quam cum ex millibus vix vnus sequatur, nihil mirum, paucos admodum esse qui ab hoc vitio hodie liberentur. Fuisse autem qui abstemi ab hoc vitio sese assueverint notius est, quam ut a me pluribus dici debeat. Non est igitur cur nostri temporis Chymici, homines indoctissimi, & ad fallendos tantum mileros nati ac nugis egregie instructi, nobis obficiant, methodica ista curandi ratione, quam Hippocrates, Galenus, & alii veteres posteritati memorie tradiderunt, nullos plane curari possit. Quomodo enim hæc ipsa eos curaret, qui illam despectui habent, & voluptatibus suis oblectant magis in animum induxerunt suum. Quum igitur Galenus etiam vultu, & medicinam faciente, hoc nomine multi curari non potuerint, quid mirum si hodie in ista vitii rationis corruptela, nullus fere curetur. Non est tamen quod impostores illi sibi persuadeant, de suis arcanis: quæ recte ita appellantur, quod neque a se neque ab aliis intelligantur: hoc vitii genus curare queant. Testatur enim quotidiana experientia, quod nullo recte curant, sed eos vel mox interimunt, vel fucata corruptione lætante paulo post, redeunte morbo, magis excarnificent, aut in deteriore morbum coniiciant: Horrore rigunt omnes, qui ad rerum gubernacula sedent, ut a somno profundo excitari, in hos nebulones, tanquam humanæ vitæ pestes, grauiter animaduertant, & profusus cœculetur. Quod ni fecerint, Deo in extremo iudicio rationem reddituri sui grauissimum. In vicem vini utendum aqua, in qua cinnamomum, anisum, aut similia decocta sint, aut certe ea potione, quæ hodieois temporibus, ridicula atque inuisa voce, *Hippocras* nominatur. Eius confessionem perent studiosi et cap. de resoluti. me. Fructus & Venerem diligenter caueant agrotantes. Aliud præterea facile solubilem, ac sua sponte dolentem habere eosdem oportet. Quod si tamē officio suo parum recte fungatur, simplici aliquo clystere eluatur. Vbi vero propter bilis influxum moros excitantur, tunc bilis communis scopus humoris affligentis est vacuatio, quæ tum per vomitum, tum per ventrem fieri debet. Per medicamenta itaque bilem ducentia cōsidenter purgandi sunt sic afflicti. Deinde vsque ad vigorem apponenda medicamēta, quibus refrigerandi & adstringendi facultas inest: qualia sunt, quæ ex *sempernino, ressi viridibus, prunice acuto, solano, plantagine*, & similibus, iam sæpe commemoratis apparantur. In hoc influxus genere

Locula.

Cataplasma.

Videtur.

Cur paulo hodie a podagra liberantur.

Bilis communis scopus.

176 Operum Leonhard. Fuchſii Pars III.

Arthri- reliquos artus occupauerit, & *ἄρθρι* Græcis, hoc est, *articulæ morbus* nominatur. Hoc vi- **A**
uit. tium interdum repente irruit, æqualiter per omnes articulos diſperſum. Vt plurimum
 vero clanculum & paulatim fluxus irruere ſolet. Alteri enim cuiſpiam magni digiti pe-
 dis articulum dolor inuadit: aliis vero calcanei extremum. Rurſuſq; aliis cauum pedis,
 aut ex calciamenti, aut ex conſimilis rei affrictu. Initium podagra a pedibus ſumit, vnde
 etiam nomen ſortitum eſt, paulatim ad genua procedit, ad coxendicum item ac ſcemo-
 rum iuncturas, deinde ad manus, ſingulis articulis particulatim affectis. Qui vero ex-
 tremitate ab hoc vitio apprehenduntur, iis & *ſπινæ* vertebræ & coſtarum iuncturæ, & ge-
 næ dolent, aliquibus autem & guttur: neq; eſt aliqua oſſium connexio, quæ ab hoc vitio
Cruſta. ſurſummunis. Generatur autem a cruditatibus aſſiduis, & ebrietatibus, vini fortioris, præ-
 fertim ſi ieiunus id faciat, poſitione, immodico rei Venereæ uſu, vehementi & concitatio-
 re deambulatione, ſtatione diutius extracta, equitatu crebro, coſuetatum exercitiorum
 ſuppreſſionibus, ac familiarium exercitiorum intermiſſionibus. Mætores autem, curæ,
 vigilæ, & reliquæ animi perturbationes, non hoc modo vitium ſuſcitant, ſed & noxi-
 quoque ſuccos procreant. Nonnunquam etiam colicus dolor perperam curatus, cauſſa
 cur arthritidis ſequatur, eſſe ſolet. Quod palam teſtantur ea, quæ libro 4. par. 4. *Aphoriſmo* 3.
Hippocra- ſcribit Hippocrates in hunc modum: *Cuidam inteſtinum celum vocatum, ſimulæque articu-*
tes. *lari morbo detinebatur, dolore vacabat. Poſtquam vero ab eo ſanatus eſt vitio, pluuſ doluit.* Cuius
 quidem ſententiæ vberiorem explicationem in noſtris commentariis offendit ſtu-
 dioſi. Ceterum vt plurimum habitas ad hoc genus vitii a parentibus in filios ac poſte-
 ros propagatur. In vniuerſum autem amplius omnium eruditorum humorum copia vi-
C tium huius cauſſa exiſtit. Humores tamen ſuperantes, qui ſe iuncturis inferunt, vel ſangu-
 nei ſunt, vel bilioli, vel pituiroſi, vel melancholici. Interdum etiam ex humorum com-
 miſſione vitium contrahitur. Porro cauſæ extrinſecæ facile de ſermonib; ægri aut aſſiduo
 tum cognoscuntur. Humorum autem diſcrimina iis notis deprehendere licebit. San-
 guineus quidem humor ſi multus fuerit, plenitudinem efficit & tumorem ingentem,
 non venarum modo, ſed totius partis affectu circa cutem, eumque rubentem. Qui hoc
 vitio affliguntur, neq; refrigerantia, neq; caleſcæntia valde præſidia adhiberi ſuſtinent,
 & aſſidue exacerbantur, quandoquidem aſſidue & æqualiter ſanguinis deſluxus cõtin-
 git. Vrinæ eorum fuluæ ſunt, & mediocri præditæ craſſitudine. Venæ etiam in his co-
 pioſo ſuſcepto ſanguine replentur, & in tumorem attolluntur. Ætas vero apta huic vi-
D tium iuuentus. Edulia item boni ſucci, & copioſe nutrientia præceſſerunt, neque uſq; ex-
 ercitiorum. Tempus vero, in quo affliguntur maxime ægrotantes, eſt ver ipſum. Porro
 bilioſum deſluxum color cutis ſufflauius offendit. Interdum vero rubor eorum ſaui per-
 miſcetur colore, vbi videlicet ſaui bilis ſanguini commixta eſt. Item caloris ſenſus, do-
 lotiſq; lancinantis modo acris. Humor quoq; in cutem ſubito ſine euidenti tumore e-
 rumpens. Refrigerantibus medicamentis ſic affecti gaudent & iuuantur, a calidis autem
 offenduntur. Febbris in ipſo acceſſionis ſtatu accedit, validaq; ſiti conficit. Vrina eorum
 ſubfulua, quandoq; etiam acris. Curæ autem ingentes, & iræ, & vigilæ, & fatigationes,
 & in ſumma, victus ratio bilem procreans, præcedere ſolent. Ætas, temperamentum,
 & tempus, calida & ſicca, ad eum deſluxum apta ſunt. Quod ſi pituitoſa ſit fluxio, ad di-
E gitotum impreſſionem cauiſ ſit tumor, ſubluxus & moderatus. Color membri male af-
 fecti candidus. Ætas hoc modo magis afficitur ſenilis, temperamentum humidum & fri-
 gidum, in conſimili aeris ſtatu, & tempore hyberno. Vrina tenuis eſt & aquoſa, præceditq;
 otium, & victus ratio, quæ pituitoſum humorem progignit. Si autem ſaſa fuerit pituita,
 pruritus maximus & mordacitas partes laborantes infeſtat. Si ex melancholico ſucto
 fuerit fluxus, q; rato tamen contingit, color tumoris nigrior eſt. Ætas quæ magis hunc
 fluxum generat, eſt vigor inclinatio. Temperamentum item frigidum & ſiccum, tem-
 pus autumnum, regio frigida & ſicca, aeris conſimilis ſtatus, vndeſq; atram bilem gignens.
 Porro eum ſanguinei humoris fuerit influxus, protinus ſanguis mitti debet, non ſolum
 ſemel, ſed iterum atq; iterum, detractio paulatim repeti-
F a. Si enim venæ ſectio-
 ne omiſſa, repellentibus medicamentis fuerit uſus, magni in aliis auctoribus ex ignobilibus e-
 nim partib; ad principes, & vitæ neceſſarias repulſus irruet. Quapropter ſumme neceſ-
 ſaria eſt ſanguinis in ſanguineis influxionibus vacuatio, præſertim in his qui ſanguine re-
 dundant. Secunda eſt autem vena in brachio inferne & dextrae eruris inflexione infeſtari.

Quod

- A** Quod si vero manus dextra dolore afficietur, venam in dextro crure secamus iuxta poplitem, aut talos, aut plantam pedis. Habet enim miram vim vena e directo membri affecti, *Galeno & Actio lib. 12. cap. 13. testibus lecta.* Quod nos alibi etiam copiose demonstrauimus. Tum vero potissimum sanguinis missio rētanda erit, cum quempiam virum hoc primum inuadere cepit. Qui enim sæpius huiuscemodi defluxione sunt confecti, plus noxæ quam auxilii ex sanguinis detractioe sentiunt, præsertim si corpore sint imbecillo ac frigido. Post missionem sanguinis laboranti particulæ remedia adhibete oportet, quæ neque valde refrigerant, hæc enim humores cogunt ac condensant: neque immodice calefaciunt, hæc siquidem caloris ratione ad partes laborantes plus attrahunt. Quapropter acetum veteri cum tofacro locum affectum rigare oportet, præsertim si in alto hæret dolorum causa videatur. Etenim acetum propria sua tenuitate vsque in altum progressum expeditum rosaceo viam exhibet, quod natura sua lenire dolores potest. Si vero in superficie dolor consistat, per vini & olei vsum magnopere iuueris: æquæ quidem tepidiorum, hyeme vero calidiorum. Deinde cataplasmati quoque vtendum, quæ dolores lenite possunt, absque hoc vt fluxiones prouocent, ex farina vtnegræci, hordeacea, fabacca, lupinorum chamæmelo, & similibus. Oportet autem, vt ea semper calida omnino sint id quod commode fieri potest, si assidue permutentur, & lana foras secus contendantur. Non parum proderit & hoc medicamentum, quod habet: *Lasii cap. primi, aut omis, vnciam dimidiam. Vitellos eorum duos, olei rosæci, vnciam vnam. Croci, drachmam dimidiam. Adde lili panis, quod sitis, vt recipias cataplasmati formam.* Hæc itaque terantur,
- C** donec vniantur, & vnitatandem membro dolenti imponentur. Potest quoque ex oleo rosaceo, acetum, resina, cera, galbano, ammoniaco, rhure, croco, & similibus compositum emplastrum, aut ceratum. Tale enim repulsorium vim, propter crocum & acetum tum obinet: concocturiam vero, discussoriam & moderate siccantem, rursus propter crocum & aliorum commixtionem. Ceterum cibos ei adhibere oportet, qui extenuant, & parum nutriunt: quales sunt olera. Carne autem, nisi voluerim montanarum, prorsus abstineant. Piscibus vtantur saxatilibus. Vinum si fieri per intemperantiam agrotantium potest, ex toto circumcidendum: nam hæc fere vnica ratio est, qua sanitas consequitur. Quam cum ex millibus vix vnus sequatur, nihil mirum, paucos admodum esse qui ab hoc vitio hodie liberentur.
- D** rueri notius est, quam vt a me pluribus dici debeat. Non est igitur cur nostri temporis Chymici, homines indoctissimi, & ad fallendos tantum miseros nati ac nugis segregie instructi, nobis obiciant, methodica ista curandi ratione, quam Hippocrates, Galenus, & alii veteres posteritati memorie proderunt, nullos plane curari potest. Quomodo enim hæc ipsa eos curaret, qui illam despectui habeat, & voluptatibus suis obsequi magis in animum induxerunt suum. Quum igitur Galeno etiam viuente, & medicinam faciente, hoc nomine multi curari non potuerint, quid mirum si hodie in ista vidus rationis corruptela, nullus fere curetur. Non est tamen quod impostores illi sibi persuadeant, de suis arcanis: quæ recte ita appellantur, quod neque a se neque ab aliis intelligantur: hoc vitii genus curare queant. Testatur enim quotidiana experientia, quod nullo recte curant, sed eos vel mox interimunt, vel fucata curatione lædant: vt paulo post, redeunte morbo, magis excarnificent, aut in deteriorum morbum coniciant. Horrigitur omnes, qui ad rerum gubernacula sedent, vt a somno profundo excitati, in hos nebulones, tanquam humanæ vitæ pestes, grauiter animaduertant, & profusus cōculcent. Quod si fecerint, Deo in extremo iudicio rationem reddituri sunt grauissimam. In vicem vini vtendum aqua, in qua cinnamomū, anisum, aut similia decocta sunt, aut certe ea portione, quæ hodiernis temporibus ridicula atque insulsa voce, *Hippocras* nominatur. Eius confessionem petent studiosi & cap. de resoluti me. Fructus & Venerem diligenter caueant agrotantes. Aliud præterea facile solubilem, ac sua sponte deicientem habere eosdem oportet. Quod si tamē officio suo parum recte fungatur, simpliciori alioque clystere eluatur. Vbi vero propter bilis influxum dolores excitantur, tunc
- F** is communis scopus humoris assigentis est vacuatio, quæ tum per vomitum, tum per ventrē fieri debet. Per medicamenta itaque bilem ducentia cōsidenter purgandi sunt infecti. Deinde vsque ad vigorem apponenda medicamēta, quibus refrigerandi & adstringendi facultas inest: qualia sunt, quæ ex *sempernis, resu viridibus, ramice aceto solano, plantagine*, & similibus, iam sæpe commemoratis appatantur. In hoc influxus genere

Localis.

Cataplasma.

Vitis.

Cur paulo post hodie a podagra liberantur.

Bilis & humoris cōf. ratio.

178 Operum Leonhard. Fuchsi Pars III.

**Impo-
sitione.**

nonnunquam propter doloris vehementiam, iis quæ stuporem inducere possunt vtendum medicamentis. In quem quidem vsum conuenit adhibere medicamentum, quod paulo ante descripsimus, ex lacte caprino, medulla panis, croci, & ouorum vitellis constans, cui feminis papaueris, drachma dimidia, aut opii, drachmam dimidiam, aut plius, aut minus, pro ratione doloris admixtum sit. Profunt etiam in eundem vsum cicuta sola, & hyoscyami, imposita & adhibita. Sed animaduertendum erit, vt cum in feruentibus doloribus ad stupefacientium vsum fuerimus coacti, postea resoueamus partes per ea, quæ calefaciunt. Nisi enim id ipsum fecerimus, debiles & intemperatas atque adeo perpetuo fluiti obnoxias partes reddemus, & vt in actionibus facile offendantur efficiemus. Calorifica vero sunt, origanum, satureia, sinapi, piper, & id genus alia. Porro adiuuare etiam oportet sudoribus exclusionem, corpus calefaciendo & fricando, ita tamen, ne locos affectos contingamus. Præbenda denique in potu ea, quæ vrinam cient. Nam talia bilem per vrinam vacuant. Soporem quoque inducentia, quod fluores ab ipsis resiccantur & sistantur: atque id maxime, si post corporis purgationem exhibentur, conferre solent. Cibi illis dandi refrigerantes, non tamen humectantes: humiditas enim auget fluxionem. Famem & inedia ne tolerant: nam bilem acriorem reddunt. Ex fructibus, vtiuntur pomis adstringentibus & melspilis, aliisque quæ refrigerant, & simul fluxus cohibent. A vino prorsus, vt priores, abstineant. Qui obpituitæ influxum ægrotant, horum curationem a pituitæ vacatione auspiciari oportet. Euacuatur autem humor pituitosus per vomitus, nihilominus tamen & inferne per ventrem. Vtilior vero in hoc vitio per inferna purgatio, siue iuxta manus, siue iuxta pedes hæreat morbus: & multo magis, si iuxta omnes corporis articulos fluxus constitit. Familiarior enim pituitæ via, & minus periculosa per intestina existit. Si enim in superiorem ventrem violenter attracta non vacuetur, periculum inducit. Quapropter tutius est, vt ad infernam excretionem ducatur. Ante tamen purgantia medicamenta, ea quibus incidendi & extenuandi facultas inest exhibenda, vt hac ratione ad purgationem crassi humores præparentur, & idonei reddantur. Si vacuatio per purgationes fieri non potest, tum inedia ac fame vtendum est ad plures dies. Qui natura pituitosi sunt, eam facile & citra noxam tolerare possunt. Nam pituita in iecore contenta ex dimidio, coctus sanguis existens, in fame & inedia concoquitur, & in optimum sanguinem murata in venas rapitur, partibusque corporis alimentum præbet. Hinc recte ab Hippocrate dictum est: *Corporibus carnes humidæ habentibus, famem adhibere conuenit. Fames enim corpora fucat.* Vtendum etiam frictionibus discussoriis ampliusque efficacioribus clysteribus, & medicamentis vrinam cientibus. Ceterum extrinsecus medicamenta, quæ dolores leniunt, & quæ discutere ac moderate resiccare possunt, adhibenda, de quibus paulo supra diximus. Illis vero in morbi principio aliqua quibus adstringendi potentia est, commiscenda. A principio autem solis discutientibus vtendum. Mansuetissimum vero hoc, quod habet: *Althea sola cocta trita, rum per se, sum cum polline aut hordeacea farina imposita. Radix pratensis in eadem cocta in aqua multata trita, & imposita confert.* Et hoc vnguentum, quod accipit: *Oleorum laurini, & irini, vtriusque vnc. vnam. Atripis nulli, veteris butyri, vtriusque, drach. tres. Medulla ceruina, drach. duas. Resina terebinthina, drach. quinq. Galbani in aceto dissoluti, drach. vnam. Hyssopi, radicis albeæ, feminis semograci, singulorum scrup. duos.* Ceteræ, quod satis est, fiat vnguentum. Porro quæ ratione nutrimenti præbentur edulia, natura sicciore sint, & minus nutriunt: vt est *oryza, ficus, auena, & eiusmodi.* Carnes tamen auium montanarum assæ iis baud in commodant. Cappares ex aceto mulso mirifice profunt. Vinum autem præbeatur quam minimum, interualli tempore, tenue, fuluuni & vetus. Qui melancholici humoris fluxionibus molestantur, si venæ sectione, aut purgatione sunt vacuandi. Venæ quidem sectione, quando sanguis melancholico succo infectus est. Purgatione vero, quando melancholici sunt ægrotantes. Si vero ambo hæc simul redundarint, non vnum aliquod ex prædictis adhibere suffecerit, sed prius lecta vena, deinde medicamēto purgare vtendum. Quod ipsum & in aliis vitis duplici vacatione indigentibus faciendum erit, vt in lib. 2. *Parado xerum nostrorum abunde monstrauimus.* In principio autem morbi, & in ipso vacationis tempore, reprimentibus & simul sensum calefacientibus vtendum est. Post vacationem vero iis, quæ leniter calefacere, attenuare, & discutere possunt, de quibus supra satis superque dictum est. Ceterum quoniam topi & duri tumores, subinde in articulis creantur, modo

Vitis.

**Pituitosi
fluxus cu-
ratio.**

**Pituitosi
fluxum fa-
cile facit.**

7 Aph. 60.

**Vnguen-
tum.**

Vitis.

**Tophi
curatio.**

propter

A propter humoris qui ad eos decubuit crassitiam, terrestremque duritiam: modo propter immoedium discitentium & resiccantium medicamentorum, sine eorum quæ molliendi facultate pollent mistura: ideo ad eos remouendos iis, quæ in cap. de lienis duritia a nobis producta sunt, medicamentis utendum. In primis vero confert vetustissimus & corrimulque caseus, cum suilla carnis præpinguis & veteris decocto contritus & impositus. Ad hoc malum conducunt etiam *ficus iriti & impositi*. Item *alibea bu colta, auena, vrtica, bryonia radix, bulbi, anisi, abrotani, euphthalmi, marrubiique folia, cum pice & sulphure vino permixti*. Admissendi etiam *adipes suillus, caprinus, vitulinus, & asinerum*. Medulla item omnes, & alia quæ emolliendi vi prædita sunt. Balneum sane, ne id quidem silentio transeamus, post phlegmonum remissionem omnibus podagricis commodissimum existit. Dum lauât, spongia aceto & sale permixtis madefacta, locis laborantibus circumponenda, vt a fluxione immunes permaneant. Lauare autem eos non semel tantum, sed iterum atque iterum in aere per omnia moderato oportet. In aqua tamen calida nõ diutius morandum. Consulitissimum itaque, vt aqua calida perfundantur. Vtile quoque, vt totum corpus linteis siccis perficetur. Præterea curati a podagra, hac se ratione a podagra deinceps tuebuntur. Si primam bis in anno, vere nimirum & autumnò, modo nihil sit quod id ipsum prohibeat, sanguinem large detraxerint. Deinde si iisdem temporibus, & crebrius etiã, medicamentis purgantibus vsu fuerint. Porro cibus, vt etiam aliquid demant, & a satietate suspiceant, necesse erit. Utendum autẽ cibus concoctu facilibus, & qui promte in partes corporis distribuantur, excrementisque vacent. Vno aut potius abstinendum, aut parce admodum utendum. Exercitiorũ creber sit vsus, idque ante cibum. Labores enim, vt Hippoc. *magis principis*, cibos præcedant. Et vt rem vniuersam in pauca contraham, qui a podagra immunes esse cupiunt, hoc vt breuissimum, ita & saluberrimum Hippocratis præceptum secum reputent: *amari ieiunium, ieiunium temperatum, ieiunium videri. Quod est: Sanctum studium est, non satiare cibis, & impiegrum esse ad labores*. Somnus etiam & Venerea, vt idem docet, sint mediocria. Quod ad præsidiorum partem attinet, sal minatum in oleo tritus, & articulis affinitus, omnes qui se ab hoc vitio vindicare volunt, magnifice iuuat, nisi præter modum sicca intemperie sint præditi: eoque illius & mane & vespere per totum vite curriculum utendum est. Causam eius rei exponit Galenus lib. 2. de simp. medica facul. cap. 14.

An balneum condecet podagricis

Quomodo quia podagra locum

Epil. p. 4. Aph. 28. 1. Aph. 28. 2. Aph. 28. 3.

D LEONHARTI FVCHSII DE SANANDIS FEBRIBVS, LIBER IV.

De Diaria. Cap. I.

DIARIA febris, quæ Græcis *ἡμερῆς* dicitur, ea est, quæ vnicam habet accessiōnem, vno vt plurimum die, ex ipsius saltem natura, circumscriptam. Desinit enim post primam accessiōnem, nec integrum diem excedit, si quis eam recte tractet, idque propter magnitudinem, in qua subsistit, nempe spiritum, qui facilius disiequitur. Hinc recte a Galeno lib. 1. de ratione curandi ad Glauconem simplicissima vocatur, quod scilicet breuissima, placida, minimeque maligna sit. Quare quæcumque vel per Medicorum ignorantiam, vel ægrotorum intemperantiam, vel ministrantium errorem in eiusmodi febre commissa, in aliud ipsam genus transierit, ea non sua naturæ ratione eueniunt. Sicut autem Galeno lib. 9. Ther. meth. auctore, duplex diaria: Vna, quæ simpliciter & citra adiectionem sic appellatur, hæc quidẽ ultra vnius naturalis diei spatium, hoc est, horas viginti quatuor, nõ exarbitratur. Altera, quæ cum adiectione plurium dierũ diaria nominatur. Galeno loco citato, *Synochus non putrida, vt sequenti cap. dicitur*, appellatur. Hæc in tertium vsque diem extenditur. Neque est cur quispiam miretur hanc febrem dici diariam, cum tamẽ de substantia eius, diariæ vocabulum non sit in triduum n. ut iam dictum est, extrahitur. Quia n. proptio, atque adeo conuenienti nomine careat, clarioris simulque breuioris doctrinæ gratia, non obstante quod non aduersetur, cum natura huic eadem sit, quæ aliis diariis, vnicam namque duntaxat accessiōnem obtrinet, rectissime diaria nominatur. Si quidem præter tria prima febrũ genera, quorũ vnũ est in quo spiritus seu vapor plus iusto incalcescit: alterum in quo humor putrescit: & tertium in quo solidæ corporis partes febrilem calorem, vt habitum susceperunt: quantum excogitare atque statuere genus

Epil. 28. 1.

Simplicissima febris diaria

Diaria duplex. Diaria simpliciter

Diaria plurimum dierum

Diaria cur diaria dicitur

Diaria tria prima genera

Causa. necesse eſſe, ſi non ſub diaria complecteretur. Oritur diaria febris, quum abſque vlla putredine ſpiritus præter naturam incaleſcit & ſuccenditur. Id quod multis modis accidit: nempe ob cutis conſpirationem ſeu denſitatem, quæ ſolitus effluuium vaporum & ſpirituum cohibet: quod quia calidum acreque eſt, ideo febrem gignit. Propter laſſitudinem ac vehementem ſatigationem, itemque vigilias, cruditatem, triſtitiã, timorem, iram, curas animi vehementes, viſionem a ſole, refrigerationem, famem, ebrietatem, adenum tumores, aliaque ſimilia, quæ ſpiritus accendere poſſunt. Signa vero quibus deprehenduntur diariæ, duplicia ſunt: quædam enim omnium diariarum communia: quædam autem particularia. Communia quidem ſex numero exiſtunt, quorum vtiq; primum eſt pulſus. Omnes autem diariæ, *Galenus lib. 3. de prædictionibus & pulſibus aſſere*, in magnitudinem celeritatem, frequentiamque, quantum in iſis eſt, pulſus mutant. Exquiliæ vero ſeruant eam, quæ ſecundum naturam eſt æqualitatem, molliſſimam, & ordinem. Alterum ſignum commune, vrina eſt, quæ eam omnino, quæ ſecundum naturam ſe habet imitatur, aut naturali ſtatu parum deſectit. Vrina vero ſecundum naturam, colore quidem ſubruſa, & ſubſtantia mediocriſ, in qua, quod reſidet eandem, leue, ac æquale eſt. *Tertium*, eſt caloris qualitas, quæ in omnibus diariis febribus ſuauiſ & mitis exiſtit. *Quartum*, ſolutionis modus. Siquidem ſingulæ ſoluantur in halitum, qui ſenſum effugit: aut copioſos vapores, vel madores, vel ſudores ſuaues. *Quintum*, deſectus malorum ſymptomatum: verbi gratia, vehementis doloris capitis, & ventriculi, & aliarum partium, ſaſtidi ciborum, inquietudinis ſitis inexplibilis, & id genus aliorum. *Sex-tum*, quod omnes diariæ a cauſa extrinſeca, quam primitiuam hodie Medici appellant, oriuntur. Quæ ſingula ſuſus explicat *Galenus lib. 1. ad Glaucanem, cap. 2. & lib. 1. de differ. feb. cap. 7.* Nec non *lib. 2. de indiſc. cap. 13.* Porro ſigna quibus quævis diaria particulatim cognoscitur, hæc ſunt. Qui ex peruelegis febricitant, hos vitioſus color ſequitur, & faciei tumor, grauiſq; oculorum morbus: vix enim palpebras atroſunt: humiditas palpebrarum, pulſusq; exigui. Siquidem vigilias, cum conuulſionem impediunt, *Hippocrates lib. 2. de viſu acut. morb. aphor. ult. ſeſſe*, humiorem ac vaporum crudorum copiam pariunt, innatum calorem imminuunt, corpusq; reſoluunt: vnde conſequitur vitioſus color, faciei tumor, palpebrarum humiditas, earumq; mouendarum difficultas. Per vigilias enim cerebrum ſenſusq; inſtrumenta aſſidue exercentur, vnde plus facultatis & ſpiritus animalis abſumunt: quibus tandem reſolutis, & in aſtiones obcuſas inſumtis, vitales ſpiritus antequam integram elaborationem ſint experti, aſſidue alliciunt. Quid multa? vigilie naturam a coquendi munere auocant: quocirca magnam cum in reliquo corpore, tum in cerebro cruditatem relinquunt. Ceterû ſatigatis animalis facultatis inſtrumentis, caput imbecillius redditur, vnde cruditas, & nauiſ caloris imminutio ſequuntur. Ex quibus rurſus ſunt vitioſus color, tumor faciei, palpebrarum humiditas eorundemq; motus grauitas: ſcilicet reſoluta facultate, & vapens humorisq; copia degrauant. Curæ & mororis ſigna, corporis macies, ex morote luculẽtior, ex curis obſcurior. Quoniam in morore intro reuocantur ſpiritus, vbi facile obſoci caliditatem accenduntur & diſcutiuntur, humorq; in vapores diſſipatur: vnde corpus temporis ſpacio exſiccatur, emaciaturq;. In curis vero ac cogitationibus ad caput feruntur, in quo minus ob caloris penuriam, quam in interno corpore abſumuntur. Minus enim ob loci frigiditatẽ inſtillantur, & reſoluitur. Proinde corporis habitum minus exſiccant, ac extenuant. Oculorum quoq; cauitas & ariditas vtrunq; affectũ ſignificant. Sed in curis & cogitationib; minor, quia ſpiritus & humores minus abſumuntur. In morore aut maior, ob loci caliditatem, ſpiritus & humores reſoluentem. Inſueta quoq; decoloratio quæ hæc affectus ſequitur, ſcilicet, curæ ipſa natiuo calore. Qui per iracundiam furoremue febricitant, iis neq; oculorũ cauitas adeſt, neq; vitioſus faciei color: ſed magis oculi prominere videntur, ſcilicet, delatis eo ſpiritib; ipſos diſtendentibus. Hac ratione facies nõ decoloratur, ſed ruber, vt in quam ſpiritus & humor coſſuat. Cũ iis calor & corporis pfundio foras emetgens, nõ ſolũ illic, ſed ad vniuerſam cutẽ fertur, vnde pulſus magnitudo perfeuerat. Sic teliquarũ etiam diariatũ ex animi perturbationib; natũ ſigna, e pulſu maxime petenda ſunt. In triſtitiã enim ſpiritus intro feruntur, ſed non aſſatim, ibiq; coarctantur, ac velut ſuffocantur: nec rurſus vt in iracundia foras ſparguntur, ſed ſeſe accendunt, ac conſumuntur, vnde temporis progreſſu humiditas abſumitur, & virtus conſopitur, obritur, deſciſque

- A**lesque redditur. Eam ob rem pulsus parui sunt, languidi, rari, quia neque necessitas vr- Timoris
get, neque valida facultas est. In timore recenti celeriter intro velut ad suam scarebram mo-
uentur sanguis & spiritus, mens quoque conturbatur. Natura enim commoto, atque ut sibi
providere sollicita, modo huc, modo illuc impellit spiritus, qui motu accenduntur:
unde sunt pulsus celeres, urgente scilicet necessitate. Mens vero concitata, in aqua-
les ac vibratos reddit. In inveterato autem dissipatis spiritibus, viruteque languescit,
pulsus quales in tristitia esse monstrauimus, redduntur. Qui ob solis vitionem Vitionis
solis.
stumque febricitant, iis cutis sicca est & calida, ut quam suo contractu solis ardor extle-
canit accalefecit. His caput deuri videtur, propter spiritus accensos. Oculi rubicun-
diores, vaneque iis in oculis, temporibus, fronte, & tota facie interdum extenduntur.
- B** Qui ex frigore febricitant, si grauedinibus & destillationibus corripitur, quod scilicet
frigus constringat, & intra cutem fumosa excrementa detineat. Cutis denique
eorum minus calida, corpusque totum maiorem prae se fert humorem, quod solitus
effluxus frigore cohibeatur. Præterea nullus in facie squalor, eandem ob causam.
Quibus lassitudo febrem attulit, iis cutis aridior quam in aliis diariis redditur, quod Lassitudi-
nis.
scilicet exercitatio corpus exsiccat, eiusque humiditatem exhauriat. Pulsus quoque
iis dissimiles sunt. Supra modum enim exercitati & defatigati paruos, ob virum im-
becillitatem, obtinent pulsus. Qui autem exiguos labores subierunt, quod iis non-
dum vires collapsæ sint, magnos. Qui ob temulentiam aut famem diaria cætripian-
tur, si ad dignationem nullis notis indigent, de sermionibus enim ægotantium tius- Temulen-
tia & fa-
mit.
C modi causæ deprehendi possunt. Qui ex adenum tumoribus febricitant, pulsus ha-
bent maximos: quia vrget necessitas, id est, febrilis calor, necessitatique morem gerit
facultas. Hinc celeres etiam & crebri sunt. Pulsus quoque huius est æqualitas, quod mo-
uendi instrumentum non sit impeditum neque obstractione, neque humorum vel va-
porum aerium abundantia, neque compressu, nisi sit admodum ingens phlegmone.
Calor iis multus, & a vigore statim humor quidam ex alto corpore ad cutem fertur
calidus, sed tamen suavis. Fit enim a materia benigna, quod nihil acrimoniæ eiusmodi
febres habeant, eum solus bubonis calor, non etiam fumus putris ad cor permeet. Fa-
cies his omnino rubicunda, ac tumida, propter caloris abundantiam. Et vrinx subal-
bae apparent, quia materia quæ vrinas coloratiores reddere debebat, ad bubonem
- D**ranslata est, & quia caloris suauitas sanguinem ultra modum non calefecit, ideo
nec bilem, quæ vrinx colorem addit, procreauit. Curandi ratio diatriarum febrium Vitis.
peti vix rationem perficitur, cuius quidem in omnibus diariis simpliciter nomina-
tis communis scopus est, *Galeno lib. 8. Ther. meth. cap. 2. testis*, ubi cibi boni succi, &
concocti faciles, ac distributioni idonei præbeantur. Vitis quidem a sole, & iratis,
qui refrigerent & humectent. Refrigeratis, qui minus nutriendi, & moderate calefa-
cant. Vigilis, aut tristitia, aut nimia confectis cura, qui humectant pariter ac so-
mnus conciliant: ut a siccitate, quæ ab iis iniuriis illata est, vindicentur, præterea ut
vires recreent. Qui ex fatigatione febrem contraxerunt, iis tantum cibi permittend-
um, quantum concoquere possunt: semper enim vitanda cruditas est. Siquidem
- E** labore dissipata corporis substantia, vberiore cibo, & concoctu facili reparanda
est. Modum autem cibi sumendi metiri oportet viribus, ætate, naturali tempera-
mento, & consuetudine ægotantis. Præterea tempore anni, regione, & id genus a-
liis. Ceterum in quibus corporis temperatura calidior & siccior est, hos in primo sta-
tim accessions insultu cibare oportet. Nisi enim quis hanc naturam statim cibet,
oculissime in ea diaria febris in putridam & acutam mutabitur, *ut Galenus lib. 10. The-
method. cap. 3. copiose ostendit*. Tenuiter vero præcipue sunt alendi, qui ex bubone labo-
rant, ut in quibus substantia corporis depedita non sit. Vinum omnibus propemo-
dum diariis proprie & simpliciter nominatis febribus confert, album colore, & sub-
stantia tenue. Nam præter id quod concoctionem iuuat, vrinas etiam & sudores, Vinum dan-
dum diariis.
F *Galeno lib. 8. The. meth. cap. 3. testis*, elicit. Sed vigilis, mœrore, & cuncta afflictiis vberius
concedendum, utpote quibus magna copia spirituum sit exhausta, quos vinum fa-
cillime & celerrime reparat. Quibus tamen caput dolet, siue vigilante, siue alia
occasione affecti sint, a vino sibi temperare debent, ut quod facile caput tenet. A qui
excandescencia ac furore febricitantibus tuto vinum, nisi omnino a perturbatione

quieuerint, haud datur, vt in quibus ſpiritus & ſanguis maxime ferueant. A vino etiam, qui ex bubone ſeu adenum tumore febricitant, donec is ſolutus ſit, arceſcendi ſunt non tam quod febris ſit inutile, quam quod bubonis curationem remouetur. Augēt enim humorum in laborantem locum deſluxum, proinde & phlegmonem, quā ratione & febrem. Cutare autem oportet omnes diarias ſimpliciter diſtas, Galeno teſte, balneis. Quapropter omnes qui iis febribus laborant, in primæ acceſſionis inclinatione in balneum ducendi ſunt. Non omnes tamen eodem modo, nec eiſdem balnei partibus vti debent. Nam qui bubonibus febrem contraxerunt, vtiliter in aere balnei immorantur, tum quod cutem rareſciant, tum vaporem e cōtēpo-
Cenſio. re foras eliciat. Nec ægrotos ſiccitate lædit, quemadmodum eos qui ex Laſſitudi-
 nis, vigiliis, curis, & aliis animi perturbationibus febricitant. Siquidem quum iam
 Non in a-
 moribus dia-
 ris eodem
 modo, nec
 eiſdem bal-
 nei parti-
 bus vten-
 dum.
 ab iis cauſis reſiccatur ſit corpus, ab aere balnei arceſcendi ſunt, ne noxam augeant. Igitur in balneo aquarum dulcium calente diutius verſari poſſunt, vt amiſſam hu-
 miditatem eius madore reſarciant. Poſtea veto oleo copioſiore tepido, cui nihil ad-
 frictionis inſit, mollibus manibus fricari debent. Hæc enim friſtio humectat, laxat,
**Friſtio mol-
 lis.** ſolidas partes emollit, & quæ in corporis meatibus detinentur, diſcutit. A ſolis vſtio-
 ne febricitantes, protinus ab initio refrigeratione, & crebrioribus balneis aquæ dul-
 cis, ſolæque exigui olei perſuſione, extra friſtionem, quod hæc ipſa calorem exci-
 tat, curare decet. Sin autem quæ refrigerant capiti admota, roſaceum & omphaci-
 num quod ſalis expetis eſt, aliaque quorum *libro 1. cap. 3.* mentionem fecimus. Hæc
 quidem primum frigefacta, deinceps lana ſunt excipienda, ac in ſublime ſuſpenſa.
C manu expreſſa ſincipiti inſtillanda; quæ aſſidue, donec febris inclinauerit. Poſtea
 in balneum æger ducendus. Si quis ex frigore febricit, ita quoque ad balneum in ac-
 ceſſionis remiſſione ducendus eſt, caputque ante & poſt balneum irino, & nardi-
 no oleo, aut ſimili fouendum. Caleſcipientibus enim & conſtipationem amolienti-
 bus medicamentis indigent, qui hæc de cauſa febricitant. Qui ob ſamem diaria
 febre laborant, inclinatione acceſſione ſtatim ad balneum ducendi ſunt, plurimo-
 que oleo dulci ac tepido perſuſi, molliter perfricandi, diutiusque in calidi ſolida aqua
 continendi, vt ſcilicet ſiccitas quam ſames corpori conciliauit, olei & balnei humi-
 ditate corrigitur. Vbi a balneo egreſſi fuerint, vires cibis conuenientibus reſcien-
 da, deinde rursus ad balneum ducendi. Vbi denuo exierint, balnei perturbatione ſedata,
D aqua calida propinanda: mox piſanæ cremor exhibendus, & interdum
 lactuca aſſumenda, piſcesque ſaxatiles ac molli carne præditi ex albo iure comedendi.
I Quod quale fuerit veteribus, *Galenus libr. 4. de tuenda ſanitate, & libr. 3. de Alimen-*
torum ſuaſi. capite De piſcibus molli carne præditi, oſtendit. Si propter cruditatem fe-
**Si a crudi-
 tate.**bris diaria euenit, conſolidandum in primis erit, num aluus lubrica ſit, an adſtricta.
 Si lubrica erit, & ea tantum quæ corrupta fuerunt, vacuata eſſe videbuntur: tum la-
 uandum, tum nutriendum in remiſſione febris erit: ſed non, niſi prius quæ ſunt iuxta
 ventriculum proſpexerimus. Sin ita copioſa inanitio aut prius facta ſit, aut nunc et-
 iam duret, vt virtus ægrotantis deſecta ſit, ſatius eſt omiſſa lauatiōe cibare, ſed pro-
 ſpicientes prius iis quæ circa ventriculum ſunt. Proſpicietur autem laborantibus
E modo vacuatio non amplius duret, irrigatione ventriculi ex oleo & abſinthio, aliſſ-
 que quæ ſupra, *lib. nimirum 3. cap. De ventriculi imbecillitate*, diſta ſunt. Ea vero quæ ven-
 triculo imponuntur, abunde calcentia ſunt. Nam quæ repida ſunt, ea omnia ventri-
 coli firmitatem diſſoluunt. Si autem venter omnino adſtrictus eſt, contractus hypo-
 chondriis, mox toto ventre, conſiderandum eſt num cibus in gracile inreſtinum,
 aut cōlum deſcenderit. Quod ſi alimenta adhuc in ventriculo perſiſtant, conetur
 æger plurima tepida aqua epota, immiſſo digito aut penna, totum quod inſeltatæ
 grauatur euomere. Deinde fouere oportet hypochondria, & quieſcere. At vbi iam ad
 inreſtinum alimentum deſcenderit, iubendum vt declui facie ac ventriculo recum-
 bant, venterque fouendus, ac ſomnus conciliandus: is enim mirifice cruditatem con-
Fcoquit. Poſt ſomnum ad educenda alui excrementa glans ſupponenda, aut leui cly-
 ſteri aluus mouenda, *quemadmodum copioſius Galenus libr. 2. Ther. meth. cap. 5. docet.* Qui ex
 adenum tumore febrem contraxerunt, iſſe Medicum quidem, vt ceteri prope mo-
 dum omnes qui diaria laborant, quid faciendū ſit interrogant. Tamen vlcus in primis
 quod

A quod bubonem attulit, curandum est, ea quidem ratione, quam Galenus in libro *De medendi ratione* docuit, Declinante autem accessione lauandi sunt. Tenui præterea vi-
ctu nutriendi, quod in iis corporis substantia non sit deperdita. Arcendi quoque a vi-
no, non tam quod febri sit inutile, quam quod bubonis curationem temoretur. Au-
get enim humorum in laborantem partem defluxum, proinde & phlegmonem: qua
ratione & febrem. Hæc quidem ad curandi rationem febrium diarium simpliciter
dictarum sufficiant.

De diariis plurium dierum. C A P. II.

EDIARIUM numero est etiam, quæ plurium dierum nominatur, non alia qui
eiusdem ratione, quam quod in tertium vsque diem extenditur. Alio nomine Syno-
chus non putrida vocatur. Diarium vero vetetes hæc febrem appellauerunt, quod
eiusdem cum diariis simpliciter dictis naturæ sit. Quippe post primam accessionem,
si modo quis eam recte tractet, desistit. Merito itaque inter diarias connumeratur,
nihilque obstat quod eius accessio ultra vnum protendatur diem, quemadmodum cap.
precedenti fusiua nobis dictum est. Oritur hæc febris ex densatione seu stipitatione me-
atuum cutis. Densatio autem ipsa, Galen. lib. 9. The. meth. cap. 3. septe, vel obstructis exilibus
meatibus, vel conuiuentibus, vel etiam corpore ipso moderatius densato: id quod a
frigore, aut qualitate vel balnei, vel medicamenti assatum acerbæ & adstringente, so-
le feruente, & aliis quæ eam siccare valent, euenire solet. Quia vero propter sti-
pitationem fumida ac fuliginosa excrementa intra corpus detinentur plurima, foras
autem quod de iis effluit per exiguum est, sit ut hoc nomine febris accendatur. Hæc signa
primum tantum apprehenditur, neque enim densitas exercitatum tantum latere potest, 1.
In iis enim cutis durior & compactior sentitur. Caloris etiam motu hæc febris cogno-
scitur, vt qui primo occurrit mitis ac leuissimus sit: postea vero si diutius adnotam ma-
num contineas, actiori. Nam per adstrictæ cutis exiguos meatus halitus paucus ex-
halat, qui fortis colorem fert, proinde mitis esse sentitur. Spacio autem temporis im-
positam manum magis ac magis calefacit, ita vt sensim auctus acrior appareat. Tertiæ
ex urina apprehenditur, quæ neque consistentia, neque colore a naturali multum est a-
liena. Sanguis enim non admodum feruet, neque bilis multa quæ vniuersam coloratiorem red-
dat, gignitur. Quartæ ex mole corporis, quæ manet, & non concidit, quod cutis densi-
tas vaporis ac humoris resolutionem impediat. Proinde neque oculi caui sunt, neque ari-
di: sed prominentiores ac humidiores, quam pro naturali constitutione, videntur.
Quinto ex pulsu, qui æqualis, maximus, celer, frequens, & vehemens existit. Qui ita
laborant, iis, modo recte curare velis, sanguinis missio adhibenda erit: tantumque san-
guinis detrahendum, quantum vites tolerant. Pro certo quoque habendum, nisi iis qui
hoc per naturam sunt habitu, vt corpus ex abundantia ad transpirationem inabile
habeant, id adhibeatur præsidium, fore vt vel suffocentur, vel ceræ syncope omnino
periclitentur, nisi eos vel vitium roboret, vel plurimus sudor, vel largum sanguinis pro-
fluuium a morte vindicat. Corpore per sanguinis missionem vacuato, non multo post
cibos & medicamenta ex iis quæ detergunt, exhibebis. Quæ autem in febribus hoc
præstant, in alimentorum ratione, vt attestatur libro 8. The. meth. cap. 4. Galen. sunt pituitosa
& multa: in medicamentorum vero, oxymeli, & quæcunque incoquere in multa li-
cer, seu calamintha, & hyssopum, & origanum, & serpyllum, & iris, & apium. Verum hæc o-
mnia iusto sunt calidiora, adeoque febres accendunt, ita vsque vt vinum. Oxymeli au-
tem solum nec febres accendit, & strenue deterget, sic vt ea quæ glutinosa crassaque
sunt dissoluat, & meatus obstructos liberet. Ex hoc victu obseruabis, quantum de fe-
brili calore minuitur. Etenim si tertio die mane videtis minimum esse quod de febre
relinquitur, ac neque putredinis humorum in pulsu nota subsit, neque in urina crudi-
tatis suspecta vero hora qua primo die febris occupauit, extra meridiem sit, audacter
hominem quam ocysime lauabis, longe ante sextam horam. Abunde tamen sit, si intra
tertiam horam lauationem compleueris. Ad eundem modum & si decimam horam sus-
pectam habueris, vsque ad septimam laues licet: quum tres æquinoctiales horas, qua-
tuorve inter balneum accessionisq; tempus interponi, abunde sit satis. Vbi in balneo
corpus lualuerit, dulci prius oleo tepido unctum, ac modetissime frictum, mox de-
tergeri extrinsecus, abluq; debet. Moderatissime vero detergent tunc erui farina,

tum hordei, tum fabarum. Præterea *mulsa*, quæ sit aquosa, magis autem quam hæc *iris*, & *panacis radix*, & *aristotelia*, & *mulsa*, quæ mediocri est mixtura: veluti etiam hæc magis quæ est meracissima. Fit hæc ubi mixta melle exigua est aqua, sic ut liquidum mel exiguis curis meatus facile ingredi possit. Hac magis detergent tum spuma nitri, nitrum ipsum, tum *aphonitrum*. Est autem & sapo ex iis quæ maxime detergere valent. Porro post balneum, præter aquam quæ parum apti incoctum in se habet, nihil est ægrotanti offerendum: licet quod inter balneum & suspectas horas spacium erit, trium fore horarum conciciamus. Si vero circa vespertam, aut duabus horis citius accessio inuadat, tum laquille maneliceat, tum ciballe, sed tantum pituæ ctemore, Deinde si suspectæ horæ nihil afferant, & lauare rursus, si velit, licet, & cibare, vrina tamen & pulu consideratis. Sin aliquid eueniat, & conferendum, id est, cum accessione, quæ primo die incidat, & tum vrinæ considerandæ sunt, tum etiam pulsus. Quæ omnia profecto mediocria apparebunt, ubi exigua relinquatur obstructio. Quare ipsum & laubis quarto die, & cibabis, ad iam dictas consideraciones specians: ipe-rabisque nihil quinto die superuenturum. At si magna obstructio facta sit, ea febris ex diarium genere non erit.

De synocha putrida. C A P. III.

Synochus febris. *S*ynochus Græcis Medicis, Galeno libro 9. Ther. method. cap. 5. auctore, est febris, in qua vna accessio ab initio ad finem perpetuo manens, in multos dies porrigitur. Vel est, quæ omni mutatione magna usque ad iudicium caret. Hinc commodissime Latinis continens nominatur. Quanquam vero vna est: id est, species eiusmodi febrium, a qua synochos eas appellant, tamen natura earundem non est simplex, vnaque, Quædam enim illarum nullam prorsus putredinis notam habent, quas ex diariarum febrium genere esse, capite præcedente monstrauimus, nominatque synochos non putridas diximus. Quædam vero manifestam habent putredinis notam, ideoque synochi putridæ vocantur: de quibus in hoc agemus capite. Barbaram sedantes medicinam, has synochos, illas vero *synochos dixerunt*, Galenus autem & Græcialii, ut commemoratum est, vitæque sub nomine synochi complexi sunt. Ceterum febrium continentium tres sunt differentie. Nam quædam illatum a principio ad finem vique æquali magnitudine ac vehementia perdurant, has Græci *synochos* & *synochos*, hoc est, in eodem vigore permanentes, vocant. Quædam vero semper augentur, & exiguum aliquid adiiciunt, eas Græci *synochos* & *synochos*, id est, incrementum suscipientes, aut inualescentes nominant. Quædam paulatim diminuantur & decedunt, quas Græci *synochos*, hoc est, decrecentes, appellant, quemadmodum *fusus loco paulo antecitato, & lib. 2. De differ. feb. capite 2. & lib. 2. De iudicio, cap. 4. Galenus docet*. Synochus seu continens putrida sit, ubi in omnibus valis, maximis potissimum, quæ circa alas & inguina sunt, æqualiter communes putrescunt humores. Quod quidem euenire solet, quando a vehementi stipitatione, qui intra corpus est febrilis calor cohibetur. Quæcunque enim calida & humida sunt, difficilenque transpirationem habent, ea prompte putrescunt. Quare hoc genus febris nec in gracilibus, nec iis qui raro sunt corporis habitu, nec in frigido corporis temperamento, nec in frigida ætate excitatur: sed plurimum in iis, qui sanguine abundant, & tum ætate, tum natura, tum acquisitionis temperamento calidi sunt: ac præcipue carnosus ac corpulentis, & denso corpore præditis, aut etiam calidis excrementis repletis. Qui ita febricitant, iis pulsus est maximus, vehemens, celer, frequens, & æqualis. Constitutio substantiæ arteriæ, nec durior quam pro natura est, nec mollior: celeritatis tamen frequentique eo petuenit, quo febris ipsam ignitudinis. Atque hæc quidem indicia illa cum synocha citra putredinem, communia obtinet. Priuatim veto ei putredinis notæ insunt, idque tum in vrina, tum pulsui, tum caloris ingrata qualitate, de quibus copiosissime tractat Galenus lib. 2. De differentiis febrium, cap. 5. Curandi ratio, haud leccus atque in synocha non putrida, a missione sanguinis auspicanda. Et virtute quidem valida existente, nulloque alio insigniter repugnante, sanguis usque ad animi deliquium auferendus. Maximum enim hoc, ubi valentes vires sunt, Galen. lib. 9. Ther. method. cap. 4. teste, synochi seu continentis febris remedium est. Primum namque in contrarium statim agitur corpus, celerime ex animi defectu refrigeratum. Ut vero corpus refrigeretur, nemo quod vel ipis ægris, vel quod

De medendis morbis Lib. III. 185

- A** quod naturæ quæ animantes gubernat iucundius, vtiliusque sit inuenire potest. Deinceps in eiusmodi corporibus necessario superuenit alius defectio, nonnunquam etiam bilis vomitio. Quas res statim a toto corpore madores, sudoresve excipiunt. Optimum igitur factum est, statim non numero dierum, sed vni virium robori in febribus illis attentum esse: quippe quod si seruatum est, non solum textu, sed etiam move, sed etiam frequentibus dieb. sanguis est mittendus. Quod si vero curare aliquando infirmum coegeris, cui non solum antea secunda venæ remedium prætermisum est, sed nunc quoque vel per Medicorum ignorantiam, vel ipsius laborantis propinquiorum, & eius timiditatem procedente tempore sanguinem mittere prohiberis, ad frigidam exhibendam accedes: sed diligenter aore discernens, quantum ex ea nocuum cōtingere possit. Nam si id aut exiguum erit, aut nullum; offerenda potui est quæ prorsus sit gelida, quantum agro bibere libet. Quinimo magis id audebis, si frigide potioni assueuerit. Sin magnum timetur incommodum, ab hac quidem abstinen dum, atque aliis auxiliis quibus obstruatio eximatur, & abundantia vacuetur, & feruor febris descebeat ac sedetur, vtendum. Porro incommoda quæ frigidam potionem intempestiue, immodiceque exhibitam sequuntur, in iis consistunt, primum quod lentos crassosque humores, siue obstruções, siue putredinem, siue phlegmonem, siue qualis erysipelas, aut scyrthum; aut œdema est affectus creauerint, attenuari digerique prohibet. Quoties igitur ex iis febris accenditur, ad corū vacuationem frigida non conducit: ad præsens tamen non paruum adfert leuamē, propterea quæ iam accensam febrem exstinguit. Verum quod causa eius adhuc permaneat, aliam denovo febrem accendi necesse est, atque ea quæ præcessit, nonnunquam difficiliorem, propterea quod densatum ex frigida corpus est. Atque hæc vna incommodi species est minime contemnenda. Altera est, quæ multas laborantes imbecillas particulas, siue ita se ex naturali intemperie habent, siue ex vitio adscriptio, frigida lædat. Sic compertum est, aliis gulam adeo vehementer esse laxam, vt vix deglutirent, quæ modo dū eius rei historiam elegantem receoet Gal. lib. 7. The. meth. cap. 8. Aliis ventriculum, vt vix concoquerent. Aliis ipsum ventriculi os, aut iecur, aut colum, aut pulmo, aut sepsi traosuerfum, aut renes, aut vesica, aut tale quippiā aliud a frigido percussum, ad propriam actionem infirmum est redditum. Nonnullis autem ex intempestua immodicaque eius potione, non multo interposito tempore, nec postmodum, sed ilico difficultate spirandi & conuulsione & tremore cornpiuntur, ac toto, vt semel dicam, neruoso genere læduntur. Vt igitur in pauca rem cōstitrahamus, quibusunque in principe particula tumor aliquis phlegmatodes, aut œdematodes, aut scyrthi naturam obtinens consisterit, iis frigidam offerre non oportet. Sed nec iis quibus obstruatio, putredinis humor non coctus, incommoda. Quod si vero euidenter percipis absque iam dictis tumoribus coctionis in vtriusque notas, & neque pars aliqua temperamento adeo frigido fuerit donata, vt in hanc noxa procumbat, audacter frigidam dabis. Quippe solidatum animalis partium natura roborata, præternatos iam humores aggreditur, ita vt qui viles sint, atque ad nutriendum habiles, hos quidem ad se trahat: inutiles vero vel per ventrem, vel per cutim eiiciat. Quod si etiam frigida affluet: æger fuerit, maiori cum fiducia frigidam exhibebis, ipsa scilicet experientia iam edoctus, omnia visceta eius occursum familiariter tolerare. Omnino namque si quod frigidum adeo esset, vt ab hac offenderetur, per sanitatis tempus euidenter offensam suam ostendisset. Nulla vero per sanitatem particula quicquam ab hac læsa, nec etiam inter febricitandam quicquam lædatur. Vbi namque nonnulla quæ frigidæ potioni non assueti, tamen propter ardentem febrem eam bibere coacti nullum incommodum senserunt: multo profecto minus eorum qui assueuerunt, quisquam lædi debet, cui etiam pro munimento maximo accedit ipsa caloris copia. Hinc namque quum in vasorum sinibus plurimus continetur, vt pote tum aerea in his substantia, tum etiam succis omoibus inflammatis, quantum a frigido patitur refrigeratus, tantum rursus calefaciendo in ipsum agit. Ideoque in iis ruralis, qui exiguum sanguinem, carnemque obtinent, frigida potio est. Celeriter namque ad solidas animalis partes peruenit, nulli quod eius vim frangat occurrens. Eodem etiam sit, vt hec tunc febres nec perinde eam quæ prorsus sit gelida, nec multam desiderant, ceu quæ extenuatis omnino, exiguique sanguinis corporibus incidunt.

Frigida quæ
do exhibenda.

Frigida in-
commoda.

Quibus frigi-
da non
exhibenda.

Contine-
tiam febri
duo maxi-
ma reme-
dia.

In erudi-
te ciborum
non mitti-
tus ſan-
guis.

Vitus ra-
tio.

Quando
cōtinuus,
febri labo-
rantes ſunt
aleandi.

Ex his itaque quæ iam dicta ſunt, omnibus perſpicuum fit, continentium febrium A
maxima remedia eſſe hæc duo, ſanguinis detractiōem, & potionem aquæ frigidæ.
Verum illa nullo non tempore, modo vires ſuſtineant: hæc, quum & in pulſu, & in vi-
rinis cōditiones evidentes cernuntur notæ, febriſ aurem maxima eſt. Attendenda
vero cum venæ ſecundæ indicationibus ſunt, tum quæ eam præcedunt, tum ve-
ro quæ ſequuntur. Nam ſi præcedat ciborum eruditās, tanto tempore diſſerre ve-
næ ſectiōem iubebis, quantum ſatis facere tum ad eorum cōcoctiōem, tum vt ex-
crementa deſcendant videbitur. Sin ſequetur neceſſario vacuatio quæpiam, tan-
tum illi de ſuperante relinquendum, quantum eſt per eam vacuandum. Itaque ſi tem-
pore mittendi ſanguinis menſes moueti contigerit, ſiue etiam hæmorrhoids ſit reclu-
ſa, ſi inſpecto fluentis impetu, ipſe ſatis forte videbitur, qui ſolus quod requirit vacuet, B
naturæ tē omnem permittes: ſi minus, tantum ipſi detrahes, quo ex coniunctis
ambobus perficiatur quod poſtules, quemadmodum capitulus Galeni libro 9. The. method.
capite 5. docet. Vitæ autem ratio in his febribus hæc poſſimum ſit. His quibus ve-
na ſecta eſt, poſt duas a ſectiōe hotas ptiſanæ cremorem exhibebis, quietemque
imperabis. Vbi vero a ſomno excitati fuerint, rursus ptiſanæ cremor præbendus. In
hæc vitæ ratione viſque ad tertium diem perſiſtendum. Animaduertendum autem
in ſynochis febribus tum alendos eſſe ægros, quo tempore ſanialis cōſueue-
runt, & vbi maius leuamen ſentiunt: ita enim alimentum facilius ferent. Quod ſi vi-
tæ vires robuſtæ fuerint, & vigor morbi ſtatim expectetur, tenuiſſimo victu vtē-
dum erit. Sin contra vires imbecillæ fuerint, haud ſine ingenti diſpendio victus ten- C
nuiſ exhibetur. Ergo in cibis offerendis virium totum diligenter perpendendum erit.
Plura qui de huius generis febrium curatione ſcire deſiderat, Galenum loco paulo an-
te citato legat.

De continuis Febribus. C A P. IIII.

Febriſ con-
tinua.

Febriſ conti-
nua & cōtinua
diſſerunt.
In quoniam
vires & cōtinua
vires cōtinua.

Caſſi.
Diſſerunt
continua
febriſ. rita.
Anſens fe-
briſ ſine
cauſis.
Continua
eiuſdem
cauſis cum
intermit-
tentibus.

Continua
tum & in-
termitten-
tum diſ-
ſerunt.

Signa.

FEbris a Latinis continua Græciſ autem cōtinua dicta eſt, quæ non antequam ex-
toto fuerit ſoluta, ad inſebriecitationem deſinit, remiſſionem tamen aliquam ſenſi-
lem in ſingulis acceſſionibus obtinet. Vnde omnibus perſpicuum fit, cōtinuam & cōtinuam
eſt cōtinuam & cōtinuam febres inter ſe diſſerre. Siquidem in ſynocha continen-
te nulla ſit febris remiſſio, donec deſinere incipiat. Synechiſ autem, ſiue cōtinua
in ſingulis acceſſionibus remiſſionem ſenſilem habet. Item ſynochus vnicam dō-
taxat acceſſionem obtinet, ſynechiſ vero plures. Ceterum cōueniunt hæc febrium
genera in eo, quod neutrum horum ad inſebriecitationem peruenit, Græci quidem
Medici, vt hanc, quam diximus, ſtatuerent diſſerentiam, ſolæciſmum committere
potius voluerunt, quam formam iſtarum febrium ſine nomine relinquere. Quippe
Græciſ cōtinua & cōtinua dicitur, non autem cōtinua. Porro continua febris ſit, vbi vnus
duntaxat humor intra vaſa putreſcit. Suntque huius febris, pro putreſcentis in venis
humoris diuiciſitate, diſſerentia tres. Nam ſi ſtæua bilis intra vaſa putreſcit, tertia-
nam continuam, quæ alio nomine Græciſ cōtinua Latinis vero ardens appellatur, effice-
re ſolet. Sin pituita putreſcit in venis, quotidiana continua generatur. Si vero me-
lancholicus humor, quartana continua naſcitur. Quare eiuſdem generis ſunt cum
intermittentibus: cum tertia quidem exquiſita intermittente, tertia continua,
quod ſcilicet perinde atque illa tertio quoque die acceſſionē habeat. Quotidiana cōtinua,
cum quotidiana intermittente, quod nimirum ſingulis diebus acceſſionem ob-
tineat. Quartana continua, cum quartana intermittente, quæ quouis quarto die in-
uadat. Diſſerunt tamen etiam ab inuicem, non obſtante quod eo qui vtrique facit hu-
more cōmunicent, duplici ratione, vna, quod in continuis humor putreſfactus intra
vaſa, vt comprehenſum eſt, continetur: in intermittentibus autem per ſingulas corporis
partes diſpergitur. Altera, quod intermittentes ad inſebriecitationem deſinant.
Impero enim delationis ipſæ per ſeipſas expurgantur. Continua autem ad inſebri-
ecitationem non peruenit, niſi ex toto fuerint ſolutæ. Proinde nullam certius indi-
cium febrium continuatum eſt, quam quod nulla earum ad inſebriecitationem per-
ueniat, donec de integro & prius deſierit. Alia ſigna ſunt illis etiam intermittentibus
cōmunia. Exquiſita enim ardens febris omnes alias exquiſitæ tertianæ intermittē-
tes notas ſeruat, hoc tantum diſtamine varians, quod neque cum vigore inuadit, neque
in quie-

A in quietem definit. Pari ratione quæ singulis diebus accessionem habet, exacerbatur, omnes exquisitæ quotidianæ notas præ se fert: sed quod haud intermittit, hæc se a quotidiana intermittente differt. Simili modo & ea quæ quarto quoque die accessionem obinet, quartanæ exquisitæ notas reuinet, sed ad quietem non peruenit. Porro quum continuas febres ex putridarum genere esse, ex iis, quæ diximus constet, necesse erit, ut qui illas commode curare volet, putredinem primum inhibeat. Ita dux statim se indicationes exhibent, quarum altera a febre, altera vero a putredine sumitur. Atque a febre rursus dux, scilicet ut portio febris quæ iam accensa est, percurratur: quæ vero in generatione est, inhibeatur. Aliæque dux a putredine, ut & quod putredinis iam factum est, sinemus, & quod in generatione adhuc est, sistamus. Quod

Curationis
methodus.

B in generatione est, id perspiratio impedita facit. Ita ab hac quoque dux aliz indicationes nascuntur, tum ut quod retentum est vacuetur, tum quod retinendum est prohibeatur. Prohibebitur autem iis præiudiciis, quæ obstructioni medentur. Huius rursus obstructionis, quod iam occupauit sanandum est: quod futurum est, arcendum. At curabitur quidem id obstructionis quod iam factum est, per ea, quæ obstructione liberant. Propulsabitur quod futurum est, si effluxum obstructuentium humorum eompescuerimus. Vnde satis liquet, quod vltima in ipsa resolutiua methodo est inuentum, id omnium primum in curatione esse peragendum. Quum igitur particulatim rem expendentibus quinque sunt in febribus continuis, a quibus indicationes colliguntur, febris nimirum, putredo, impedita perspiratio, obstructio, humorum obstructuentium copia, a postremo curatio auspicanda erit. Copia itaque humorum obstructionem efficiendum requirente vacationem, principio si valida fuerit virtus, tempus & ætas, atque alia consentiant, sanguinem mittere oportet. Mittendus vero tum in magis sanguis erit, quando vniuersum corpus plus solito rumet, aut vena eminens ac dilata sit. Ea namque sanguinis abundantiam significant. Vacuata multitudine, ad alterius, puta obstructionis, curationem accedendum, medicamentisque quibus obstructio tollitur vtendum.

Quinque sunt
res a quibus
in febribus
continuis
indicationes
colliguntur.
Vena scilicet
dilata.

C Quoniam veto horum plethoræ calida sunt, metuendum ne tum putredinem, tum febrem augeant, itaque iis quæ citra calorem ab obstructione liberare possunt, vtendum. Qualia autem hæc sint, diximus supra, capite nimirum huius libri secundo. Vbi vero quæ obstructum deterfa & dissoluta sunt, per alium, vrinam, ac sudores ea vacuare tentandum. Quum veto materiz quæ hæc efficiunt calidæ sint, necesse est tum putredinem, tum febrem augeri. Quare quoad licet id agendum, ut quæ minus calefaciat materia deligatur: aut si qua inuenire potest quæ non calefaciat, quemadmodum in hoc casu balneum, vti quæ ea petenda est. Balneum vero id ipsum posse, Galen, lib. 3. De tuenda sanis. capite 3. iis verbis diserte docet. *Dulcium calidissimum aquarum si temperata sint, vix calida & humida est: sin tepidiores sint, humida & frigida.* Et paulo post. *Balneum si probe adhibeas, duras, sensusque partes emollit, excrementum, liquamentumque si quod intus distentem hares, euocat.* His peractis, & deterfis iis quæ cuti impacta fuerunt, adeoque obstructione ac impedita transpiratione amota, ad putredinis curationem veniendum est. Quocirca hoc tempore imprimis vires robotare,

Obstructio
vt sananda.

D E quo & putredinem supetent, & humores concoquant, studebimus. Putredinem quoque sanabimus, si id quod corruptum est, omni ratione vacuabimus: Quod reliquum est, moderatis motibus, & refrigerante perspiratu ad exquisitam mediocritatem reducemus, ac vacationem eorum per vrinam, deiectiones alui, vomitum, ac sudores moliemur. Vltimo ad febris curationem progrediendum, quæ quidem per refrigerantia fieri solet. Omnis enim febris, quæ febris est, humectatio refrigeratioque remedia sunt. Quo vero modo horum quodque recte fieri debeat, partim antea dictum est, partim in sequentibus commemorabitur. Porro in febribus continuis, quibus morbi viget non longius septimo futurus est, & vires validæ sunt, ætasque consentit, exquisitus omnino & reuivis victus institutus est. In quibus vero longius septimo totius morbi

Balnenim re
frigerat.

Putredinis
curatio.

Victus ta-
tio.

E bi vigor erit, aut victus imbecilla est, per initia quidem liberalius, instante vero vigore parcius, vigente morbo tenuissimum cibare oportet. Postea rursus semper vberius, eodem modo cibum augendo, quo ante vigorem minuebatur, quemadmodum sectione 1. Aphoriz. Hippo.

crates docet:

A omnibus fiat epithema. Porro vigile morbi instante, & nullo eorum, *qua supra capite tertio dicta sunt* prohibente, sincere frigida iam tuto exhibeatur. Quod si timor, quamvis minimus, obstitit, primam portionem refractam propinabimus. Refrangeretur autem in hunc modum. Sumito temperata *aqua cyathum unum, cui quinque scyllera frigida admisceto*, & sic suspectis corporibus præbeto. Quid multa? in ardentium febrium curatione horum alterum fieri necesse est, ut aut biliosi humores excernantur, aut iidem extinguantur. Excernuntur autem per sudores, vomitiones, & aluum. Extinguuntur vero potu frigida, quo sane sepiissime ex toto ardentissimæ febres curantur. Ceterum *balscum aqua dulcis* iis solum conuenit, qui citra tumorem ad phlegmonis, aut erysipelatis naturam tendentem ardenti febre laborant. Quod si vero concoctionis notæ in urinis appareant, multo magis competet. Aeger autem qui in ardentissima febre frigido vii cupit solio, sit iuuenis, moderatoque corporis habitu, *ut Hippocrates etiam monet*. Nec id facere in animum inducat, nisi æstatis tempore, ac anni constitutione calida, inque febris vigore, & sit quoque frigida lotioni perfunctare assuetus. Moderatori vero existente febre, robustaque virtute, simul cum concoctionis indicis, solium aquæ dulcis & temperata sufficit, ac confert. Ex vñtationibus, *oleum chamæmelinum*, præsertim ubi aer ambiens frigidus sit, conducet. Ceterum materiei copiam, ex qua ardentibus febribus competentia remedia componuntur, sequentia capita suppeditabunt.

De exquisita tertiana intermittente. CAP. VI.

TERTIANA febris intermittens exquisita, ex aliqua bile per sensiles corporis partes delata, & sui ipsius naturam putam sinceramque seruante oritur. Quapropter, quum ex bile sincera, nullique alteri humori permixta proereetur, exquisita medicis dicta est. In biliosis morbis natura corporibus consistit, & vigeni ætate, tempore æstiuo, calidis & siccis regionibus, similibus aeris constitutione, vita etiam laboribus, vigiliis, curis, intensis cogitationibus, ac solis feruoribus dedita & exposita. Hæc etiam statim ab initio, inque singulis accessionibus rigorem vehementem affert: quæ vna quidem ratione ab ardente febre, *ut supra est ostensum*, differt. A quartana vero rigore in hoc distat, quod corpus pungetur, ac veluti vicerare videatur, quum quartana refrigerationem habeat simillimam ei quæ hyberno tempore sentitur. Tertianam iraque febrem non contingit fieri sine rigore vehementi, pungente ac vulnerante carnem. Quartana vero, neque primo statim die cum rigore inuadit vehementi. Nam progrediente ipsa, atque aucta, vna quoque rigor augetur, sensusque ægotantium non est quasi eorum, qui punguntur, sed potius qui refrigerantur, & veluti ad ossa vsque molestantur. Est & in tertiana pulsuum exactus ordo & æqualitas, qui tamen ad vehementiam ac magnitudinem atque frequentiam in accessionum incrementum excitantur. Præterea in rigore, etiam sitim inuehit, ac hominem exurit, ut abiectis vestibus æger denudetur, ampleque & frequenter spiret, exsuffletque veluti flammam, frigidamque potendâ effligiet. Calor æqualiter subinde per totum corpus diffunditur, nihilominus vix thorax quæ extremitates calent. Et ubi manum inieceris, primo quidem contactu calor plurimus ac mordax occurrit, veluti cum vapore quodam erumpens: non multo tamen postea a manu remanente vincitur. Bilis denique vomitio superuenit, aluiusque soluitur, & biliosum mingunt, subrissum, suillavumque, & moderate crassum. Urina quoque statim nubesculam albam, aut sublarionem laudabilem habet. Ruffiore autem existente urina, neque suspensione, neque nubescula in primo circuitu apparentibus, febris ad septem circuitus extenditur. Præterea ad infebriatationem desinit, ubi accessionis spacium horarum æquinotialium ad summum duodecim durauerit. Nam hoc tempus longissimum est in veris tertianis. Breuius vero aliquando prædicto spacio temporis accessio, in eo quod magis ac minus plurimum habens differentiam, ob quantitatem videlicet, aut qualitatem ipsius bilis, aut propter laborantis vires, aut propter præsentem eo tempore corporis laborantis affectum. Febrem igitur quæ intra duodecim horas terminatur, exactam tertianam nominamus: quæ vero diuturniorem accessionem habet ea non tertiana exquisita, sed extensa vocatur *quemadmodum Galen. libr. 2. De differ. febr. capite 1. fusius monstrat*. Quod si quotidie febris cum vehementi rigore inuadit, & cum aliis

Frigida
quæ
hibenda.Falsæ qui
bus confert

i. Aph. 2.

Vñtationes

Causa.

Exquisita
tertiana
causa
signa.Tertiana
rigor quo
differat
a quartana.Duplici
tertiana
notæ.

190 Operum Leonhard. Fuchsi Pars III.

tum vrinarum, tum multivum, tum ceterorum notis quas diximus, duplex tertiam A
nuncupatur. Quæ singula signa copiosius profecquitur Galenus lib. 1. ad Glaucon. cap.
5. & lib. 2. De differ. feb. capite 3. & libro secundo De indicio capite 3. Ceterum exquisitam ter-
tiam, quæ ex sincera flaua bile commota constat, quoad fieri maxime potest, hume-
tare & refrigerare oportet. Quippe is humor inter omnes alios qui in corpore sunt,
Vicia. Galen. cap. 5. lib. De inæquali intemperie, testis, calidissimus & siccissimus existit. Ager itaq;
deumbat in loco frigido ad auram suauem, vs cap. huius libri tertio etiam dictum est, expo-
sus. Accenda quoq; turba a domo est, vt quæ halitu calefaciat: solum spargatur frequen-
ter aqua frigida, liquore rosarum stillaticio, violarum item & similium. Humi iternantur fo-
lia salicum, vitis flores rosarum, violarum, nymphaea, & id genus aliorum. Cibis vitantur ægro-
tantes, quibus refrigerandi & humectandi vis inest. Tantum vero de iis dari debet, B
quantum optime concoqui potest. Ex oleribus quidem atriplex, blitum, malua, lactuca,
cucurbita, lapathum, intybum, & id genus alia. Ex aliis autem cremor pisana, & sorbitio ex a-
lica. Ex picibus vero saxatiles. Hi enim præter id, quod refrigerant & humectant,
boni sunt succi, ac facile concoquantur. Ex volatilibus quæ molli sunt carne, vt sunt
gallinacei perdices, columba, & passeris iuniores, pasciani, & similia. Quæ vero talia non
sunt, eorum alæ, vt quæ ob crebram exercitationem excrementis vacant: & gallo-
rum gallinaceorum testiculi & suum pedes, quia exercitati excrementis carent: ac
cerebra, præsertim si rite coquantur. Porcellorum quoque si liquefactas coctura
carnes præbueri, nihil nocebit: ita n. facilius a ventriculo conficiuntur. Sed & ova for-
bilia, id est, quæ tantum modo incalescunt, permittantur, præsertim eorum vitelli: ii C
enim, Galeno & Paulo scilicet, facilius quam album concoquantur & mediocriter re-
frigerant. Ex fructibus gustari conceduntur, qui non omnino ad concoquendum
difficiles sunt: vt sunt acerata, pruna mora. Abstineendum autem a melle, vt quod facile
in bilem vertatur, sinapi, salsamentis, & omnibus acerbis. A vino autem, priusquam
morbus concoquatur, omnino arcendus æget. Bibat autem interim aquam in qua
parum cinnamomi decoctum sit. Vel hoc vtatur potu, qui habet: Zalapii violacei,
vncias quatuor. Aqua in qua parum cinnamomi sit decoctum, libram vnam. Commi-
sceantur inuicem, & de altero in alterum vas sepius transfundantur. Vbi vero con-
coqui coepert morbus, dandum erit initio vinum tenue, paucum, & aequolum. D
Liberalius vero, ubi in propinquo est morbi solutio. Hæc quidem victus ratio mul-
torum est, non omnium, ad coniecturam tradita & exposita. Qui enim molliter non
educantur, sed duram vitam agunt, ac robusti sunt, iis tenuior victus instituendus est,
nempe pisana cremore vsque ad febris iudicium contenti sint. Quod ad somni ra-
tionem attinet, in accessione non est dormiendum, sed vigilandum potius: vt scilicet
sanguis & spiritus, adeoque caloris natui ad interiora motio impediatur, inque con-
trarium, & ad exteriora trahatur: alias enim febres vix dissoluntur, & ad consistendi
tempus tardissime perueniunt, fluxionesque multiplicantur. Finita accessione, so-
mnus non improbat. Exercitia, & omnes alii vehementes motus fugiendi, ne
cum Herodico, cuius libro sexto, Epide. meminit Hippocrates, ægrotautes interficia-
mus. Animi deturbationes, ita potissimum, timor, moestitia, & similes longe ab-
E
sint. Ceterum non solum iam dicta victus ratio, sed & medicamentis quæ refri-
gerate & humectare possunt, vii oportet. Initio autem ad bilis feruorem restin-
guendum, caloremque initigandum hoc decocto vtendum, quod accipit: Florum
violarum, boraginis, rosarum rubearum singulorum manipulum vnum. Florum nymphaea, manipu-
lum semis. Intybi satini vtriusque, lactuce, singulorum manipulum vnum & semis. Passularum
reputarum, vnciam vnam. Prunorum damascenarum numero vndecim. Seminum intyborum
sativorum lactuca portulacæ, cucurbitæ, singulorum vncias tres. Radicis cichorii, drach. sex. Co-
quantur singula in duobus libris aquæ fontanæ, quoad tertia pars absunta fuerit. De in co-
lo trahantur, & sacchari adiectione ius decocti dulce reddatur, alboque oni purifice-
tur, additis serapii de intybo satino latifolio, & zalapii violacei, vniuscusque vncias duas & dimi-
diem. Commixtis omnibus fiat potio, de qua singulis diebus in aure rateiuno detur
F
pondus vnciarum quatuor & dimidia. Quod si æger delicatior est, & a potione abhorret,
sumat quotidie ex hoc medicamento, quod habet: Sacchari violacei, boraginis, rosæ,
nymphaea, cichorii, singulorum, vnciam dimidiam. Antidoti e prunis damascenis citra diacridion,
drach.

Vicia.

Ova for-
bilia.

Potus.

In accessio-
nibus haud
dormiendi

Para. 3.
Apho. 34.

Casatio

Decoctum
concoquens
hic.

Mixtura.

De medendis morbis Lib.III. 191

- A** drachmas septem. Diarrhœden abbatin, unciam unam. Specierum diatriosentalen, uncias duas. Vacuatio.
Zalapiti violacei quod satis est ad excipiendum, fiat mixtura. Summovenda præterea
cautius, quæ febrem attulit, id quod fit ubi biliosus humor vacuatur. Eum itaque qui
ad stomachum recipit, per vomitum educere oportet. Hic vero quæ ratione sit cien-
das, in superioribus libris est expolitum. Eum autem qui deorsum fertur, per alui ex-
cretionem elicere convenit: quod quidem etiam sponte interdum in exquisita ter-
tiana fieri solet. Quare qui tum rhabarbarum exhibent Medici nequaquam, quod
nonnulli faciunt, reprehendendi sunt. Siquid illud abunde bilem flavam primum e-
ducit & edomat, postea vero vi sua adstrictoria partes corporis inter purgandum læ-
sas, ventriculorum potissimum & intestina, roborat. Neque enim natura, alia de causa
- B** hanc ei facultatem indidit, quam ut a purgatione roborat. Quapropter hæc adstrictio quæ minime vehemens est, febrem haud lædit. Vomitiones vero eliciuntur maxime accessionis initio, *ut auctor est Galenus, libro cui titulus est: Quæ nam purgare oporteat quibus medicamentis, & quando.* Vomitus.
Nam eo tempore natura illuc bilem producere so-
let: quomodo modum in remissione ad internas partes, aut ad cutem. Igitur per id tem-
pore molles ac leves clysteres iniciendi, tum quod facile bilis educatur, tum eius acri-
monia quæ intestina molestat atque mordicat, clysteris lenitate frangatur. Talis vero
est is, qui accipit: Alabastrum foliorum violæ purpureæ, lactuca, mercurialis in sybilis utriusque
singulorum manipulum unum. Seminii portulacæ, melenum singulorum drachmas duas. & seminis.
Coguntur in aqua infla quantitati donec tertia pars absumatur. Cole trahuntur, & iuri decocti
- C** ipsius adiciantur, cassia singularis recens extralla medulla, unciam unam. Olei violacei, uncias tres. Clyster.
Salsæ communis unciam unam & dimidiam. Commixtis omnibus fiat clyster. Per urinam
quoque & sudores bilis exigenda præsertim si illuc natura feratur. Quod recte fiet
medicamentis quæ urinam cient, non tamen omnibus, sed quæ citra exsiccationem
id præstare possunt. Urina quoque potionibus, in quibus apium & anethum madue-
runt, prout cauda. Et si concoctionis nota apparebunt, iam tuto absinthium exhibe-
bis, quod a ioculisammum est ventriculi remedium, ubi hunc bilis infestaret: si præ-
sertim ex ipsius coma, quantum sufficiat, accipiens, in melicrato maceraveris. Bilem
enim per alium ex ventriculo purgat, ex venis vero per urinam. Sudorem vero hoc vel
simili medicamento euocabis quod accipit: Radicum apii, asparagi, ichorii. singulorum un-
ciam dimidiam. Seminum petroselinii feniculi, rufi lybistici, singulorum drachmas duas. Cicerum
nigrorum, drachmas tres. Ascebi, manipulum semis. Coguntur singula in aqua fontana infla
quantitati ad tertiam, dein solo trahuntur, & sacchari adiectione iuri decocti dulces reddatur: ad-
ditis oxymelini compositi uncie duabus, fiat potio. Aur singula prædicta redigantur in
pulverem, & de his qualibet vice drachma una, aut drachma una & dimidia, eum tribus
oxymelini simplicis uncias exhibeantur. Hæc autem medicamenta quæ sudorem
eliciunt, in accessionis declinatione, aut die in qua æger a febre liber est, propin-
quantur. In hunc usum etiam non parum confert inundio ex oleis chamæmelino;
anethino, & id genus aliis. Balnea denique calida ex aqua dulci & potabili profusè
duplici nomine, tum quia aliquid bilis euocent, tum etiam quia sua qualitate pluri-
um iuvenit. Nam huiusmodi balnea, ut etiam libro tertio De mundi sanitate testat-
ur, humectant, & potentia refrigerant. Balnea vero ex aquis marinis, salis, nitrosi,
& sulphureos, plus quidem bilis educunt, sed multo minus quam potabiles profunt.
Præstat autem neque ipsa vtilia dicere, quandoquidem plus exsiccando obstant, quam
vacuando iuvenit. Semper autem oportet contrarias qualitates, Galenus ad Glauconem
teste, illis quæ præter naturam inualuerunt opponere: quom hoc multo commodius
fit, quam quouis modo vacuare. Ex quibus sane verbis bisitiquet, Galeno parum placere,
in exquisita tertiana vacationes, præsertim eam quæ sit sanguinis missio, &
vehementer purgare medicamento. Nec melatet hoc loco esse qui merentur, imo
me non obscuris verbis suggillant, quod in tertiana exquisita sanguinis missionem
parum probem. Et pro sua opinionis confirmatione locum Galeni ex libro methodi me-
dicandi recipere, & male tamen intellectum producunt. Quod vero locus ille ipsorum o-
pinionem non patrocinetur, in enarratione huius loci in nostris commentariis, & in-
fra capite præsentis libri 12. prolixè ostendimus, ut opus non sit eius explicationem hic re-
petâ, & inserâ. Sunt enim id genus purgati omnia medicamenta facultate calida. Quæ

Vacuatio.

Vomitus.

Clyster.

Urinam mouentia.

Absinthii.

Sudorem eliciunt.

Balnea ad quæ dulcis.

Sanguinis missio, vbi mæq; purgatio in tertiana exquisita, parum Galeno probantur.

vero febris hæc omnium calidiſſima ſit, ideo refrigerari & humectati potius deſiderat, quam vehementer purgari. Alias autem vacationes magis permittit, præſertim ubi humorem naturæ expellere tentat. Iuvanda quoque natura eſt, ubi ex ſe ſola opus perficere non poteſt. Quod vero ad balneum attinet, hic plane in eo ſcopus ſit, ut corpus moadat & humectetur. Itcirco neque nitrum, neque ſalem, neque ſinapi inſpergere oportet, ac calente oleo plurimum perſuſos ægros ad aquam perducere ac proluere convenit. Et ſi in eo natate velint, iis quamdiu poſſunt permittendum eſt. Et qui balneis delectantur, ſi etiam bis die lauare petmiferis, nihil peccabis. Sed illud in memoria habeto, ut id opportune fiat. Si enim iam concoctionis ſigna appareant, tunc etiam ſi frequentius laueris, nihil erraueris, ut *Galenus loco antea citato perſpicue docet.*

De tertiana notha. C A P. VII.

TERTIANA notha ſeu ſpuria ſit, quando bilis maxima ex parte pituitæ miſcetur. Hinc eſt, quod non ſingule nocte, ut in exquisita, puræ ac ſincerioris bilis naturæ præſeferant. In ea etiã tempus acceſſionis duodecim horas excedit, neque ut exquisita ſcæptenis circuitibus iudicatur. Tardius denique in hac ipſa ſpuria tertiana coctionis ſigna apparent, neque tantus in eius vigore calor. His omnibus accedit, quod non finitur, ut exquisita, ſudoris copia. Quare victus ratio in hac febre non ſit in vnuerſum quæ refrigeret ac humectet, ut in tertiana exquisita, ſed quæ aliquam calefaciendi & inciſendi vim aſſumat. Bilis enim in ea craſſior, neque adeo calida exiſtit. Hac igitur laborantibus plurimum prodeſt priſanæ ſuccus, cui iniectum piper ſit, & muſta in qua eoctum ſit hyſſopum, origanum, & nardi ſpica potui danda. Sorbitiones etiam concoctũ faciles dandæ ſunt. Porro quum acceſſionis tempus longius ſit, atque adeo integrum diem duret, non ſane quotidie, ſed alternis tantum diebus cibum exhibere oportet. Hac enim ratione cauebimus, ne a ſuo munere auocetur natura, adeoque morbus augeatur. Proſpiciendum autem vniueſe erit, ne morbus augeatur neue ægrotantis vires, quas conſiſtare diutius oportet, deiciantur. Difficile vero eſt vtrumque ſeruare, quod inedia quantum ad morbi concoctionem prodeſt, tantum vel amplius etiam vires offendi. Cibo autem quantum ægrotantis robur augment, tantum concoctiones impediunt. Proinde inedia vitendum, ubi valentiores fuerint vires & morbus concoctũ difficilis. Largiore autem cibo, ubi vires fuerint imbecilliores, neque morbus concoctũ contumax. Potus ſit aqua in qua parum cinnamomi, & aliquid hyſſopi aut origani decoctum ſit. Quies conducit, exercitia vero nocent. Hæc enim naturam ac calorem natiuum, qui crudam materiam in tus concoquere debet, foras euocat. Quod ad urandi rationem attinet, ſi ſanguinem mittere oporteat, neque hoc omittendum, ſed ab initio ſtatim, adhibita ætatis, temporis, regionis, habitus corporis, & ſimilium quæ ſanguinis miſſionem vel ſuadent, vel ab ea dehortantur diſtinctione: tantumque ſanguinis detrahendum, quantum præſens exigit ſtatus. Statum autem præſentem intelligere tum ægrotum morbi. Ager enim ſi viribus valet, ſanguinis miſſionem admittit: ſi minus, reſpuit. Si morbus ex humorum copia conſtat, ſanguinis miſſionem expoſcit, non quidem mediocrem, ſed pro eius copia. Verum quãdo diu duraturus eſt morbus ob eruditatem, mediocriter extrahendus eſt, ut in fine morbi vires ſeruentur. Clyſteres quoque non admodum molles, ut inertem materiam euocent, alio indantur, qualis eſt qui habet: *Malua, mercurialis, ſclerum violæ nigra, origani, hyſſopi, ſingularum manipulum vnum. Seminũ cartami, drachmas tres.* Coquantur omnia in aqua iuiſtæ quantitas. Colato iuri adiciantur *benediſta laxatiua nominata, hiera picra, ſingularum drachmas tres. Mellis roſacci, drachmas ſex. Olei violacei, chamæmelini, ſingularum vniũ vnam & dimidiũ. Salis vulgaris, drachmas duas.* Fiat clyſter. Exhibenda quoque decocta, quibus inſunt quæ citra plurimam calefactionem & exſiccationem incidere, & vrinam ciere poſſunt. Cuiusmodi eſt quod accipit: *Radix apii, ſimuliculi, cicborii ſing. vnc. vnam. Intybi ſatiur vtriuſq; origani, hyſſopi, ſing. manip. vnum. Lactuca, manipulum vnum & dimidiũ. Seminũ quatuor frigidorum communium ſing. drach. vnam. Seminũ feniculi & apii ſingular. drachmam vnam & ſemis. Caquantur in aqua lib. duabus, donec tertio abſumatũ part. ius colo expurgatũ ſacchari adiectione dulce reddatur, ouique albuminib; punſcetut. Dein addantur ſerapii acidi ſimplicia, mellis roſacci colati, oxymelitis ſim.*

Balneum.

Cuſſia.
Signa.

Vidua.

Cuſſia.
Vena ſe.
ctia.

Clyſter.

Decoctum.

A *simplicis sing. vna vna & semis*, & fiat potio, de qua quotidie in aurora dentur vnciæ quatuor. Post hæc, quæ placide ventrem subducunt, medicamenta sunt exhibenda, vt est *dulutum rhubarbari, vehementer expressum*, vt liquor in qua maceratum est, aliquid etiam adstrictionis in se recipiat, ob causam præcedenti capite expositam. Item anidotos & psyllio, diaphenicon, & alia eiusmodi, quæ per se aut aliâ admixta, bilem vna cum pituita educere possunt: qualia multa in superioribus libris, & lib. 2. De comp. medica. annotauimus. Post septimum diem decoctum absinthii iugiter dandum est. Multos quoque iuuat oxymeli per se potum. Vomitus autem a cibo adeo is febribus inueteratis vtilis est, vt multi *Galenus lib. 3. ad Glau. septe*, hoc vno præsidio curati sint. Febris enim diuturnitas multam in stomacho excrementa pituitosa patit, quibus vomitu teiectis, a febre vindicantur: Hypochondria quoque calidis fouenda sunt medicamentis, vt illicet flarus qui ea distendunt, per illa discutiantur. Inter reliqua vero hoc potissimum conuenit, quod recipit: *Florum chamæmeli, meliloti, anethi singulor. manipulum vnum. Absinthii, manipulum dimidium. Rosarum rubearum, manipulum vnum. Seminum lini, fumægræ, singulor. drachmas tres.* Ebulliant omnia in aqua sufficienti ad tertias. Dein spongia in hac irrigata hypochondria foueantur. Proderit quoque ventriculum hoc, aut simili vnguento inungere, quod accipit: *Oleorum mastichini, rosæ, chamæmelini, sing. drach. tres. Caryophyllorum, drach. vnam & dimidium. Cera quod satis est, fiat vnguentum.* Porro balneum in hac febre ante concoctionis signa salutare non est, quia crudos humores; aut coquēdos, ad cutem euocat, obstruktionemque auget.

C *De quartana. Cap. VIII.*

A LTERVM genus febrium intermittentium est exquisita quartana, quæ ex solo melancholico humore putrescente generatur. Hæc quidem non statim primo die cum rigore inuadit vehementi, sed talis est, qualis iis, qui vehementi gelu frigescent. Progrediente autem ipsa & aucta, vna etiam rigor augetur, inualefcitque quotidie vsque ad totius morbi incrementum, sensusque eius non pugentis stimulantisve cutem, sicut in tertiana exquisita, sed vehementem algorem inducentis, & tanquam ossa frangentis existit. Pulsus admodum rarus & tardos in principio accessionum obtinet. Quum vero viger, vel adhuc etiam augetur, necessario veloces & crebri sunt. Seruatur tamen & tunc natia ipsius tarditas & raritas, si cædentem velocitatem atque frequentiam in accessionibus consideres. Verum caloris motus, incrementum, & vigor tertianis febribus contraria sunt. In ea enim paulatim humor veluti lapideus aliquis, aut testæ, aut os, aut tale aliquod huiusmodi corpus frigidum & sic cum succenditur. Vbi vero aliqua ex eo flamma fuerit accensa, nihil fumidum aut a seino combustum in accessione relinquit. Atque idcirco in humore longiores sunt cessationes, quam in pituita, atque intermissio exquisita puta videtur: quoniam hic quicquid atræ bilis fuerit accensum, exhauritur atque dispergitur. Bilis præterea flauæ vomitus quartanam haud comitatur. Vrinæ tanquam per crassiorem materiam excolatæ sunt tenues, albæ, & aquosæ. Ad hæc in autumno potissimum incipit, et aicis superueniens febribus. Ceterum inspicienda & laborantis natura, seu temperamentum, victus ratio quæ antecessit, regio, ætas, & alia eiusmodi. Si enim frigida & sicca fuerint, tunc certius quartanam futuram sperabimus, potissimum vbi eo tempore quartanæ febres populariter vagabuntur. Quartana laborantes per initia moderate leniterque tractandi, neque vilo vehementi medicamento, aut vacatione irritandi. Quippe humor qui quartanam efficit, tractui est contumax. Aegre igitur inter initia, & antequam concoctus sit, trahens medicamentum sequitur: idque propter suam crassitatem ac frigiditatem, & quod vias angustas, per quas illi transire debet, obstruat, quemadmodum *Galenus in libello cui titulus est. Quos nam purgare oporteat, quibus medicamentis, & quando, copiosius docet.* Tamen si sanguis admodum exuperare videatur, tum is erit aufertendus. Et si secta vena sanguis niger & crassus, qualis maxime in lienosis conspicitur, profluat, audacter mittendus est. Nam huius magna copia extracta, natura reliquo humori concoquendo superior euadet, febremque breuiorem reddet. Secunda autem vena in gibbero sinistræ manus interna, lienarem vocant, vel media. Hæc enim vena ex lienis maxime, qui in febre quar. ana afficitur, vacuat humorem melancholicum. Si vero tenuis ac flauus appareat, statim est supprimen-

Visitationis dus. Eiusmodi namque humor inutilis non est, sed crassum ac frigidum humorem, cum sua substantia, cum qualitate emendat. Victum instituire conuenit optimum, cum nimirum, qui minime flatuosus sit, bonumque succum generet. Autilis itaque carnibus arcendi sunt xgri, atque ab omnibus aliis eduliis quæ viscida & tenacia sunt, tardeque exire soleant. Ab omnibus denique quæ corpus refrigerant & exsiccant. Utendum est volatilibus spontanis boni succi, quæ autem in paludibus degunt insalubres sunt, & excrementis ferrent, crassumque humorem gignunt. Piscibus autem saxatilibus, & qui molli carne, tenacitate carente, præditi sunt, utendum. Salsa vero ac sinapi in hisce febribus cibis sunt adhibenda, ut crassos & glutinosos humores incidant & extenuent, supervacuumque humiditatem depascantur. Vino utendum est albo, tenui, & mediocriter calido. Hoc enim sua tenuitate humoris melancholici crassitudinem extenuat, caloris autem mediocritate corpus humore melancholico refrigeratum modice calefacit, coctionemque iuvat, & urinam provocat. A frictionibus autem & deambulationibus, aliisque consuetis studiis, non sunt penitus arcendi. Hoc est, permittenda quidem hæc sunt, sed minus tamen quam per sanitatem. Neque tam crebro, tamque vehementer fricare, deambulare, aliterque corpus exercere licet, quam per sanitatem, quod alias obstructionis, ut dictum est, periculum imminet. Sed si moderate hæc adhibeantur, idque in intermissione febris, & longe ab accessionibus, excrementa vacuabunt, & alia commoda. *Galeno libr. 4. de tuen. sani. expensu, adferent.* A balneis tamen, si possunt, omnino abstinere debent, solis contenti frictionibus. Nam etsi quatenus calefaciunt prosint, tamen quatenus foras euocant, obstructionis periculum asserunt, præsertim ubi corpus excrementis redundat. Et si brevis quartana sit, minimeque violenta, non male per accessionum intermissiones, id est, diebus inter accessionem mediis, xgri ad solitas exercitationes se transferant. Ceterum venter, si omnino fieri potest, consuetis alimentis, vel puris, vel medicamentosis emolliendus: aut clysteribus primum mollioribus, deinde acrioribus. Sensim enim augenda est eorum vis, prout sensum febris materia coquitur. Nam per initia, ut dictum est, leniter has febres tractare oportet. Exemplum mollium ex præcedente capite petes. Paulo vero actior est hic, qui accipit: *Malua, ch. m. meli, mercuriali foliorum viola nigra, singul. manipulum unum. Folculorum fena, radicis polyopodi, singulorum drachmam dimidiam. Hamoniditu, manipulum unum & dimidiam. Coquantur omnia in aqua sufficienti ad tertias, luri per colam transfuso admisceatur medulle cassie fistulæ, uncia una. Antidoti diaphana laxativa, uncia dimidia. Olei communis, uncia tres. Mellis rosacei salis fissilis, drachma una, fiat clyster.* Interpositis quibusdam diebus, medicamentum, quod diatrion pipereon vocatur, & diospyloticum, dandum est. Hæc enim quia vehementer calefaciunt, non quotidie sunt adhibenda. Quorum quidem componendorum ratio & utilitas, ex 4. *Gale. de sani. tuen. lib. petenda est.* Recte autem fecerint xgotantes, si solum pipet cum aqua quotidie bibent, *Galeno libr. 4. ad Glauc. aut. lere.* Calefacit enim, & flatuosi spiritus crassitudinem soluit, & quæ in hypochondriis sunt congesta, cruda concoquit, & extenuat. Datur autem commodissime in iusiulis, & condimentis, vel consensibus conuenientibus. Hæc quidem per initia usque ad vigorem peragenda sunt. Quod si in morbi vigore xgotus iam esse videatur, tunc tenuiori quam ante vel post victum utendum est: statimque longa quies imperanda est, ne natura circa morbi materiam concoquendam occupata, a suo munere auocetur. Deinde providendum visceribus, quæ distendi solent tum viscosi, tum crassi humoris, ac spiritus etiam flatulenti copia, quibus resolutis atque vacuatis, emollescunt ac laxantur. Illinenda igitur quæ mollire & laxare possunt: ut sunt quæ ex *farina hordeacea semine apii, iridis radice, ruta, & iis similibus* componuntur vnguenta. Inter cetera vero finistrum hypochondrium hoc vnguento illinendum erit, quod habet: *Olei de capparibus, drachmas tres. Oleorum irini, amygdalini dulcis singulorum drachmas duas. Seminis apii, cumini, radicis iridis singulorum scrupulum unum. Cera quod facit fiat vnguentum.* Post hæc utendum medicamentis quæ ciendi urinam vim obtinent, antea vero nequaquam. Si enim priusquam viscera ab obstructione libera sunt, ea adhibueris, humores (calida namque sunt) secum rapiunt, obstructionemque augent. In hunc sane usum nullâ appinanda, in qua anethum, aut ruta, aut apium decoctum sit. Si coctionis notæ apparuerint, mox purgantibus medicamentis

A mentis vtendum est, quæ melancholicum succum educunt, i¹ que non semel tantum, sed sæpius, si res ita exigete videatur. Semel enim ea educi non potest, quando tam vehementis medicamentum, quod vniuersum hunc humorem tractui contumacem semel purget, corpus sustinere non queat. Formulas autem horum medicamentorum ex *libro 1. capite De melancholia*, petes. Præter alia tamen Actius laudat vinum dulcem infusum in euitatem colocynthidis, sic tamen vt illi admisceatur quippiam apii, aut dauci, iucunditatis gratia. A cibo vero vomitus est ciendus, si nihil prohibeat, *Vomini.* veratro albo, primum cum raphano permixto, *vt in superioribus est ostensum.* Quod si parum aus nihil effecerit, veratrum ipsum per se dandum. Et si quispiam ab eleboro abhorreat, hoc aut simili vt licebit, quod recipit: *Succi raphani, aut eius liquoris stil.*

B latitii, vncias quatuor. *Oxymelitis simplicis, vncias duas.* Misce, ac tepidum bibendum exhibe. Qui vero vomere nequeunt, per inferiora purgandi sunt. Tales autem sunt, qui pressum angustumque thoracem obinent: A purgatione dandum medicamentum e viperis, quod theriacam vocant, aut quod illi facultate simile sit quale est quod ex liquore cyrenæico conficitur, caputque *liquoris cyrenæici, myrrha troglodytica, piperis, aqualis partes.* Scorum trita ruta succo colliguntur, in pitulasque finguntur. Quot si oboli penderent. Qui autem per initia morbi, aut omnino ante vigorem, aliquod ex his medicamentis dederunt, ex simplici quartana sepe duplicem, aut sine dubio maiorem ac difficiliorem: ex duplici vero triplicem, aut omnino ambas maiores difficillioresq; reddiderunt.

De quotidiana. C A P. I X.

QUOTIDIANA febris intermittens expulitque putredine, per sentientes corporis partes a natura detrusa, ortum habet. *Gærois iniquitas* dicitur, quod *scilicet singulis diebus accessiones facit.* Quod si vero priuatim vitrea pituita, quæ aliarum omnium frigidissima est, ex dimidio putrescat, hoc est; si non tota ipsius substantia æqualiter, sed aliquæ ipsius partes putruerint, aliquæ vero non, *Epiælen febre* appellatam excitat: In qua ægrifebrieant simul & rigent, atque eodem tempore in omnibus corporis partibus vitrumque, calor: em nimirum & frigus immodicum, sentiunt. Si quidem partes humoris putredini essent nondum expertæ, per omnes venas, aut etiam reliquum corpus sparsæ rigorem creant: putrefactæ vero, febrem accendunt. *Cæ Signa.*

D cetum quotidiana haud quaquam cum rigore primo statim die inuadit, sed progressu temporis refrigeratio potius quam rigor occupat: Pulsus, quem primum accessio fit, inordinatus est & inæqualis, tardus, paruus ac debilis. Neque etiam in augmento velocitas motus, magnitudo, atque vehementia quotidianæ adfunt. Calor illi non tam acris ac vehemens, vt in tertiana: neque enim adurit, neque denudari corpora, & vestitum iactati cogit, neque multum & crebro spirare compellit, ac veluti flammam ex ore efflare, vel frigidam expetere, sed humidus & fumosus, cum multo vapore commixtus est. *Ægre quoque accenditur, ac longum consumit tempus, dum inualescendo peruenit ad summum.* Minime denique qui sic febricitant sentiunt, quod scilicet non duntaxat lingua, sed & vniuersum corpus in hac febre humidissimum sit. Vrinæ

E in quotidianis vel albæ, tenues, & aquosæ: vel crassæ aut turbulentæ. Nullus omnino sudor in primis diebus erumpit, neque vnquam ex acta febricendi quies attingitur. Occupant fere decem & octo horarum spacium. Vomitus etiam pituitosus accessit: & quæ per aluum excernuntur frigidiore, humidiora, erudiora, aquosiora, & pituitosiora sunt. Ceterum quotidiana febris humidas, pituitosæve naturas maxime inest. Anni quoque tempore humidior, hyeme præsertim, humida ex frigida constitutione, senili ætate, & puerili. Hinc est quod Galenus adolescentem biliosum & natura siccum, nunquam hoc febre correptum se vidisse scribit. Ex grandioribus vero, qui pituitosi magis, ac corporis habitudine crassi sunt, vitamque agunt ociosam, gulæ indulgentes, & ebrietati debiti, crebro balneis, maximeque a cibis

F bo vtentes, quotidiana facile capiuntur. Quas singulas certe solius libro 1. ad *Glaucomem* cap. 7. & libro 2. *De differ. feb.* cap. 4. & libro 3. *De induciis capites.* Galenus prosequitur. *Videtur* Et ut ratio in hac febre in vniuersum sit incilioria & extenuans: ideoque ad ea nunc capita lectiori recurrendum erit, in quibus qualis hæc sit victus species, a nobis est abunde commemoratum. Primis quidem diebus, huc est, quando eruditatis adhuc signa

apparent, pituita incidenda eſt, & meatus obſtructi detergendi. Ideoque oxymelite ^A eſt vtendum, vtpote quod ſtrenue detergit, glutinoſi incidit, & meatus ab obſtrudione liberat: & iis quæ viam mouent, vt ſcilicet pituita iam extenſa expeditius per meatus tranſire ac vacuari poſſit. Conueniet itaque decoctum e radice *apii*, *petroſelinii*, *iridis ſemeni*, & id genus aliis antea ſepiſſime commemoratis, cum ſerapii acido compoſito meliſſe roſaceo, & duobus radicibus vocato, & aliis quibus incidendi & extenuandi ineſt ſaculus. Circa vigorem de ventriculo, maximeque eius ore, habenda eſt ſollicitudo. Proſpiciendum igitur illi eſt iis, quæ foris ad mora robur addunt, cuiuſmodi ſunt maſtiche, nardus, abſinthium, & id genus alia. Quapropter ante cibum hoc vtendum vnguento, quod accipit: *Oleum maſtichini, abſinthii, nardini, ſingulorum drachmas duas & dimidiam. Maſtiche, caryophyllarum, ligni aloes, ſingulorum ſerupulum dimidiam. Cinnamomi, ſerupulum vnum.* ^B Cum cera quantum ſatis eſt, ſingatur vnguentum, quo ventriculi regio inungatur. Confirmato ventriculo, vomitus imperandus eſt *prima ſumto raphano, dein cibis aſſumtis*, præſumptis enim cibum ſubleuat, proutdeque vomitionem faciliorem reddit. Poſt medicamentis quæ pituitam eliciunt, vtendum eſt, tunc enim a pituita, vtpote concoctionem experta, opportune purgatur. Qualia vero ſunt eiufmodi, ex præcedentibus libris patere cuiſlibet poteſt. Atque hæc pro quotidianæ febris, quæ raro admodum accidit, curatione dixiſſe ſatis ſit.

De heſtica febre. C A P. X.

Heſtica
quid.
Heſtica
de diſta.

non eſt
paleſte.

ſigna.

HECTICA febris appellatur, quando calor præter naturam non ſolum in ſpiri- ^C tibus & humoribus, ſed iam partibus etiam ſolidis conſiſtit: Heſtica vero diſta eſt, vel quod firma, fixa, & ſtabilis ſit, diſcultetque ſoluatur, quemadmodum habitus: vel quoniam habitum corporis complexa ſit. Sic enim vocare conſueuerunt ſolidas corporis partes, eas humidis diſtinguentes. Hæc certe dolorem neſcit, & quæ ea detinentur, nequaquam febricitate ſe exiſtimant: neque enim calorem percipiunt, quum vniuerſæ iſtis particulæ æqualiter ſint excaletactæ, vt copioſius in libello *De inæquali intemperie Galenus oſtendit*. Febris autem heſtica duplici modo generatur. Primum quidem magna ex parte ab ardentibus febribus, quæ adeo protrahuntur, vt longitudine temporis humorem in corpore cordis contentum abſumant, vel etiam ſi copioſius adhuc ſubſiſtat. Illæ vero non tantum heſticæ ſunt, ſed etiam ^D *paleſte*, hoc eſt, tabidæ. Quæ autem manente adhuc humiditate generantur, vbi corpus cordis occupauerint, hinc maxime acceduntur, haud ſecus quam lucernæ flamma ex ellychnio. Atque hæc vna quidem febris heſticæ generatio. Reliqua eſt, quum ſtati inuaſerint, ſimilem primum ſui ortum diariis facientes aut ex mœrore, aut ira, aut laſſitudine nimia, vna cum ſolis ſeruore natæ. Hæc autem febrilis non eſt admodum difficile curare. At quæ ex iſtis in tabem marcoremve, qui Græcis *non eſt paleſte* dicitur, ex Medicorum inſcitia perueniunt, vbi iam exquiſite conſiſtunt, & non adhuc incipiunt, hæc non modo curare difficile, imo etiam impoſſibile eſt. Earum enim natura calida & ſicca eſt, vt tale aliquid patiatur cor, quale *lucerna funiculus*, quum plurimum peruſus fuerit. Nam qui ita torrefactus eſt, frangitur & diſſolvitur, atque ^E ex ariditate continuitatem admittit, adeo vt etiam ſi copioſum ſuperinfundas oleum flamma abundantiꝝ non poſſit accendi. Semper enim parua & imbecilla in iſta palpitant, ac continue ſciminor, donec ex toto exſtinguatur. Talis quidem eſt febris quæ omnino *paleſte*, hoc eſt, *tabida* exiſtit. Heſtica vero, quæ in maraſmum incidit, cognita promptiſſima atque facilis exiſtit. Nam priuſquam pulſum atque calorem tactu perpendas, videbis oculos immodice concauos, veluti quibusdam quaſi ſcrobibus reconditos, exhaustam vniuerſam in iſtis humida ſubſtantia, ita vt oſſium quibus palpebræ cohærent, eminentiæ conſpiciantur. Sordes quidem in iſtis aridæ apparent, & quidam ſqualidus affectus, qualis maxime ineſt his qui toto die ſub ſolis ardore iter longum perpulſerem fecerunt. Floſ etiam ille vitalis periit, cuiſque in fronte arida diſtenſaque eſt. Palpebræ frequenter veluti ſom- ^F nolente conuiuent. Verum malum eorum ſomnus non eſt, ſed potius vigilandi impotentia. Contabueſce quoque carnes, quæ in temporibus ſunt, vt collapſæ videantur, & concaua loca. Quid enim aliud præter oſſa & eutem ſolam habent? Nam ſi denu-
datum,

- A** datum ventrem inspexeris, neque intestinum, neque viscus vllum super esset tibi videbitur. Hypochondria sursum ad thoracem conualluntur. Quod si eos tangere libeat, cutis quidem apprimè est arida: quam si digitis apprehendens extenderis, instat corii cuiusdam consistit. Pulsus ren uis, durus, debilis, & frequens. Caliditas quam primum manus admouetur, debilis est: paulo post acri, & rodens erumpit, & magis quam amplius tangendo immoraberis. Maxima quoque erit hæc & minime anceps nota: adhibito cibo calor incenditur, pulsusque magnitudine & velocitate intenditur. Tandiu vero hæctica febris dicitur, quamdiu natua humiditas referuatur. Vbi autem ambigitur, ne nihil amplius humoris super sit, absoluta iam tabes est, quæ Græcis *καταρσις* vocatur. Hæcticas vero febres priusquam ad tabem deueniant, omni co-
refrigerandi
Curatio
- B** natu refrigeremus. Summa itaque curationis in refrigerando ac humectando collocatur, tam iis quæ extra admouentur, quam iis quæ intra sumuntur. Aer igitur inspiratus frigidus sit & humidus. Et si natura talis non sit, arte pareatur, *ut dictum est supra capite 6. De tertiana curatione.* Cibus utendum iisdem viribus præditis, *psisana* nimium tremore, *pane modico in aqua frigida macerato: carnibus hædi, phasianorum, & alacrum montanarum, testiculis gallorum, carnibus caporum, ouis forbulibus, castoreo recens salu ex-
perite: pisibus saxatilibus, lactuca, intybi, cucurbita, spinachia, malua, & similibus: cerasis, prunis, malis punicis, melonibus, ficibus, & eiusmodi.* Lactem maritice si prodest, modo alia febris ab humorum putredine orta non complicitur. Quæ vero ad huius exquisitam exhibitionem sunt necessaria, ut alia multa huic insituto conuenientia, tradit Galenus lib. 7. Ther. method. capite 6. Potus sit aqua frigida, præsertim si ea assuetus est æger, moderate sumta, aut aqua in qua parum cinnamomi sit decoctum, aut vinum aquosum ac renue. Conuenit denique hæcticis sæpius die cibum accipere, ut nimirum hac ratione caueant, ne vna vice magnam ciborum copiam, quam virtus inualida vincere haud potest, ingerant. Morum immodicum, & quicquid vires resoluere potest, deuitent. Ceterum medicamenta purgantia iilis, quos hæctica affligit, non sunt propinanda: calidiora enim atque vehementiora sunt, quam quæ illis conuenire queant. Sed si alius plus æquo adstrictus sit, lenibus & refrigerantibus ac humectantibus clysteribus, adiecta medulla casæ fistularis, hanc eluere oportet. Intra eorpus ea exhibeantur medicamenta, quibus refrigerandi & humectandi vis inest: qualia inter composita hodie visitata sunt letaria, violaceum, ex intybo satiuum, acidum, oxyæctharon, & similia. Item antidota. diarrhodon abbatis, diarragacantha, diapapaueris, & id genus alia. Ex simplicibus, succi & liquores stillatici lactuca, portulaca, intybi satiuum, & papaueris. Inter ea vero quæ foris admouentur, balnea huic malo obnoxiiis quouis tempore idonea sunt. Balnea nimirum aquarum dulcium, ad quæ sane æger in lectulo, aut sindone deportari debet, sintque in singulis angulis qui sindonem ferant quatuor. Aquam vero solli temperatissimam esse oportet: in ea etiam moderare commorandum ne se quippiam e propria humiditate hauriat, tantum abest ut in ea sudare debeat. Sunt qui in aqua balnei herbas, nempe violas, maluas, lactucas, flores intybi, papaueris, & iis similes: alii pedes vitulinos, & capita agnina, quoad ossa carnibus separentur, coquant. Cauendum etiam, ne capiti eius, Galeno libro decimo Ther. method. capite decimo teste, quicquam infundatur, quum sit satis id quoque bis terque, cum toto corpore in aqua mergi, demissa mediocriter deorsum sindone, ac tursum per quatuor iuuenes qui eum portant, leuata. Mox hinc eductus, in frigidam semel totus tingatur, ne vel breuissimo quidem spatio illic moratus. Hæctica vero laborantes, quia id balneum accedunt, Galeno loco iam citato attestante, nisi in frigidam sint immissi, nihil iuuant. Protinus autem ubi extractus fuerit, alter paratam habens sindonem ipsi iniiciat, ac deinde aliam. Tum in lectulo collocatus, primum spongiis detergeatur, deinde mollibus linteis. Nec committent, qui eum detergebunt, ut violentius eum contrectent, sed quoad fieri potest blandissime. Quid multa? eam sane curam & diligentiam, si fieri potest, omnino in balnei usu adhibeant, quam Galenus loco paulo antecitato requirit. Post hæc oleis frigidis, & aliis humectantibus inungendus erit. Inter cetera vero hoc conuenit, quod accipit: Olei violacei, unciam dimidiam. Olei de cucurbita
Liniment.
drachmas tres. Butyri recentis & salu expertis pinguedinis porcine, drachmam unam & dimidiam. Misce, & fac linimentum, quo vniuersum vagatur corpus. Vel adiciantur lentis succi

198 Operum Leonhard. Fuchſii Pars III.

Oleum ro-
ſaceum.

Epithema
coctum.

Epithema
incoctum.
Oloti-
menta.

Pollio Ro-
mulian.

Hemipituita
uquid.

Cruſſa.
Signa.

Exquiliſus
hemipituita-
uſ.
Non exquili-
ſus hemi-
pituita.
Curatio.

*tragacantha, drachmas duas. Aſe dulla cruris vitulini, drachmas tres. Certe quod ſatis eſt, ſi-
at vnguentum. Vult quoque oleum violaceum, amygdalarum dulcium, depapavere, & roſa-
ceum, quod Galenus libro tertio. De ſimplicium med. facultat. capite 16 teſtit, acientia corpora
mirifice humectare poteſt. Vbi vinctus fuerit, ac veſtibus amictus, rurſus ſuperlecta-
lo aut ſindone in domum vbi cibatur, reducendus ac nutriendus erit. Proderit etiam
e oraque iecur epithematis refrigerare & humectare, qualia ſunt quæ habent: Siſla-
ticii violarum liquoris, nymphaea, & lactuca ſingularum uncias tres. Aceti optimi, unciam dimi-
diam. Roſarum purpurearum, ſant alorum omnium ſingularum drachmam unam. Specierum dia-
margariton, drachmam dimidiam. Caphura, grana tria. Croci ſcrupulum dimidiam. Miſcean-
tur, & ſiat epithema, quod eord s regioni adhibeatur frigidum. Aliud recipit ſiſla-
ticii lactuca liquoris, uncias duas. Aceti, unciam unam. Specierum diarrhodon abbaſis, drachmā
unam & dimidiam. Roſarum eburnæ, drachmam dimidiam. Caphura ſcrupulum dimidiam. Miſce-
antur, ſiatque epithema, quod iecori admoveatur. Conferunt etiam hæticis medica-
menta, quæ dolore ſuo refrigerant & humectant, vt ſunt nymphaea ſtates, caphura, viole,
roſa, & eiſmodi. Plura quoque ad ſura ionem hæctices conſueticia reperient ſtudio-
ſi in capite De ſura. Et in ſananda hæctica hoc vnice ſtudentum, vt corpus non ſolum per
ea, quæ intra corpus ſumuntur, refrigeremus & humectemus, vtum etiam per ea,
quæ extrinſecus admouentur, per olei potiſſimum nundionem. Quantum enim
hoc ipſum forſ adhibicum ad corporis ac virium c onſervationem & reparationem
conducit, & elebri Pollionis Romuli exemplo doceatur. Hunc namque ceſum iſa
annum excedentem, vt auſor eſt Plinius libro 22. cap. 24. quum diuſus. Auguſtus hoſpe-
interrogaret, quæ nam ratione vigorem illum animi corporique cuſtodiſſet, reſpondit: Intus
muſſo forſi oleo.*

De hemipituita oſen ſemtertiana. C A P. XI.

QUANTUM varia ſunt genera compoſitarum februm, vt patet ex capite ſeptimo
libri ſecundi De differentiis februm & capite 9. & 10 libri ſecundi. De iudiciis Galeni: nos etiā
ſummatim ea capite 26. noſtri Compendii indicauimus: tamen de ea hæ loco duntaxat ag-
gemus, quæ ex tertiana intermittente, & quotidiana continua componitur, & Gra-
ecis *ιανγοντι* dicitur, non alia certe de cauſa, quam quod tota eius natura dimidia parte
alterutram prædictarum februm habeat. Vt ſcilicet hoc genus febris complicata
ſit inſtar exempli, ad cuius ſimilitudinem omnes aliæ febres compoſitæ curentur. Fit
itaque hemipituita, vbi putreſcens pituita putreſcit & bili admixetur. Conſtat tertia-
nam cum rigore inuadere, quotidiana cum refrigeratione extremitatum. Quare
quæ & amburum mixtura conſtat, horrorem inducit, qui rigore quidem minor eſt,
maior autem ac vehementior refrigeratione, adeoque iſis ſimul conſuſis neutrum vero
eminet. Generatur autem duplici modo: vel enim duæ acceſſiones ſtatim ab initio in-
uicem iunguntur, ſimulque cōgreduntur, vel ſeorſum ſingulæ accedunt. Vbi igitur tertia-
na præpollet, magis horribila febris efficitur, & rigoris etiam non nihil in progreſ-
ſu acceſſionis aſſumit, adeſtque omnino calor maior & ardentior, & bilis vel vomitu,
vel deiectione pellitur, aut humidus vapor exhalat. Quando altera pituitoſa ſuperat,
perfrictiones quidem ſummae exercent, pauci veto horrores: neque tamen ſitis, neque
ardor in iſis aſſigit. Quum pares magnitudine ſunt tertiana intermittens, & quoti-
diana continua, inſultus quidem acceſſionis cum horrore accidit. At quum ex pitui-
ta proueniens febris præcelluerit, ſubmiſſiones pulſuum ſiunt, & horrores. Si vero
ealiente præualeat, ſubito incaleſcunt. Talis ſane eſt exquisitus hemipituita, ex æqui-
ualente duarum februm, puta tertianæ intermittens, & quotidianæ continuæ tem-
peratura proficiens. Non exquisitus vero, vel ob bilem largiorem, vel pituitam cau-
ſatur quemadmodum ſuſius noſ ſeſt. 4 aphoriſ. commentar. 43. & libr. 2. De differenti. febr. capite 2.
tradit Galenus. Ex prædictis quiuis intelligere poteſt, quæ in hac febre ſit curandi ra-
tio. Nam quum hemipituita exquisita ab æquivalente eom mixture duarum fe-
brum, tertianæ ſcilicet & quotidianæ conſtet, curatio quoque adhibenda eſt tō ter-
tianæ tum quotidianæ ex æquo conueniens. In non exquisito autem, quum vel bilem
largiorem vel pituitam habeat, pro humoris exceſſu variatur etiam curatio ipſa. Si eni-
m ſtaua bilis ſit ſuperior, præſidiis maxime vtetur, quæ in tertianæ expoſuiſus cu-
ratione. Sin pituita, iſis quæ in quotidiana curatione comprehenſa ſunt. In ſumma, ei
quod,

A quod maxime vrget in cumbendum: ita tamen, ne alterum prorsus negligatur. Quapropter nihil opus est hoc loco, remedia quibus hæc febris demolitur percutere, quum quibus ea pro humorum diuersitate & natura promtius ex capitibus de tertia & quotidiana curatione discit. Quod si itaq; quis primum simplicium febrium curationes exacte cognouerit, nullo labore etiam compositas curabit. Simplicium enim curatione perspecta, promtissimum cuius erit compositas curare, vt hoc nomine non sit opus de compositarum febrium curatione seorsim scribere.

De pestilentia, C A P. XXII.

QUUM multorum hodie passim recentiorum Medicorum de pestilentia scripta essent, sique omnes propemodum pestem inter febres connumerent, quod hæc nunquam sine febre adeoq; simplicem esse putent, idq; non sine maximo errore, adeo eius definitionem, quatenus per se morbus est, & simplex, subicere placuit, quæ est eiusmodi: *Pestis quæ Græcis, $\mu\epsilon\lambda\epsilon\iota\varsigma$, vel $\mu\epsilon\lambda\epsilon\iota\varsigma$ dicitur, si dixeris, dicitur, est lues pernicioſa, contagiosa, ex aere, qui per os aliosque corporis meatus inspiratur, pestilenter seu venenose orta, quæ uno eodemque tempore homines promiscue inuadit.* Vnde omnibus palam fit, luem hanc morbum esse a tota substantia corpori nostro contrariam, ideoque non nisi alexipharmacis ac medicamentis tota substantia veneno pugnantis curari posse, *vt infra plenius ostendatur.* Pestem autem sine febre esse posse, Galenus libro 9. de simpl. medica. facul. in capite de holo armenia testatur, vbi pestem interdum dissete omnino sine febre esse: *περιεργασίας* scribit. Experiencia quoque constat, quod in scrupulissimis pestilentis de repente, sine alioqui homines concidant, nulla in ipsis existente putredine, adeoque febre. Atque id euenisse in peste quæ suo tempore Parisi grassata est, Ioannes Andernus in eo, quem nuper de peste germanica lingua scriptum libello etiam testatur: In quo quidem præter aliorum Medicorum imperitorum sententiam, pestem sine febre esse posse manifestis verbis ait. *Sed quum ea de re alibi egerim plenius, non est cur nunc prolixius de ea disseram: sed satis sit sibi breuiter, vt in aliis quoque vitiis corporis fecimus, causis, indicia, & curandi rationem indicauerimus.* Pestilentia causas potioris Galenus lib. 1. De differentia febrium, cap. 5. duas esse tradit. *Præm*, acrem vitiatum pestilentem ac putridum. *Alteram*, humores corporis vitiosos victu collectos, & ad putrescendum paratos, quum leuem aliquam occasionem ad febris originem & venenositatem ab aere ambiente acceperit animal. In pestilentia itaq; constitutione, inspiratio maxime causa est, sine qua diu animal prorogare vitam haud potest, cur homines peste corripitur. Magna enim ex parte incipit ex inspiratione aeris ambientis, huc ea per os, siue alios corporis meatus fiat, a putrescibili euaporatione vitari. Putredinis autem principium est, vel cadauerum multitudo non ctematorum aut hematorum, vt in bellis accidit, vel ex aliquibus lacubus, aut paludibus æstiuo tempore euap. ratio. Contingit vero quandoque, præcedere ambientis aeris immensam caliditatem. Quum igitur aeris temperatura a naturali habitu ad immo-dicam caliditatem & humilitatem conuersa fuerit, pestilentiam sequi necesse est. Hinc est quod Galenus lib. 1. De tempe. cap. 4. omnium aeris temperamentorum pestilentum id esse quod humidum & calidum est, scribat. Non raro etiam prauitas vitiosus humores, vt comprehensum est, qui sunt in corpore putredini obnoxios reddunt, adeoque causæ existit, cur eiusmodi corpora pestilentia corripiantur. Et tunc sane ii potissimum laborant pestilentia, qui praua victus ratione vtuntur, atque adeo omni genere superuacuum pleni sunt. Proinde mirum videri non debet, si interdum vnus aliquis ex multis, quod rarissime tamen accidit, aere nondum in totum pestilente, hoc morbi genere corripitur. Quicumque enim probe vitiant, & redundantis vacant, si quidem nequaquam, aut certe minimum, aere etiam ipso vitioso mali sentiunt, ac facile ad naturalem habitum reuertuntur. Hinc facile est respondere iis qui quærunt, quomodo eueniat, vt non omnes ex æquo pestilente corripiantur, quum tamen aerem pestilentem inspirare singuli cogantur. Prima enim cur aliqui illi maneant hæc causa est, quod superuacua humiditate pleni non sunt, & moderatis tum victu tum laboribus vtuntur, ac corpus bene spirabile est. Altera causa est, quod corpora non sint æqualiter affecta. Quum enim corporum affectus dissimiles sint ac multiformes, quidam facile vincuntur, & promptius

Causæ;

Putredinis principium voco.

Temperamentorum aëris caliditas & humiditas pestilentia est.

Cervix interdum aliquis aere nondum pestilente hæc hæc insensatur.

Quare nonnulli a pestilentia illa permittuntur.

me patientur, a cauſa efficiente: quidam vero inſuperabiles ſunt, ac omnino non patiuntur, aut difficulter. Quate qui præpotenti cauſæ quoad eius fieri poteſt aduerſantur & reniuntur, peſtilentia non capiuntur. Qui iſis contrarii ſunt celerrime hanc patiuntur, & maxime iſta laborant. Siquidem maxima portio generationis moriborum eſt, cotporis quod patitur habilitas. Nulla eorum cauſa ſine eius quod patitur habilitate efficiere aliquid poteſt. Alioqui omnes qui ſub æſtuo ſole commorantur; aut qui nimio motu utuntur, aut vini potu grauantur, aut exaeſcendentes, aut triſtina affectu febricitarent, quemadmodum copioſius libro primo, De differ. feb. cap. 4. Galenus oſtendit. Tamen interea non negamus, quin interdum propter ſcelera & flagitia hominum Deus diras peſtilentias immittat, quibus delictorum noſtrorum gravitatem puniat. Exſtant enim eius rei multa perſpicua in prophetis teſtimonia, apud Ezechielem præſentim, qui cap. 5. ita ſciturum reliquit: *Ece Hieruſalem pro eo quod ſanctum meum violasti in omnibus offenſionibus tuis, & in cunctis abominacionibus tuis: ego quæque te conſuram, & non parces oculis meis, nec miſerebor. Tertia pars tui poſſe morietur, & ſame abſumetur in medio tui, &c.* Ceterum tempora quibus poſitiſimum naturali lege graſſatur peſtilentia, ſinem æſtatis & autumnii eſſe initium conſtat. Tum enim aer atque hominum corpora multis de cauſis ad putrefactionem ſunt magis habilia, quas in enarratione Aphoriſmi noni, ſectionis tertie, ordine expoſuiſimus. Signa futuræ peſtilentiae multa & varia a recentioribus commemorantur, inter quæ *primum*, eſt temporum anni

Diſtinctiones
etiam peſtilentiae inter
dam inſumit
tunc.

Tempora
quibus poſitiſimum
peſtilentia
graſſatur.
Signa vicia
in aëre.

1. mutatio. *Alterum*, et cetera in aëre phaenomena, poſitiſimum autumnii tempore.
2. *Tertium*, ubi exanthemata nedum pueros, verum etiam adultos crebro affligunt.
3. *Quartum*, frequentes autumnii tempore venti meridionales & occidentales. *Quintum*, aer autumnio tenebroſus & turbidus, minans pluuiam, cum tamen nihil pluuit.
4. *Sextum*, ſi prægnantes ex leui quauis ocaſione abortiunt.
5. *Septimum*, quando zizitate a pluuiâ ſubito magna ranarum in tergo cinericioſiorum, in ventre autem luteoſum, & aut alterius diuerſi coloris comparuerit copia.
6. *Oſtauum*, numeroſa inſectorum, vermium, & reptilium multitudo.
7. *Nonum*, quadrupedum & natatiliū interitus.
8. *Decimum*, autium et nidis ſuis, illæ ouæ ſua relinquentium, profugium.
9. *Undecimum*, anno, n. æ caritas. *Duodeciſimum*, quod omnium certiffime peſtilentiam præſagire videtur, eſt calida & humida totius anni conſtitutio. Noxæ autem quæ hominem iam peſtilentia eſſe correptum demonſtrant, plurimæ quoque eſſe ſolent. *Primum*, autem eſt, ſi exteriora frigent, interiora vero ardent.
10. *Secundum*, totius corporis grauitas, laſſitudo, ſegnities, & difficultas ſpiritus.
11. *Tertium*, capitis dolor, & grauitas.
12. *Quartum*, animi anxietas & triſtitia.
13. *Quintum*, propenſio mica ad ſomnum magna ex parte, interdum enim vigilæ acceſſiua moleſtant.
14. *Sextum*, oculorum aſpectus totius ac varius.
15. *Septimum*, appetentia deiectionis.
16. *Oſtauum*, ſitis immenſa, & et ceterb vomitus.
17. *Nonum*, otis amaritudo & ſiccitas.
18. *Decimum*, pulſus frequens, exiguus, & profundus.
19. *Undecimum*, vrina magna ex parte eſt veluti iumentorum turbida craſſa, & fetida. Quanquam interdum hæc a ſanorum vrina non multum abeſſe videtur. Quapropter ex aliarum notarum imperiti facile decipiuntur, nihil mali ſuſpicantes propter vrinæ colorem bonum.
20. *Duodeciſimum*, quod omnium eſt certiffimum, ſi poſt aſores, aut ſub alis, aut circa inguina poſitiſimum bubones, ſine manifeſta aliqua cauſa, aut io aliis etiam partibus carbunculi ſubito oriantur. Verum quum exoriuntur, naturæ robur præ ſe ferunt, ut quæ adeo ſit valida ac potens, ut venenum & corpore pellere conetur. Partes quoque corporis præ aliis laborantes, & aſe venenatos humores protrudentes demonſtrant. Quippe in ceruice ſi apparuerint, cerebrum poſitiſimum laborare oſtendunt. Si ſubalis, cor: ſi vero in inguinibus, iecur. Quod Hippocrates etiam libro 6. Epid. ſect. ſecunda, aphor. 4. iſis ſignificare verbis voluit: *Abſceſſus, veluti bubones, ſigna ſunt earum partium unde exuberant.* Verum quum non ſemper appareant bubones: quod tamen pernicioſiſſimum eſſe ſolet, quod naturam tum imbecillam eſſe, nec venenatos humores expellere poſſe ſignificat: ad alia etiam ſigna, quæ paulo ante ſunt expoſita, reſpiciendum erit. Porro ſi iam comprehenſa ſigna apparuerint, aut ſuſpicio ſit ægrum peſtilentia correptum eſſe, nequaquam, aut peſtilentiſſimus apud omnes fere Medicos mos hæcenus inoleuit, primo ſanguis mittendus eſt, ſed conſeſtim antidotum ſiue alexiterium aliquod dandum, & quod tota

Bubones
exoriri quid
potentia.

Curatio.

ſub.

A substantia pestilentiae veneno aduersatur, quodque illud ad se trahit, & a corde quo repetere cepit, reuocat, opprimit, mutat, alterat, & expellit. Hæc enim Galenus *lib. 5. de simpl. medica. facul. cap. 17. §. 18.* alexiteriorum actio est. Nisi enim antidotus veneno mox resistere, humores adeo mutabi, vt æget sanitatem recuperare nequeat. Nec est cut initio aliquem quo minus a sanguinis missione abstineat, Galeni auctoritas inoueat, qui *lib. 11. de medendi methodi cap. 15.* ita scriptum reliquit: *Optimum est in febribus vnam incidere non modo consentientibus, sed etiam omnibus aliis, quæ putrescens humor conestat: vbi præsertim nec atas, nec vires prohibent. Leuata namque quæ corpus nostrum regit natura, exacerbatque eo, quo velut sarcina premitur, haud ægre quod reliquum est vincet.* Nam is locus Galeni, vt propædum amnes faciunt, non est simpliciter de omnibus febribus putridis inaudiendū;

Bus, alias in tertianis singulis, etiam exquisitis, itemque in febribus putridis cruditate natas, sanguis mittendus esset, quod tamen eum Galeni sententia ex diuina pugnat. Siquidem *lib. 3. ad Glauconem cap. 9.* vbi ex professo tertianæ exquisitæ curationem tradit, non solum sanguinis missionem, verum etiam reliquas omnes vacuationes in ea febre, tanquam parum commodas, negligendas esse suadet & hortatur, iniquiens: *At contraria qualitas, ei quæ præter naturam excedit, semper opponenda est, quam si longe commodius sit, quam quemadmodum libet vacuare.* Quibus utique verbis Galenus manifestissime inuict, alterationem, quæ per contraria perficitur medicamenta, in tertiana exquisita plus conferte, quam quouis modo, verbi gratia, vel per venæ sectionem, vel per purgationem, vacuare. Cui sententiæ ratio quoque ipsa subscribit, quæ est

C eiusmodi. Exquisita tertiana quæ minimum ea, quæ sit per sanguinis missionem vacuatione eget, quod inter putridas fere simplicissima, & breuissima, per se ipsam ad vigorem & iudicium properet. Nam, vt Hippocrates *sect. 4. aph. 39. ait*, tertiana exquisita septenis circuitibus, quam tardissime, iudicatur. Non est igitur eui magna præiudicia, qualis est venæ sectio, exposcat. Præterea tertiana exquisita in biliosis temperamentis, & calidissimo cœli statu plurimum accidit, vt hoc quoque nomine sanguinis missionem haud desideret. Humor insuper qui in ea febre putrescit, non modo obstructions non facit, sed factas potius recludit. Proinde si aliqua in biliosis corporibus obstructio accideret, sicut leuior erit, ita minus operæ vt tollatur requirit. Denique humor qui in exquisita tertiana putrescit, extra vasa est, adeoque venæ sectione educi nequit. In febre autem putrida & cruditate nata non esse mittendum sanguinem, Galenus *capitibus 6. & 7. libri de curandi ratione per sanguinis missionem* expellens verbis ducet, dicens: *Vbi crudi humores in corpore exuperant, & iam febris carripuit, sanguinem nequaquam mittes.* Nisi igitur sibi quispiam pugnantem facere velit Galenum, vt fateatur non in omnibus febribus putridis de ipsius sententia mittendum esse sanguinem, necesse est. Quod autem in citato loco non de omnibus putridis febribus Galenus loquutus sit, sed de iis tantum, quæ ex obstructione quam plenitudo, & immodica vitiosorum humorum copia excitauit, natæ sunt, metipse Galenus confirmat, qui *lib. 8. de medendi methodi cap. 4.* in diatriæ obstructione procreatis, sanguinem mittendum esse hortatur, etiam si nulla plenitudinis signa adfuerint, eiusque rei causam mox subicit.

E inquit: *Quia plurimo vitioso succo vna cum sanguine vacuata, tantum est eis quæ obstructions saluant, vti. Si enim obstructionibus liberandis priusquam vacuaueris studas, metus est ne ipsas magis impingas.* Si igitur in obstructione ex multis vitiosis humoribus citra plenitudinem nata, sanguis vt mittatur, Galenus *suadent*, necesse est, quanto magis in ea quæ ex plenitudine procreatur mittendus erit. Præterea quod Galenus in eo loco vbi optimum esse scribit, *in omnibus febribus putridis sanguinem mitti*, de iis duntaxat putridis febribus quæ plenitudine ortæ sunt, inaudiendus sit, ratio quam ipse mox subicit, luculentissime monstrat, quam inquit: *Leuata namque, quæ corpus nostrum regit natura, exacerbatque eo, quo velut sarcina premitur, id est plenitudine: haud ægre quod reliquum est vincet.* Siquidem plenitudo naturam suam copia sic premit, vt non facile putredinem, nisi plenitudo prius subleuata fuerit, expellere queat. Hinc est quod *lib. 10. de medendi methodi cap. 2.* Galenus inter alia sic scribat: *Obstructionum ipsarum alia est, quæ ex plenitudine, alia quæ ex qualitate humorum, qui scilicet, aut lentis, aut crassis sunt, incidit. Præsertim autem inter remedia in ea, quæ plenitudo facit, sanguinis missio. In ea quæ ex humorum qualitate consistit, attenuantium usus.* Vt etiam dictis clarum sit, Galeni prædicto loco non simpliciter de omnibus putridis

Galeni loci
est enarra-
tus.

Ratio. 1.
Tertiana
exquisita
sanguinis
missionem
non requi-
rit.

In febre putrida & cruditate nata non mittendus sanguis.

De quibus febribus prædicto Galenus locutus sit.

Obstructio
nam duo
genera.

Obiectio
diſtincta.

Cur febres
tertianas
corruptas
hodie ſan-
guis mit-
tat.

Pestilens
aer.

Semina
peſtis.

Cur Gale-
nus peſtilen-
tiales inter
putridas
recenſet.

Multas
varias cau-
ſas, cur in
peſte non
ſit morten-
dus ſan-
guis.
Primaria
tio.

febris, ſed iis tantum quæ ex obſtructione quam plenitudo, aut multi ſucci viſio ſi A
procreantur, natæ ſunt, loqui. Nec impedit quod hic nonnulli ebulliant, multis videl.
noſtra ætate exquisita febre tertiana correptis, magna virilitate, eſſe detractum ſangui-
nem, eoſq; protinus febre liberatos. Contra illos qui hoc auxilium neglexerunt, ma-
gnas, & vix expugnabiles febres incidiſſe. Sed facilis & expedita eſt reſponſio. Nā con-
ſtat hodie, ob immenſam hominum crapulā, ac celeberrimam ebrietatem, rariotres vi-
deri tertianas exquisitas: at ſi incedunt, ſuſpectæ certe nobis eſſe debent, q; ob plenitu-
dinem, q; ex largiore victu contraxerunt ægrotantes, ortæ ſunt. Vt mirum non ſit tum
ſanguinis miſſionem, vtpote illis maxime neceſſariam, conferre. Quapropter quum
hoc noſtro ſeculo, ob crapulā, cui ſere omnes obnoxii ſunt, ſingulis propemodum fe-
bribus putridis plenitudo coniuncta ſit, cōſentaneum eſt, vt illis ſanguinis miſſio plu- B
rimum conſeruat. Sed vt tandem ad inſtitutum redeamus, quum Galenus ſupra citato
loco, de iis tantum febribus putridis quæ ex obſtructione, & quidem citra veneni per-
miſſionem, natæ ſunt loquatur, *vt iam eſſenſum eſt*, non debet ab imperitis quibuſdam
Medicis locus ille ad peſtilentiales detorqueti febres, vtpote quas conſtat non ex
interna obſtructione, ſed potius externa cauſa, nempe venenati peſtilentisve aeris
attractione & inſpiratione, ortas eſſe. Peſtilentem autem aerem dicimus eum, qui
ex putridis exhalationibus: ſive cadauera hominum, aliarumve animantium putre-
dinem hanc exſpient, ſive cænoſi quidam lacus, vel ſtigata, vel paludes, ſive viſce-
ra terræ: aut ex tetris & mortiferis ſpiritibus quos *Chærmea ſerbes* exhalant, conta-
minatus eſt. Haſ vtique Galenus modo exhalationes putridas, quod venena tales C
ſint, eiſque aer inquinatus ſit: modo putridam qualitatem, qua ſi militer aer contami-
natus ſit: modo peſtis ſemina, quod ex ipſis hæc oriatur, eaque in aere veſicentur: nunc
veto calorem putridum, quod exhalationes calidæ exiſtant, vocat. Quinetiam pu-
treto illa calida, venenum calidum, & magis quidem proprie dici poteſt, quod non
ſecus atq; alia quædam calida venena calefaciat, poteſt faciat, & interimat. Hinc eſt, q;
lib. 3. de diff. feb. 7. peſtilentiales febres non immerito inter putridas recenſeat, quādo-
quidem aer ille putridus ac peſtilens intra corpus receptus, mox, niſi antea ægrius in-
terficiat, calefaciat, putrefaciatque, & venenata ſua qualitate interimat. Quoniam
vero peſtilentis febris putrida eſt, tamen quia admixta ſibi venenatā qualitatem ob-
tinet, ideo inter initia nunquam, ſicut quædam aliarum putridarum febrium genera, D
ſanguinis miſſionem, ſecus atque hæcenus magna Medicorum pars arbitrati ſunt, ad-
mittit, idque multis ac variis de cauſis, quas ordine commemorabimus. Harum
tem prima hæc eſt, quod Galenus in libro de theſiaca ad Piſonem, vbi ex profeſſo de peſti-
lentibus conſtitutionibus agit, ſanguinis miſſionis non meminit, & ſolam theſiaca hoc
vitio correptis proſuiſſe, nec vllum aliud præſidium ei reſiſtere potuiſſe dicit. Acce-
dit, quod alii etiam veteres Medici Græci, ſique omnium præſtantiffimi, de peſti eu-
ratione ſcribentes, ſanguinis miſſionis nullam mentionem faciunt, ſed ſolius tan-
tum antidoti, quod ſcilicet tota ſubſtantia, & innata ſibi quadam proptietate vene-
no aduerſetur, eiſque vites aut obterat, aut hebetet, aut foras excernat. Quem ad-
modum enim illi veneno quod morſu canis, aut iſtu ſcorpionis, ac ſerpentis, aut alter-
ius feræ venenatæ eiſciatur, corpori illapſum eſt duplici ratione occurrebatur: vna
quidem, vt virus iniectum antequam aliis irrepens viſcera tangeret, conuenienti an-
tidoto eoercerent, eiſque perneciem retunderent, hebetarent, aut prorſus concu-
earent: altera vero, vt venenum ea parte qua intrauit, appoſitis cucurbitulis cum mu-
lta flamma, & circumſtantibus locis altioriſus vlcuſculis ſcarificatis, aliſque traſtoriis
remediis adhibitis, ne particularim inſinuatetur, foras reuocaret: pari profeſſo ra-
tione in curatione peſtis in hanc vnam quoque curam incubuerunt, vt primum, &
mox inter initia morbi, neglecta prorſus ſanguinis miſſione, antidotum darent, non
ignorantes moram in hoc morbi genere eſſe periculoſiſſimam, quan do quidem vene-
num peſtilens parvis momentis, ſi ei antidotum non reſtiterit, adeo mutare humores
poſſit, vt homo deinceps ſanitatem recuperare haud nequeat. Dein vt petſudorem, F
& extrinſecus emplaſtris, aliſq; medicamentis atraradotiſis buboni impoſitis, vene-
num & corpore euocarent, operam dederunt. Proinde quū non ſolum ratione, verum
etiam experientia cognouerint iam dictā curandi rationē in omni veneno vel hauſto,

aut ab

Aut ab aliqua fera corpori iniecto, atque etiam pestilentia ipsa, esse omnium optimam & expeditissimam, vtpote per quam ocyssime veneni vis retunditur, & ne viscera peccat impeditur, & foras excernetur, vnam & eandem tam veneni, quam pestilentia esse curandrationem memoriz postulat prodiderunt, vt ceteri quoque ipsam arripere, ac sectarentur. Atque hinc est, quod neque Hippocrates, neque Galenus peculiarem librum *de pestilentia curandi ratione* posteritati reliquerint, quod hanc haud secus atque reliqua venena curandam esse docuerint. Quare odio omnium digni sunt nostri seculi Medici, qui hac ipsa curandi ratione contempta, & posthabita, quum tamen ei prosper succellus nunquam non responderit, & felicissima fuerit: Arabum, hominum magna ex parte indoctissimorum, potius curandi rationem, qua a-

Bliquor hominum myriadas interfecerunt, sequi voluerunt. *Altera ratio cur veni inter pestis initia secunda non sit, hanc est: Quum de Hippocratis aphor. sententia, occasio propemodum omnibus in morbis, potissimum vero in letalibus ac venenatis, princeps sit, danda in primis Medico opera erit vt hanc nulla prorsus ratione negligat, quod hac semel temere amissa & praeterita, fieri non possit, vt a peste quae tanquam bestia aliqua furiosa impetu maximum in hominem facit, violenta xger vindicetur. Negligatur autem tum in hoc morbi genere curandi optima occasio, quum inter eius initia priusquam antidotum detur, sanguis mittitur. Nam interea temporis dum antidoti exhibitio praehitur, veneni vis inualefcit, ac corpus occupat, sequi in totum corpus diffundit, paucisque iis hominibus eisdem humores altetat, putrefacit, & inficit, vt homo sanitatem postea consequi nequeat. Quum igitur mora, & occasionis neglectus xgro non solum periculum creet, verum etiam illi incertissimum mortis discrimen constituat, & necesse afferat, Medico nequaquam in antidoto exhibendo cunctandum, verum, posthabita sanguinis missione, quam primum aliquem peste correptum animaduertit, ad antidoti quod innata sibi proprietate veneni ac putredinis vim frangere potest exhibitionem, vt praecedenti quoque ratione dictum est, ei confugiendum erit. Quod si fecerit, sed antea venae sectio vius fuerit, haud dubie, vt quotidiana etiam experientia confirmat, coplures ista sua peruersa curandi ratione interficiet. Hinc est quod Andernacus est, vir sane doctissimus, & coplures alii nostrae aetatis Medici non verentur disertis verbis affirmare plures qui pestilentia laborarunt, sanguinis missione, quam antidoti ab initio vfos,*

Dperisse. *Tertia ratio quae sanguinis in peste missio repudiatur ac pelligitur, eiusmodi est. Quum Galenus, & omnes in arte medica praestantes viri in eo contentiant, sanguinis missione non esse vtendum, nisi in eiusdem redundancia ac plenitudine quae obstructionem efficit, aut vbi nulla etiam plenitudine praesente, metuendum sit, ne propter ictum, aut dolorem, aut partium imbecillitatem phlegmone procreetur, vt cap. 3. libri de curand. ratione per sang. missionem plenius a Galeno docetur: nulla vero iam dictarum causarum in peste subit, peripicuam hinc omnibus euadit, in ea sanguinis missione opus non esse. Si enim iam dictis non expensis, nihilominus iis qui peste consistantur sanguis detrahitur, xgro tamen non parum minuuntur ac debilitantur. Quum enim sanguis in eo non redundet, adeoque secundum naturam se habeat, & ad nutritionem necessarius sit, nec inter huius morbi initia adhuc sit, valde saltem alteratus, putridus, & infectus, fieri non potest quin vires eius detrahitio plurimum labefactet, & ita sane illas deiciat, vt postea veneno aduersari, illudque frangere, obtundere, ac vincere nequeant. Huc accedit, quod venenum pestilens per se cordi, totique corpori adeo est infestum, vt nihil aeque ac illud eius vires deicere possit. Quum igitur vires hominis pestilentia consistantis duplici ratione, & sanguinis, nimirum minime necessaria, sed modis omnibus noxia, missione: & ite pestilenti veneno, ita labefactentur, deiciantur, ac concidant vt postea veneno resistere nulla ratione possint, non immerito ea de causa omnes a sanguinis missione, quae ab initio eius morbi sit, tanquam ab ea re vnde certa mors speranda sit, abstinerebunt. Quare non temere factum est, vt Galenus passim, omnibusque in morbis, praesertim letalibus, ac pestiferis, virtutem maxime respiciendam esse moneat, quod scilicet ea labefacta, de xgri salute actum sit. Vt errare toto caelo necesse sit Cornariu, qui in suo libello quem de peste inscripsit, asserere ausus est, quamquam vniuersa ratio nusquam negligenda est, tamen hic minus habenda est, quasi vero parum referret peste correptos validos aut imbecilles esse, quum ex iis quae diximus, omnibus mente ac ratione praeditis*

Altera

Tertia

Cornarii
error deus

conſect, venenum nec obteri, nec hebetari, nec frangi, nec excerni ſine vitium robo-
re poſſe. Quod quum ita ſe habeat, non eſt cur in Cornarii conſilio acquieſcamus;
& inter peſtus initia venam ſecemus, ſed mox illaque proſus interpoſita ſi ora, &
priuſquam aſ. nguinis miſſione, & veneno vires ægri frangantur ac immiouantur, an-
ridotum, quod a tota ſubſtantia, & innata quadam proprietate peſtilens virus oppu-
gnare, obtundere, ac foras excernere queat, demus. Quod nſ. taſum a nobis fuerit,

Quarta

more imperitorum Medicorum, qui haſtenus venæ ſectiōem antidoto in vniuer-
ſum omnes præmiſerunt, multorum ſalutē prodemus, & neci trademus. *Quarta ratio*
cur in præſenti morbo ſanguinis miſſione initio vtendum nō ſit, hæc eſt. Sanguine, &
ſpiritu eidem permiſto, per venæ ſectiōem vacuatis, eaq. ratione vniuerſo Luogine
conciatō ac vehementer commoto, venenum extrinſecus nos circumfundens, & e-
iuſmodi in nos demiffa pernicies, in pu'm onem, cor, & venas inanitas facilius per-
meat, penetrat, maioreque ſeroela inualeſcit, ſanguisq. promptius labem contrahit.
Quemadmodum enim venenum quod corpus noſtrum ingreſſum eſt inter initia vi-
no in loco in alto nimirum corporis aliquandiu quieſcit, nec ad modum mouetur, mi-
nuſq. corpori moleſtum eſt: ita idem vena ſecta ſanguineq. emiſſo commotum ac cō-
citatum, ſeſe latius diſſundit, & penitus in venas peoctrat, ac ſanguioi ſe inſinuat, æ-
grumq. magis moleſtat ac vexat. Natura enim ita comparatum eſt, & quotidiana id-
ipſum experientia conſtat, cauſam motū, quieſcētē eſſe moleſtiorē. Si quidem mo-
xium quieſcens, nō raro conſuetudine nobis familiare efficitur. Quod erſi Galib. 2. de

Cauſa mo-
ta quieſcen-
te mole-
ſtor eſt.

ſympſis cauſa cap. 7. abunde mōſtrauit, tamen vt clariuſ idipſum cognoſcatur, exemplis
aliquot rerum externarum oſtendere haud grauabimur, quorum illud primum eſto.
Si in aquā quieſcentem ac minime perturbatam pauxillum ſellis inieceris, id quidem
ſpatio temporis, loco ſuo hæret, nec mox cū aqua ipſa permisceatur. Quod ſi vero quiſ-
piam aquā hanc cōmouerit atq. agitauerit, tum ſtatim ſel ſeſe hinc inde diſſundit, ac
per totam diſſluit aquā, eamq. amaram efficit. Pari modo ſtamma exigua mota & ſuſ-
tatione ſollicita, mox in ingentē ignem euadit. Nonne formicæ acervo reſſe in quo
deliteſcunt immoto ac quieſcente, & ipſe quieſcant? Si quis vero illū perturber, mox
magno numero formicæ erumpent, & ei qui acetuum cōmouit moleſtæ erunt. Quē-
admodum igitur omnis cauſa mota, quieſcente eſt moleſtior, vt dictum eſt, ita venenū
peſtilens aliquo modo quieſcens, venæ ſectiōe agitatū ac concitatum, magis ſeſe in
corpus diſſundit, & in vaſa elicitur, adeoq. ægrum magis vexat, & moleſtat, ac ipſius
vires minuit, atq. ita inſicit, vt illud interire necceſſe ſit. *Quinta ratio*, qua oſtenditur
ſanguinem inter peſtis ioitia & ante datum antidotū non eſſe mitteodum, eiſmodi
eſt. Quanq. peſtilens venenum extrinſecus in nos demiffum, niſi aotidotum mox da-
tū eidem reſtiterit, omnia ea quib. ſe inſinuat, putrefacit, inſicit, ac corrumpit, adeoq.
febrem etiā putridam excitat: etſi ab aliis putridis febribus, vt pote veneni permiſſiōe
ac coniunctiōe deſtituta, diuerſam: atq. hoc nomine necceſſe ſit in ea etiam putre-
dinē eſſe, ramē nō eſt cur ob id venæ ſectiō tum locum habere poſſit. Quippe vt nulla

Aliud.

Quinta.

Nulla pu-
treſedo ſan-
guinis miſ-
ſione cura-
tur. Parcedo tri-
bus ratio-
nib. cura-
tur.

alia putredo, ira multo minus peſtilens, ſanguinis detractione curari poſſet aut debet:
Nam veluti lib. 11. *metbo. meden. cap. 9.* Galenus teſtatur, putredo omnis tribus rationibus
curatur, & e corpore expellitur, nempe per vrinam, alui deſectionem, & ſudorē.
Quum vero inter hos modos tres, primis duobus natura in veneni expulſiōe, ſi pro-
be excretiones ſuas inſtituat, haud vritur: neque Medicus, vt qui naturæ miniſter eſt,
hos vſurpare debet, quod ſine maximo ægri incommodo & periculo fieri non poſſit,
vt putredo qui venenum admiſtum eſt, in vētriculum & inteſtina, aut veſicam detru-
datur, trahaturve. Quapropter tertius modus Medico arripiendus erit, dandumq. ab
eo antidotum aut medicameotum, quod vtrunq. venenum nimirum & putredinē, ſi
qua adeſt, per ſudorem excernere ac pellere poteſt, ac modis omnib. ſanguinis miſſio
omittenda illi erit, vt quæ corporis vires labefaceret ac minuat, nec putredinē multoq.
minus venenum, pellere, vt oſtenſum eſt, queat. *Sexta*, & omnium efficaciffima, cur
ſanguinis miſſione inter initia in hoc morbo vtendum non ſit ratio eiſmodi eſt. Na-
tura quidem in peſtilentia venenum, & alia noxia ſemper quidem foras conatur ex-
pellere, buhonibus, tuberculis, puſtulis, & tumorib. excitatis, quare per venæ ſectiōem
introrſum, & venas reuocari ac retrahi non debent. Qua quidem de re infra plura di-
cemus.

Sexta.

- A** cemus. *Septima* ratio priori non minus efficax hæc est. Quum in confello sit apud omnes medicorum peritos, illique unanimes seuerè prohibeant ne vno die geminæ vacuationes: quæ saltè alicuius momenti sint, & altera earundè, vt hoc in loco sanguinis missio, inutilis fuerit: corpori adhibeantur, quod nimirum illis eiusdem vires intrinsecè immutantur, labefectentur, ac deiciuntur: quanto magis ne id fiat in pestifero hoc morbo, in quo quam primum pestilens virus in corporis vires impetum facit, quod illis tota substantia aduersetur, eas frangit ac minuit, summo opere cauendum erit. Quum enim aduersariorum etiam confessione, neque venæ sectio, neque per sudorem expulsio ultra naturalem diem, & viginti quatuor horas extrahi debeat, vt geminæ iam dictæ vacuationes intra nominatum iam tempus breue admodum perficiantur necesse est. *Quis* vero est tam stupidus, quis tam mentis rationisque omnis expertus, non intelligat itis duabus vacuationibus intra breue hoc temporis spæcium sese excipientibus, vires, quibus venenum ipsum per se satis insidiatur, easque obterit, frangit, ac minuit, omnino deici & exstingui, vt ne sanellum veneni ferocitæ aduersari queant? Proinde fieri nequit vt æger, nisi validissimis viribus fuerit, ex hoc morbo conualecat. Si igitur extra hanc rationem nulla esset alia, tamen sufficere deberet, vt aduersarii relicto veteri ac maxime pernicioso errore, sanguinis missione deinceps inter huius morbi initia penitus abstinere, & veram legitimamque veterum curandi rationem sectarentur. Sed sunt hodie, qui vti que fateantur, iam quidem de errore moniti, curandi rationem semper ab antidoti exhibitione
- C** ne incipienda esse, tamen post eius portionem nihilominus prodesse, vt sanguis etiam mox mittatur. Respondeo, nequaquam. Nam sanguinis missio nunquam nisi constanti plenitudine, facienda erit, vt paulo post dicemus. Sanguinem autem nisi plenitudo adsit, non esse detrahendum, causa est, quod sanguis tum non redundet, veluti ratione tertia ostensum est: & quod venis sanguinis detractione vacuatis, venenum in totum diffundatur corpus, vt ratione quarta dictum est: & quod eadem vires onere non leuentur, vt postea plenius monstrabitur: & quod hac ipsa putredone non curetur, vt ratione quinta ostendimus. *Postremo*, quod altera vacuationum, quæ scilicet sanguinis missione fit, inutilis est, & alteri quam antidotum efficit, plane contraria. Hæc enim foras pellit venenum, illa vero id ipsum intro, hoc
- D** est, in venas eliciat, & in contrarium renocat, vt infra fulius dicetur. Quapropter ne vna alterius motum impediat, vno tempore fieri non debent. Quum itaque iam abunde nobis demonstratum sit, veteres Græcos Medicos, eosque longe peritissimos, neque in peste, neque in aliis venenis, extrinsecus in corpus eiacularis, sanguinis missione vfos fuisse: sed ne intemptius & longiori mora occasionem agendi negligerent, ac interea venenum ad cor permearet, & per venas diffusum humores putrefaceret, iniceretque initio curationis mox antidotum quod ipsius vires frangeret, obunderet, hebetaret, & iam dicta omnia impediret, dedisse, idque id eo quod inter initia eius morbi sanguis, neque redundet, neque adhuc putridus, corruptus, ac venenoinfectus; sed adhuc bonus sit, adeoque extractus vires non le-
- E** uiter minuat, commotusque ac concitatus promptius labem contrahat, latiusque se diffundat, & si etiam nunc sit corruptus ac putridus, tamen venæ sectione putredo curari nequeat, sed tantum per sudorem educendus sit, neque faciendum esse putarint, vt brevissimo tempore binis vacuationibus vires corporis ita labefactarent & exstinguerent, vt deinde veneno resistere, illudque vincere haud posset: danda & nobis opera erit, vt tantorum viroorum exemplo, sanguinis missione posthabita, quam primum quis pestis semina se hausisse senserit, nulla prorsus interposita mora, antidotum demus. Quemadmodum igitur pestilens vires sua malicia ac putredine, tanquam bestia aliqua ferocissima, maximo impetu hominem petit, totaque sua substantia ei aduersatur, illumque inficere, tandemque interficere conatur: ita vicissim ei a Medico confectum apponendum erit antidotum, quod itidem tota sua substantia, & insita quadam proprietate, veneni vitulentiam & impetum frangere, obtundere, hebetare, & foras per sudorem excernere, naturamque in expulsionem eiusdem, bubone excitato, iurare possit. Quod si vero accideret, vt antidotum humores pestilentes; ac putredine, venenataque infectione cor-

- ruptos non excernat, tamen eorſdem nihilominus ſine ſudore mutare & alterare pō-
teſt. Ceterum ſi huic morbo magna coniuncta ſit plenitudo, cum virium robore,
ægerque ætate florens, morbuſque adhuc in initio ſit, mittitur, perinde atque in aliis
febris putridis e plenitudine natis, ſanguis ſine periculo poterit, ita tamen vt an-
te ſanguinis detractiōnem horis ſere decem aut duodecim antidorum æger ſumat,
ac ſudet, poſtque ſudorem tum cibis, tum medicamentis idoneis vires reſciantur,
indeque æger aliquid virium reſumat. Buboni præterea, ſi is appareat, attractoria &
conuenientia medicamenta ſunt imponenda, quæ veneni ad interna reuulſionem
impediant. Quibus omnibus peractis, eo quidem in latere, vt hætenus quoque faci-
tatum eſt, in quo bubo excitatus eſt, vena incidatur. Sin bubo nullus adeſt, ex eo la-
tere mittatur ſanguis, vbi maior grauitas eſſe apparet. Hac quidem venæ ſectiōne ple-
nitude tollitur, & obſtructioni medetur, calorque febrilis minuitur. Sed hic haud du-
bie pro excuſando ſuo errore aduerſarii dicturi ſunt, *quandoquidem in eo, quem iam com-
memoraſti caſu, in hoc latere in quo bubo excitus eſt venam incidere liceat, curioſiſſima vos qui-
dem faciunt, & ſanguinem non niſi ægro adhuc valde detrahimus, erroris accuſat?* Hæc præ-
terea, inquit, ſanguinis miſſione corpus quo premebatur onete ac ſarcina, leua-
mus, ac viribus ſuppreſſis opem ferimus. Sed facilis & expedita eſt reſponſio, non e-
nim eos damnamus ſimpliciter quod venæ ſectiōnem uſurpant, ſed potius quia illud
intempeſtiue, & præter neceſſitatem, inque hoc morbo, in quo haud conducit, ad-
hibent. Intempeſtiue quidem, quia ante antidotum: citra vero neceſſitatem, quia in-
ter initia ſtatim ſanguis nondum corruptus & infectus, ſed adhuc bonus eſt: nec ſi
iam putrefactus ſit, ſanguinis detractiōne, veluti iam aliquoties diximus, curari
queat. Vires inſuper onete oppreſſas non leuant, ſed detracto ſanguine eaſdem
non ſolum imbecilliores reddunt, ſed & venis vacuatis veneno occaſionem præ-
bent, vt latius iam & expeditius per totum corpus diſſandi poſſit. Quæ quom o-
mnia paulo ſupra copioſius a nobis demonſtrata ſunt, non eſt cuſumque diuſiō lon-
gius repetamus. Inſtant alii, qui præ cæteris ſibi prædicorum nomen magno ſuper-
cilio ſibi arrogat: ſic enim illi eos appellant qui aſſidue medicinam faciunt, qui-
que omnium exercitatioſimi videre, & ab omnibus habere volunt: in hunc quidam
modum. *Sanguinem, inquit, in peſte inter initia eſſe detrahendum, hinc omnium maxime
liquet, quod peſtis nunquam ſi citra internam aut externam phlegmonem, nemo autem eſt qui
ignoret, immo in conſeſſo eſt apud omnes ſolidioris medicina peritos, inter phlegmonum initia
enim quæ ad certum aliquem corporis locum præ naturam conſiſt, ſanguinem per venæ ſectiō-
nem a laborante loco eſſe reuocandum & vacuandum: cur igitur non eadem ratione in peſte ſan-
guinem variatum & infectum initio ſtatim morbi a corde in contrarium reuocare & vacuare
licebit?* Reſpondeo, argumentum quidem hoc procederet, ſi omnia eſſent in peſte
paria, & ſi nunquam non peſtis internam phlegmonem coniunctam eſſe aduerſarii
demonſtraſſent. Verum quom omnia ſint diſſimilia, hoc ipſo ſane argumento ſuo
perſpicue docent, quam longiſſime abſint ab eo quo de ſumme gloriantur nomine,
immo ne principia quidem medicinæ adhuc teneant. Principio namque quod illi
pro conſeſſo aſſumunt, nempe peſtem nunquam ſine interna vel externa phlegmo-
ne eſſe, nemo ſane mentis facile puto illis concedet, quandoquidem falſiſſimum ſit,
& cum quotidiana experientia quod illi aſſerunt ex diametro pugnet. Quom enim
ſæpe ſine externa glandularum phlegmone peſtis hominem occupet & inuadat, quā-
to magis idipſum citra internā fieri poteſt. Non cōiungi autē internam phlegmonem
cum peſte, niſi rariſſime. hinc colligi poteſt. Veriſimile namq; non eſt vt vno & eodem
tempore aliquē tum peſtis, tum interna phlegmone inuadat. Quom enim natura hoc
tempore quo peſtis aliquem inuaſit tora in eo ſit, vt venenum ac putredinē ab illo cō-
tractam expellat, fieri vix poſſet, quin ſanguinem redundantem tum ad princeps ali-
quod membrū, verbi gratia cerebrū, cor vel iecur, aut ad aliam quampiam partem de-
cumbentē, vna cum veneno eici: ret extenere te, & externam aliquam in glandulis
phlegmonē excitaret. Atq; hinc eſt, q. hanc excretionem Hippoc. *id eſt, abſceſ-
ſum*, nominet, quem admodū lib. Epid. ſect. 2. aph. 4. vbi ita ſcriptū reliquit. *Abſceſſus, vel-
uti bubones ſigna & indicia ſunt earum partiū, quæ germina ſine propagines (græce πρὸς τὸν αὐτὸν
appellatur) habent.* Hoc eſt glandularū tumores interna viſcerū habitudine indicant, quorū ger-

Amina & propagines sunt. Glandulæ enim sunt velut publica viscera, ut totiusq; corporis sanitas, in quam abeque habita natura horum eluuiis & excrementum deiecit, ideoq; viscerum & internorum membrorum laborantium indicationem ac significationem præ se ferunt. Quum itaq; excrementum hoc ad glandulas, velut ex interno penu de mittatur, facili ex bubone de viscerum habitudine, ac tota vitioforum humorum mole extimatio existit. Recte igitur id excretionis genus abscessus dicitur, q; scil. noxia, reli-

Abscessus

Abscessus
quod dicitur
quia

ctatam quæ prius oblidebunt parte, in aliam abscedat. Præsertim quoq; si prius in aliam partem reponantur ac transferantur. Præterea si in cœna phlegmone pesti perpetuo coniungatur, tunc ægrus, peninde atq; in aliis id genus phlegmonibus, maximos in laborante loco dolores perciperent, q; tamen nequaquā aut certe quam rarissime accidit. Et si aliquando evenit, ut quispiā simul phlegmone interna & pestilentia infestetur, tamēis nunq; aut rarissime curatur, sed plerunq; & fere semper, nisi robustissimis viris, fuerit æger. Interim tamen Proinde quæ res ita se tum habear, ut de euratione fere nulla spes Medico ostendatur, consultissimū est, ut in Gal. consilio acquiescat, nullumq; remedium sic affecto adhibeat. Nam, ut ille lib. 11. med. meth. ca. 1. ait, in quo desperata, est omnino salus, impudentis cōsiliū fuerit, apud vulgum infamar e præidia, quæ multis fuerit salutis. Accedit, q; hæc ratione Medici non solum aliis, qui tamē iuuare possent, contempta & suspensa remedia reddat, sed fame quoq; suæ pessime cōsulat, ut qui ægro mortuo, passim ab omnib; fere traducatur, ac si illum interfecerit, necisq; illius auctor

Desperatis
non sunt
remedia adhi
benda.

fuerit, eredatur. Quod verò casu iam dicto salutis nulla spes super sit, in causa est, quod quivis duorum morborū per se, citra alterius cōplexum, satis potens sit, ut ægrum nec tradat. Accedit, q; quicq; parvis momentis curandi rationem propriam ac suā, eamq; omnium difficillimā, requirat. Quod si igitur Medici vel rogatus, vel alia quadam de causa eiusmodi ægrum curandum aggrediat, id præmissa solemnī protestatione faciat, & principio antidoto dato, ac paucis horis interiectis, viribusq; ante recreatis & refectis, sanguinem mittat, ex vena, quæ & directo locum laborantem respicit. Si verò vires ægri imbecilliores sunt, quam ut venæ sectionem perferre possint, cucurbitulæ potius assigendæ erunt, aliaque, prout morbus postulat, peragenda. Præterea supra

D di scimen se nondum tenet. Siquidem, ut cap. 2. libri de Inæquali intemperie attestatur Gal. phlegmone sit ubi calida fluxio, id est, sanguis calidus copiosus, in aliquā corporis partem præter naturam confluit, venaq; & arterias ita opplet ac distendit, ut in iis contineri amplius nequeat, sed partim per ipsarum ora, partim per tunicas, velut colatum foras transmittitur, & vacua spacia quæ inter partes similes sunt implet, tumoremq; efficit. Quare rectissime sit si in interna hac phlegmone statim inter initia, & eo in latere in quo dolor sentitur, sanguis mittitur, aperta q; vena a parte ad quam cōfluere cepit, in contrarium reuollitur. In peste autem quæ nequaquā ex copiosioris sanguinis affluxu, sed potius ex venenati aeris Inspiratione fit, vena secanda haud erit, quod nulla tum eius in corpore sit redundantis, adeoq; ex ipsius detractione multat, &

Phlegmone
ut sit
Calida. Ru
tio.

E non contemnendæ noxiæ sequantur. Proinde quum sanguis in pestilentia præternaturam ad aliquam corporis partem non cōfluat, & inter initia adhuc bonus sit, nec si putredo in eo nascitur, venæ apertic ne educi & sanari possit, ut in superioribus monstratum est, falsissimum sit, quod non sine maxima ignorantia suspitione de reuulsione per sanguinis missionē inter initia faciendā afferunt argumentū. Fatemur quidem, & in hac re non possumus, in pestilentia reuulsione utendū esse, atq; nō per sanguinis detractionem, sed aliis plane rationib; duabus, quarum utiq; prima sit per antidota siue medicamenta quæ venenū a corde attrahunt ac reuollunt, obtundunt, alterant, vel per corporis mæus viscerum expellunt, altera vero: quandoquidē constet Medicum in extrudendis noxiis naturā, cuius minister est, modo recte motus suos instituat, per

Pestis

F perpetuo sequi debere, hæc verò pestilens venenum a principib; ac nobilib; membris ad ignobilia, nempe glandulas, ut plurimum protrudat, & in eis bubonem excitet: per emplastra, & alia medicamenta quæ extrinsecus buboni imposita venenum & corpore trahunt, & naturæ expulsionem iuuant, perficitur. Atq; hinc omnibus tam peritis, quam imperitis clarissimo innotescit, quam crassus, manifestus, atq; perniciosissi-

mus ſit error, ſe bubone peſtifero aliqua in corporis parte iam apparenre, in eadem perinde atque in internis phlegmonibus, vena inter initia aperiaur. Nam quum natura iam tota ſit in eo, vt venenum e corpore eiciat, immo magna ex parte etiam illud extruſerit, tamen tanta eſt horum aſinorum, practicoꝝ dicere volui, ruditas ac ſtupiditas, vt nihilominus naturæ inſtitutum & actionem impedire atque inerrturbare, venenum præterea per eam venæ ſectionem ruruſus in corpus ioque venas reuocare, ægrumque haud ſecus, quam ſi gladio illum iugularent, interficere non vereantur. O cæcos homines, o inſignes caroſiſſes, cur noo exoriantur Carones qui de hac veſtra craſſiſſima inſciia condignas ſumunt penas? Cur non hoc Hippocra- tis dictum: *Quæ ducere oportet, quæ maxime natura vergit, eo per conferentia loca educere*

L. Apho.

conuenit: expenditis id enim facile vos veſtri erroris commune faceret. Quum enim natura vbi vicerit, peſtilens venenum perpetuo per bubones & ſudores e corpore pellat, quæ veſtra eſt tum cæcitas, tum audacia, ac contumacia, vt illam non imitemini, ſed eius actionem pertinaciter, ac citra omnem pudorem per ſanguinis miſſionem impedire non timeatis? Quemadmodum enim in phlegmonibus internis ſanguis in corpore redundans, & aliquam in partem præter naturam confluens illiſſe ſeſe accumulans per venæ ſectionem alio, & in contrarium reuelltur & foras educitur: ita quoque virus peſtilens quod a natura & medicamento iam expellitur & eicitur, per ſanguinis miſſionem veſtro conſilio adhibitam, ruruſus intro io venas vacuatas reuocatur, & io contrarium trahitur. Accedit, quod hæc ipla ſanguinis detractio eorum etiam medicamentorum quæ buboni impoſita ſunt actionem, penitus interturbet. Vt enim illa venenum foras trahere & e corpore educere conatur: ita vos per ſanguinis detractioem, illud ruruſus ab eo loco in corpus reuellere ſtudetis. Proinde hinc conſpicuum ſit, quam impudenter vobis practicoꝝ, vt loqui vobis conſuetudo eſt, nomen arrogetis, quum carniſicis potius appellatio vobis competere, quædoquidem hac venæ ſectione ægrotantis vitam, haud ſecus atque carnifex hominis iugulum, gladio petatis. Ex iis igitur quæ hæcenus a nobis dicta ſunt, nulli non perſpicuum euadit, quod non ideo per ſanguinis miſſionem reuellendum, quod natura ex inſecus bubonem excitauit, ſed contra potius naturæ impetus a Medico iuandus, & venenum foras per conuenientia præſidia trahendum, atque e corpore educendum ſit. Nec eſt cur hoc loco nobis deo inſultent, dicentes. Quum vobis licere puteris, vt in peſte

Obiectio.

cui obſtruſtio coniuncta eſt, ſanguinem mittatis, idem proſecto inde vobis, quod nobis accidat, nempe quod per ſanguinis miſſionem venenum ruruſus intro reuocetur. Reſpondeo, minime gentium. Nam in obſtruſtione quæ peſti complicatur non ſtatim inter initia, & priuſquam antidotus aliqua exhibitæ fuerit, quod vos perpetuo facitis, ſanguinem detrahimus, ſed tum, vbi prius antidoti præſidio venæ viſ ſopita, alterata, & magna ex parte, aut rota fuerit eiecta & excreta, & æger abunde ſudauerit. Accedit, quod per ſanguinis miſſionem qua nos vtimur, redundans duntaxat ſanguis educatur, a quo velut onere quodam, natura grauata fuit. Leuata igitur hoc pondere natura, virtus nequaquam, quemadmodum per veſtram venæ ſectionem, deiicitur, ſed validior redditur.

Reſponſio.

Quod ſi vero plus æquo ſanguinis etiam educatur, tamen non eſt cur venenum a bubone reuelli, & ruruſus ad interiora trahi queat: quandoquidem ne id fiat, medicamenta buboni impoſita, & foras vehementer trahentia idipſum impediunt. Quid multis opus eſt verbis? nihil eorum quæ veſtram venæ ſectionem ſequuntur iocummoda, noſtram, modo iam dicto adhibitam, ſequi poſſunt, quod vtriuſque ratio diuerſa ſit, vt antea monſtratum eſt. Quare paſſim vos impingitis, vt nulla plane vobis euadendi reliqua ſit via ac ratio. Ceterum vt ad inſtitutum vnde digreſſi ſumus redeamus, indicatio curandi in hoc morbo, quæ ſæpe omnium praua eſt, & a morbi ſubſtantia ſumitur, noo niſi medicamenta quæ eidem rota ſubſtantia aduerſantur, primum omnium eſſe adhibenda abunde inſinuat. Vt mirari ſubeat Andernacum, qui in libello ſupra citato, peſtilentiam nullam habere curandi indicationem ſcribere auſus eſt, quum tamen prima in omnibus curandis morbis indicatio, ab ipſo morbo petatur. Inter antidota vero quæ multa & varia ſunt, vnice laudatur, id quod *Electuarium de oro* dicitur, quo olim Maximilianus, optimus & prudentiſſimus Imperator, vſus eſt. Hoc cur omnibus propemodum aliis præferam, ſecit

Electuarium
de oro.
Maximilianus
Imperator.

- A fecit mirabilis eius affectus, quem sepe in multis aegrotantibus ostendit, & quod sit paratu facile, & legitima habeat quæ eius compositionem ingrediuntur simplicia: excepta nucæ vomica quæ ne hodie quidem satis cognoscitur, & pro qua radix petalitzæ indi debet, & radice distamni albi, pro qua melius est *vr folia veri distamni*, quæ nunc bene haberi possunt, vsurpentur. Licet & radix illa venenis aduersetur. Datur prædictum electuarium iis qui prouectioris sunt ætatis, pondere drachmæ vnius. Iunioribus autem interdum scrupuli duo sufficiunt. Diluitur autem in stillaticio rosarum, aut intybi, aut scabiose vocatæ liquore. Est & huius medicamentum vsus non contemnendus in præseruando, si quotidie ex eo sumatur pondus grani vnius, vel duorum hordeaceorum, aut magitudine pisii. Plurimum confert etiam huius portionis
- B** sumtio, quæ habet: *Theriacei Andromachi scrupulos duos. Antidoti Antihydricæ scrupulum vnum. Boli armenii preparati, scrupulum dimidium. Liqueorum stillaticiorum rosarum, scabiosæ & buglossi, singulorum unciam vnam. Quanta vero sit boli armenii in petilenna obli-* Patio.
- genda vis & potestas, libr. 8. De simplicibus medicamentorum facultate abunde docet Gale-* Boli armenius.
- nus, qui in magna peste, quæ Romæ grassabatur, quotquot hoc medicamentum*
- biberunt, celeriter sanatos esse scribit. Quare debet huius medicamentum, pellis tem-*
- pore, maximus esse vsus. Prætereā non parum auxilii affert & hic pulvis, qui accipit* Pulsis opti-
- Foliorum distamni veri, radicis tormentille nominata, radicis pimpinellæ, cedroris, gentianæ,* mus.
- radicis betonicæ altitulis (quam hodie officina corrupta voce tunicam appellat) singulorum unciam*
- dimidiâ. Boli armenii preparati, unciam vnam. Terra lemmis, drachmas tres. Aloës secoraria, myr-*
- C** *rha, singulorum unciam dimidiâ. Croci drachmâ vnam. Mastice, drachmas duas. Tercatur om-*
- nia subtilissime, & fiat pulvis. De quo aegrotanti detur pondus drachmæ vnius in*
- stillaticio rosarum, aut oxalidis liquore. Plura in præsentia alexiteria haud comeme-*
- morabimur, quod iis omnium recentiorum, qui de peste aliquid memoriz prodidi-*
- derunt, libri referri sint. Infra tamen, ubi de præseruandi ab hoc malo ratione age-* Sadoa.
- mus, aliqua prædictis adiciemus. Sumro igitur aliquo prædictorum medicamen-*
- torum, æger, in lectum calefactum, mollioribus lintheis stratum & adornatum, stragi-*
- lisque probe tectum & munitum, ut illic quatuor, aut quinque, aut pluribus horis,*
- pro virum ratione, sudet, reclinetur. Quod si vero hæc lege ægro sudor non eliciat-*
- ur, pedibus ægrotantis lateres ad ignem calefacti subiiciendi. Hænamque suo calo-*
- D** *re prompte sudorem mouebunt. Toto autem hoc tempore quo æger sudat, vniue-*
- rsu cauendum erit, ne dormiat, edat, aut bibat. A sudore purissimis lintheis sudor dili-*
- genter abstergendus. Deinde lecto, si lubet, aut potest, æger surgat, aeremque extra-* Quid a sudore facien-
- neum vires. Aer autem cubiculi in quo æger decumbit, cum odoratis rebus ac fi-* dam.
- grantibus suffimentis quotidie quater aut quinquies emendetur, ac repurgetur. Cu-* Aeris co-
- biculum autem præstat mutare: quod vnius cubiculi aer, ex assidua habitatione ægri* rectio.
- plurimum vitiat, emendari facile non possit. Cubiculi autem aer in quod trans-*
- fertur æger, prius suffimentis corrigatur. Quia vero hæc esse oporteat, paulo post li-*
- ceemus. A sudore duabus aut tribus horis, pro viribus, facto iusculum gallinaceum æ-*
- grotanti offerendum: idque subinde sæpius fiat. Sensim enim & paulatim resicen-*
- E** *das æger erit. Quapropter illi confert sæpe comedere, at parum admodum. Er qui*
- hac ratione cibantur, ceteris citius conualescent. Carnibus quoque pullorum galli-*
- naceorum cum oxalide, aut limonum succo, aut omphacio coctis huic vti licebit.*
- Æger etiam primo die omnino a somno confabulationibus ministrantium, dehor-*
- tationibus strepitu, frictione extremorum, aurium, nasi, & pilorum vellicatione, abor-*
- rendus est. Ad quod institutum non inutile erit, spongiam accertimo aceto imbutam*
- naribus admoveere. In vehementiori siti, licebit vsurpare hanc portionem, quæ acci-*
- pit: Zulapii violacei, uncias tres. Serapii ex acido citrii succo, unciam vnam & dimidiâ. Serapii* Potio.
- de iustyo satino, uncias duas. Decocti oxalidis, scabiosæ, & florum buglossi, uncias decem, vel tantan-*
- dem liquoris cornuæ stillaticii. Commisceatur, & fiat potio. Licebit etiam vt quæ in*
- F** *qua hordei parum decoctum sit, succum rosaceum, aut oxalidis, aut limonum, vel ompha-*
- cium admisceas, & potus vice exhibeas. Ceterum exhibendam medicinam, potissimum*
- si vires inualidæ fuerint, quæ cor, aliasque corporis partes in corpore principatum*
- habentes roborant & confortant: quale est quod habet. sacchari violacei, rosacei, buglossi,*
- cei, singulorum unciam vnam & dimidiâ. Boli armenii preparati, drachmâ vnam. Coraliorum* Medicamentum roborans.

- Epithema.** *rubeorum ſcrupulum unum. Corticum mali citrii, drachmam unam & dimidiam. Caphura ſcrupulum dimidiam. Cum ſerapio de acido citrii ſucco, quod ſatis eſt, fiat antidotus liquida. Cordis etiam regioni, maxime ubi iuxta thoracem adhuc tubercle æſtum ſenſcrit æger, epithema hoc imponendum, quod habet: *Liquoris ſtillicitii roſarum, bugleſi, oxalidis, ſingulorum uncias quatuor. Specierum antidoti & gemmis, drachmam unam. Ligni aloei, ſantalorum rubeorum, corticum mali citrii in puluerem redactorum, oſis cordis ceruini, ſingulorum ſcrupulum dimidiam. Croci, grana ſex. Commixtū omnibus ſingatur epithema.* Animaduertendum tamen, vt epithemata non niſi calefacta adhibeantur. Poſtquam autem refrigerantur, ſtatim ſunt remouenda: tum enim meatus conſtringunt, ægro rantiq; moleſtiam haud exigua affertur. Quocirca ſacculis præſtat vti, cordialibus nominatis, qualis eſt qui accipit: *Florum roſarum rubeorum, nymphae, violarum, ſingul. drach. duas. Santalorum omnium, corallū albi & rubri, ſpadii, margaritarum ſing. drach. tres. Cinnamomi, coryophyllorum, oſſis cordis ceruini, ligni aloei, corticum citrii mali, croci, ſingulorum ſcrupulum unum. Seminū oxalidis, ſcrup. duos. Caphura, grana quatuor.* His omnibus ritibus in puluerem, formentur ſacculi duo quadrati & ſenſco, & alternis vicibus calefacti applicentur. Porro vnice ſtudentium etiam erit, vt venenati humores ad locum vnde bubones emiſcerantur, apoſitis cucurbitulis, aut medicamentis aliis trahendi vim obtinentibus alliciantur: quale eſt hoc quod accipit: *Ficum pinguium numero ſex. Vuarum paſſarum, vnc. dimidiam. Salis ſoſſilis, drach. duas. Mellis, vnc. unam. Cum oleo chamamelini ad emplaſtri formam reducatur, quod ca-lefactū buboni imponatur.* Aut eiufmodi, quod plurimum ab omnibus commendatur. Accipe cepis, quæ maxima eſt, eiufque capite amputato, totam perforato, & Andromachi theriaca comple, adiectis rutæ vel ſaluiæ ſuccis. Quo quidem peccato, totamen, quod in capite cepæ eſt luto obturetur, & cepa igni ad mota torreatur. Vbi ſatis toſta videbitur, cortices eius auferantur, & ſubinde in mortario conſutator, donec emplaſtri conſiſtentiam naſta videatur, ac buboni imponatur. Nec eſt, quod te Gentilis, Valeſci, & non nullorum aliorum auctoritas moueat, cur minus theriacam bubonibus imponas. Neque enim, vt illi toto cœlo errantes putauerunt, a ſe propulſando theriaca, aliud ve huc ſimile alexiterium medicamentum, agit: fed potius ad ſe trahendo, vt ſupra libro primo capite De conuulſione, ex Galeni monumentis abunde monſtrauimus. Valeret etiam hoc emplaſtrum, quod ad ſuppurationem bubonis plurimum conducit. Habet ſarina ſenogreci, ſeminū lini, florum chamamelī, ſingul. vnc. dimidiam. Radiciſ altheæ, liliorum alborum, ſingul. drach. dimidiam. Ficus ſex numero. Foliorum diſcammī veri drachmas tres. Radiciſ plu, drachmas duas. Seminū ſinapi, drachmam unam & dimidiam. Fimi columbini, vnc. dimidiam. Oleum chamamelini ſiluaei, ſingulorum unciam unam & dimidiam. Redigantur in formam emplaſtri, aut pulvis conſiſtentiam, Laudatur & hoc quod accipit: *Emplaſtri diachylon ſimplicis, uncias duas. Ammoniā, galbani, ſingulorum unciam unam. Conuulſi omnibus, ad emplaſtri conſiſtentiam redigantur.* Ceterum ſi prædictis ad-moris bubo ſua ſponte non rumpatur, imponendus ſubinde ſimus anſericus in oleo vulgari, aut chamamelino diſſolutus. Hæc de curatione eorum qui peſtilentia correpti ſunt, dixiſſe ſatis ſit. Nunc quo pacto aliquis ſe a peſtilentia, quæ certum quen-dam infectat locum, præſeruare, ac munite debeat, breuiter quæque exponemus. Quum vero initio huius demonſtrauerimus, peſtilentiam non fieri niſi ex peſtilentis ac putridi aeris inſpiratione, ſatis conſtat, nullum eſſe fuga ipſa peſtilentis remedium. Neque enim vlla alia aeris peſtilentis euitandi ratio eſt, quod inuitis etiam nobis hauriendus ſit aer, niſi in locum aliquem ubi minime vitioſus eſt aer, ſed optimus plane conceſſerimus. Quod eo citius magiſque faciendum erit, quo malum ipſum eon-tagioni inagis eſt obnoxium, quemadmodum certe quotidiana experientia abunde reſtat. Fugendum etiam longius, in eum nimirum locum, ubi, vt comprehenſum eſt, aer adhuc purus omnique vicio deſtitutus eſſe deprehenditur. Nec ab eo loco niſi tardiffime eſt redeundum domum. Hinc non temere vulgo dici ſolet, peſtilentiz tempore plus opis & auxilii præſtare tria hæc aduerbia, cito, longo, & tarde, quam tres, optime etiam inſtructas medicas officinas. Quare quibus commode per officia licet, ſi nullaratione ſe induci patiuntur, vt in aere peſtilente morentur. Quod niſi fecerint, ſe præſenti mortis periculo temere exponunt. Nā, vt Gal. Et in li. De theriaca ad Piſanē attestatur, peſſiū tanquā & ipſa exiſſas quādiū beluæ haud paucas interim, verū civitates quo-*

- A** que tota depiciens, male conficit. Quippe prava quidam aeris ad corruptionem prompta mutatio efficitur: & homines quum respirations necessitate periculum evitare nequeant, ipsam acrem, velut venenam quoddam ad se per os attrahunt. Quamobrem etiam, ait, Hippocratem illum multis modis admirandum fando, qui locum illum ex Aethiopia Graecos invadentem non aliter curavit, quam aeris mutatione, alterationeque ne talis amplius inspiraretur. Quam igitur ingrem per totam. Athenarum urbem incendi iussit, non simplicem lignorum materiam, verum ferta floresque suavitissimos alimentum ipsius esse consuluit, vnguentaque pinguisima & odorifera ipsi superfundi, ut aerem purum hoc modo redditum, homines in mali sustulium inspirarent. Hæc ille. Quem locum Galeni ideo recitavi, ut perspicue hunc omnes intelligerent, loci mutationem & alterationem præstantissimorum Medicorum omnium
- B** testimonio inter remedia pestilentie primum obtinere locum. Sed non latet, Ad censuram quædam morbos theologia esse quoddam hoc tempore in orosos sane homines, & plane Stoicos, qui clamitent, pii & Christiani hæc in parte non esse Medicorum consiliis obtemperandum. Quippe Christi, norum esse ut mortem non metuant quidem, tantum abest ut illis fugere liceat. Belli mehercules homines, qui hoc a nobis exigunt, quod nemo sanctorum, imo ne Cbtilus ipse, quem exhorruisse mortem sacre testantur literæ, præstare potuit. Et quod exhorruerint, nihil mirum quidem, quum omnibus a Deo sit institutum, ut vitam tueantur, mortem fugiant. Hinc D. Paulus ad Ephes. 4. scriptum reliquit: Nemo unquam suam ipsius carnem odio habuit, imo eam potius nutrit, ac fovet. Exhorruisse autem, in o declinasse mortem sanctos, multis scripturæ exemplis ostenditur.
- C** Abraham metu mortis, Saram uxorem suam appellare forem voluit, Genesi. 22. Iacob mortem exhortens, Esau fratrem fugit in Mesopotamiam. David vitam servare cupiens, Saul em & Absalonem filium fugit. Elias propheta audacissimus, post occisos prophetas Baal, ininis Isebelis reginæ territus, in desertum fugit. Moses quum quereretur a rege Aegyptiorum, fuga in Midiam sibi vitæque suæ consuluit. Verum dicent hoc loco morosi illi, exempla nunc producta non docent, mortem quam pestilentia affert, sed eam, quæ persecutiones sequitur, fugiendum esse. Quibus vicissim respondeo, mortem esse mortem, & quacunque causa oriatur. Deus inter cetera supplicia famem etiam, ut quæ mortem affert, numerat: quam si fugere licet, cur non etiam pestilentiam? Famem autem fugisse Abrahamum, Isaacum, & Iacobum, notus est, quam
- D** ut longius a me demonstrari debeat. Quod si nulla supplicia diuinitus inflicta fugere licebit, certe Turcam, aliosque tyrannos, quos tamen flagella Dei esse constat, persequentes nemo Christianus fugere debet. Peccant igitur, qui oppida & pagos his advenantibus deserunt. Pari ratione domo aliqua conflagrante nemo excurrat, nemo etiam ad sopiendum incendium accurret: nam & ignem inter supplicia a Deo immixta numerandum esse, nemo inficias ibit. Incident prætere a vndas, nunquam natione tibi consulet, sed aquam veluti Dei supplicium tibi adimere vitam æquo patietur animo. Parte denique aliqua corporis vulnerata, aut fracto osse, nemo Christianus chiturgi operam requiret: Dei enim supplicium perferet. Nemo frigora, utpote Dei supplicia, arcebit vestibus, & id genus aliis rebus ad ea propulsanda necessariis utetur.
- E** Quid multa? nemo Christianus vilo remedii genere aduersus vllum morbum hac ratione uti audebit, quod nullum sit genus morbi inter supplicia a Deo immixta non connumerandum. Non debere itaq; mortem metuere pios, ita intelligendum erit, non debere illos metu mortis despõdere animum, nõ debere etiam ut deuitent mortem non concessis mediis vitæque peccare: in summa, in morte non debent desperare. Sed existit ea de re doctissimorum nostri xui theologorum Lutheri & Brentii libelli, in quibus Stoicorum illorum somnia pulchre refutantur: quorum ego hac in re iudicia pluris facio, quam centum aliorum. Quid multa? fugere mortem nemo potest, quandoquidem mori omnibus statutum sit. Pestem tamen fugere, utpote alios cõtagiosos morbes, elephantiam, morbum gallicum, & id genus alios licet. Quare hanc alia
- F** illorũ obiectiones misiss facio, & ad institutum reuertor. Si vero eertis ac iustis de causis, ut fugias, tibi haud licuerit, tum prima cura sit, ut domus, in qua tibi cõmorandũ est omni foetore carcat, & a foras atq; spurcicia sit aliena. Fenestræ eiusdem clausæ sint, dieb. potissimũ nebulosis ac pluuiosis, ne pestilens aer ingre diatur. Quod si tamẽ aperire vis, cura ut sint versus orientẽ aut septentrionem constitutæ, idq; fiat a sole iam ali-

- Epithema.** *rubeorum ſcrupulum vnum. Corticum mali citrii, drachmam vnam & dimidiam. Cepura ſcrupulum dimidiam. Cum ſerapio de acido citrii ſucco, quod ſatis eſt, fiat antidotus liquida. Cordis etiam regioni, maxime vbi iuxta thoracem adhuc tubercle æſtum ſenſerit æger, epithema hoc imponendum, quod habet: *Liquoris ſtillatitii roſarum, bugleſis, exalidii, ſingulorum vncias quatuor. Specierum antidoti & gemmis, drachmam vnam. Ligni aloei, ſantalorum rubeorum, corticum mali citrii in puluerem redactorum, æſus cordis ceruini, ſingulorum ſcrupulum dimidiam. Croci, grana ſex. Commixturæ omnibus ſingatur epithema. Animaduertendum tamen, vt epithemata non niſi calefacta adhibeantur. Poſtquam autem refrigerantur, ſtatim ſunt remouenda: tum enim mcatus conſtringunt, ægro tantique moleſtiam haud exiguum afferunt. Quocirca ſacculis præſtat vti, cordialibus nominatis, qualis eſt qui accipit: *Florum roſarum rubeorum, ſymplocæ, violarum ſingul. drach. duas. Santalorum omnium, B coralli albi & rubri, ſpadii, margaritarum ſing. drach. tres. Cinnamomi, charyophyllorum, æſſis cordis ceruini, ligni aloei, corticum citrii mali, croci, ſingulorum ſcrupulum vnum. Seminis exalidis, ſcrup. duos. Cepura, grana quatuor.* His omnibus tritis in puluerem, formentur ſacculi duo quadrati & ſenſico, & altetnis vicibus calefacti applicentur. Porro vnice ſtendum etiam erit, vt venenati humores ad locum vnde bubones emetſerunt, appoſitis cucurbitulis, aut medicamentis aliis trahendi vim obtinentibus alliciantur: quale eſt hoc quod accipit: *Ficum pinguium numero ſex. Vuarum paſſarum, vnc. dimidiam. Salis ſoſtilis, drach. duas. Mellis, vnc. vnam. Cum oleo chamamelino ad emplaſtri formam reducatur quod calefactum buboni imponatur. Aut eiufmodi, quod pluitinum ab omnibus commendatur. Accipe cepis, quæ maxima eſt, eiufque capite amputato, totam perforato, & Andromachi theriacæ comple, adieciſis rutæ vel ſaluiz ſuccis. Quo quidem peracto, foramen, quod in capite cepæ eſt luto obturetur, & cepa igni admota torreatur. Vbi ſatis roſta videbitur, cortices eius auferantur, & ſubinde in mortario contundatur, donec emplaſtri conſiſtentiam naſta videatur, ac buboni imponatur. Nec eſt, quod te Gentilis, Valeſci, & nonnullorum aliorum auctoritas moueat, cur minus theriacam bubonibus imponas. Neque enim, vt illi toto celo errantes putauerunt, a ſe propulſando theriacæ, aliudve hoc ſimile alexiteticum medicamentum, agit: ſed potius ad ſe trahendo, ut ſupra libro primo capite De conuulſione, ex Galeni monumentis abunde monſtrauimus. Valet etiam hoc emplaſtrum, quod ad ſuppurationem bubonis plurimum conducit. Habet ſarina ſanogæ æſi, ſemini lvi, florum chamamelini, ſingul. vnc. dimidiam. Radici altheæ, libanum albarum, ſingul. drach. dimidiam. Fieni ſex numero. Foliorum diſſamini veri drachmas tres. Radici plu drachmas duas. Seminii ſinapi, drachmam vnam & dimidiam. Feni columbini, vnc. dimidiam. Olearum chamamelini, ſitacei, ſingulorum vncias vnam & dimidiam. Redigantur in formam emplaſtri, aut pulvis conſiſtentiam. Laudatur & hoc quod accipit: *Emplaſtri diachylon ſimplicis, vncias duas. Ammoniaci, galbani, ſingulorum vncias vnam. Contuſis omnibus, ad emplaſtri conſiſtentiam redigantur. Ceterum ſi prædictis admotus bubo ſua ſponte non rumpatur, imponendus ſubinde ſimus aſcrinus in oleo vulgari, aut chamamelino diſſolutus. Hæc de curatione eorum qui peſtilentia eorum repti ſunt, dixiſſe ſatis ſit. Nunc quo pacto aliquis ſe a peſtilentia, quæ ceſtum quendam infeſtat locum, præſeruare, ac munire debeat, breuiter quoque exponemus. Quum vero initio huius demonſtrauetimus, peſtilentiam non fieri niſi ex peſtilentis ac putridi aeris inſpiratione, ſatis conſtat, nullum eſſe fuga ipſa præſentis remedium. Neque enim vlla alia aeris peſtilentis euitandi ratio eſt, quod inuis etiam nobis hauriendus ſit aer, niſi in locum aliquem vbi minime vitioſus eſt aer, ſed optimus plane conceſſerimus. Quod eo citius magiſque faciendum erit, quo malum ipſum contagioni magis eſt obnoxium, quemadmodum certe quotidiana experientia abunde teſtatur. Fugendum etiam longius, in eum nimirum locum, vbi, vt comprehenſum eſt, aer adhuc purus omnique vitio deſtitutus eſſe deprehenditur. Nec ab eoloco niſi tardiſſime eſt redeundum domum. Hinc non temere vulgo dici ſolet, peſtilentiæ tempore plus opis & auxilii præſtare tria hæc aduerbia, cito, longe, & tarde, quam tres, optime etiam inſtructas medicis officinas. Quare quibus commode per officia licet, ſi nulla ratione ſe induci patiantur, vt in aere peſtilente moreantur. Quod niſi fecerint, ſe præſentis mortis periculo temere exponant. Nã, vt Gal. Et in li. De theriacæ ad Piſoneſe atteſtatur: *peſtis tanquæ & ipſa exiſſit, quanta belus, haud paucos interim, verum ciuitates quoque*****

A que totas depascens, male conficit. Quippe prava quadam aeris ad corruptionem prompta mutatio efficitur: & homines quum respirationis necessitate periculum evitare nequeant, ipsam aerem, veluti venenum quoddam ad se per os astrabunt. Quamobrem etiam, ait, Hippocratem illum multis modis admirandum laudo, qui lucem illam ex Aethiopia Gracos invadentem non aliter corripuit, quam aeris mutatione, alterationeque ne talis amplius inspiraretur. Quum igitur ignem per totam Athenarum urbem incendi inisset, non simplicem lignorum materiam, verum ferri, floresque suavisimos alimentum ipsius esse consuluit, vixentemque pinguisima & oloriferam ipsi superfundit, ut aerem purum hoc modo redditum, homines in mali suscitatum inspirarent. Hæc ille. Quem locum Galeni ideo recitavi, ut perspicue huic omnes intelligerent, loci mutationem & alterationem præstantissimorum Medicorum omnium

B testimonio inter remedia pestilentie primum obtinere locum. Sed non latet, esse quosdam hæc tempore morosos sane homines, & plane Stoicos, qui clamitent, piis & Christianis hæc in parte non esse Medicorum consiliis obtemperandum. Quippe Christi, norum esse ut mortem non metuant quidem, tantum abest ut illis fugere liceat. Belli in hercules homines, qui hoc a nobis exigunt, quod nemo sanctorum, imo ne Christus ipse, quem exhorruisse mortem sacræ testantur literæ, præstare potuit. Et quod exhorruerint, nihil mirum quidem, quum omnibus a Deo sit institutum, ut vitam tueantur, mortem fugiant. Hinc D. Paulus ad Ephes. 4. scriptum reliquit: Nemo inquam suam ipsius carnem odio habuit, imo eam potius nutrit, ac fovet. Exhorruisse autem, imo declinasse mortem sanctos, multis scripturæ exemplis ostenditur.

C Abraham metu mortis, Saram uxorem suam appellare sororem voluit, Genesi 20. Iacob moriem exhorrens, Esau fratrem fugit in Mesopotamiam. David vitam servare cupiens, Saul'em & Absalonem filium fugit. Elias propheta audacissimus, post occisos prophetas Baal, minis Isebelis reginæ territus, in desertum fugit. Moses quum quereretur a rege Aegyptiorum, fuga in Midiam sibi vitæ quæ suæ consuluit. Verum dicent hoc loco morosi illi, exempla nunc producta non docent, mortem quam pestilentia affert, sed eam, quæ persecutione sequitur, fugiendam esse. Quibus vicissim respondeo, mortem esse mortem, & quacunque causa ortam. Deus inter cetera supplicia famem etiam, ut quæ mortem affert, numerat: quam si fugere licet, cui non etiam pestilentiam? Famem autem fugisse Abrahamum, Isaacum, & Iacobum, notius est, quam

D ut longius a me demonstrari debeat. Quod si nulla supplicia divinitus inflicta fugere licebit, certe Turcam, aliosque tyrannos, quos tamen flagella Dei esse constat, persequentes nemo Christianus fugere debet. Peccant igitur, qui oppida & pagos his adveniantibus deserunt. Pari ratione domo aliqua conflagrante nemo excurret, nemo etiam ad sopiendum incendium accurret: nam & ignem inter supplicia a Deo immixta numerandum esse, nemo inficias ibit. Incident præterea vndas, nunquam natione tibi consulet, sed aquam veluti Dei supplicium sibi adimet vitam æquæ patietur animo. Parte denique aliqua corporis vulnerata, aut fracto osse, nemo Christianus chirurgi operam requirit: Dei enim supplicium perferet. Nemo frigora, utpote Dei supplicia, atcebit vestibus, & id genus aliis rebus ad ea propulanda necessariis utetur.

E Quid multa? nemo Christianus vilo remedii genere adversus vllum morbum hac ratione vitæ audebit, quod nullum sit genus morbi inter supplicia a Deo immixta non computandum. Non debere itaque mortem metuere pios, ita intelligendum erit, non debere illos metu mortis despõdere animum, nõ debere etiam ut deivent mortem non concessis mediis vitæ peccare: in summa, in morte non debent desperare. Sed existat ea de re doctissimorum nostri ævi theologorum Lutheri & Bentiilii belli, in quibus Stoicorum illorum somnia pulchre refutantur: quorum ego hac in re iudicia pluris facio, quam centum aliorum. Quid multa? fugere mortem nemo potest, quandoquidem mori omnibus statutum sit. Pestem tamen fugere, utpote alios cõtagiosos morbos, elephantiam, morbum gallicum, & id genus alios licet. Quare hanc aliamque

F illorum obiectiones in istas facio, & ad institutum reuertor. Si vero certis ac iustis de causis, ut fugias, tibi haud licuerit, tum prima cura sit, ut domus, in qua tibi cõmorandũ est omni fetore careat, & a sordibus atque spurcitia sit aliona. Fenestræ eiusdem clausæ sint, diebus, potissimum nebulosis ac pluviosis, ne pestilens aer ingreditur. Quod si tamẽ aperire vis, cura ut sint versus orientem aut septentrionem constitutæ, idque fiat a sole iam ali-

Adversus
quosdam
morosos
theologos

Pii quomodo
morosum
non metuere
debeant

212 Operum Leonhard Fuchſii Pars.III.

quot horis orto. Raro, & non niſi celo ſereno, in publicum prodeundum: neque id etiam, niſi prius ſumta aſſidoto, quæ a contagione conſueturæ valeat. In ædibus quotidie ſuccendendus ignis e lignis quercinis, iuniperinis, tamaricis, lauri, aut ſimilibus, quo aer in iis vinatus corrigatur, purgeturque. Quippe miram eſſe ignis vim ad aeris putredinem emendandam, Hippocratis exemplo, quod paulo ſupra prodiximus, abande docemur. Viuis etiam carbonibus ſequens pulvis crebro inſpergatur, qui habet: *Rosmarini, manipulum dimidium. Salvia, betonica, abſinthii, maiorana, erigoni, ſingularum Manipulum unum.* Terantur omnia ſubtiliſſime, & fiat pulvis.

ſuffimentum

Vel ille, qui accipit: *Baccarum iuniperi, unciam unam. Myrrha, drachmas tres. Thurru, maſtiche, ſingularum drachmas tres & dimidium. Radix garyophyllata, ſeu benediſſe volgo vocata, drachmam unam. Ruta, unciam dimidiam. Corticum cupreſſi, drachmam unam & dimidium. Radix angelica ſarina, lauradula, ſingularum drachmas duas. Tritis omnibus fiat pulvis. Pauperes ligna iuniperina fiſſa, aut baccas ipſas carbonibus ignitis imponant. Ditiores ligno aloes, aut puluete galli moſchatæ, garyophyllorum, & ſimilium vtantur. Dum in publicum prodire neceſſitas cogit, hanc aut ſimilem odoratam pilam ſecum circumferant, quæ habet: *Ladani, drachmas tres. Syriaci calamitii, drachmas duas. Cinnamomi, maceris garyophyllorum, nucis moſchatæ, ſingularum drachmam unam. Ligui aloes, ſcrupulum unum. Spicanardi, ſcrupulum dimidium. Myrrha, maſtiche, thuris, ſingularum drachmam dimidiam. Moſchi, ambaru, ſingularum granatru, Tritæ & cribrata ſtaſſe, ſtillaticio maiorana liquore ſufficiemibus madefiant, & excipiantur. ſingaturque pila odorata, ipſum hodie vocant. Æſtatis tempore aer frigidis rebus depuretur, nonbus nimium roſarum, violarum, nymphet, pampiniſ, foliis falicis, & id genus aliis. Pauimentum etiam ſtillaticio roſarum liquore, item oxalidis, ſimilibus itroretur, aut aqua frigida cui aliquid aceti commixtum ſit. lnuat etiam odoratæ roſas, acetum, capſuram ſantali, & eius generis alia. Vel hanc pilam, quæ accipit: *Ladani, unciam dimidiam. Syriaci calamitii, drachmas tres. Florum myrthæ, roſarum, violarum, ſingularum drachmam unam. Corticis mali citrii, drachmam unam & dimidiam. Santalorum omnium ſingulis, drachmam dimidiam. Maceris cinnamomi, ſingularum ſcrupulum unum. Maſtiche, drach. unâ. Papaneris candidi ſucci ſemperniui ſeru. dimid. Ambaru, moſchi ſing. granatru. Tritæ excipiantur ſtaſſe, liquore ſtillaticio roſarum, fiatque pila odorata. Ceterum quom Galenus libr. 8. diſſer. febr. cap. 4. vnam & primam quidem eorum, qui a peſtilentia tuti eſſe cupiunt, curam ſote itradat, vt corpus quam maxime ſuperuacuis atque excrementis vacet, & o-***

Pila odorata.

Pila alia odorata.

Videtur etiam

Exercitium

Chorea publicæ vendæ.

Exercitium.

primo ſpſitet, nihil certe æque, fugiendum erit, æo nimia cibi & potus ingeſtione ingurgitatore. Cibus igitur in vniuerſum facilis concoctionis, & bonum procreantibus ſanguinem, ac putrefactioni minime obnoxius vtendum. Qui quales particulatim ſint, ex Galeni libris *De aliment. facul.* & cibus boni & mali ſucci diſcendum erit. Quare de ſingulis ſeorſim hoc loco diſſerere, ſuperuacaneum eſſo iudico. Semper quoque cibus, quibus hoc tempore vſemur, aliquid aceti admixcendum erit, aut acidius aliis quiſpiam ſucci amphacium minimu, aut citrii mali, aut limonum, arantiorumque vocalorum ſuccur. Æſtatis tempore oleribus vtendum, bngloſſo, iuribis, oxalide, & lactuca. *Hymelaſia, petroſeline, apio, maiorana, meliſſophyllo, & hyſſopo.* Fructibus omnibus abſtinendum, niſi acidi fuerint: vt ſunt mala punica, citria, limones, arantia, & iis ſimilia, quibus vti expedit. Potus ſit vinum tenue & aquoſum. Cauſat ſibi quiſque a metacitoris potu, & multo. Quid mediocriter videtur ratio ſit refrigerans & deſiccans. Exercitio itaque non vtendum, niſi mediocti, Galeno etiam libr. 8. *De diſſer. febr. capite. ſeila:* & in loco temperato, atque aere prius per medicamenta ac ſuffimenta purificato & emendato. Cauendæ igitur choreæ publicæ, item curſus, ſaltationes, & quicquid eſt eius generis exet citii quod crebram aeris inſpirationem requirit. Quapropter hac etiam de cauſa peſtilenti tempore choreas magiſtratus, publico edicto propoſito, vetare debet. Quippe experientia ipſa ſatis docet, multos dum choreas agerent inſectos hæc lue, mortem oppetiſſe. Somnus, vigilia, vt omnia alia, ſunt moderata. Dormiendum vero in cubiculo bene obturato ac claſſo, ne ſcilicet peſtilens aer ingreditur, cuius ſubinde aer ſuffitu aliquo mane & veſperi purificetur ac corrigatur. Linteis vtendum putis ac mundis, & aliquandiu cum rebus odoriferis poſitus. A ſomno ubi experte cæus fueris, prima hæc cura ſit, vt corpus a ſuperuacuis exoneret. Vniueſo vero cauendum tibi erit, ne aliu vilo

tem-

A tempore adstrictam habeas. Proinde si sua sponte quotidie non deiecerit, catapotis Rufi vocatis, aut molli elypteri, aut glandibus in hoc paratis irritabis. Corpore a redundantis tum per aluum, tum velicam repurgato, medicamentum aliquod samentum, quod a pestilentis contagione munire potest, qualia multa paulo post commemorabimus. Ex si propter occupationes necessarias in publicum prodeundum eris, *zedearia, aut angelica, aut pimpinella radicem* commanducabis, aut *rimam* odorabis: mirifice enim huius odor pestilenti auri aduersatur. Coitus, immoderatus praesertim, vti ce fagiendus. A coitu sese quisque ab aere publico & infecto contineat. Balnea, publica potissimum, in vniuersum, veluti praesentissima venena, desestanda, quod mirum apertis horum calore corporis meatibus, aer pestilens promissime sese in pro-

Rurū odor
pestilens
aerem aduers
facit.
Venus.
Balnea.

B funda corporis recipiat. Qui priuato balneo vti volunt, is se ab egressu eiusdem ab aere vitiatō diligentissime muniat. Consultius tamen est vt frictionibus domi, & in aere emendato utamur, quam balneis. Caput tamen lixiuio, cui *asarum, maiorana, lauerdula, rosmarinus, betonica, salvia, chamamelum*, & id genus alia incocta sint, singulis septimanis lauandum, Ceterum iuuenibus, & qui sanguine abundant, pestilente tempore appetente venae sectione vtendum erit. Neque semel tantum, modo nihil aliud impediat, sed iterum atque iterum sanguinem educere interdum illis maximum ad tuendam sanitatem, & vti a peste praeseruiuntur, momentum affert, quod corporis habitum non nihil refrigeret, & ad commodationem caloris dncat. Purgandum quoque re ipsa possente, corpus medicamentis purgatoriis nominatis, idque vere praesertim & autumno, iuxta Hippocratis sententiam. Qualis vero esse debeant, & praecedentes

Veni se
dio.

Purgatio.

Catapotia, vti *Hippocratis sententiam*. Qualis vero esse debeant, & praecedentes libris cuius patet. Nos enim hic capita tantum istarum rerum attingimus, Quod ad animi perturbationes attinet, *syphilis, ira, odium, timor, grauiorē cura*, & quicquid est cogitationum seueriorum, fugienda omnia. Gaudio & hilaritate mediocribus vtendum. Nunc reliquum est, vt praeter sanguinis missionem & purgationem, ad alia medicamenta, quae ab hac lue tueri ac immunes conseruare possunt, progrediamur. Inter quae sane primum locum obtinent catapotia Rufi nominata, vel pestilentialia, vel communia, quae habent: Aloes iecorariae partes duas, croci orientalis, myrrhae, vtriusque partem vnam. Cum vino albo, aut cum stillaticio scabio saliquore singantur catapotia. De quibus quotidie sumatur scrupulum vnum, plus aut minus pro aetate

Animi per
turbationes

Praeseruan
us vena
medica
menta.
Catapotia
Rufi.

D & virium ratione. Quanquam autem hanc compositionem omnes hodie officinae *pilulas Rufi* nominant, tamen ab ea quam olim Rufus memoriz prodidit, differt, atque alia est. Quippe Rufi compositio crocum non habet, sed pro eo potius guttam ammoniacam recipit. Praeterea ea quam Rufus composuit, potio est, non cataportium, ut satis liquet ex libro secundo capite 35. Pauli *Aeginae*, ibidem enim hanc describit. Ceterum catapotia quibus vulgo vtuntur officinae, propter aloem & myrrham, vt pote quae putrefactioni plurimum aduersantur, miram quandam aduersus pestiferam lue contagionem efficaciam habere constat, ideoque minime contemnenda sunt. Licebit autem & sequentibus vti pilulis, quae accipiunt: Aloes iecorariae, drachmas tres. Myrrhae, drach. vnam & dimidiam. Agarici preparati drach. vnam. Croci orientalis, drach. dimidiam. Boli

Cōpositio
Rufi.

Pilulae.

E armenii preparati scrup. vnum. Seminii mali citrii, scrupulos duos. Mastiches, scrupul. dimidium. Radicis pimpinellae, drachmam dimidiam. Cum stillaticio rosarum liquore fiant ex drachma vna pilula tredecim. De quibus vna, vel duae sumendae. Potest etiam vsus esse illius medicamenti, quod officinae *Electuarium de nucibus* appellant. Accipit iuglandinum numero viginti. Ficam pinguius numero quindecim. Ruta, manipulos duos. Absinthii partem vnam, etulam foetidam vocant scabiosam singulorum manipulum vnum. Radicis aristolechia longe, vnciam dimidiam. Radicis aristolechia rotunda vulgaris, vnc. vnam & dimidiam. Radicum tormentillae, petasitis pimpinellae, dictamni vulgaris sing. vnc. duas. Foliorum dictamni veri, manipul. vnum. Baccarum lauri, drach. tres. Cornu cerui vsti, drach. duas & dimidiam. Maceris myrrhae, boli armenii, terra lemmia vera sing. drach. tres. Salis marini, drach. vnam & dimidiam. Florum buglossi manipulum vnum. Corticum mali citrii, vnciam dimidiam. Contusa aetata omnia accipiuntur, vncis duabus mellis desumpati, fiatque medicamentum liquidum, ita modō celsignat.

Electuariū
de nucibus
appellatum

Potio

Foliorum dictamni veri, vnciam dimidiam. Radicum zedeariae, betonicae albis pimpinellae, tormentillae sing. drach. dimidiam. Corticum citrii mali, drach. tres. Terra lemmia, drachmas sex. Boli armenii, vnciam vnam. Myrrhae selecta, aloes iecorariae, drachmas tres. Croci orientalis, drach. dimidiam. Myrrhae, drach. vnam & dimidiam. Boli armenii, drach. tres. Foliorum dictamni veri, manipul. vnum. Baccarum lauri, drach. tres. Cornu cerui vsti, drach. duas & dimidiam. Maceris myrrhae, boli armenii, terra lemmia vera sing. drach. tres. Salis marini, drach. vnam & dimidiam. Florum buglossi manipulum vnum. Corticum mali citrii, vnciam dimidiam. Contusa aetata omnia accipiuntur, vncis duabus mellis desumpati, fiatque medicamentum liquidum, ita modō celsignat.

varia singulorum unciam dimidiam. Croci, drachmam dimidiam. *Idest* iebes, drach. unam & dimidiam. Radici glycyrrhizæ, drachmam unam. Scabiosa, oxalidis, singularem drachmas tres. Sam alarum purpurearum, drachmam unam. Ranunculi cbari, anthera singularem drach. dimid. Oſſis cordis cervini, cer aliarum rubearum singularem ſtripul. duos. Capſura grana tres. Tritis omnibus in pollinem, fiat polvis, Si lubet, ex iis conficies orbiculos, aut morſulos cum ſachara, & liquoribus ſtomaticis roſarum & ſcabioſæ, & de iis quotidie drachmæ vnus pondus exhibebis, plus aut minus, pro ætate & viribus. Commendatur quoque vnice bolus armenius cum aceto ſumtus, ut ſupra eſt commemoratum. Item theriaca, iſteridatis antidotus, & id genus alia, quorum paſſim eſt copia apud eos qui de hac lue aliquid memoriz prodiderunt. Nos hic ſinem dicendi de hoc genere vitii facimus. Exant enim copulium doctorum virorum in Italia, Gallia, & Germania non pauci de peſtilentia commentarii, vnde varia remedia excerptere omnibus licebit.

LEONHARTI FUCHSII DE MEDENDIS

TUMORIBVS PRÆTER NATURAM,

Liber V.

De phlegmate. C A P. I.

Inflamatio
Phlegmonis
Bulſionis
ſemioris
Generatio



VA M latior aliqui, licet parum proprie inflammationem, Græci *phlegmon* nominant. Vox autem *phlegmon* illis bifariam ſumitur. Generatim, p omni calido & dolorifico, cum ſeruore, tumore: vt plane rum idē quod *phlegmon* hoc eſt efferueſcentia, ac inflammationis ſignificet. Sic ſane herpes, cryſipelata & carbunculi, phlegmones dicuntur, quæ in ſignificatione ab Hippocrate & aliis veterib. vox eſt viſurpata. Proprie autem phlegmone, eſt tumor ex ſanguine copioſo in locum aliquem præter naturam conſtante factus, ſupra ſeruorem efferueſcentiæ ve rubens, dolens, durus, & tactu renitens. Quod copioſius tradit Galenus lib. 13. Ther. meth. ab initio ſtatim. Nos hoc loco de phlegmone, quæ proprie ſic appellatur, & in externis partibus oboritur (nam de interiorum partium phlegmonib. ſuperiorib. libris actum eſt) diſſeremus. Fit hæc ipſa a ſanguine boſo, & craſſitie mediocri, qui in particulam aliquam vniuerſum iſſuit, atque propter copiam impactus in hæret: id quod propter vulnera, fracturas, conuſiones, luxationes, vlcera, & id genus alia quæ dolorem cōcitare, & fluxionem accerſere poſſunt, euenit. Phlegmone in particula aliqua orta, vehemens dolor vrget, niſi cōſmodi ſit quæ ſenſum omnino difficilem habuerit: pulſus in profundo moleſtus accidit, tendiq. prorsus ac frangi particula apparet, & vehementem calorem perſentit, vt quaſi combuti videatur, vnde & refrigerari deſiderat. Taliſq. rubor per ſumma viger, qualis ex balneis aduenit, aut ex igne, aut quouis alio modo calefactis. Renixus partis rãgenti eam, pro tenſionis modo. Quæ ſingula ſuſus loco iam citato, & libro primo ad Glauconem capite 1. Galenus proſequitur. Quum itaque phlegmone particulam quampiam, ſine manifeſta poſſiſſimum cauſa præcedere, obſederit, principio totum corpus euacuare oportet, præſertim vbi hoc ſanguine plenum fuerit, & valida vis laborantis, tempusque anni, regio, ætas & id genus alia nō impediunt. Quod ſi itaque in inferiore aliqua parte, verbi gratia genu, phlegmone conſtitent, tum ſanguinis euacuatio ex ſuperioribus partibus faciendæ. Incidere itaque oportet in gibbero venam aut interiorem, aut mediam: niſi alterum crus malis ſcarificare, aut igo venam pertundere. Si vero aliqua pars ſuperior patitur phlegmonem, per inferiora ſanguis eſt educendus. Semper enim fluxionis motum ad contrariam trahere expedit. Debet tamen reuulſio fieri ſecundum rectitudinem, Galeno in libro De curandis ratione per ſanguinis miſſionem teſte. Poſt venæ ſectiōnem, partem phlegmone laborantem perfundere ac illinere oportet medicamentis, quæ id quod inſiuit repellere ſint idonea: & quod iam in male affectam partem ſe recepit, vacuare quæaot, quæque robur iis quæ laborant partibus addant. Qualia vero horum medicamenta quæ id ipſum præſtent, in ſuperioribus libris ſæpe a nobis expoſitum eſt. Gale- nus quidem miſtice commendat poſcam, *exeratum* Græci vocat: nempe ſpongi- am hoc ipſo perſuſam & imbutam, parti phlegmone laboranti imponendo. Item cataplaſmata ex ſemperiuuo & mali punici cortice in vino decoctis, & rhoea poſteora compoſitum, ſi non vehemens vrgeat dolor. Repellit enim id, quod inſiuit, adſtringe- do, atq.

Proprie.

Cauſa.

Signa.

Cura.

Vena ſec-
tio.

Loca.

Cauſa.

A do, atque id quod continetur exsiccando vacuat, & partes adjacentes utroque nomine corroborat. Si vehemens dolor fuerit, cataplasmata ex plantagine, lente, solano, pane, & oleo rosaceo imponenda. Paulo veto ante, supra particulam male affectam, spongiam vino austero, aut aqua frigida madefactam apponere oportet. Melius vero fuerit, si aliquid aceti admisceatur. Quod si pus se in particula ostenderit, cataplasmata imponenda erunt, quæ suppurationem iuvant: ut sunt farina triticea, *semmi lini* & *fenogreci, butyrum, pinguedo porcina, radix alibea, & similia in superioribus libris sæpe admodum commemorata.* Suppuratione facta, quod ex doloris, febris, & caloris temissione coniectamus, secare, atque pus vacuare convenit. Eo vacuato, vulnus abluitur & abstergeri oportet melicrato vel oxycrato, vel vino & melle. Imponendum vero, si ad huc phlegmone aliqua affuerit, cataplasma ex lente, aut olenm rosaceum cum luteis ouorum, aut aliud quod phlegmonem arcere potest. Si vero sine phlegmone fuerit, aliquod ex his medicamentis quæ emplastica vocantur, & glutinantia, imponendum: ut est *amylum, cerussa, pompholyx, malicorium, et visum, & c. in suis locis.* De quibus copiose differit Galenus libro 3. ad Glauconem & 3. Ther. method. Nos hic capita tantum rerum attingemus, quod de his fere omnibus in præcedentibus libris a nobis copiosius sit dictum.

De herpete. C A P. II.

Q V M flaua bilis non naturalis sola, & nullo infecta humore cetera in aliquam particulam decumbit, vitium *herpes* vocatur. Quæ si substantia crassior acriorque fuerit, totam cutem ad subiectam usque carnem exulcerat, appellaturque *herpes exedens*. Si vero tenuis & minus acris calidamque fuerit, exiguas pustulas milio similes per summam cutem excitat, ob eamque similitudinem, *miliarius herpes* nuncupatur. Fit herpes, ut dictum est, ex flaua bile. Miliarem tamen, Gal. lib. 14. Ther. method. ex bili, quæ pituitæ aliquid admixtum habet, procreari tradit. Signa ex paulo ante dictis patent. Quod ad curandi rationem attinet, initio vtendum vitæ ratione frigida & humida, perinde ac in febre tertiana. Vino in totum æger abstinere, & pro eo bibat aquam, in qua *cinnamomum vulgare* exigua portione decoctum est. Corpore etiam medicamento aliquo, quod bilem ducit, vacuandum, de quibus spe in præcedentibus libris est dictum. In miliari autem vtendum medicamento, *Galenus locis citatis testis*, quod mixtum est facultatis: quod scilicet simul & pituitam educat. Corpore itaque prius purgato, mox ea, quæ influentem humorem reprimunt, repelluntque medicamenta particulæ laboranti imponenda. Sed hic diligenter considerandum est, quod non omnino similis cura particulæ laboranti in hoc vitio adhibeatur. Nam qui exedentes sunt herpes, refrigerari quidem desiderant similiter aliis herpetibus, non tamen ea ferunt medicamenta, quæ propter id quod refrigerant, etiam humectant: sed sola admittunt refrigerantia, quæ etiam maxime exsiccant: non igitur vel lactucæ, vel polygونی, neque ex illarum lentem, vel psyllium, vel portulacæ, vel serin, vel semipouum, vel tale aliquid quod refrigerare possit atque humectare, apponere oportet. Neque vnquam fidus spongiæ frigida aqua perfusa, neque solano: quamuis refrigerandi atque vna exsiccandi vim habet sed mediocriter illi vero maiorem quam solano adsit, expetunt siccitatem. Igitur initio cataplasmata ex eapæcolis vitis, foliis rubi, plantaginisque applicanda erunt. Postea vero lenis his miscetur, interim & mel & polenta. Plurimum quoque commentatur liquor, qui ex vitis caudice sua sponte, aut ignis vi expressus exudat. Ipsas autem partes exulceratas, hoc vel simili medicamento illinere convenit, quod habet: *Citrinorum, gallæ, vtriusque drachmæ tres, Myrrha, thuris, aloes, singulæ drachmæ duas & dimid. Aluminis sicci, drachmæ duas. Radici aristolochiæ reuinæ vulgaris, drachmæ duas & dimid. Calaminthæ, drachmæ vna & dimid.* Tota vino subaustero excipiantur, & fingantur pastilli, qui dissoluti cum aqua mellis illinantur. Valer etiam medicamentum, quod ex bolo armenio, & terra lemnia, stillaticio rosatum liquore, & aceto exceptis, componitur. Mixturæ vero confert hoc, quod fit ex lana veteri succida & illota, in olla cõbusta donec nigrescat & ardeat: quæ subinde in puluerem redacta, cum stillaticio rosarum liquore dissoluitur, ut quasi atramenti scriptor i. e. remam habeat. & pluma illinitur bis in die. Herpetes vero, qui exedentes non sunt, id expurgatio prius corpore, medicamentis quæ reprimunt, ut cõprehensum est, curantur. Vbiorem curandi rationem tradit Gal. lib. 14. Ther. method. & lib. 3. ad Glauconem. Satis itaque sit, locum nunc monstrasse.

Suppuratio.

Herpes.

Herpes.

Exedens herpes. Miliarius herpes. Cauda. Signa. Vitis caudæ purgatio.

Localia.

Cautela.

Pastilli.

Erysipelas
quid,
ignis facies.
Causa.
Signa

ERYSIPELAS Græcis, *Ignis facies* Latinis, *Galeno libr. 2. ad Glauco. teste*, geminum existit, non exquisitum, & exquisitum. Non exquisitum quidem, est tumor ex feruente, tenuiq; sanguine conflat. Vel est ex sanguine & flaua bile, calidioribus quam oporteat, mixta fluxio. Causa ex iis, quæ diximus abunde patet. Erysipelas phlegmone calidius est, magisq; colorem flauum pallidum ve refert. Et si tetigeris, facile sanguis subterfugit, rursusq; illabitur exquisitè tenuis, & aspectu rubidus, non tamen dolet veluti phlegmone; neque vtr aliqua phlegmones species pulsus, aut compressionē aut tensionem similem inuehit. Tumor etiam exiguus in cute potius consistens, quā alte descendens adest. Sed accidit vt interdum valde patum infestet, ac tum præsertim, quando per solam cutem diffusum fuerit, nihil inferiorem carnem molestant. **B**

Exquisitū
erysipelas.

Ex hoc quidem sæpius euenit, atque hoc est exquisitum erysipelas. Proinde quoddamtingit subiectam carnem, neque ex sola tenui bile consistit, neque simplex est erysipelas, verum iam affectus permixtus ex erysipellate atque phlegmone. Exuperant autem in ipso quandoque propria erysipellati symptomata, atque hoc vitium a iunioribus Medicis *Erysipelas phlegmonosum* nominatur. Nonnunquam vero phlegmones, & tunc ipsum nominant *phlegmonem erysipellatam*. Quod si neuriis symptomata manifeste exuperauerint, sed æquali apparuerint, tunc erysipelas & phlegmone mixta esse dicuntur, veluti clarius in *Insistit. nostris docuimus*. Curatio partim victus ratione, partim medicamentis perficitur. Victus ratio sit talis, qualem in febribus & similibus calidis vitis supra descripsimus. Quum vero vitium hoc geminum cutationis scopum, nempe vacuationem & refrigerationem habeat: inter initia vero si sanguis in eo, *Actio etiam* **C**

Erysipelas
inflammatio.
Inflammatio
erysipellata
Curatio.

Vena scilicet

attigisse, abundauerit, adeoque erysipelas non exquisitum fuerit, ac vehemens feruor affuerit, vena secanda erit. Si in facie fuerit eiusdem erysipelas, vena in gibbero humeraria dicta incidenda. Si autem inferiores collo partes erysipelas tale pariuntur, interior, quam iecorariam vocant, vena secanda: vt media, si neutra harum apparuerit. Si in cruribus fuerit vitium, itidem in gibbero vena interior, sed eiusdem lateris incidenda. At si quid sanguinis missionem impediatur, aut erysipelas exquisitum fuerit, hac potius, *Galeno etiam libr. 14. med. meth. cap. 3. suadente*, omittenda, purgatione potius vtrendum ex medicamento quod bili ducenda idoneum est: quale certe est *Rhaindicum*, *barbarum officinis* vocatur, quod ad domandam bilem efficax, *Aliuaria auctore* existit. **D**

Purgatio.

Elyster.

Idq; maxime faciendum, vbi bilis flaua redundat. Plurimum etiam profunt clysteres in hunc vel similem modum parati, qui accipiunt: *Malua. foliorum viola nigra, lactuca, intybi versisq; singulis manip. vnum & dimidium. Mercurialiū, manip. vnum. Semen cucurbitæ, melonum, portulacæ singulorum drach. duas. Florum nymphaeæ, manip. vnum. Hordei, vnciam vnam. Coquantur omnia in aqua sufficienti ad tertias, iuris solati libra vni admisce medulla castæ fistularis, vnc. vnam. Flera picra, vnc. dimidium. Olei violacei, vncias duas. Olei nymphaeæ, vnciam vnam. Salu. vulgaris, drachmam vnam & dimidium, & fiat clyster. Post totius corporis vacuationem reprimentibus auxiliis vtendum. Refrigerabimus itaq; particulam afflicta, liquoribus stillaticis. solani semper vni portulacæ, psyllii, hyssici, lactucæ, & intyborum, aut succis eorundem. *Valer. etiam lenticula palustris, & ceratum liquidum ex aqua frigida, cuius confectioem tradit Galenus libr. 2. De simpli. med. facult. cap. 8. Et copiosius libr. 10. Ther. meth. capite 9. Item polenta cum aliqua prædillarum herbarum partis afflicta imposita confert. Quæ autem illiuntur medicamenta refrigerantia, frequenter admodum immutanda sunt, vt quousque refrigerandum sit cognoscere liceat. Refrigerationis enim terminus, *Galeno libr. 14. Ther. method. teste*, ipsa coloris mutatio est. Etenim quod exquisitum & purum erysipelas est, statim cum hoc quiescit. Quod enim non purum est, sed iam quodammodo phlegmonodes, si plusculum refrigeres, lniadam cutem præfert. Sin **E****

Reprimentia

Refrigerantia
monita
refrigerantia.

ne sic quidem quis desistat, nigricat, potissimum in senili corpore: sic vt quædam ita refrigerantium, ne discutientibus quidem medicamentis ad perfectionem lenentur, sed scirrhosus quidam tumor in particula relinquatur. Ergo satis est, vbi laborantis particulæ alteratur colorem videris, a refrigerantibus ad contraria transire, priusquam vel lniada, vel nigra prius fiat. Vbi itaque feruor ægotantis particulæ iam desit, refrigerantibus admiscenda sunt discutientia medicamenta, idq; priusquam liueat. Quare cum confert stillaticius liquor solani, commixtus stillaticio li-

Discussio
mixta
refrigerantibus

quori

A quori chamæmeli. Imponendū etiā cataplasmata ex fatina hordei & feno græci, & id genus alia. Quod si is humor occupauerit, incisa cute cataplasma superponendū est, perfundendusque locus plurimum quidem ex aqua calida, sed & marina aqua & muria interim conducet. Quinetiam ipsi cataplasmati eiusmodi aqua, vel acetum, vel oxalme misceatur. Erysipelati autem phlegmonoso, & phlegmoni erysipelati, mixta quantū fieri potest curatio adhibenda, semperque illi quod exuperat magis resistendum, non tamen prætermittenda ea quæ a mixto præstatur indicatione. Sicuti autē subinde erysipelati admisceatur phlegmone, ita etiam aliquando ordema: ac vocatur, quod ex ambo-
bus tum est conflatum, erysipelas ordematofum: non secus, quam vbi ex refrigerando
durum ægreque resolubile redditur, vocabitur erysipelas scirrhosum. In quib: curatio i-
B p̄sa, veluti in omnib: compositis, mixta administratur.

Erysipelas
ordematofum
Erysipelas
scirrhosum

De carbunculo. C A P. IIII.

CARBUNCULUS, qui Græcis ἀνθράξ dicitur, fit, cum sanguis crassus & seruescens & im-
pense calidus in aliquam particulam decumbens, cutim excussit. Errantiaque recentio-
res, qui anthracem & carbunculum diuersa esse vitia putant, ut copiose libro 2. Paradox.
capite 1. demonstrauimus. Arabum placita sectantes, prunam & ignem persicum nominant
hoc vitium. Incipit hoc plerunque a pustula: aliquando vero, licet raro, & sine hac.
Ceterum inter initia, quibus hoc insit vitium, scabunt particulam omnino. Mox o-
ratur pustula quædam mainfcula, quæ rupta vlcus cum crusta gignitur. Saepe vero
non vna oritur scabētibus pustula, sed multæ exiles, veluti milii semina, ceteræ in par-
ticula residentes. Quibus petruptis, similiter crustosum vlcus prouenit, quale ferra-
menta candentia excitant. Crusta vero ipsa modo citatis colorem præfert, modo ni-
grorem. Omnibus præterea his circumposita caro in summam peruenit infammationem,
non tamen colore aspicitur erysipelatis, imo qui adhuc phlegmonem colore sit
nigrior, veluti si plusculum rubro minus misceas nigri, qualis eeste bituminis, aut picis
color est. Quod autem necessario febricitent, qui ita sunt affecti, idque non minus, im-
mo magis illi quibus erysipelatosa est phlegmone, id vitique latere neminem
potest. Curatio incipienda ab incisa vena, & adhibenda sanguinis vacuatio, si nihil
obstet, vsque ad animi defectum. Inciditur autem vena partem afflictam e directo re-
spiciens, atque pro eius situ nunc humeraria, nunc interior, interim etiam media, &
ea quæ in malleolis est secatur. Quinetiam scarificare eiusmodi tumores post sangui-
nis missionem, alienum non fit. Sint autem incisiones mediocribus altiores, pro-
fundioresque, propter infestantis humoris crassitudinem. Sunt qui ipsas incisiones fal-
sa aqua calente statim perfundunt, nec in illis sanguis eeat, concreuitque, sed foras e-
grediatur. Imponi vero sibi laborans particula, quod ad inflammationem feruorem-
ve spectat, refrigerantia desiderat. Ceterum propter humoris crassitudinem Localia.
militiā, nec fluxionem auertere poteris: & si quando id feceris, aliud quippiam quod in
alio sit corpore, offendes, atqui nec affluere is humor permittendus est, quin potius
inquirenda remedia sunt, quæ cum modice reprimendo etiam discutere possint. Ta-
le profecto est cataplasma quod ex plumbagine conficitur, tum quod ex biscocta lente,
scilicet miscentibus his nobis micā panis qui in clibano sit coctus. Esto autem panis
nec omnino a fursate purus, nec nimium eius habens. Siquidem qui omnino purus
est, eius subtilitas in cutis meatibus hæere est apta. Furfuraceus autem crassiorum est
partium. Super ipsum veto vlcus, valens aliquod medicamentum, quod vehementer
exsiccat, cuiusmodi est pastillus Andromis, vel Polyide, qui describitur a Galeno libro 5. De
compof. med. vbi & sin. vel si pastillus quem supra in capite De herpete produximus, adiecto
chalcanthi scrupulo. Liquari autem debent cum vino aliquo dulci, ad fordium strig-
menticiamve crassitudinem. Item radix dracunculi, vel aristolochiæ, vel silphii
liquor, singula ex aceto illinenda. Quæ autem reliquis adhiberi viceribus solent, nem-
pe quæ concoquant & pus moueant, ea nunc adhibenda non sunt, quando ita particu-
læ putredinem foueris. Porro partes adiacentes quæ consortii lege afficiuntur,
succeidilanus ex liquore stillatio rosarum, aceto, & bolo armenio irrigandæ. At vt
radicitus carbunculos euellas, dirimæque ab adiacentium commercio, malum puni-
cum acidum minutatim concisum in aceto coques: vbi intabuerit, in leuorem dete-

Carbuncu-
lus.
Anthrax.
Causa.

Signa.

Cursus.

Venerfectio

Scarificatio

Localia.

Catapla-
smata.

Purmo-
nentia non ad-
hibenda.
Adiacentes
partes mu-
nentia me-
dicamenta.

res, linteoque illitum impones. Cum vero siccescit, aceto humectabis. Cessante vero
 iam inflammatione & seruore, vlcus ac cicatricem similiter relinquis vlcerebus perdu-
 ces. Id quod fiet, si primum adhibitis iis quæ expurgant medicamentis, glutinaria im-
 posueris, quale est hoc vnguentum, quod habet: *Olei rosacei, vinctus duas. Cerussæ, plumbi*
visti, lili haryri, singulorum scrupulum unum. Rosarum purpurearum, scrupulos duos. Radici sym-
phyti maioris, balaustiarum, boli armenii, singulorum scrup. dimidium. Succis sempernari, scrupulum
unum. Cera candidæ quod satis est, fiat vnguentum. Inter simplicia vero medicamenta
 plurimum laudatur symphytum inter duos contritum lapides, quod diuino quodam
 miraculo carbunculum sanare dicunt. Miranda etiam referunt de herba vulgo *Scabiosa*
 vocata. Ceterum crustas adimunt, *butyrum recens, axungia porci*, & id genus alia
 pinguis.

De Gangrena. C. A. P. V.

Gangrena
quid.

GANGRENA Græcis non est, nisi partis, quæ ex magnitudine phlegmones sic
 mortificatio, nondum tamen integre facta, & iam confinata. In gangrena itaq; pars
 nondum mortua est, nec sensu priuata, sed emoritur, atq; ad extinctionem tendit. E-
 ius vitii tanta vis est, vt nisi ocysime succurras, facile pars laborans mortis habitum re-
 præsentet: hoc est, promptissime vitæ, sensus, & motus extinctionem contrahat. Vbi
 vero membrum ipsum languis perfectio, & in totum emortuū, sensus ac vita destit-
 tutum fuerit, tum hoc vitium non amplius gangrena, sed *gangra*, Græcis, Latinis *Side-*
ratio, recentioribus *Esthiomenon* vocatur. Differunt etiam alia ratione gangrena & *side-*
ratio, quod scilicet gangrena carnis tantum partibus & valis: sideratio vero ossibus

signific.

Causa.

Signa.

Cura.

etiam innascitur. Ceterū absolutā hanc laborantis partis corruptionē, sensus penitus
 auferentem, vulgus *ignem sancti Antonii* appellat. Fit autē gangrena & sideratio, quan-
 do vel parti vitalis denegatur facultas, vel quando in magnis phlegmonibus natus
 calor perit & exstinguitur, perinde atq; exigua flamma a maximo igne. Cognoscun-
 tur iis notis: *Color floridus, qui in phlegmonibus adfuerat, in ipsis exstinguitur.* Deinde dolor
 & pulsus recedunt, non finito adhuc affectu, verum sensu iam emortuo. Vnde mem-
 brum mox nigrum conspicitur: molle quoque & putridum, fetoremque expirans,
 cadauerosum efficitur. Quum constet sanguinis copia generari gangrenam, eius cu-
 randi præcipuus scopus erit, vt celerime, qui in laborante impactus est particula san-
 guis, & cuius occasione emoritur, scilicet attectis ob loci angustiam sese dilatate ne-
 queantibus, vacuetur & exsicceat. Fit autem largi illa sanguinis ita impacti ex laborā-
 te patte vacuatio, vel vena incisa, si quæ amplior, ac tutius circa eandē partem cōspi-
 citur: vel vniuersa cute, vna cum subiecta carne excisa: vel multis profundisq; vel fre-
 quentibus & altis scarificationibus incidenda. Alii ad eundem finem singulas ad-
 mouent, & venas minores proximas aperiunt. Verum profundæ illæ ac frequentes se-
 ctiones aut scarificationes, ad eius vitii curationem sunt multo efficaciores. Ceterum
 pro affectus magnitudine vel maximæ sectiones fiunt, vel incisuræ vitæq; frequentes:
 illa vbi putredini vitium vicinus est, hæc vbi tantū putrescere incipit. Quo enim vi-
 tium maius est, eo maiore remedio indiget. Proinde altis plagis multisq; cutem ac to-
 tam ei subiectam carnem, si vitium ad ossa perueniat, vulnerabimus: sin minus, solis
 scarificationibus ac simplicibus incisionibus vtetur. Vbi autem abunde sanguinem ex altis
 illis incisionibus emanare permiserimus, locus aqua salsa abluendus erit, vt sanguis crassior,
 & qui alioqui ibidem concreveret, foras egrediatur. Deinde medicamentum
 aliquod quod ad putriā facit vlcera, hoc est, quod putrefactionem prohibeat ac dissol-
 uat, imponendum. Cuiusmodi est *farina eruiua, aut liliacea*: vel si harum facultas non
 sit, *subacca ex oxymeli*: atque ipsam *oxymeli* per se. Quippe hæc sua siccitate pus &
 putrilagine absumunt ac detergent: singiditate vero, quod nondum vitiatum est
 roborant, & a putredine arcent. Vbi vero iam ipse veluti seruo subleuerit, ac vitii
 funa sese remisit, *vnguentum* id quod vulgo *Ægyptiacum* dicitur, ex flore æris,
 alumine, melle, & aceto, ad æquas portiones mixtis & coctis compositum, superim-
 ponendum erit. Hoc enim putrefactionem prohibet ac discutit, putrefactura
 quæ ac corruptum ab integro & sano adhuc dirimit, & decidere cogit. Denique
 crustam inducens, quod sanum est conseruat, ac tuetur. Quod si valentius atque ef-
 ficacius vltimate medicamentum velis, adiiciendus prædictis sal est: aut si vitium ma-

Putrefactio
nem proba-
beant.Vnguentū
Ægyptiacū

Agis adhuc increuerit, aliquem ex pastillis Andronis, Polyidæ, aut Pasiænis exquisi-
te ac curiose tritum admiscere oportet. Probatur in ea re ante omni *arsenicum* quod
vocat *sublimatum purum* aut *correctum*, idque vel in puluere, vel ex vino dissolutum, aut
linamento, aut xylō exceptum, inter sanum & corruptum applicatum. Hoc enim
confestim vitium sistit, & id quidem si de dolore. Quod si necessitas exigat, spe-
cillo sepatandum est sanum a corrupto. In eiusmodi autem medicamentis adhiben-
dis, ut res securius tractetur, naturam corporis ægroti attente considerare oportet.
Nam, ut *Galenus* etiam libro 2. ad *Glaucōnem* attestatur, rustici corpus quod natura durum
est, vehementissima efflagitat remedia: muliebre vero molle, imbecilliora. Intantis
quoque vel pueri, & virile corpus, quod quidem album sit & molle, ac balneis assue-
tum, & in exercitatum, mollia exposcit medicamina. Consideranda insuper est par-
tium quæ male affectæ sunt, nedum totius corporis, natura, quando id, quod iam com-
putruit, abscindis, aut circuncidis. Quædam enim sunt partes, quæ citissime putre-
scunt, si negligenter curentur: aliz vero tardiuscule. Quædam item medicaminum
vires ac beneficia tardius sentiunt, aliz citius. Porro si nihil magis vitium his canstis-
cis medicamentis constiterit, ut id quod est inter integrum ac vitiatum locum, debet.
Solent vero hæc auxilia omnia nihil interdum proficere: atque tunc vnicum, tã-
ersi, ut Celsus inquit, miserum auxilium est, membrum quod paulatim emoritur, ab-
scindere, ut cætera pars corporis tuta sit. Nam quod computruit, veneni in modum suo
contactu quod adhuc sanum & integrum est, inficit ac corrumpit. Si quando autem
putrefactam huiusmodi atque emortuam partem abscideris, vel quod in membro quopiam
computruit usque ad sanum corpus conclideris, eam quæ veluti radix est, sanæ & inte-
græ parti adiungas, ob maiorem securitatem candenti ferro adurere convenit. Ita
enim celeriter sanguis profluuium compescet, & putredinem arcebit. Facta vero
adustione porri succo, vel sale cum potro utendum est, vel aliquo ex his pastillis, quos
paulo ante diximus. Hæc enim siccant, & stringunt putredinem, atque humorum afflu-
xum prohibent. Vbi vero his remediis adhibitis, tibi cessare putredo videbitur, ut cru-
stæ medicamentis adurentibus, vel ignito ferro inducæ citius decendant, cataplasmate
utendum est ex pane vel hordeacea farina, vel triticea, ex hydreleo incocta. Item
medicamento, quod cephalicum vocant, ex melle illito. Hæc enim detergendo, cru-
stam a subiecta carne resoluunt. Quinetiam medicamentum quod *tetrapharmacum* di-
citur, præterea & *Macedonicum*, pus mouendo & emolliendo, crustas a subiectis parti-
bus diducunt: quæ admodum etiam omnia quæ ad suppurationem perducunt. Pa-
nis quoque cum apio, aut ocimo intritus etustas a sanis partibus citra erosionem deter-
gendo, rumpit ac separam. Sic & iris, vel radix panacis, aut aristolochiæ, aut acori cum
melle. In mollibus autem corporibus abunde facit erui farina, cum melle aut thure.
Solent etiam vulgus ad resoluendas crustas uti butyro, aut alio quouis pingui. Vbi cru-
sta deciderit locum aceto abluunt, postea sequens emplastrum admovent, quod re-
cipit: *mellis silebram, vitellus ouerum crudus tres, aut quatuor numero, farina bordei silebram*.
Hæc miscentur in formam emplastri. Post biduum vero vel triduum, ut melior fiat
purificatio, huic emplastro adici possunt drachmæ decem myrrhæ & leucæ. His rite
peractis, huiusmodi vitæta ad sanitatem perducenda sunt medicamentis, quæ carnem
producant, & cicatricem inducant.

De impetigine. C A P. VI.

IMPE TIGO, Græcis *ἰμπετιγή* dicitur, vitium cutis est, quod celeriter in faciem & lepram, quam
Græci sic nominant transit. Sunt qui cutis asperitatem interpretentur. Fit ex tenui ac-
que sanie, crassioribus aliis commixta. Vitium est insuauissimum, & pruritus inferens,
& circumtensionem, & periculum non minus. Proserpit enim aliquando per totam
faciem, & oculos ipsos contingit. In curandi ratione, diligenter ea quæ mitior est, a fe-
ra impetigine, quæ mentagra etiam dicitur, & recens ab ea quæ longiore tempore du-
ravit, discernenda. Si quidem quæ recens ac mitis est, curatio facilius est, quam ea quæ
diuturna & fera existit. Principio autem curationis, si plenitudine laboret corpus,
sanguinis missio adhibenda. Sin minus purgatio quæ tenues & crassas humores purget,
exhibenda. Supra modum vero confert hæc potio, quæ habet: *Florum violarum, buglosæ, melissæ, hyssopi singuli manipuli, unum. Glycyrrhizæ rasa, unciam unam. Prunorum damascenorum*
semis.

Crustas a partibus excludit solentia

Emplastrum

Impetigo. Angeli. Crustæ. Signa. Curatio. Mentagra.

Purgatio. Potio purgans.

- numera duodecim. Oxyporicum, vnciam vnam. Seminum melonum, cucurbitae, cucumerum, citruli, decurtatorum singulorum drachmas duas. Fumaria, manipulum vnum & dimidium. Radicis polyodi, foliorum fenae, vtriusque drach. sex. Corticum myrobalanorum flauorum, ceruleorum, vtriusque vnciam dimidiam. Agarici optimi drachmas duas. Rhubarberi scitici vocati selecti drach. vnam & dimidiam. Spicae nardi, grana sex. Zingiberis, drachmam dimidiam. Deoquantur in aqua iussa quantitate, donec dimidium absumatur, & ea quae decocta sunt per integram noctem simul perferant, postea colo transfundantur, adiectaque sacchari conuenienti quantitateius decocti dulces reddantur, & subinde in co diluantur antidoti hamech & diaphanice vtriusque drachmas tres. Fiatque potio, de qua quotidie in auroa exhibeantur vnciae quatuor. Corpore vacuato, ad localia progrediendum erit, quapropter si regentes fuerint impetigines, pariet. rize folia cum aceto trita illinenda: aut ammoniacum cum parietariae succo: in aceto tritum, illinendum. Idem facit brassicae succus, aut quod ex eius caulibus dum aduritur destillat, illitum. Confert etiam plurimum cortex radicis oxypathii commanducatus, & illitus. Puerorum impetigines, hominis salua continue destricta curantur. His etiam opiculatur gummi pruni illitum. Et linimentum hoc, quod accipit: *Refina terebinthina in stillaticio liquore rosarum lota, vnciam vnam. Olei rosae, vnciam dimidiam. Quorum lutea duo, succi duorum malorum arantiorum dulcium. Cemmixtis omnibus fiat linimentum.* Vbi vero iam diu durauerint, impetigines, tum valide siccantia, & abstergentia, Galena lib. s. *De compositione medicamentorum* in teste, requirunt. Quare illis vitio: s folia cum aceto trita & illita profunt, aut asphodeli radix in aceto decocta & trita, si afficitur. Probatum etiam ad impetigines hoc vnguentum, quod habet: *Refina terebinthina in stillaticio rosarum liquore lota, vnciam vnam. Olei rosae, vnciam dimidiam. Euxyrenensis axungiae porreae, vtriusque drachmas tres. Sulphuris vici, drachmas duas & dimidiam. Nitri, drachmam vnam & dimidiam. Aluminis falsitici, zucharinum vocant, drachmam vnam. Salis fossilis, drach. vnam. Seminii staphydiae agriae, libbagryi, vtriusque scrupulos duos. Vtellei oui duas. Cetera quod satis est, singatur vnguentum.* Actius lib. 8. cap. 10. inter multa alia hoc vniuersum commendat, quod habet: *Pici succa, refina colophonitae, radicis ellebori albi tritae, olei rosae, cere singulas partes aequales, fiat vnguentum, vel ut Actium vocat, emplastrum liquidum.* Vt tum vbi vitium iam ita bile factum fuerit, & medicamentorum molimini resistit, vtendum erit excoriatoriis, quale est quod accipit: *Lithargyri, nitri, eris vsti, foliorum viticis sing. drach. vnam. Chalcantis scrupul. vnum. Sulphuris vici, ellebori albi, vtriusque, drach. dimid.* *De ruginis, scrup. duos.* Vnumquodque per se coactum, deinde simul confusa oleo rosaceo & coacta excepta, ac in vnguenti formam redige. Post excoriatoria, medicamenta, quae vlcera repurgant, ad mouenda. Vlcetibus autem repurgatis, vtendum iis quae glutinant medicamenta, quorum aliqua supra commemorauimus.

De scabie. CAP. VII.

- SCABIES**, quae Graecis *σχίζα* dicitur, summa cutis asperitudo est, pruritus, in qua corpus *spanulim* absumitur. Originem exatta bile ducit, aut pituita salia, crassa ac lenta, vt testatur Galenus libro 2. *De sympt. causis, capite 10.* Scabies summam corporis cutem exedat variisque figuris habet, ac furfurcula magis ex se eorpuscula edit. Prineipio veto opus est, vi conuenienti viustatione vtantur egrotantes, quapropter a cibis atram bilem generantibus, aut salsum picuitam, abstineant: quae quales sunt, in capite De cancro dicemus. Vtuntur veto potius iis quae facile concoquuntur, & bonum procreant sanguinem: Vinum bibant tenue & antiquum, aquosum tamen. Curandi ratio, si corpus plenum fuerit, a venae sectione auspicabitur. Incidenda autem erit vena media, & totum sanguinis eiacundum, quantum egrotanti ex te esse videbitur, aut quantum vires teneant. Sin minus, purgatio ex iis quae atram bilem ducunt, est exhibenda. Præter decoctum autem in capite precedenti positum, & ea, quae in capite De melancholia commemorauimus, mirifice profunt cataplosia de fumaria, & haec quae accipiunt: *Albes iocortae, drachmas duas. Corticum myrobalanorum flauorum, drach. duas & dimidiam. Folliculorum fenae, agarici optimi, epithymi sing. scrup. vnum. Fumariae scrupul. duos. Dactylidis scrupul. dimidiam. Tragacanthae, rosarum purpurearum, vtriusque, drach. dimidiam.* Cum stillaticio liquore fumarum nant cataplosi id, quibus detur pondus drachma vnius, plus aut minus, pro aetate ac vitium ratione. In fallit pituita abundantia catharticum impetiale, & antidotum hamech samopore valebunt. Corpore vniuerso vacuato, vlus esse poterit balnei *aeris*.

A aciei, aut aque dulcis, in qua tamen radix oxylapathi, fumeria, scabiosa, bet a oxalis, & id genus alia, qua in capite De pruritu commemorabimus, decocta sint. Reponi quoque in sacculis debent farina lentium fabarum, hordei, & fursures, & cum iis abstergi totum corpus. A balneo arget in lecto stragulis opertus sudet. Extrinsecus ad solem, vel in balneo, quæ illinuntur fere eadem sunt, quæ supra De impetigine diximus. Inter simplicia vero potissimum ad eum usum adhibentur *staphis agria*, *lupini sulphur vivum*, *cicer sili radix*, & *lata ouorum*. Inter composita hoc vnicè conducit, quod habet: *Resina terebintina in stillaticio liquore rosarum lata*, *unciæ duas*. *Oleum rosæ*, *costini*, utriusque *unciæ dimidiæ*. *Sulphuris viui drachmas tres*. *Seminis staphidis agria drachmam unam*. *Salis fissilis*, *drachmam unam & dimidiæ*. *Lutea ouorum tria*, *butyri recentis*, *unciæ unam*. Commixtis omnibus fiat linimentum. **B** Smegmata quoque ex solis lapathi, oxylapathi præsertim, mirifice conferunt ad scabiei amolitionem.

De pruritu. C A P. VIII.

PRVITUS, est scalpendi assidua cupiditas. Hic vero senibus maxime accidit. Contrahitur ex pravo humore, qui nimirum biliosus, atque adeo acris, aut pituitosus, putris falsusve est. Vitium de ægri sermonibus promptè dignoscitur. Humorū vero pruritus efficientium diuersitas, ex ætate, temperamento, victus ratione, anni tempore, regione, & reliquis iis similibus agnoscitur. Si plenitudine corpus simul laboret, a sanguinis missione curatio ipsa auspicabitur. Sin cacochymia tantum affuerit, medicamenta exhibenda quæ redundantem vitiosum succum educunt. Corpore ipsō vacuato, ad externam curationem diuertemur. Lauandum itaque prorsus ieiuno est, non nunquam & modico cibo sumto iterum lauandum: quippe vitium hoc vix inhumescit. Detergitur autē fœnogreci, aut betarum, aut futurum, aut malux, aut altheæ, aut hordei decocto. Præter hæc valent farinæ etiā fabacæ, vel lupinorū. Si inueterauerit vitium, lauatio similiter quidem conuenit. Fomentum autē ex *salvia*, *myrica*, *herba mercurialis*, *origani pulegi*, *baccarum lanri*, *cucumeris siluestris radici decocto*, & *oxalima* fiat. Potest & linimentoꝝ supra commemoratorum vsus esse. Ad pruritus etiā mirifice confert, si nūcū iugladium corticis vnc. vna, sulphuris viui tãtundem, cum apii succo tetantur: & cum iis in balneo corpus assatim defricetur. Hoc enim solum, Paulo reſte, multis tum biliosis, tum pruritu detentis, abunde fuit. Apium etiā per se **D** viride tusum, infricatumq; in balneo, vehementer auxiliatur. Smegmata quoq; ex lapathi radicib. in aceto coctis, confici possunt.

De exanthematib. C A P. IX.

Exanthemata Græcis sunt tumores sponte in cute florentes. Sic dicti, quod turgentium ad florem gemmarum in plantis modo tumeant. Hippocratestertio *Epid. libr. vii. c. 10.* ubi dicitur, hoc est, ab erumpendo, quod scilicet sponte e cute erumpant, in eaque floreat, vocauit. Plinius *papulas*, & interdum etiā *pituitæ eruptiones* nominat. Interpretes alii quot Latini *pustulas* appellant. Sunt autem duplicia exanthemata, quædam enim sublimia, quædam vero lata. Sublimia, ab iis, qui barbaram sectantur medicinam, *Variales* nuncupantur: Germanis autem, *Kindoblattem*. Lata & humilia, Barbaris *Asterbilis*, Germanis, *die Kindesflecken* appellatur. Procreantur autem ex crassis & cuti impaetis humoribus. Sublimia tamen a calidiore & tenuiore humore fiunt, lata vero, a frigidiore & crassiore. Totum autem hoc genus exanthematum nascitur, natura corporis profundum expurgante. Quare paucissimi admodum sunt, modo ad legitimam ætatē perueniant, qui hoc malum effugiant. Non ignoro autem vulgo appellari morbillos, quæ Galeno & aliis Græcis *exanthemata sublimia*: & Variolas quæ illi *lata exanthemata* nominant; quanquam parum recte, quemadmodum scit. *2. secti Epidemicon aphor. 2. capioſe demonstramus*. Ad quem quidem locum, ne eandem rem cum maximo aliorum fastidio, sæpius repetamus, nunc lectorem ablegamus. Exanthematum eruptionē grauiora quædam symptomata sequuntur, vehemens nimirum dorsi capitique dolor, diffi- **F** cultas spiritus, pruritus narium & aurium, febris, punctiones vniuersi corporis, pādiculationes, & oscitationes crebre. Vbi iam egrediuntur, initio facies maculas quasdā ostendit, quæ vel in sublime tolluntur, vel in latum extenduntur. Sublimia itaq; exanthemata, cutem in tumorem manifestum attollunt, atq; exulcerant, pruritumq; excitant. Lata exigua admodum tumorem efficiunt, neq; tamen exulcerant, neq; etiā

6. Aph. 5.

Latorū ex-
themata e-
ruptione
mali mo-
riuntur.Curatio in-
fantium.

x. Aph. 10.

Decoctum.

Curatio ad-
ulcorum.Hippocr-
tes.

pruritus exeat, quod scilicet in latitudinem extenta diffidentur, humorque ea faci-
ens acris non sit. Quod etiam Hippocrates in Aphorismis testatur, dicens: *Lata exanthema-
ta non admodum pruriunt*. Postquam vero iam eruperint, rauco de vocis, dolorque in
faucibus ac gingivis accidit. Porro difficilis exanthematum fit eruptio & progressus
iis, quorum cutis crassa & densa existit. Difficilior autem semper laterum est exitus,
ut pote quæ ex crassioribus, ut dictum est, ac tenacioribus humoribus oriuntur, atque adeo
hoc nomine non facile cutem penetrare possunt. Quare si accedit eitis etiam densitas
plerumque, latus detentis exanthematis, moriuntur. Contra pauci admodum, modo in
victus accurandi rationibus error absit, in sublimi exanthematum eruptione pereunt
quum ex tenuioribus humoribus, ac prompte erumpentibus generentur. Exanthemata
etiam magna ex parte infantibus, eveniunt & iuuenibus rarissime senibus. Meliora ex iis
sunt rubri coloris: deteriora, imo pessima, quæ atrum, aut viridem præ se ferunt colo-
rem. In curandi ratione diligenter ad ætatem est respiciendum. Si enim infantibus, erum-
pere per cutem ceperint exanthemata, cauendum vnicuique ne naturæ motus impedia-
tur. Quare initio acrem deuitare frigidum oportet, senim cutem densat, atque adeo
exanthematum eruptionem prohibet. Versentur autem potius in eo, qui mediocriter
calidus est. Corpus etiam vestibus aut stragulis ab iniuria aeris frigidi probe muniatur.
Cauendum tamen ne, quod vulgus facere solet, supra modum calidis hypocaustis, aut
nimis tegumentis ac stragulis lyncope accersatur, atque adeo æger suffocetur. Infan-
tes ipsi neque pleniori, neque nimis tenui cibo alantur. Et si venter illorum non respondeat,
tunc melle quod cibo additur aut resina terebinthina cicicis magnitudine moue-
dus. Vehementiora enim medicamenta, ne adultis quidem danda, tantum abest ut pueris
conuenire queant: prompte enim dysenteriam concitant, potissimum in subli-
mioribus exanthematis, quorum generatio ex acris est humoribus. Quod si natura
probe excreuerit exanthemata, nullum sane facessere negotium oportet, iuxta hoc
Hippocratis: *Qua indicantur, & indicata sunt integre, neque mouere, neque nouare aliquid, siue
medicamentis, siue aliter irritando, sed sinere oportet*. Sunt tamen, qui infantes in uoluant pan-
nis rubris aut puniceis, ut ad crebrum illius aspectum & intuitum ad exteriora, atque
adeo summam cutem ferantur humores. Qui ubi euocati fuerint, facile discutuntur.

Quod si tamen natura in expellendis humoribus tardior aut imbecillior esse apparet,
hoc, aut simile decoctum, quod obstructions tollit, exhibendum erit, quod habet:
*Radici apii, feniculi, petroselinii, sing. vnciam dimidiam. Seminum anisi, asperagi, rusii singulor.
drachmas duas. Caricarum numero sex. Celamintha, manipulum vnum*. Coquantur in aqua
sufficiens, donec medietas absorbatur. Iuri per collum transfusi, & sacchari adiectione
dulcia admisceantur. *Serapii acidi simplicis, vnc. tres, & fiat potio*, de qua detur quotidie mane
& vespere pondus vnciæ tres, plus aut minus pro ætatis ratione. Si adulti corripuntur
exanthematis, initio curationis, si corpus plenum fuerit, sanguis mittendus, id quo
faciendum antequam appareant exanthemata. Si vero humorum copia in alto consti-
terit, purgatio primum tentanda est. Nam si hac neglecta prius discutere aggrediaris,
obstrues ipsos potius, quam per cutem vacuabis. Sin autem nulla in alto deliteant humorum
superuacua, per cutem vacuare oportet, & non procul attrahere, per alium, aut vomitum
vacuationem molitus: sed humorum qui cuti impacti sunt, curationem medicame-
tis quæ exalfaciunt & discutunt, experiaris: idque maxime, quod lata sunt exanthema-
ta. A frigido enim admodum & crasso humore hæc ipsa orta sunt. Quæ quidem cura-
di rationem Hippocrates etiam ipse libro sexto Epid. par. 2. *Aphorismi decemisti* probat,
ubi ita scriptum reliquit: *Lata pustula, quales hyeme Simon habuit, non admodum pruriunt. Hic sane quum ad ignem inungeretur, vel calida lauaretur, inuabatur. Pustiones non
expediebant. Puto viique eum qui calidum abunde fouisset, huic prodesse potuisse*. Quibus sane ver-
bis manifeste innuit Hippocrates, humores crassos ad eum repentes non esse per
medicamenta ad profundum corporis trahendos, sed per cutem potius, calidis tum
fomentis, tum medicamentis vacuandos. Quæ autem sint eiusmodi, in superioribus li-
bris sæpe est dictum. Porro si post eruptionem exanthematum oculi male afficiantur,
liquor stillaticius rosarium, in quo parum succi semperuiui, aut portulacæ, aut liliæ sit
dissolutum, instillandus erit. Faucium vero & oris noxæ medendum compositione
diamoron, & id genus aliis medicamentis, suo loco expositis. Reliqua curandi ra-
tio.

Atiò, quæ post plenam exanthematum apparitionem requiritur, in desiccando sita est. Quare humectatio omnis externa abest.

De ambustis. C A P. X.

CORPORIBUS quæ ab igne, aut feruente aqua exuruntur, tria accidunt symptomata, dolor, bullæ seu pustulæ, & exulceratio. Igitur ambusta igni, *medicamenta* vocant Græci, indigent medicamentis quæ moderate abstergunt, abique eo quod euidenter calefaciant, aut refrigerent. Protinus ergo inlubendas pustulas terra quæuis leuis, cimolia præsertim, in teneris quidem corporibus cum aqua, in durioribus autem eum aceto non admodum acris, aut posca madefacta, illinenda. Sunt qui præferant eam terram quæ sub valis aquariis reperitur, si cum albo oui excipiat. Cimolia stil-

Coratio
ambustorum
igni
medicamenta

Blaticio etiam rosarum liquore excepta, mirifice confert. item ouum integrum erudum statim impositum, lana molli exceptum præelare facit, pustulasque excitari prohibet. Etenim refrigerat leuiter & citra rorsionem desiccatur. Idem efficit atramentum scriptorium illitum, aut thus aqua dilutum, vellens cocta tritaque, velerum illitum. Beræ etiam folia cruda contusa, postea elixata, & eum vino illita conducunt. Item hederæ folia in vino decocta, & illita. Alumen item omne cum aqua & oui albo, Santalæ etiam trita, & cum stillaticio rosarum liquore excepta, adiecto succo semperui, prodesse plurimum possunt. Idem valet bolus armenius illitus. Locum autem, qui rorsionem patitur, manu contingendus non est: quare medicamenta ipsa penna illinenda sunt. At ex aqua feruente rorsionibus priusquam pustulæ oriuntur amian-

Curtio
rorsionem
est
aqua
feruente.

Cum scissile, (alumen planissimum vocant officinæ) titum cum aceto illinitur, aut fel taurinum cum aqua copiosius liquatum inungitur aut bulbiliorum, aut hyacinthorum cum rosæco triti, & in fordium spissitudinem coacti delinuntur. Porro pustulæ si fuerint excitatæ, principio ne frangito. Si vero persistant, frangito eum acu, ut aqueus humor effluat, alias enim partes subiacentes corrumpit, & exedit. Partibus exulceratis adiantrum aridum, leuigatumque, aut myrti folia eombusta, pertritaque insperguntur. Laudatum est remedium, *vnguentum candidum* vocatum eum succo semperui, & id quod in capite *De carbunculo* descriptum.

Pustulæ
curatio.

Exulceratio
tonis.
Laudatum
quid.

De formica, verruca & clauo. C A P. XI.

FORMICA, quam Græci *μυρμηκία* vocant, tumens & callosa, magnaque ex parte rotunda est excrecentia, colore nigricans, laetore basi, & in cute fissili, qua in scalendo & attritu mordenti formica sensum efficit, unde etiam nomen accepit. Græci enim *μυρμηκία* formicam vocant.

Formica
μυρμηκία

Verruca vero, quæ Græci *ἀκροχόρδον* dicitur, indidem exigua est cutis excrecentia angustiore tamen basi, ac perisilis, ut chordæ nexu suspensa esse videatur. Hæc autem dum abscinditur, longe maiorem sanguinis quantitatem, quam suæ paruitati congruat, reddit. Clauus rotundum est tuberculum, clauorum capiti simile, quod plerumque in calcaneis & pedum plantis nascitur, in gradiendo afferens dolorem & impedimentum. Græcis *κλῆμα* nominatur. Generantur ex humoribus frigidis & crassis, pituitosis atque melancholicis. Signis non est opus ad dignoscendum, sed prompte ex iis, quæ diximus, discernuntur. In curandis iis remediis, cavendum initio erit, ne

Verruca
ἀκροχόρδον

Clauus

Causa
Signa.

Curatio.

Egrotanti ab omnibus iis, quæ frigidæ & crassos humores procreare possunt. Dein corpus purgandum medicamento, quod pituitam, aut melancholicum educit humorem, aut utroque. Corpore purgato, ad localia veniendum erit, inter quæ sane medicamenta maxime laudatur liquor tithymali, aut fici arboris illitus. Elaterium quoque cum oleo infricatum, eos tumores tollit. Thus item cum aceto, hircinum fel, nitrum cum urina pueri Venerem non experti stercore ouillum, aut hircinum, cum aceto illitum. Vales etiam arugo cum sulphure ignem non experto combusta, & ocimi folia cum chalcantio, item ruta cum nitro & pipere. Verum antequam prædicta medicamenta apponuntur, euelli debent verruæ, maximè potissimum, id quod bifariam fit. Vel enim pilo equino iuxta basim excipiuntur, qui quotidie magis atque magis constingitur, donec e corpore decidan: Vel circum-

Localia.

Exulsiō
vel
tactum.

Fscarificatæ, scalpro radicitus eximuntur. Nonnulli ne rursus succrescant, candenti ferro vtuntur. Galenus libro 14. The meth. capite 17. Romæ fuisse quendam tradit, qui verrucas & formicas ore sanauit. Formicas enim certa primum labotum applicatione, cum succu ad se traxit, atque a radice euellit: deinde primorib. apprehensam dentibus, totam simul excutit. Sed, ut idem scribit, scalpro ad myrtacci folii speciem forma-

A primo potissimum, cap. De dolore capitis ex pituita, dicta sunt. Deinceps quæ eisdem putga- Locali
re valent medicamenta exhibenda. Corpore purgato, ad localia veniendum medi-
camenta: quare leuca, hoc vel simili medicamento affricandæ. Fici folia vitridia ma-
cerato in aceto: sit autem aceti tantum, ut ea superet, & penitus contegat: deinde con-
tusa & trita cum sufficiente calce viua misceto, & locis prius extensis, in sole illinito,
visquæquo lenugini similem imaginem ipsa leuce induat, atque deinde qui succum
recentem supra istam illitionem inducit, ipsamque leucem solam aliquandiu con-
fricato, & ne vicinas partes exulceres obstruato. Egregie enim auxiliatur. Laudatur
& hoc quod in eum paratur modum: *Inglandium nucum immaturarum & adline acerba-
rum exteriorem corticem viridem detrahito, & fici nigra sylvæstris ramulos amputato, adhuc li.*

B thargyrum conficito, ac cum aceto coquito terito, & ad vnguenti formam reducto, idque ipsum in
sole illinito. In decoquendo etiam hordei grana septem addito. Hinc enim sufficiens
decoctionis signum habebis, ubi videlicet hordei grana cocta videbis. Fortiora iam
dictis sunt, sulphur viuum, veratrum, sandarach, calcanthum, alumen rotundum &
scissum, ventres cantharidum, sal ammoniacum, nitrum & id genus alia, e quibus vn-
guenta confici possunt, quale est hoc quod habet: *Sulphuris viui, nitri, utriusque drach.* Vnguenti.
*duas. Aluminis scissi, rotundi, elebori albi, drach. unam. Salis ammoniaci, drach. dimidiam. Fari-
mæ lupinorum, drach. duas & dimidiam.* Redacta in puluerem cum vnguento flavo, citrinum
vocant, quod satis est excipiantur. Porro cutis prius quàm medicamenta adhibeantur,
nitro defricanda erit. Sunt etiam, qui prius acu transfixa purgant, quoad cruor ema-
net, antequàm medicamenta illinant. In alphis curandis victus ratio sit, quæ neque pitui-
tæ, neque atram bilem in corpore acetuet. In albo igitur, principio quæ pituitam edu-
cunt medicamenta: in nigro, quæ melancholicum humorem vacuât, exhibenda sunt.
Corpore vacuato, utriusque coniuncte prodæst auxilium, elota calx aqua soluta, aut dr.
cunculi, aut ari radix, cum aceto illita. Simili modo utrumque vetatrum eisdem efficax
est. Item lupinorum anarorum decoctum superfusum, eorumque farina ex aceto vel
oxymelite illita. Cappatis quoque radicis cortex cum aceto, lilieque radix cum mel-
le, cepa ex aceto in sole, petuncta. Alia quoque medicamenta, quæ paulo supra com-
memorauimus adnota, plurimum adiumenti afferre solent.

De ademat. Cap. XLII.

Dicitur Galeno, & aliis post eum Medicis Græcis, est tumor mollis, laxus, & dolo-
ris expers. Barbaris, corrupta & inepta voce, *Indimidia* dicitur. Nonnullis ineptius
multo, *cimæ*. Fit ex substantia pituitosa, aut spiritu vaporoso. Signa iam fere dicta sunt.
tumor enim adest mollis, qui si summis prematur digitis, cedit, fossulamque reddit,
ne amotis digitis resilit, sed prementis vestigium retinet, colore albus, qualis in pe-
dibus ac cruribus eorum quos aqua intetius vexat, & in tabidis, & aliis qui malo
corporis habitu (*oxym.* Græci vocant) laborant, prouenire solet. Verum in illis peri-
culosis affectibus, oedema quidem symptoma est, nulla propterea præcipuaque cura-
tione indigens. Sola enim initio ex oxyrhodino, cur nonnunquam ex sale & oleo,
vel etiam ex sale injecto oxyrhodino ipsum sistit. Quam veto propter pituitam Curatili
particulæ influxam oedema constitit, duplex eius curandi scopus erit. Alter, ut hu-
mores partem occupantes vacuentur: alter vero, ut fluxio restringatur, reprimatur.
Quare initio corpus purgetur medicamento, quod pituitam ducit. Eo va-
cuato, quæ reprimunt, & siccandi simul ac discutendi facultatem obtinent medi-
camenta, adhibenda sunt: ut est spongia, aqua quæ parum aceti habuerit imbuta,
cum ligamento leuiter stringente imposita, quæ ab inferiori parte incipiens supra
finiat, vitium abigit. Esto autem spongia, modo conductura sit, recens: hæc enim
plus exsiccatur, atque discutit, Gal. lib. 11. De simplicia facul. teste. seruat enim etiam nummum
eam quam a mati accepit facultatem. Aceti etiam in posca sit tam moderata tempe-
rarura, ut possit ipsam quispian bibere. Quæ autem ex ea plus aquæ continet, in prin-
cipio adhibenda est, maxime in mollibus corporibus. Quæ vero hac fortior fuerit, in
robustis & duram habentibus cutem, & quæ ad primam spongiæ appositionem ne n-
iua oritur. Quod si spongiæ nouæ occasio non est, hanc detergebis abluesque nitro, &
aphronitro, & lixiuio. Quod si sub his oedema non substat, ubi rursus deligabis, pusil-
lum aliquid aluminis adicies, ac nouam spongiâ ad mouebis, atque tum (ut præscriptum

Oedema
quid.
Causa.
Signa:

Curatili

Spongia rei
coca.

eſt) deligetur ab inferiore ſuſum. Sit autem arctatio mediocris, ac primæ quidem A ſarciæ in ectione, quæ ſcilicet inferne incipiunt, magis arctandæ: quæ deinceps, ſunt remittendæ: ceterum non adeo, vt laxa ſit aliqua deligationis pars. Curationis quidē intento in œdemate, vt diximus, mixta eſt: vnus quidem, vt eius ſubſtantia diſſoluatur: alia, ad conſtringendum & congregandum. Quod ſi diuturnum œdema fuerit, œdema prius oleo inungens, deinde ſpōgiam ex lixiuo impones, atque ſtringes vt hemementis. Diſcutit etiam ac comprimit œdemata quolibet terra illita, tum ſtatim ſatiua. In diſcutiendis etiam œdematis mirifice conducit emplaſtrum diachylen, & oxycroceum nominatum. Sic etiam emplaſtrum ex radice alibea, liliorum alborum, malua, acantho, oxylaptho ſeneſione, ſemine lini, & iis ſimilibus compoſitum, miram in diſcutiendis œdematis vim obtinet. Cocta autem & ſubacta, & cum axungia vel butyro B myxta, in forma emplaſtri rediguntur.

De inflationibus. C A P. XIV.

INFLATIONES Græci *ὑπερμεν* vocant, tumores ſunt, qui ex flatulento ſpiritu in aliqua parte coacervato geniti ſunt. Diſſerunt autem ab œdemate, quod illa, Gale- no etiam libro 14. Ther. method. cap. 7. atteſtante, ex pituiſoſo humore ortum habent. Proinde prementibus nobis cedunt, digitique admodum alte in ipſa deſcendunt. Inflationes vero ex flatuſoſo ſpiritu collecto, vt comprehenſum eſt, naſcuntur alias ſub cute, alias ſub membranis quæ oſſibus circumdantur: aut muſculos viſcerumve aliquod includunt. Porro colligitur aliquando non parum etiam in ventriculo & inteſtinis, itemque in medio ſpacio horum, & peritonæi. Diſſerunt quoque hæ ab œdemate, quod & preſſe digitis non retinent veſtigium, & ſonitum veluti tympanum reddunt. item quod in cœlitate ſenſibili coniunguntur: atque hæc nonnunquam maxima. Cauſſa autem flatulenti ſpiritus, qui & flatuſ dicitur, eſt caloris nativi imbecillitas, qui humidam maritimam ſenſili tranſpiratione diſcutere non poteſt. Quapropter ſulcitat quidem vaporem ex humida materia, ſed eum haud ob ſuam imbecillitatem diſcutit. Quem admodum copioſius lib. 3. De ſymptomaticis cauſis Galenus monſtrat. Quod ſi cum caloris imbecillitate adſit meatuum per quos flatuſ euaporatur, denſitas, inflatio maior erit. Signa inflationum ſunt, tumor tactui tenens, cum lucido quodam ſplendore, ſonum, vt vter, vel tympanum, dum percutitur, reddens. Ad hæc perſepe ſentitur flatuſ per vniuerſum corpus, modo huc, modo illuc di- C currens, ac dolorem tensionis pariens. Quum igitur tria hæc, materia humida, coloris imbecillitas, & meatuum denſitas inflationem generent, curationis ipſius ſcopus erit calorem ſubſtantiam roborare, vaporem extenuare & meatus recludere. Porro poſteriora duo, nempe denſi corporis rarefactionem & craſſi ſpiritus extenuationem, iſdem omnino medicamentis & præſidiis aſſequimur, extenuantibus nimirum & calcſcipientibus, magis aut minus, pro laborantium partium denſitate vel varietate, & vaporum quoque craſſitudine vel tenuitate. Pro horum namque diſſerentia facultas medicamentorum quæ admouentur, intendi & remitti debet. Itaque ræz partes, & vapor ſeu ſpiritus non admodum craſſus, minus: denſæ vero, & vapor multa craſſitie præditus, magis ex tenuantibus, & calidis egent. Caloris autem E ſubſtantia ſi perit, aut imminuitur eſt pro ratione iacturæ eius reſarcienda erit. Si vero alterata fuerit, ad mediocritatem reducenda. Quod ſi doloꝝ cruciat, ad anodyna tranſeundum eſt. Principio itaque in curatione eius vniꝝ curandum, vt æger ab omnibus iis quæ flatuſ generare poſſunt tum cibis, tum potionibus abſtineat. Utendum autem potius calidis & ſiccis, item attenuantibus, ac flatum diſcutientibus. Concoctrix quoque ſacultaſ odorataſ & flatum diſcutientibus medicamentis, vt ſunt diacuminum, diacalamintes, odoratum roſaceum, & id genus alia, quæ in libro 3. in capite De inflatione ventriculi diſſa ſunt, roboranda erit. Extrinſecus ventriculuſ ex milio, aut ſale, vt crudo lini ſemine ſouendus eſt: ſi quidem doloꝝ mediocris ſit. Sin vt hemementis, vtendum eſt oleo tenui quod rutam incoctam habeat, aut aliquod calidorum ſeminum, cuiuſmodi ſunt camini, apii, & petroſelini. Quibus ſi nec ſedetur doloꝝ, cucurbita magna cum longa ſtamma, ſine ſcarificatione ventri aſſigenda eſt, ita vt amblicum complectatur. Quod ſi artubus & muſculis qui ſub cute, aut etiam membranis, quæ oſſa veſtunt, oriatur inflatio, ſi citra dolorem ſit, liquor aliquis re- nouiſi-

Anuissimarum partium, cuiusmodi est lixiuium sponsia noua exceptum, imponi debet. Sin dolor quoque uret, vngenda pars oleo est, quod relaxandi ac remittendi vim habet. Incidunt porro eiusmodi affectus, vbi vel mûculus, vel membrana quæ os circueit, est contusa. Ad mûculos vero, medicamentum quod magis mitiget, est adhibendum. Quo fit, ut ad hos solo lixiuium non vtatur, sed immissa ei tum sapia, tum pauculo oleo. Sanius autem fuerit in principio non addidisse lixiuium, sed sapia cum vino & exiguò oleo vri, ac quod mediocre sit olei adicere. Vbi mixta sunt, modice excalescere, ac sanam succidam ipsis imbutam imponere. Vbi cæsypos præsto non est, aliquid cerati quod ex cæsypo componitur, recte admissuetis. Debent enim contuli mûculi leni.

Brimedicamento, cui mixta sit facultas: quippe quæ simul con eo quat, discutiat, & modice adstringat. Quippe si nihil habet adstrictionis aliquando phlegmonas, in plethoricis maxime corporibus, auget. Quæ singula longius Galenus libro 14. Ther. method. cap. 27. prosequitur. Quid vero faciendum sit, si inueterauerit inflatio, Galenus. bidem monstrat. Ceterum si huiusmodi statulentis spiritus fumosus fuerit, malus, corruptus, & a materia venenata excitatus, cum dolore intolerabili, & vehemendi calore, per membra discutrens, nullum tutius ac melius consilium dari potest, quam quod vbi in parte quapiam subliterit, pars ipsa protinus infra supra quæ deligetur, ac in medio nouacula, vel ferro candente tumor aperiatur, ita vt facile vapor ille venenous egred. possit. Deinde huiusmodi plaga implenda erit aloë, & bolo armenio exrosa. eo & aceteto dissolutus. Transactis vero diebus tribus aut quatuor, vultus carne implendum erit, & ad cicatricem perducendum.

Contrafacti
mûculi
remedia.

Si statuleus
spiritus
venenatus
fuerit.

De scirrhis. CAP. XV.

SCIRRHS exquisitus est tumor præter naturam sensus ac dolores expert, & durus. Non exquisitus v. r. non omnino insensibilis est, difficulter tamen lentit. Scirrhus igitur qui sensu prius vacat, sanari non potest: qui agere sentit, facilem curationem non admittit, nec tamen prius incurabilis. Fit, Galeno libro Therapeutica methodi 14. cap. 3. te. sse, ex humore glutinoso, & crasso, qui particulis induratis impæctus, solum contumaciter repugnat. Interdum statim ab initio consistit, augeturque. Magna vero ex parte Medicorum impentia euenit, qui erysipelata & phlegmones vehementer refrigerant, & adstringunt. Signa iam dicta sunt in scirrhii descriptione, nempe tumor durus, & valenter renitens, dolore inter tubrum & nigrum medio. Inchoante itaque scirrho, & quæpiam adhuc imbecillum sensum seruante, curationem adhibere conuenit. Curandi vero eius communis indicatio est, vt quod præter naturam in particula est, totum vacuetur, vniuerso tamen prius, si res ita exigat, vacuato corpore. Modus tamen vacationis eius proprius est. Nam detergere id vbi contumaciter inhxret, oportebit. Quod si quis us quæ vehementer trahunt discutiantque medicamentis vacuare tentet, nec his quæ humectant & excalescunt molliat ac liquet, huic paucis primis diebus egregie processisse curatio videbitur: ceterum quod de affectu restabit, id insanabile erit. Siquidem toto quod in eo tenuium partium erat discussio, quod reliquum est, veluti lapidosa concetio linquetur. Quippe etiam qui in articulari morbo videntur calli, ex humore crasso glutinosoque proveniunt, quando is non paulatim est discussus, sed violentis medicamentis totus simul siccat. Hac igitur de causa ad scirrhosos affectus, nullum vehementer excalescens siccativè medicamentum est aptum, sed ea tantum, quæ cum emolliendo discutere commode possunt. Huius generis sunt omnes medulle atque adipēs. E medullis autem primas tenet ceruina, & vitulina, ex adipibus commendantur anserinus in vulcrum, leoninus vero in quadrupedum genere præstat. At gallinaceus post anserinum sequitur, & pardinus leoninus, ac deinde vrsinus & taurinus. At caprinus crassior & siccior prædictis est, magisque hircinus. Inter resinas terebinthina & larcia.

Fnaeligendz. Emollit etiam ammoniacum strymia, & bdelium strymiaque, magisque Scythicum, quanto videlicet est humentius. Pati modo & styrax qui humentior est, itco vtilior est. Eiusdem generis etiam sunt butyrum, alibea radix, & alia quæ supra in capite De lienis duritia commemorauimus. E quibus vnguenta & cerata componi possunt, vt ibidem monstrauimus. Ceterum inter curandum male affectam particulam, calido oleo

Scirrhus
quid

Causa.

Signa,
Curationi

Emolliencia

fouere oportet, & glutinosa medicamento postquam apposita fuerint, nunquam remouere, prorsus sponte decidunt. Imo si etiam lauandus sit xger, omnino permittenda sunt. A balneis tamen medicamentosis ac sponte natis, prorsus abstinendum. Hæc enim huic malo plurimum aduersantur. Quid multa? quo pacto scyrthus relictus in aliqua parte corporis sit curandus, eleganti historia Galen, lib. 2. ad Glan. cap. 9. docet, quin illic studiosi legete possunt. Præterea cum membrorum alia rariota sint naturaliter, alia densiora, etiam vacuationem eorum diuersa specie remedia postulare est necessum. Hac igitur de causa tum in tendonibus, tum in ligamentis, quum scirrhosa fuerint, satius est ei curationi, quam per mollientia molimur, aliquid incidentium admiscere. Ex quorum numero vel in primis acetum est. Interim vero & in aliis partibus, quas scirrhus afficit, eo utimur. Verum in tendonibus & ligamentis in hunc modum. In aceto acerrimo candentem igni lapidem extinguere oportet, ac si quidem haberi potest, pyriten: sin eius copia non datur, molarem. Deinde ascendentem post infusum lapidi acetum vapore calido, in hoc dimoueri scirrhosum ligamentum vel tendo debet, atque exinde rursus medicamentum, quod molliat, imponi. Multi enim hoc modo curationis perfecte sanati sunt, ut fere magicum opus, Galeno attestante, videretur. Initio tamen oleo, non aqua, quotidie omnino laborantem partem perfundere oportet. Esto autem id oleum haudquaquam adstringens, sed plane tenuium partium, cuiusmodi *Sabinum* est. Incoquimus autem oleum interdum *fenogratam*, aut *thi camam*, aut *alibea*, ac *sylicistria cucumeris* radicem. Ceterum curationi, quæ per acetum administratur, vitius est vitio iam adulto, & quum præparata iam sub mollientibus pars fuerit. Siquidem aceti vis, modo quis ea modice & debilitate tempore vtatur, salutatis eiusmodi affectibus est, cum crassos humores dissecans, ac resolvens: sin vel immoderatus, vel in tempore non idoneo, tenuiores partes violenter absumens, id quod reliquum est lapidescere facit. Sed & si quis eo diutius vtatur, substantiam ipsam neruorum attingit. Ob id igitur nec sæpe, nec inter initia, nec longo tempore, me dicamentis, quæ ex aceto componuntur, ad ligamenta & tendones vtendum. At in liene, & carnosius muscoli partibus scirrho affectis, tutus eius est vsus. Quippe rara sunt naturaliter hæc partes, nec est, quod metuas, ne quis neruus eius vi ledatur. Ac ammoniacum quidem thymiamate cum aceto, etiam non pauci leni impudentes vtuntur, ad luti scilicet crassitudinem, quod ex vtriusque est mixtum, redacto. Vtendum autem eo tum maxime erit, cum per emollientia medicamenta antea scirrhosus tumor mollitus est: hoc namque tempore aceto liquatum ammoniacum maximum vsum præstat. Sufficit autem eo vno altero die vsus, rursus ad mollientia reuerti. Ac rursus his plurius dies vsos, denuo ad medicamen quod ex aceto fit redire, siue id ammoniacum, siue quid aliud habeat eorum quæ molliunt. In medio tempore etiam radice altheæ in adipe asferino, aut galli in aceto, aut fuillo liquata, & cataplasmatibus more imposta vti licebit. Syluestris etiam malux folia cum aliquo supradictorum tusa proficiunt. Quæ singula copiosius prosequitur Galenus lib. 14. Theb. meth. & 2. ad Glanconem.

De Strumâ. C A P. XVI.

STRUMÆ, quas Græci *glandas* vocant, sunt glandule induratae. Vel (vt Galenus lib. 23. Theb. meth. definit) sunt scirrhosiores glandularum phlegmones. Barbari *scrofules* vocant. Scrofex enim, id est, sues colla habent glandulosa, & magna ex parte strumosa. Sunt magna ex parte in collo, alis, & inguinibus, quod iis locis glandulæ vasibus substrata collocentur. Differunt strumæ inter se, magnitudine, natura, loco, ortu, multitudine, & vasorum complicatione. Magnitudine, quoniam quædam parua, quædam magnæ, quædam maximæ, quædam mediæ. Natura, quod alie mites, alie malignæ sint. Mites sine phlegmone & dolore, cum mediocri duricie apparent. Neque enim molles sunt, sicut steatoma: neque duræ, sicut scirrhus: sed mediam quandam inter hæc tactus proprietatem obtinent, tumoremque omnino circumscriptum, rotundum, æqualemque efficiunt. Malignæ vero, phlegmones, pulsantesque dolores inuehunt, tumoremque inæqualem præ se ferunt, in quo vasa prominent, cõrectatque manuum effertantur. Loco præterea differunt, quoniam quædam in posterioribus colli partibus, quædam in obliquis, quædam circa guttur oriuntur. Item quædam superficiem

Scirrhosus
in tendonibus
& ligamentis
ca.
13110.

Aceti vis.

Strumæ.

Scrofules.

Differentiæ
strumarum.
Magnitudo.
Natura.
Mores.

Malignæ.

Loco.

- A**ficiem statim sub cute, quædam prope magna nobiliaq; vasa penitiores partes occupât. *Oritur*, quod quædam quasi suspensæ, quædam insertæ oriuntur. Ac suspensæ quidem huc illuc facile mouentur: insertæ veto lubniruntur, validiorum corporum impetum tolerantes. *Multitudine*, quod morbo vna, modo plures generentur. *Vasorum complicatione*: quædam enim venas arteriasque implicatas habent, quædam prorsus non habent. Oēs autem suis membranis includuntur, perinde atque steatomata, & melicerides. Generantur perinde atque scirrhi, ex crassis & glutinosis humoribus. Notis ad virii huius cognitionem nihil opus est: sensibus enim, visu nimirum, & tactu, statim deprehenditur. Paruæ strumæ maioribus facilius curantur, sicut mites & blandæ phlegmone obfesse. Malignæ vero, sanari nō possunt. Quum enim omnes huiusmodi strumæ cancerosæ ac vasis cernere sint, dum curantur per manum, curationi non cedunt: & dum curantur, erumpendi sanguinis periculum afferunt, præterquam quod quam plenior quæ penitiores inueniantur, minime abscindi possunt: vasa enim nobilia tamquam radices obtinent. Sed pro loci ratione, superficialitæ profundius curatu faciliores sunt. In curatione etiam strumarum diligenter glandularum scirrho affectarum natata consideranda. Sunt enim quædam, quæ in medio vasorum spacio consistunt, & quod ibidē scissum & diductum est implent, atque adeo eius diductionis pro firmamento sunt. In iis cum eorum haud magnus animantibus vsus sit, curandi ratio est, vt totum quod vitiatum est, scalpello excindatur, vel medicamentis putrescere cogentibus. Quæ autem sit ratio excidendi, non est nostri instituti docere. Eam tamen luculenter admodum tradit Aetius libro 15. capite 5. & Paulus libro 6. capite 35. Præterea sunt quædam glandulæ, quæ vel saluum, vel lac, vel genitale semen, ad hæc quæ pituitosius quendam humorē in mesenterio, vel faucibus, vel larynge generant. Harū certe maior est vsus. Ideo quæ in scyrroso affectu sunt, non aliter quam reliquæ partes quæ scyrrō laborant, sunt sanandæ. Corpore itaque primum per ea medicamenta, modo ætas & alia permittant, quæ crassos & glutinosos humores educunt, vacuato, ad emollientia primum, deinde veto ad diſcutientia progrediendum. De emollientibus satis copiose capite præcedenti est dictum. Inter diſcutientia laudatur priuatim farina lupinorum, ex oxymelte cocta & diluta. Si ouillum irem steruus aceto incoctum & illitum. Probe etiā discitur strumas calx viuæ, melle, vel oleo irino, vel adipe sullo excepta. Valet etiam hoc ceratum quod habet: *Sulphuris, seminis nasturtij & verrice, singul. drach. duas. Nitri, drach. vnam & dimidiam. Myrrhe, galbani, ammoniaci, sing. drach. vnam. Olei veteris, vnc. tres cum dimidia.* Cum cera & resina terebinthina quod satis est, informetur ceratū. In pus couersa strumas rumpi loliacea farina cum vino columbæ, & semine lini vino incocta. Ceterum strumalaboratibus alius reddi facili debet, tenuisq; victus adhiberi. Quare ab omnibus crassos generantibus succos abstineant. Bibant vinum tenue, & album. Fugiant portionem aquæ frigidæ, ac turbidæ. Deniq; iis assidue vomitus prouocari debet, & pct os illis pituitam educere oportet, atq; caput excicare.

De abscessibus. CAP. XVII.

- A**bscessus, qui Græcis *ἰσχυρὸν* vocantur, vitia sunt, in quibus a seipsis, quæ prius iunguntur partes, abscedunt. Spacium igitur in medio vacuū necesse est fieri, quod materia aliquam aut flatusosam, aut humidam, aut ex vtraque mixtam contineat. Male itaque nonnulli recentiores Medici apostematis & phlegmones nomina confundunt, quum sint diuersa inter se vitia. Ii abscessus ex vaporoso spiritu, aut humida materia, vt dictum est, aut vtraque mixta. Quocunq; autem modo abscessus fiant, id spatium quod abscedentes partes interiacer, humoribus illum efficiendis impletur. Qui si diutius aliquando maneant, in varias formas mutantur. Etenim lapidibus, arenis, testis, lignis, carbonibus, luto, strigimento, amurcæ, fæci, multisq; id genus aliis similia sepe in abscessibus contenta deprehenduntur. Priuam tamen abscessus, in quo pulti simitis continetur humor, *Atheroma* dicitur. Qui vero mellis substantiam referentem in se humorem habet, *Meliceris* nominatur. Abscessus autem in quo veluti adeps est, *Steatoma* appellatur. Signa ex iis quæ iam dicta sunt, abunde patent. Potro curantur abscessus vacuata: quæ in spacium abscessus materia. Quoniam autem ex varia est, vt modo diximus, ideo non eadem ratione omnes vacuātur. Nā si in sinu minime profundo tenuis & pauca

materia resoluique idonea contineatur, cuiusque rara sit, discutiendis molienda curatio est. Sin ob humoris crassitudinem aut copiam, cutis densitatem, & abscessus altitudinem discuti non possit, ad suppurationem transeundum est: ut in phlegmonibus, maxime quæ in abscessum iam vertæ sunt. In quibus vero abscessibus nulla ob crassitudinem nec discutionis, nec suppurationis spes relicta est, ut in steatomatibus vno præsidio vitum nempe excisione: quemadmodum in aliis, quibus pus ac alia materia discuti non potest. Nonnulli enim abscessus solâ manus curationem efflagitant, in quibus scilicet materia propter crassitatem nec discuti, nec putrescere potest. Quædam vero tam sectionem, quam suppurationem addunt, ut in quibus humor suppurari quidem potest, sed ob crassitatem, aut lentorem discuti non potest: cuiusmodi est: atheroma. Alii triplicem curationem nempe discutionem, suppurationem, & sectionem recipiunt: quales sunt qui ex tenuioribus constant humoribus, sed non vti rotâ discuti possunt. In iis vero abscessibus, qui in alto corporis consistunt, ac potissimum in viscetibus, medicamenta quæ ex aromatis componuntur, maxime sunt utilia: utpote quorum vis collectum humorem cum in habitum resolvar, tum digerat. Sunt profecto & alia eius generis non pauca, quorum laudatissima sunt tum antidota quæ ex viperis componitur theriacen vocant; & quod ex cretica calamintha est compositum, a Galeno lib. 4. *De iudiciis sanitate cap. 6.* describunt. Priuatim veto meliceridas dissipat hoc emplastrum, quod accipit: *Possularum detractum vinaceum, lib. vnam. Cumini minutissimi triti, vnc. tres. Omnia simul in mortario subacta confecta, & alligata.* Et hoc, quod habet: *Salis ammoniaci, lithargyri, cerussæ, sing. lib. vna. Cera, terebinthina, galbani, opoponacis, sing. vnc. vnam. Rubricæ sinopice, vnc. sex. Aceti, vinici septem, & semissem. Lithargyrum, cerussam, & salem ad exallum leuorem tritum simul decoquit, deinde rubricam prius in aceto tritam iniecit, & cum vniuersu liquabilia, postremo omnibus simul confectis, & ratu opoponacis & galbanum aceto solata admisceto, & vtere.* Ceterum si medicamentis adurentibus cute superposita prius denudate expedit: e quorum numero, Paulo attestante, simplicius quidem est quod constat *calce viva, sapone, & lixiuio.* Aliud magis varium, quodque reconditum in seruari potest, capit *Calce vine, drach. quatuor. Peculi vini combustæ, utriusque id est, singul. drachmas duas. Rubricæ sinopice, drachmam vnam.* Tenuatur in lixiuio, & vbi ad mellis crassitatem reducta fuerint, ter seruescificato, ut medicamentum consistentiam habeat, & pixide plumbea reponito, lixiuium super destillans, ne nimis cito exarescat. Ergo circumfusam cutem eiusmodi medicamentis crustam inducentibus, primum abruptum. Postquam vero crusta deciderit, exedentia exhibero. Erodit autem valide citra vellicationem & mortuum quod habet: *Signatus eris, drachmas quatuor. Sendaraca, arsenicum rubrum nominant, drach. duas, Elæbori nigri, drachmas duas, cum resicato vti.* Sed quæ adjacent atque in ambitu sunt partes omnes, prius cerussâ cum oleo delinito. Verum vbi tales abscessus sectione curare voluerimus, in ea quidem curatione siue pultaceus, siue melleus, siue adiposus, siue cuiusdam alterius substantiæ humor in eis contentus fuerit, vnus scilicet nobis scopus perperuus est, nimirum ut tunica in qua humor concluditur, aufetamus. Sed dum hoc molimur, impense cauendum est, ne remore membrana vulneretur, aut dilaceretur, vnde humor qui in ea continebatur effusus operationem impediatur, & portio ipsius relinquatur. Si enim dissecta tunica, ac humore perfuso renuior subleuatur, difficulter admodum tunica excorari curarique poterit. Si vero humoris aliquid relictum fuerit, periculum est, ne morbus reuiuifcat & renascatur. Quod si tale aliquid incidit, melius est non conseruare, & exedentibus medicamentis supra commemoratis, aut consimilibus reliquiis absumere.

DE CANCRO CAP. XVIII.

Cancer est in agnatis, *linefcentis, assestu rorer, & cum dolore, tumor.* Nomen accepit a cancro, quemadmodum enim in isto pedes ex vtraque parte sunt corporis, ita in hoc vicio venæ oppletæ, & in ambitu tensæ, canceri animalis pedibus omnino sunt similes. Fit in omnibus humani corporis partibus, sed sæpius in feminatum mammis, quæ a natura purgationem non habent, quod raræ & laxæ sint, ac crassissimam melancholicæ humoris materiam promptè excipiant. Generat ex melancholico humore feruescente: qui si acrior existit, exulcerationem etiam efficit. Sunt enim duæ supremae cancerorū differentiæ. Nam quidam eorum vlcerare carent, & ita ab omnibus fere antiquis occulti appellantur. Quidam etiam exulcerantur. Tumoris magis quam phlegmone nigricat, sed

232 Operum Leonhardi Fuchſii Pars III.

ſingul. diach. vnam. Hoc iraſque vnguento cancer illinendus. Cōmendatur etiam ſucus ſolani & plantaginis, admixto puluere auripigmenti, ſi iis locus laborans illinatur, & linteam in iis maſefactum ſuperponatur. Ceterum ſi quando cancrum per chiturgiam curare audebis, cepiſſe quidem a vacuando per purgationem melancholicum humore oportebit. Vbi vero rotum quod vitiatum eſt, proſus excideris, ſic vt nulla ſuperſit radix, ſines effluere ſanguinem. nec propere eum inhibebis: imo premendo potius vicinas carnes: exprimes ex his craſſiorem ſanguinem: mox aliis vlceribus ſimiliter curabis.

De Elephantia. C A P. XIX.

Elephantia, quæ inſuperant vniuerſi corporis cancer eſt. Sic vocatum vitium hoc, quod corio Elephantis, cutis in eo perſimilis videatur. Nam maculis quibuſdam ad artrum colorem vergentibus inſicitur, inæqualiterque aſpera, craſſa, & veluti ſquamis ſæda, liuens, ſerinaque redditur. Vnde ſaris liquet, elephantiaſim a lepra Arabū nihil diſſerre, vt de morboſiſſimis lib. 2. Perad. 2. 16. Dicitur etiam Satyrigaſ, Gal. lib. de cauſis morb. 2. 5. ſepte, quod facie, qui ſic laborant, ſatyris ſimiles ſint, vt inſ. dicemus. Quin & alacritas vehemens ad coitum ipſis adeſt, quemadmodum de ſatyris fertur, q. ſcilicet. ſemine abundant. largior ſiquidem ipſius generatio in ſeminaris vaſis ob materiz craſſitiem accidit. Vocatur etiam Leontiaſis, quod frons agtorum cum quodam rumore laxior reddatur, ad ſimilitudinem pellis flexilis ſuperciliorum leonis. Eſt autem graue vitium, & prope ex eorum numero, quæ incurabilia exiſtunt. Er graue quidem eſt ipſi agro, intolerabile autem conſpicientibus, vt pote qui ipſum omnino auerſant, adeo vt plerique ex agri neceſſariis & domeſticis, ipſius conuerſationem deuitent. Et ſane malum eſt cum eis conuerſari. inquinatum enim aer, quem inſpirando arrahimus, ex vlcerū fetore, & ex vitia ſpiritus exhalatione. Origo viti eſt ex atra bile, quæ ex craſſo & ſæculêto ſanguine, aut ſua bile nimium viſta procreatur, aut pituita ſalta. Quare hoc ipſo magis corripuntur, qui ex praua viſtus ratione craſſum & viſcoſum ac melancholicum ſanguinem acetuāt. Conſequitur eos, qui obnoxii futuri ſunt huic vitio, ſegnities, ſpiratio tarda, ſpirandi difficultas, motus difficilis, aſſidua conſtrictio alui, vrinarum, veluti ſunt iumentorum lotia, excretio, reſpiratio grauis & fetida, ruſtus continui, qui etiam ipſis agris aliquid moleſtiæ addunt, appetitus non obtuſi, impetus in Venerem intentus. Iam vero vbi ad cutem progreſſum fuerit vitium, primum malæ craſſiores ſunt, & mentum dilatatur, deinde rubefcunt, non florido, ſed liuido colore. Capilli etiam capitis magna ex parte rari ſunt, pilique ſuperciliorum decidunt. Naſus fit ſimius, aures eroſæ, labra craſſa, vox rauca, & ſub lingua venulæ varicoſæ ſunt, nigrefcuntque, quod ſignum eſt, etiam viſcera ipſa in ſimili conſtitutione eſſe, cuiusmodi plane qualis in porcis quibuſdam circa interna videtur, quæ grandinis nomine inſignitur. Quandoque vero & per omne corpus eminentiæ apparent, & præſertim iuxta ſummâ frontem ac mentum. Corpus præterea ipſorum magnum eſſe videtur, & cuiuſdam intolerabilis grauitatis eis ſenſus adeſt. Paſſillanimes ſunt ad omnia. Quidam porro ex eis ad modum eorum qui ſtrangulantur, maxime circa ſomnos, aſſiciuntur. Quamquam vero vitium hoc ſere incurabile ſit, tamen humanum eſt, vt ait Aetius, & plenū beneuolentiæ ſignum, in extremis etiam malis vſq; ad experimentum procedere, ad difficultatem eotū compenſendam. Principio iraſque vitius ratio cuiusmodi præſcribenda. A ſomno membra eorum plurimum & leniter manibus contrectari debēt. Deinde corandum, vt alius excrementa deponat. Poſt hæc deambulent, aut geſtationibus committantur, & clamore exerceantur, aut frictionibus aliſue generibus exercitationum vtantur. Sudore ſubinde, quem illinc contraxerunt, abſterſo, adipe vrſino, aut vulpino illinantur: qui ſi non adſint, caprino aut taurino, aut pro liſ aliquis ex volucrum genere, aut butyrū recens ſumatur. Pauxillo temporis interpoſito, cum ſcenogræci aut pitſanæ ſucco, qui parū ammoniaci cum aceto liquefacti ammixtum habeat, perfundantur, atque ita lauacro vtantur. Nocuum enim eſt vitio, ſi quis non lauet. Comoda ſunt etiam arida fomenta, & peſt ſufficientem ex dictorū vſu exſudationem, natationes in mari, aut ſulphurentis & aluminofiſ aquis. Fomenta veroparabuntur ex ſumaria, origano, ſcabioſa, oxylapatho, chamæmelo, meliloto, mentaſtro, & ſimilibus. A balneo deterſi, ad acrimoniæ & mordacitatis curationem ex oleo myrteo, roſaceo, aut mallichino cum aceto & vicino conqueſſatis illinan-

Cancer
per chiturgiam
gim abſoluo.

Elephantia
a lepra Arabū
nihil diſſert.
Satyrigaſ.
Elephantia
ci car ad
Venerem
alacritas.
Leontiaſis.

Cauſa.

Signa.

Vitiorum
ratio.

Balneum.

- A** illinantur. Aut decocto aliquo eorum quæ adstringunt, plantaginis scilicet, aut betæ, aut helxines, perfundantur. Optimum est & buyrum recens illitum. Post lotionem & extersionem per tenera lintea, ad horæ dimidium quiescant: deinde aqua tepida hausta sponte vomant, digitis in os, aut pinnis demissis. Postea modico intervallo temporis interposito, vinum absinthites, aut ex origano confectum bibant, non infra heminæ mensuram, & paulo post cibus eis apponatur. Cibus autem erit panis hordeaceus, aut triticeus recens. Inter olera, *beta, lactuca, melua, lapathum, fissarum, porrum, brassica binnis aquis dulcata, & capparum*. Recte etiam ipsis datur prisana, ova sorbilia, alica lota, lac cum melle. Carnibus auculatum montanarum utantur, & hœdonum, gallinarum, capotum, & iis similibus. Piscibus molli carne præditis. Ex fructibus conveniunt ficus & vuz arefactæ, pyrum coctum in aqua multâ. A reliquis fructibus omnino abstineant. Deulent etiam legumina omnia, salita, & acia. Bis cibum capere præstat, quam semel se replere. Prædium simplicissime parerit: cœna magis varia sit. Potus sit vinum tenue, album & aquosum. Aut aqua in qua parum cinnamomi decoctum sit. Vino forti & vinoso, perinde atque Venere, per totum morbi curriculum abstinent. Somnus porro diurnus nocivus, nocturnus apertissimus. Post longum a cœna interstitium, deambulatio iœta ac sensim facta, commoda est, ut cibi eo melius descendant. Quod ad curandam rationem artinet, protinus inter initia sanguis mitti debet, & magis vere, in quo potissimum hoc vitium nascitur, & intenditur. Reversus enim inde aliquo modo inritus calor, & sensus.
- C** b. liter corpus ipsum alienatur. Auferendus autem particulum ex viroque gibbero, ac incidenda interna aut media quæ in gibberis existit vena. Habendus etiam modus est in vacuando, in multo enim pravo ac vitiato sanguine parum quiddam boni sanguinis inest. Post sanguinis detractionem, noveni decemve diebus interpositis, alvus in seipso subducatur. Quibus vero medicamentis purgandum sit corpus, in capite *De melancholia, & alij quibusdam*, ubi de vitis cutis egimus, dictum est. Post dies autem aliquot sero lactis utendum, ex eoque non minus tribus acetabulis, neque ultra quinque accipiendū, *Actio & Pauli testibus*. Admiscendum est illi aliquid *scammone, epithymi, vulsena*: ita ut hæc ipsa cum modico sero ieiunis præbeamus, atque deinde ipsum serum paulatim exhibeamus. Hac purgatione frequenter utendum est. Omnino namque conandum est, ut omnem corporis habitum ab hac vitio occupatum liquefaciamus, aluique quendam veluti ex integro regeneremus. Id ipsum vero fiet, si per intervalla oportune purgationes adhibeantur, & cibi apponantur, qui facile cœcoqui & distribui possint. Deinceps vomitus cetera a cibo, aut ieiunio radicalis. Postea ad veratrum perueniendum. Post hæc autem virium refocillatæ victus ratione utendum est, ac medicamentis quæ lumen acutè desiccant, adstringantque. Leves igitur cucurbitulæ ori ventriculi, & hypochondriis utrinque affiguntur. Et primo quidem auxiliorum circuitu hoc modo perfectio, rursus ad principium reflectendum est. Et venæ quidem tectio videtur, ut quæ plus noxæ quam præsidii esset allatura, ab hiera vero principium purgandi sumatur: & reliqua deinceps ordine faciendæ, velut prædictum est, ter & quater in anno eodem ductu repetito. Malignum enim & difficulter recens vitium est, quapropter plurima cura opus est, ne in peius evadat. Quod vero vitium hoc hodie rato aut nunquam curatur, multæ sunt causæ, quarum hæc præcipua est, quod eo laborantes methodica & cōvenienti curandi ratione, nec ea quidem tempestive utantur. Si quidem medicorum operam non requirunt, nisi ubi vitium iam confirmatum fuerit, & univèrsam corporis substantiam occupaverit, ac omnem curam in se respuit. Ut nullo omnino digni sint nostri temporis Chymici, homines imperti, nebulones, & impositores pessimi, quos Hippocratem, Galenum, & id genus alios methodi auctores catnifices vocare nihil pudet, quò tamen consistit ipsos potius hoc nomine esse appellandos, ut qui suis mendaciis, imposturis, compilationibusque maxims totum mundum excarnificent, ac suis arcibus, non nisi a Satana mendaciorum patre, excogitatis illorumque animis instillatis, nō solum plebeis, verum etiam magnatibus ac principibus impudenter fucū faciunt, ac fumos lucos vendunt, digni ut hoc nomine, veluti fumus venditores, fumo necentur, ut alibi copiosius diximus. Ceterum thetiaca ex viperis Andromachi mitissime prodest, & quæ compendius totius curationis est, si post purgationes per modica intervalla præbeatur, & ea cutis etiam oblinenda. Mirabile quoque elephantæ remedium viperarum elus exhibet, ut testatur Gale. lib. 2.

- A** quod habet: *Florum violarum, boraginis, buglossi, singul. manip. dimidium. Fumaria, scabiosa, hemionitidis, vel in eius indigentia aspleno, quod vulgus Ceterachium nominat: Casubia, eupatorii, cichorii, singul. manipulum unum. Folliculorum in sena, drach. duas & dimidium. Seminis anisi, feniculi, rufi, singul. drach. duas. Vuarum passiarum, glycyrrhizae repurgatae, singulorum drachmam unam. Corticum myrobalanorum cepulorum, flauorum, singulorum, drachmam dimidium. Prunorum numero quingue. Polypodij, drachmas sex. Thymi, episthymi, singulorum drachmam unam & dimidium.* Coquantur in aqua iustae quantitatis quoad dimidium eius absumatur. Deinde colo transfundantur, & saccharis adiectione eius decocti dulce reddatur, albisq; oui purificetur, additis *oxymelitis simplicis, serapje & fumaria, singulorum vnciae duae.* Fiatq; potio, de qua singulis diebus mane & vesperti dentur vnciae quatuor & dimidiz. Humoribus ad vacuationem praeparatis, & meatibus toleratis, purgatoriū aliquod ptopinetur medicamentum, quale est quod accipit: *Antidotū Indi. hamech, singulorum drachmas duas & dimidium. Antidotū sena solutius, drach. unam & dimidium. Decocti paulo ante descripti, vnciae tres.* Cōmisceantur, & fiat potio purgatoria. Potest etiā horū catapotiorū esse vñus: *Pilularum & fumaria, & ehermodactylis, aggregatarum, singulorum scrupulum unum. Azarici in pestillo redacti, scrupulū dimidiū. Daerydij, grana duo.* Cum stillatio fumariz liquoze singantur catapota numero quindecim. Dentur in aurora. Quod si multa est cacochymia, sepius iam dicta reiterare medicamēta expedit. A purgatione corporis, scilicet pulis, brachiis, natibus, & femoribus cucurbitulae cum scarificatione sunt admouendae.
- C** Tum etiam prodest adhibere *serapij, hoc est, balnea sicca, quae ad proliciendum sudore.*
- C** & reliquias visioforum humorum educendas sunt aptissima. Saepius autem iis vtendum est, interuenientibus tamen certis dierum aliquot intervallis. Et quo die vsurus est balneo zget, eo hanc potionem mane praesumat, quae habet: *Radicum apy palustris, petroselinis vulgaris, feniculi, singulorum vncia una. Seminis rufi, asparagi, libysii vulgaris, singulorum drachmas tres. Mentisistri, calamiti, abrotani, singulorum manipulum unum & dimidium.* Coquantur in duabus aequae fontanae libris vsq; ad tertias. Dein colo tranſmittantur, & saccharo sufficioe ius dulce reddatur, & purificetur albis ouorum. Iuri decocti addatur: *Serapji acidi simplicis, oxymelitis compositi, singulorum vnciae duae.* Fiat potio, de qua mane dentur, vnc. quatuor. Hac certe ratione morbus Gallicus, qui nuper cepit, sanari facile me poterit. Quod si vero is morbus iam longo tēpore corpus infestauit, ad ligni vsum, quod Barbara gens, quae nobis illud transmittit, vernacula lingua *Gustacum* appellat, cōfugiendum erit. In cuius certe vñu, principio curandum, vt optimum deligatur. Ex eo autem optimum ceosetur, quod recens satis, neque admodum vetus & cariosum existit. Tale autem est, quod igni impositum ob resinaceos fauos, quibus intēius nigritū medullium discriminatur, citius accenditur, & flammās agit. Laudatur item, quod buxo est colore, sed nigrescens. Item quod in gustu praeter adstringentem saporem, etiam leniter linguam erosionē mordicat. Praeparatur autem hunc in modum. Lima, vel tomo, aut alio instrumento in frusta quantum licet tenuissima comminuntur, aut in scobem redigunt. Dein desculpta frusta, aut elimatam scobē in aqua fontana leuēssimā & puta decoquere oportet, in vase vitreato. Singulis autem libris puluetis ligni, vel in scobem redacti triplum aquae adlicere conuenit, in qua diem & noctem maceratur, dein ad prunas vel leotum igoem horis amplius sex, aut ad tertias, vel paulo plus, iuxta morbi indigentiam, magna cura & attenta custodia decoquitur. Aliqui plus, vel minus aquae adliūt. Semper autē inter eoquendum glutinosa & lenta (suma de traheoda, quae viceribus, & pustulis ac tumorib. illinitur, aut affricatur, aut huiusmētis excepta imponitur. Sic decoctum vbi petcolatum fuerit, in ampullam vitream defuso dicitur, & medicata vocat aqua: Germaoice, *das starrē wasser.* Quod ex prima ligni bullitione post colo expressum decoctū relinquitur, cum tripla portione elatae aquae rursus lento igne bullitur, donec quarta aequae pars consumpta fuerit. Hoc tenue decoctū Germanice, *das flin ob. r gring wasser* nominat, quo loco vini in praedio & cena vtendū. Purgato itaq; prius zgrotaente in modo paulo supra dicto, sequenti die mane in aurora sumentum decoctū primum medicatum pondere vnciarū quatuor, aut alia quāritate cōuenienti, spacio a praecedente cena septe aut octo horarum, bibendumq; calidum. Dein stragulis & vestibus bene contectus, iu lecto se per tres horas cōineat, & ludet, si fieri poterit, zger. Postea surgēs, & extremētis vndiq; probe expurgatis, leuiter & pedetētin in cubiculo obam:

- A** *Secundum*, est forcipis genus denticulatę, quod in modũ tostri avis est confectum. *Rostrium* Hinc a nonnullis Rostrium coruinum appellatur. Aliis vero, tostrum serpentium. *Coruinum.*
- Tertium*, est forceps in modum cannz siue arundinis, aut scriptori calami conca- *Forceps can-* ua, quam vulgo tenaculam cannulatam nominant, ad globos educēdos, & sigittas spi- *na.* culis cinctas, quas vulgares chirurgi barbatulas vocant, extrahendas accommodata.
- Quartum*, est terebellum inuersum, quod ad extrahendum ferrum infixum, tu- *Terebellū* bulum seu cauum arundine seu hastili vreuū habens, est idoneum. Quippe in ferri in- *inuersum.* fixi tubulum immisum, ferrum apprehendens, leuiter id ipsum, ferro lequaci, educit.
- Quintum*, est terebra in longũ porrecta, directa nuncupata, dilatādis ac amplian- *Terebra* dis ossibus, quibustela firmiter inhaerent, apprime idonea. *directa.*
- B** *Sextum*, est excisorius culter, ad amplificandā in carne accepta vulnera, quo faci- *Excisorius* lius infixa eximantur, vilis. *cultor.*
- Septimum*, est propulforium nominatũ instrumentum, quod certe geminum est. *Propul-* Vnum solidum, siue surdum, quod propulforium mas appellatur. Alterum caui, quod *forium.* propulforium femina dicitur. His duobus tela protrudimus, donec ab altera patte ap- *Mas.* prehendi, & extrahi possint. *Femina.*

FORMULÆ INSTRUMENTORVM, QVARVM MENTIO-
ne fecimus modo, quæ telis extrahendis idonea sunt, ex Ta-
gaultio delumi possunt.

Adiciam aliquas alias nosteris vsitata Gallis.


Qua arte fractum in vulnere sagitta sint extrahenda.

- Q**uod si forte telum fractum in vulnere sic relictum fuerit, vt forcipibus comme-
merādis comprehendere nequeat, eliciendum, extrahendumque tum venit rostro
gruino vel coruino, & aliis mox depingēdis idoneis instrumentis. Quæ si hastile se iuxta
ferrum abruperit, adeo vt gruino nostro prehendere sui antam non præbear, terebel-
lo glandium illice in sclopetorum vulneribus depicto defigēdum & abducendum ve-
niet, nam si eiusmodi terebello defigendi se in plumbum visine est, nullo & in lignum
magis. At si ferrum multis sulcis fuerit cuspidatum, cuiusmodi fere esse solet, Anglica-
nis sagittis, tum si fieri potest, instrumento ad id apto, vltra partem impellendum est:
nempe qua tendebat. Nam si qua venit retrahatur, periculum non leue imminet ru-
ptionis laniaturque valorum & neruorum ab ipsis tanquam hamatis sulcis. Quare sa-
tius est e regione, qua nempe tendebat ferrum, sectionem moliri, hacque ipsi exitum,
si quidem compedi id fiat, aperire. Sic enim & tutius & facilius detergetur vulnus &
consolidabitur. Contra vero si qua tendit ferrum os aliquod oppositum habeat, vel
multorum musculorum & dentz carnis obicem, vt contingit in femore, crure, & bra-
chiis nonnunquam, tum non qua tendit compellendum ferrum est, sed potius qua ve-
nit dilatato instrumentis idoneis, vulnere, neruis & maioribus vas ex anatomis peri-
tia vitatis, retrahendum & foras reuocandum est. In eam igitur rem dilatato tuium ca-
uum in vulnus immittatur. Hoc ferri gemini sulci, & tanquam hami comprehendan-
tur. Hinc rostro gruino stringatur ferrum arctius, sicque demum vna & eadem opera
illa omnia extrahantur, vt sequenti deformatione indicatur.

*Quando
qua trahē-
tur ferrum
extrahē-
dum.*


*Quando
qua venit
ferrum ex-
trahēdū.*

*Dilatatorum parte interna cauum, cum rostro gruino hamatum,
ferrum tenente.*



238 Operum Leonhardi Fuchsi Pars IV.

Instrumentorum extrahendis sagittarum & telorum ferramentis, quatinus vulnera, haustilo vacua relicta sunt idoneorum, deformatio.




Vncus extrahendis loricarum orbiculis nexilibus, & aliis peregrinis corporibus, quae tanquam sibiula & vncu lubnekti, stringi & comprehendi poterunt extrahendis idoneus: cuius etiam in vulneribus scelopeto illius vsus esse poterit.



Quod si forte seu sagitta seu lancea, seu cuiusvis alterius teli sulcatum multipliciter ferrum in parte aliqua corporis, ut femore aut crure relicto haerit, cum hastilis portione frustularum seu assulatum abrupta, tum oportebit Chirurgum excisoris forcipibus hastile supra frustra comprehensum excindere, moxque fornicibus dentatis ferrum extrahere, ut ex praesenti figura patet.

238 Operum Leonhardi Fuchsi Pars IV.

Instrumentorum extrahendi sagittarum & telorum ferramentis, quatinus valere, hastile vacuare relicta sunt idoneorum, deformatio.




Hoc cochlea, qua in cannulam eius induitur, opera diducitur.

Hoc compressu manubrio dinarietur.

Forfices cochleati cum rostro cornino. Illi quidem cochlea opera diduci & contrahi solent, ad sagittarum telorum ferramenta abducenda, hoc vero loricarum orbiculis nexiles in corpora una cum telo impressi & relictis eximuntur.

Vncus extrahendis loricarum orbiculis nexilibus, & aliis peregrinis corporibus, quæ tanquam fibula & vncu lubnecti, stringi & comprehendi poterunt extrahendis idoneus: cuius etiam in vulneribus sclopeto illis usus esse poterit.



Quod si forte seu sagittæ seu lanceæ, seu cuiusvis alterius teli sulcatum multipliciter ferrum in parte aliqua corporis, ut femore aut crure relicto hæserit, cum hastilis portione frustularum seu assularum abrupta, tum oportere Chirurgum excisoris forcipibus hastile supra frustra comprehentum excindere, moxque fornicibus dentatis ferrum extrahere, ut ex præsentis figuræ patet.

De Medendis Morbis Lib. I.

ALEONHARTI FVCHSII DE MEDENDIS VVLNERIBVS, LIBER SEXTVS.

239

De vulneribus in vniuersum CAP. I.



Vniū, quod Græci *τρίψμα* dicitur, *Galeno lib. 3. Ther. method. capite 1. stylo*, est solutio continuitatis ex vulnerado in carnosa parte reliqua. Auicenna interpres, & recentiores fere omnes, *plagam* appellant. Huius quidem causæ *plaga* censentur, quæcunq; extrinsecus aduenientia vulnerare, perforare, inci- *Causa* dere, abrumperē, ac contundere valent. Vulnerant autem, perforant, ac incidunt, quæcunq; acuta sunt, & morsum inferre possunt: vt est gladius, & animalia pungentia, aut inordentia. Abrumpunt, quæ violentè distendunt: contundunt autem, grauiā. Notæ vulnèrum non aliunde petendæ sunt, quam ex iudicio sensus, sed visus maxime. Porro necdum vulneris, sed omnium solutionum continuitatis, *Galeno capite 30. Artis medicæ attestante*, communis curandi indicatio, est vniū. Hæc autem prima & generalis indicatio a duobus perficitur, nempe a natura, tanquam a principio agente, & causâ effectrice, adiuta suis viribus & conuenientialimento: & a medico tanquam ipsius naturæ ministro. Vt autem Medicus propositum sibi curationis finem, nempe vniūtionem, tandem assequatur, quinque sunt necessaria. Primo, vt quæ extrinsecus incidunt, atque ne vulneris labra coire possint impediunt, a moueantur. Verbi gratia, si ossis aliqua particula pungens & aspera, aut telum aliquod, aut sagitta, vel mucro, vel spina, vel harundo sit quæ intercidit, adeoq; vulneris labra coire haud patiarur, vbi satis diducta fuerint labra vulneris digitis, aut vulsella, vel forcipe, aut alio id genus instrumento, prout res ex postulat, apprehensa, leuiter & citra dolorem euelli debet. Ceterum extrahendorum telorum, quæ infixâ corporibus intus hærent, duplex est modus: vnus quidem per attractionem, alter vero per protrusionem, seu impulsionem. Attractio fit ab ea parte maxime, qua venit telum, sed interdum etiam ab eâ in quam tetendit. Protrusio autem, fit in partem oppositam ei, cui infixum est. Horum autem modorum indicationes defumendæ sunt tum ab ipsis telorum generibus, tum ex illis sedibus, in quas illa penetrauerunt. Proinde tela quæ iaciuntur ac vibrantur, magna ex parte vel oblonga, & angusta, cuiusmodi sunt sagittæ: vel lata, vel rotunda, vt plumbea glans: aut angulosa, nempe triangularis: aut trifida, hoc est, tribus ex partibus acie prædita: aut spiculis cincta, quæ vulgo barbulara appellantur: nonnulla spiculis carent. Quod si itaq; telum oblongum est & angustum, cuiusmodi, vt diximus, sagitta est, & facile corpori infixitur, & altissime inlidit. Sæpius igitur alia parte, quæ qua venit, hoc est, antrosum, sagitta educenda est: præsertim vbi spiculis cingitur, quæ magis laniant si retro, quam si contra trahant. Sed in ea petra via, caro diduci debet, ferramento ad similitudinem facto Græci literæ J. Item si ex alia parte vulnus aperit, laxius esse debet, quam vt telo postea transeunte ampliâctur. Deinde vbi apparuerit, si mucroni arundo inhaeret, propellenda est sagitta, donec ex altera parte apprehendi, & extrahi possit. Si iam illa, arundo in quam seu haustile decidit, solumq; intus ferrum est, mucro vel digitis apprehendi, vel forcipe, atque ita educi debet.

Quæ extrinsecus vulneribus locidant, vt mouenda. Primum in curatione vniūtionem. Telo & corpore vt tractanda. Attractio. Protrusio. Telorum differentia.

Telum oblongum & angustum vt attrahenda est.

Blasphemia

- B** dere, abrumperē, ac contundere valent. Vulnerant autem, perforant, ac incidunt, quæcunq; acuta sunt, & morsum inferre possunt: vt est gladius, & animalia pungentia, aut inordentia. Abrumpunt, quæ violentè distendunt: contundunt autem, grauiā. Notæ vulnèrum non aliunde petendæ sunt, quam ex iudicio sensus, sed visus maxime. Porro necdum vulneris, sed omnium solutionum continuitatis, *Galeno capite 30. Artis medicæ attestante*, communis curandi indicatio, est vniū. Hæc autem prima & generalis indicatio a duobus perficitur, nempe a natura, tanquam a principio agente, & causâ effectrice, adiuta suis viribus & conuenientialimento: & a medico tanquam ipsius naturæ ministro. Vt autem Medicus propositum sibi curationis finem, nempe vniūtionem, tandem assequatur, quinque sunt necessaria. Primo, vt quæ extrinsecus incidunt, atque ne vulneris labra coire possint impediunt, a moueantur. Verbi gratia, si ossis aliqua particula pungens & aspera, aut telum aliquod, aut sagitta, vel mucro, vel spina, vel harundo sit quæ intercidit, adeoq; vulneris labra coire haud patiarur, vbi satis diducta fuerint labra vulneris digitis, aut vulsella, vel forcipe, aut alio id genus instrumento, prout res ex postulat, apprehensa, leuiter & citra dolorem euelli debet. Ceterum extrahendorum telorum, quæ infixâ corporibus intus hærent, duplex est modus: vnus quidem per attractionem, alter vero per protrusionem, seu impulsionem. Attractio fit ab ea parte maxime, qua venit telum, sed interdum etiam ab eâ in quam tetendit. Protrusio autem, fit in partem oppositam ei, cui infixum est. Horum autem modorum indicationes defumendæ sunt tum ab ipsis telorum generibus, tum ex illis sedibus, in quas illa penetrauerunt. Proinde tela quæ iaciuntur ac vibrantur, magna ex parte vel oblonga, & angusta, cuiusmodi sunt sagittæ: vel lata, vel rotunda, vt plumbea glans: aut angulosa, nempe triangularis: aut trifida, hoc est, tribus ex partibus acie prædita: aut spiculis cincta, quæ vulgo barbulara appellantur: nonnulla spiculis carent. Quod si itaq; telum oblongum est & angustum, cuiusmodi, vt diximus, sagitta est, & facile corpori infixitur, & altissime inlidit. Sæpius igitur alia parte, quæ qua venit, hoc est, antrosum, sagitta educenda est: præsertim vbi spiculis cingitur, quæ magis laniant si retro, quam si contra trahant. Sed in ea petra via, caro diduci debet, ferramento ad similitudinem facto Græci literæ J. Item si ex alia parte vulnus aperit, laxius esse debet, quam vt telo postea transeunte ampliâctur. Deinde vbi apparuerit, si mucroni arundo inhaeret, propellenda est sagitta, donec ex altera parte apprehendi, & extrahi possit. Si iam illa, arundo in quam seu haustile decidit, solumq; intus ferrum est, mucro vel digitis apprehendi, vel forcipe, atque ita educi debet.
- E** Neq; alia ratio extrahendi est, vbi ab ea parte qua venit, hoc est, retro, euellere tibi consilium est. Nā nouacula, aut scalpello ampliari vulnere, quo facilius ea sequatur, quoq; minor phlegmone oriat: quæ maior quid sit, si ab illa ipsa sagitta dum redit, corpus laniatur: aut arundo si inest, euellenda est: aut si ea non est, ferrum ipsum. Porro eximere ferrum vel terebra inuersâ, in tubulum immisâ: vel forcipe, quæ dentes atque rotas radices euellunt: vel ferramento, quod a telo extrahendo *Blasphemia* Græci vocant, aut alio quopiam instrumento ad id accommodo. Nonnunquam enim carnes prius incidentes, si vulnus instrumentum haud recipit. Quod si spicula apparuerint, eaq; breuia & tenuia sunt, forcipe ibi comminui debent, vacuumque ab his telum educi. Aut si ea maiora valentioraq; sunt, fixis si rectoris calamis, vt libro septimo capite 5. *Celsus consilii*, contegenda sunt, ac ne quid lacerent, sic euellenda. Alii spicula ipsa forcipibus seu tenaculis, vt vocant, cancellatis apprehendunt, atque ita telum eximunt. Quod si telū spiculis vtroq; versum spectantib. cinctum in neutrâ partem sequat, iuxta ipsam alia inuisione patefaciendus locus est, nisi vena, aut tale aliquid impediât. Nā summa cura cauendum ne nervus,

Larum telum
quomodo
educenda.
Dioecia
Blasphemia.
Rotundum
telum ut
extrahatur.
Siqua.

vena maior, aut arteria incidatur. Quod si horum aliquid detectum fuerit, excipendum **A**. hamo retuso est, abducendumque scalpello. Vbi autem satis incisum est, ferrum vndique et explicatum modeste, ac sine ulla vulsione tollendum est. Quidam etiam spicula eiusmodi fixis calamis, seu exiguis arundinibus, prius conegunt, ne quid laceretur: deinde ita euellunt, ea scilicet parte, quae educationi magis congruere videbitur. Larum vero telum si conditum est, ab altera parte educi non expedit, ne ingenti vulnere, ipsi quoque ingens vulnus adiciamus. Euellendum ergo est genere quodam ferramenti, quod Dioecius **B** *Blasphemia* Graeci vocant, quoniam auctorem Liochem habet, quem inter praefatos maximosque Medicos fuisse memoriz proditum est. *Tertium* quoddam telorum genus est rotundum, aut angulosum, ut plumbea glans, lapis, aut simile aliquid, quod ex funda, aut bellicis tormentis mittitur, & perrupta cute in integrum in corpus desigritur, ac intus infidit. Tela autem huiusmodi inrus condita esse, his notis deprehendens. Moles aspera, atque inaequalis, si contrectetur, subesse sentitur. Plaga seu diuisio non omnino in rectum tendit, sed & maior etiam ac amplior apparet. Caro item confusa liuidaque, cernitur. Dolor praeterea cum grauitate quadam infestat. In omnibus his latius vulnus aperiendum, idque quod inest, ea qua venit, aut vnctis, aduersus scalpelli parte, aut vulnere specillo recipiendum est: aut denticulata forcipe, si fieri potest, & eam vulnus admittit, extrahendum. Quod si telum infixum se intus later, ut nullo modo repetiri queat, aut non satis commode extrahi, tantisper dimittendum est, donec natura ipsum protrudat, aut manifestet. Aut si telum aliquod infixum primis conatibus commode ac salubriter euelli non possit, sic eoque admittere debes, donec circumposita caro emarcescat, potest refecitque. Deinde intermissum opus aggredere, telum ipsum quod infixum est, modo **C** *huc*, modo illuc agitando, ac manibus vel forcipibus leuiter ipsum contorquendo, ita enim leuius multo ac facilius telum extrahes. Interdum vero tela infixa integra intus cicatrice obducto vulnere, citra aliquam noxam diu delituerunt. Post longiore temporis spacio, partem eam abcessu occupante ac disrupto exsiliere: quo facto vulnere statim ad sanitatem perducta sunt, ea illis curatione adhibita, quae illis debetur vulneribus, quamque iam docebimus. Atque haec tenes de indicatione ea diximus, quae a telorum sumitur differentiis. Nunc eam, quae laborantibus peritur sedibus, persequemur. Sedes autem in quas tela penetrarunt, vel caro sunt, vel ossa, vel articulus. Atque in his quidem partibus, vel alter telum infidit, vel in summo duntaxat haeret, vel saltem non admodum alte, & citra medium infixum est. Adhuc vel membrum vnum duntaxat telo ictum est, vel particulae plures simul confixae sunt, ita ut particula vnate- **D** *lo* traiecta, alteri affigatur. Quocirca si in summa carne telum impactum est, aut certe magnas venas, & loca neruola non transit, nihil melius est, quam qua venit id euellere. Similiter etiam quod alte infixum est, obiectae vero partes, id est, quae ex aduerso respondent, si conuoluerentur, vel ex sanguinis profusione, vel ex aliorum membrorum consensu, & confortii lege periculum inuebant, euulsione qua parte infixum est, eximi debet. Illud autem digitis, vel ipsius reli arundine, seu hastili, quod plerumque ligneum est, inferri tubulum immisso, extrahendum. In quibus vero alte telum in carne infixum est, & plus est, hoc est, longius spatium, per quod telo reuertendum, quam quod per- **E** *rum* pendum est, iamque venas neruosque id pertransiit: breuiter, cum parum admodum integrum carnis ex aduersa parte superest, neque aliquid obstat, quo minus contra mucronem incisio commode fieri possit, melius est aperire quod superest, eoque propulsatu telum educere. Nam & propius petitur, & tutius euellitur, & in maiori membro, si medium mucro transit, facilius sanescit quod peruium est, quia utrinque medicamentum fouetur. Protrudi autem debet vel hastili ipso, si inhaereat: vel si exciderit, propulsorio instrumento, cauo quidem vel solido, quod surdum quidam vocant, prout res exigit. Porro si telum acumen habeat: quod specillo deprehendimus, propulsorii instrumenti **F** *femina*: si vero tubulum seu concauitatem habuerit, marem demitremus, atque ita ferrum inserto instrumento protrudemus, quoad educi facillime possit. At si in opposita, seu vterius telum processerit, nec ea parte ipsum possit extrahi, qua infixum est, diuisis his quae opposita sunt, per illa ipsum eximemus, vel euellentes, *ut dictum est*: vel per eam partem inquam tendit, ut modo diximus, propellentes: summa cura, ut paulo ante monuimus, semper habita, ne vel neruum, vel tendinem, vel maiorem venam, aut arteriam inci-

Si telum in
opposita
pectetur.

Si telum offi
inest.

- A** incidamus. Si telum ossi inhaesit, non nisi attrahendo ipsum eximere tutum est. Eo autem usque, Cello loco supra citato attestante, donec is locus laxetur, qui mucronem mordit, & tum vel manu, vel forcipe telum extrahendum est. Quae ratio in dentibus quoque ejiciendi est: & vix unquam ita telum non sequitur, sed ubi morabitur, excuti quoque ictum aliquo ferramento poterit. Quidam tamen aculeis, ut vocant, seu forcipibus alligant arcum, quem vulgo balistam nominant: & laborante bene stabiliis, in insensum ipsius instrumenti neruum seu chordam remittunt, & ita telum extrahunt. Quod si telum altius in osse defuderit, quod cognoscimus, si firmiter id infixum nulli vi moueatur, aut labet: excisorio cultro, osse quod in iuxta est, exempto, aut etiam terebra, si crassum sit, prius perforato, telum ipsum extrahemus. Sunt qui ab eo foramine, quod Celsus faciendum esse suadet, terebra facto ad speciem literæ J contra telum os excidunt, sic ut literæ quæ diducuntur, ad telum spectent. Quoquidem facto, id necesse est labet, & facile auferatur. Quod remedium vltimum est. Alii terebra in rectum ac longum porrecta, quæ illis directa vocatur, ossis percussis rimas coniucentes, & telum infixum mordicus prehendentes, diducunt, atque ita facile quod infixum est, extrahunt. Inter duo a. ossa, si per ipsum articulum telum prorupit, circa vulnus duo membra, ita monente Cello, fasciis habenisve deliganda, & per has in diuersas partes diducenda sunt, vt tendones, ligamenta, & netuos distendant. Quibus extensis, laxius inter ossa spaciū est, vt sine difficultate telum tecipiat. Sed illud quoque videndum est, sicut supra aliquoties monuimus, ne quis neruus, aut vena, aut arteria a telo lædatur, dum extrahitur, eadem scilicet ratione quæ supra posita est. At si plures particulae confixæ fuerint, hoc est, si membrum aliquod telo traiectum, alteri affigatur, verbi causa, brachium thoraci, aut crura inter se, hoc modo faciendum est. Si non per totum vtrumque membrum penetret sagitta aut hasta, eam ab exteriore parte, petinde atque in vno fieri coniecit, apprehensam extrahemus. Sin penitus ambæ partes transfixæ fuerint, dimidia ligni parte terra ressecata, eas ligni partes quam facillimo fieri poterit modo, sigillatim euellamus. Porro si venenato quoque telo vulnus factum est, iisdem omnibus, si fieri potest, etiam festinanti actis, adicienda curatio est, quæ velepto veneno, vela serpente, vela quouis alio venenato animante istis adhiberi solet. Ceterum quod ad chirurgiam attinet, totam carnem, quæ veneno iam mutata est, siquidem fieri potest, præcidemus. Agnoscis autem eam, quod a sana carne admodum diuersa sit. Pallida enim supra modum, subhuida, & veluti mortua apparet. Sin carnem totam a veneno immutatam circumcidere non possis, haud alienum erit circa vulnus scalpello incidere, hoc est, scarificare, quo plus vitiatæ sanguinis extrahatur. Dein venenum ad mota vulnere cucurbitula, extrahendum est. Si cucurbitula non est, tum quodlibet simile vas, vitruum nimirum, aut tale aliquid, quod idem queat. Si ne id quidem est, quod tamen vix accidere potest, homo vilis aliquis adhibendus est, qui vulnus exsugat. Sed illud ante attendendum, ne is qui vulnus exsugit, aliquod in gingiuis, aut palato, alia ve oris parte vlcus habeat: hoc namque pacto & implectus erit, & tum hominem vulneratum præstabit. Si quidem venena, Cello lib. 5. c. 17. teste, non gustu, sed in vulnere nocet. Verum priusquam hæc aggrediamur, telum ipsum, vti docuimus, eximendum erit. Atque hætenus methodus de telis e corpore eximendis tradita est. Porro spinæ, piscium ossicula, lapides, vitri fragmenta, surculi, ossium frustula, aliaque pungentia & acuta, denticulatis forcipibus sunt euellenda, aut medicamentis ad hoc paratis & vitibus. Inter quæ hoc præstantissimum & efficacissimum esse putatur, quod recipit: *Fermenti, mellis optimi, propolis singulorum uncias tres. Pisti quærent, vnciam vnam. Ammoniæ, vnciam dimidiam. Olei, vnciam vnam cum dimidia.* Ex his omnibus conficiatur emplastrum, quod loco cui fixum intus inhaeret, superponatur. Radix etiam arundinis per se, *Dioscoride attestante*, concisa, aut cum melle contusa, & apposita, infixæ sine dolore extrahit. Sunt & pleraque alia præter iam dicta, quæ vim habent cuspidis & furculos extrahendi, & infixæ euellendi: cuiusmodi sunt *argyrolucha, anagallus, distamnus, sagapenum, oxyacanthus, narcissus, rana combusta, limasum carnes, & id genus alia.* Atque hæc de primo quod ad vulneris vntionem est maxime necessarium, dixisse satis sit: ad secundum ita nobis progrediendum erit. Secundum autem quod in curatione vulnerum necessarium est, vt dissidentes seu distantes partes coniungamus, id quod per orarum adductionem, seu labiorum vulneps inuicem distantium attractionem, & applicationem assequemur,

Si telum altius in osse defuderit.

Directa. Si telum in articulo sit, nec duo ossa demeretur.

Si plures particulae confixæ fuerint.

Si venenato quis telo idus est.

Medicamenta ad vulnera extrahenda accipienda.

Infixæ extraheantur.

Dissidentia coniungantur.

Valore sim
plic.

Cōmisiō
adherens.

Bifaciam
coniuncta
manet
quā com-
mittuntur.

Deligatur
tres modi
1. Agglu-
tatoria.

Spallio-
nis.

parrem ipsam lēsam quam fieri poterit lenissime tractando. Dissidentium namq; con-
iunctionem seu agglutinationem, necessārio praeceedit orarum adductio. Quae autem
inducta sunt, in idem adducuntur, *Gal. lib. 3. The. method. cap. 4. resse*, aut vinculo ex duobus
initis circumdato, aut sutura, aut fibulis, quas *Græci* *σύνει* vocant, impolitis, aut horum
quibusdam, aut omnibus. Quod si vulnus, ut supposuimus, simplex sit, hoc est, solum
continui in carne solutio, cum quo neq; affectus ullus, neq; syroptoma ullum addit, nec
valde magnum sit, sola fascia orbiculatim circumdanda, ductas parres committere opor-
tet. Ita enim vulnus proculdubio coibit, & citra aliquam aliam extrinsecus adhibitam
cutem coalescet. Huius autem coitionis & coalescentiae effectorix causa, sola natura est.
At si magnum vulnus sit, adeo ut ductae partes in totum, atq; exacte praedicta deliga-
tura committi oqueant, futuris ipsae adducuntur. Deinde vbi sic deligatur, aut futuris
adductae fuerint, glutinatio praesidius viemur, quae collectam humorum subluviē de-
siccare, & consumere queant: aliam vero ne influat, prohibere. Plaga vero ea sui potissimū
debet, quae in molli parte accepta est, maximeq; si discussa auris ima est, *ut lib. 3. c. 2. Cel-
sus ait*, vel imus nasus, vel frons, vel bucca, vel palpebra, vel labrum, vel circa guttur cutis,
vel venter: vix enim iis partibus deligaturam vulnus admittit. Si vero in carne vulnus est,
hiatq; neq; in vnum orae facile attrahent, futura quidem aliena est: imponendae v. fibu-
lae sunt, quae otas paulum tñ contrahunt, quo minus lara postea cicatrix sit: fere autem
fibulae laius esse patiuntur. Atq; hactenus docendo q. chirturgo in curando vulnere
ponitur, est, ut ductorum orae ita ut in vnum per adductionē coactae & commissae sunt, con-
seruentur, & maneat. Conseruabuntur a. opime huiusmodi extrema, quae in vñ co-
acta sunt, iisdem fere auxiliis, quib. & in idē adducta sunt, nempe, decenti ligatione, ap-
posito membri situ, & futuris, si necessitate videbunt. Porro butariam simul manent, &
agglutinantur, *Gal. lib. 3. The. method. cap. 4. resse*, quae commissae sunt: alia enim per se, alia
ope aliorum subsistunt ac manent. Per se quidem, quaecunq; secum con crescent, ac co-
alescunt: aliorū ope, ut ea quae colligantur, & gluino aliquo tenentur, ac quae cōcrescant
coalescant, omnino mollia naturaliter sunt oportet. Talis sine estum caro ipsa, tum
quaecunq; carnea ex ipsa constitutione sunt. Quaecunq; veto dura siccaq; sunt, eorum
diuisae partes coire simul nequeunt, alieoū enim retinuum nequaquam admittunt: sed
glutinum aliquod vinculumve, quo commissae maneat, requirūt. Nunc quomodo vul-
nus ligari conveniat, primum docebimus. Deligaturae autem modi seu differentiae tres
sunt. Vna dicta agglutinatoria, barbaris incarnatiua nominatur, recentibus iū vulnerib.
tum fracturis accommodatur. Debet autem fascia in hoc genere deligaturae a duobus
latis versus mediū eiusdem circumuolui, & principū deligaturae fieri ex parte aduersa
loci vulnerati, lucēdo atq; iniiciendo alterū fasciae principium versus partē superiorem
membri, alterū versus inferiorem. Ea veto latitudine esse debet fascia ipsa, *Celsus lib. 3.
cap. 26. attestante*, ut semel iniecta, non vulnus tantū, sed vsq; ad aliquid vtrinq; et oras
eius comprehendat, quātum videbitur necessariū. Si ab altera parte caro magis recessit,
ea melius attrahitur. Si quae ab utraq; transuerſa cōprehendēde oras debet: aut si id vul-
neris ratio non patitur, media primū iniicienda est, & rum in utramq; partem ducatur.
Ceterū arctior esse debet ligatura super locum lēsum, q̄ in partib. adiacentib. Cauendū
tamen semper est, ne vel nimis arcta, vel nimis laxa sit. Quando quidem quae laxior est,
non continet: quod autem non continetur, elabitur. Ad vero quod vehementius est
adstrictum, dolorem premendo excitat, & proinde fluxionem proritat, & pblegmo-
nem accersit, quandoque etiam gangranam. Danda igitur opera est, *ut Galenus lib. 6.
The. method. cap. 5. ait*, ut vitato iubarum incommodo, vtriusque fruamur commodo.
Id fiet, si quod nimium est declinabimus. Ergo nec adeo arctare deligaturam debebis,
ut iam comprimat: nec adeo remittere ut laxa sit. Porro extrema fasciae acu assuenda
sunt. Nam nodus, loquit loco citato Celsus, vulnus laedit nisi tamen longe est. Et si ne-
cessitas desideret, plures fasciae iniiciantur, & modo qui supra dictus est, reuoluantur.
Itaq; hoc deligandi modo vulneris labra ad auiusim committuntur: & quo minus circa
vulnus exciteret pblegmone, cuius rei in primis cura habenda, prohibetur. Haec de
prima ligaturae differentia. Secunda deligaturae differentia, expulſoria vocatur: ea an-
tiquis vlcetibus & sinibus, quos cauernosa vlcera nominant, proprie dicata est, hoc
enim

- A** enim commodi præstat in illis, quod a fundo ad os collectam humorum colluviem extrudit: & ne quid amplius in locum laborantem confluat, valde prohibet. Hæc autem sit, fascia ab altero râtum principio reuoluta, incipitque ab inferiore parte membri laborantis, ubi arctior esse debet. Ab hinc ad superiorem partem facta circumuoluntione, eam paulatim soluendo, dispensatur: si saltem os per quod sanies emanat, ad superiorem partem porrectum sit. Interdum enim inferius spectat. Per partem vero superiorem intellige eam, quæ versus cor, aut iecur, vasorum radice, spectat. Radicem autem vasû, *Galeno li. 5. The. method. cap. 3. teste*, priorem eas partem, quæ iecinori propior est, vel etiam cordi. Pars superior.
Radicis.
- B** sunt equalis crassitudinis, cuiusmodi sunt tibiz, sciindendo fasciam ipsam, singulo quoque palmi intervallo: & eam valide acu affuendo, ab ea parte maxime, quæ gibba est: laxe autem, a parte altera dorsali. Hoc autem genus deligaturæ vtilissimum est, ut diximus, in antiquis vlcibus, varicibus, & tibiæ inflammationibus. Tercium deligaturæ genus, retinens, eo quod medicamenta retineat, dictum, accommodatur membris in quibus arctatio fieri nequit. neque alla deligatura, ut in collo, & in ventre, atque in omnibus abscessibus, & affectibus dolorificis. Hæc perficitur linteolo seu fascia vnicum finem, seu caput habere: vel quæ sit multorum capitum seu brachiorum, prout res exigit. Atque eius deligaturæ principium, super laborantem locum iniicietur, & in parte opposita, vel nodus, vel potius sutura fiet. Talis autem deligatura leniter & citra doloris, quàm appetet
- C** tempus, solui debet. Quod si linteola nimis adhæreant, ea tantisper vino madefacito, donec facile separari possint: fascia vero ad vultus deligandum, linteo apertissima est, *Gal. lib. 3. Ther. method. cap. 4.* quæ nec nimium mollis, nec nimium dura sit. Quæ enim mollis nimium est, & algæ ritu fragilis, nõ tuto continet. Quæ vero dura nimis est, premendo offendit. Sit igitur ex panno vteri, non tamen nimis detrito, suavi, leni, & mundo. eaq; latitudine in longitudine, quam natura partis desiderat. Ut si humerus tibi deligandus sit, fasciam quæ latitudinem sex digitorum habeat, assumes. At si femur, quinq; si tibia quatuor: si brachium, trium digitorum. Si vero digitus ligari debeat, vnius digiti latitudine fascia assumenda erit. Eius vero longitudo sit, pro ratione numeri iniectionis, hoc est, pro necessitate resolutionum. Hactenus de modo deligandi. Nunc de qualitate & modo fandi. Triplex a. in vlcibus sutura fieri solet. Vna agglutinatoria, quam barbari incarnatiuam vocant, quæ vlcibus in molli parte acceptis competit, quorum labra sic dissident, ut sola deligatura in vnum adduci nequeant, & quibus nihil iam extraneum inter ipsas oras intercipitur. Sed & recentia esse debent vulnera, quibus hoc genus suturæ accommodatur: vel saltem si vetera fuerint, ac dura, callosa que labra habuerint, per scarificationem, aut cutis ablationem sanguine emissio, renouata. Hæc a. quinq; sit modis. *Primo* filo forti, æquali, & læui, cuiusmodi est sericum, in communibus. Sutura vuln-
erum tri-
plex.
Agglutina-
toria.
- D** saltem vulneribus, primum punctum faciendum, in medio diuisionis vulneris, deinde alterum in medio spacio vtriusq; lateris, & ita deinceps præcedendo, ut inter duo quæcumq; puncta, punctum intercedat, donec vulneris labra rite commissa fuerint. Itaque neq; nimis rara, neq; nimis crebra sutura esse debet. Si enim nimis rara est, non continet: si nimis crebra est, vehementer afficit. Quia quo sæpius acus corpus transiit, quoque plura loca iniectionis vinculum mordet, eo maiores phlegmones, *Celsi libro 5. capite 26. attestante*, oriuntur. Sic igitur sutura oras iungat, ut ne ipsæ quidem inter se ex toto contingant: quo scilicet, si quid intus humoris concreuerit, sit qua emanare, ac effluere possit. Solent autem communiter vnius digiti transversum spatium inter iniecta vincula relinquere. Porro acus longa ac lævis esto, cuspidem triangulari: cauda vero excavata, ut in ea filum recondatur, & transitum acus non remoretur. Ceterum cannula habeatur fenestrata, cui incumbat ac innitatur altera pars labii vulneris, ne scilicet huc arque illuc eungetur, dum acus intermittitur: & ut per fenestellam videri possit, quando acus pertransierit.
- E** Atque ubi iam acus traiecta fuerit, vna cum filo trahatur: sed inrerim vulneris labrum, quod prope filum est, specillo huic parti applicato, veluti fulcimento & adminiculo innitatur, ne dum filum extrahitur, labrum etiam consequatur. Legitur autem primo duabus inuolutionibus, secundo vna duntaxat, deinde filum scindatur aliquantulum remota a nodo. Secundo, sit futura agglutinatoria acubus, aut pino: cum acu introdu-
- F** cta. Hac autem vtimur in magnis vulneribus, & profundis, in quibus labra plurimum

244 Operum Leonhardi Fuchſij Pars III.

inter ſe diſtant. Atque tot numero acus imponendæ ſunt, cum filo in eas intro miſſo, quot neceſſariæ videbuntur. Filum autem circa eas remouendum eſt, eo modo quo mulierculæ facere ſolent, dum ſuas acus ſuper manicas aut capitula aſſeruant: arque hoc modo relinquuntur vſque ad vulneris coaleſcentiam. *Tertio* modo, ſit futura agglutinatoria diſta, ut vnculis æqualibus ex ſtupis vehementer contortis, & gracilibus, ad modum ſcriptorii calami, vel feſtucæ, longitudine ſere medi digiti. Quod ſi viciſſim ſuturam longo tempore perdurare, pinna ſeu ſcripſorius calamus, loco ſtuparum aſſumi debet: ſit autem ad hunc modum. Vtraque vulneris ora ita iungi debet, ac ſilum ducente. Deinde factò per idem foramen reſuſu, ex ea parte qua veneras, recipienda eſt: ſic quidem, ut anſa vna remaneat ex parte qua tomeauit. In qua alterum veruculi extremum imponendum erit. Poſtea fines amborum ſilorum, eaput nimirum & tedeuntis conſtingito, & ſuper alterum veruculi caput ligaturam facito, ibique ſilareſcindito, & veruculum hoc pacto vſque ad perfectam vulneris coitionem relinquito. *Quarto*, agglutinatoria ſutura ſit ſibulis, diſtinctas atque hiantes vulneris oras compoſuſcentibus. Sinto autem ſibulæ ipſæ vel maiores, vel minores, pro ratione partis vulneratæ: ab utraque vero parte recuræ, ſigaturque hamus vnus in altero vulneris labro, & verſus alterum ducatur, in quo & alter hamus inſigatur, ut facere ſolent qui pannos iundendo apparant. Hæ autem ſibulæ, quibus hiantis vulneris oras ſic conſtahimus, nullam vim deſiderant, ſed eatenus viles ſunt, quatenus cutis ducentem quaſi ſua ſponte ſubſequitur. *Quinto* modo, deductæ vulneris oræ compoſuſcentur, pannis vtrinq; admodis, qui figuram triangularem teſerant, & ea ſint magnitudine, quæ membro læſo congruere videatur. *Qui* ſuturæ modus in iis maxime locis conuenit, in quibus volumus cicatrices factæ vulneris agglutinatione, non apparere, ut in facie. Panni autem eiulmodi, viſcoſo linimento, ac pertinaciter adhzrente obſiti debent, quod recipiat vulnerem ſanguinis dtaconis, thuris, & maſtiches, ſarcocollam, picem, & poſſinem, id eſt, ſatinam volatilem molenariam. Quæ omnia cum candido ouiliquore ſubigi debent, & in vnitatem redigi. Atque vbi linimenti formam eam induerint, ſupra dictos pannos extendi debent: qui vtrinq; poſtea ad latera vulneris, ad pollicis vnus diſtantiam ſupra vulneratam partem agglutinandi ſunt. Vbi autem hæc panni fruſtula ſic linimento oblita deſiccata fuerint, ingenioſe, & ut oportet, conſui debent. *Quo* factò vulneris labra coibunt, & agglutinabuntur. Altera ſutura ſanguinem ſupprimens, vel ſuppreſſoria ſanguinis, ſit ac ſilum trahente, traiectis oris vulneris vtrique per modum reuolutionis, uti pelles conſui ſolent. Ea autem vtiſſima, quando alia non datur vti, propter magnum prorumpentis ſanguinis impetum, accepto in venis vulnere. Sed & hæc vtilis eſt ad tranſeunda inteſtina, quum ſauciata ſunt: ad membranas quoque vulneratas, & loca carne deſtituta. Vtrum non admodum tutus eſt hic conſuendi modus. Quandoquidem diſrupto puncto vno, cetera relaxantur. Sutura tertia labiorum in vnum adductorum coſeruatrix, ſit ut reliquæ, verum non æque arcta eſſe debet. Eo enim duntaxat nomine ſit, ut ſimul maneat, quæ commiſſa ſunt, taſtiſper dum vulnus coaleuerit. Competit autem huiusmodi ſutura vulneribus in carne, aut molli parte acceptis, in quibus magna facta eſt dilaceratio, & carnis amiſſio. Hac enim factò vniionis diuorſo, ſeiuſcunt partes in vnum adducuntur, quo citius coaleſcant. His etiam vulneribus recte accommodatur, e quibus in poſterum aliquid extrahendum eſt. Illud autem de ſuturis ac ſibulis in vniuerſum diligenter obſeruandum eſt, ut illis nunquã vramur, ante quam vulnus intus purgatum ſit: niſi quum magna ſanguinis profuſio ſupprimenda eſt, ne quid ibi concreuiſſi ſanguinis teliſquatur. Id enim & in pus vertitur, & phlegmonem mouet, & glutinari vulnus prohibet. Sed ne linimentum quidẽ, quod ſupprimendi ſanguinis cauſa inſerendum eſt, inibi reſtinuendum eſt: nam id quoque inflammatur. Comprehenſi vero ſutura vel ſibula, non curem tantum, ſed aliquid etiã ex carne, vbi ſuberit hæc, oportebit, quo valentius inhzreat, neque cutẽ abrumpar. Vtraque optima eſt, *Ceſſo loco ſaſe citato aſſeſſi ſite*, ex acia molli, non nimis torta, quo mitius corpori inſidat. Sed neque rara nimis, neque nimis crebra, ob ſuperius adductas rationes, ſutura aut ſibula inſicienda eſt. Neutrã etiã vim vllã deſiderat, ſed eatenus vtilis eſt, qua cutis ducentem quaſi ſua ſponte ſubſequitur. Ceterum tunc appetit tempus remouendæ ſuturæ, quũ ea, quæ deſideramus effectum præſtiterit. Modus autem remouendæ talis eſt. Specilli caudam, id eſt, anguſtum muſtronẽ, filo ſupponito, ſilumque

Tercia.

Quartus.

Quintus.

Poliſis.
Poliſe quid:

Suturæ mo-
dus ſecundus

Suturæ mo-
dus tertius.

Tempus re-
mouendæ
ſuturæ.
Modus.

F

- A** filumque ipsum mox abscondito. Postea latum ipsius specilli muerone, labro vulneris per quod filum educitur, superponito. Ita enim pulcre vitabis, ne quid filum euellendo laceretur. Porro locus nunc exigit ut de puluillis, qui vulgaribus chirurgis plumaceoli, Germanis *Wetzel* nominantur, aliquid obiter dicamus: hi enim ad multa utiles sunt, quandoquidem dissolutas ac diductas partes fulciunt & comprimunt: partis quae unionis diuortium paritur, natiuum calorem fouent, & conseruant. Denique a graui molestoque vinculorum ac fasciarum pondere, vulnerata particulam tuentur. Fieri autem quomodo solebat ex pluma inter duos pannos candidos & mundos confuta, unde & nomen illi a veteribus inditum est. Verum quoniam eos subinde murare, & innouare, quod valde molestum erat, congebat necessitas, magis postea placuit eiusmodi puluillos ex stupis canabinis conficere, praesertim diligenter ac studiose pexis, emundatisque. Fiant etiam interdum ex lana vel xylo, quod cotoneum appellant. Perique, a. hodie loco puluillorum, panniculos admovent laeues, id est, non asperos, duplicatos, aut triplicatos: alii vero spongiam adaptant. Porro duo, vel tres, pluresve, prout res exoptulat, apponuntur. Quandoque quidem sicci, ac nullo madentes liquore: nonnunquam vero imbuntur oui candido, vel vino, vel posca: aliquoties etiam oleo, per affectus ratione. Inueniuntur autem huiusmodi puluilli triplicem obtinere figuram. Alii enim triangulari, alii rotunda, alii vero quadrata habent. Qui figura constant triangulari, glutinandis vulneribus sunt dicati. Ita vero disponi debent. Vnus ex utroque latere orarum seu laborum vulneris constituitur, ita ut super plagam inter se iungantur lateribus. Qui rotundam habent figuram, sicci aliis superponuntur, natiui caloris particulam laesae conseruandi gratia, & ut saniosam pluiem, ac sordidos ichores in se recipiant. Sed qui quadrati sunt, ideo apponuntur, ut partem laesam a fasciarum & vinculorum iniuriis vendicent. Sunt autem penicilla, & linamenta, turundas barbari ac receptas vocant, maximo usus in curandis vulneribus: proinde ut de iis, quoque hoc loco aliquid dicamus, necesse erit. Vitur autem illis octo modis. *Primo*, quum vulnera vel amplianda sunt, vel detergenda, vel quum aliquid ab eorum fundo vacuandum est: ut in profundis vulneribus, in quibus necesse est alibi vulnus aperire, ut ex fundo, & sinu ipsius ichores, hoc est, saniosque colluuias, inibi collecti vacuentur. *Secundo*, illis cogimur ut in cauis vulneribus, in quibus necessaria est carnis assisae recuperatio. *Tertio*, in vulneribus ab aere alteratis, & sordidis, quae deterfione egent. *Quarto*, in vulneribus contusis. *Quinto*, in vulneribus quae cum phlegmone, aut quouis alio tumore praeter naturam fatigant. *Sexto*, in vulneribus quae per mortuus fiunt. Talia namque vulnera non sunt festinante agglutinanda, & ad cicatricem perducenda. *Quin* potius longo tempore aperta, & hiantia manere debent. Omnis enim ferax mortuus, ut testis est lib. 5. cap. 27. Celsus, quoddam virus habet, quod foras semper euocandum est, non intro repellendum, nec occluso vulnere intus relinquendum. Sed de iis fufius suo dicemus infra loco. *Septimo*, penicillis & linamentis vitur vulneribus, in quibus persanandis circa ossa manus admouenda est. *Octauo*, in vulneribus quae iam vetustate in vicera defluxionibus scaturientia degenerauerunt. In omnibus vero aliis vulneribus inducendae cicatricis studemus, absque linamentis. Animaduertendum a. est, in iis non exiguum esse diuersitatem pro ratione finis, propter quem admoventur. Fiant enim interdum ad detergendas, ut comprehendimus est, vulnere sordes. Atque tum ex panni non asperi, & praesertim veteris laciniis, vel floccis euulsis formantur. Nonnunquam vero ideo in vulnus immittuntur, ut ipsum hians & aperitum maneat. Ac tunc quidem ex stupis bene pexis, & a sordibus recte emundatis, vel ex praedicti panni frustulis efformantur: vel etiam ex xylo, *cotton* Latini vocant. Sed & ex canna znea, vel argentea perforata fiunt penicilli ad eundem finem: ut verbi gratia, in naribus ad aeris inspirationem: & in altis vulneribus ut sanies, & purulenta colluuii, per hanc velut emissarium fectat, & foras egrediatur, non autem intus retineatur. Quandoque etiam linamenta & penicilla vulneribus inserunt, ut ipsos magis deliniscat, & amplietur: fiuntque; tunc ex spongiolis vehementer compressis, & intortis, aut ex radice gentiana. Haec enim dum multum humorem, quo scaturit vulnus, combiberint, turgescunt, & ita magis hians vulnus reddunt. Ceterum forma linamentorum aequalis esse debet, penicillorum vero inaequalis, in modum clauiculi lignei, quem Latini *impagum* vocant, ne scilicet intro labantur. Haec autem aliquoties quidem sicca, quandoque vero quopiam delibuta vnguento admoventur, prout res ipsa exigit. *Quarto*, quod in curando simpliciter

246 Operum Leonhardi Fuchsi Pars III.

vulnere medico proponitur, est vt lxx partis substantiâ conferuet, ac prohibeat ne ipsa dolore, vel phlegmone, aut aliquo alio prauo symptomate, quod vulneribus accidere solet, infestetur. Hunc autem scopum assequimur, ad motis emplastris, & linimentis ex olei candido, & aliis huiusmodi refrigerantibus vt est ceratum liquidum, *Galenus lib. 6. ca. 5. testr.* primis saltem diebus factis. Postea vero vino adstringente particula perfundenda, & figura aptissima colloquenda est. Talis autem est, *Galenus loco iam citato attestante*, quæ maxime dolore abest, & in qua æger diu immotus perleuare potest. Aperio quoque, & ea interdum ex aduerso in vulnerata parte molienda est. Necessaria etiam nonnunquam sanguinis missio, item & purgatio, *vt mox docebitur*. Omnia autem recens factio vulnere, nisi in ventre sit, ex ipso statim, *Hippocrate in libro De vlcibus, & Galenus lib. 4. Ther. meth. cap. 6. testibus*, sanguinem plus minusve effluere expedit. Quippe hoc modo phlegmone minus tentabitur tum vlcus ipsum, tum quæ circumposita loca sunt. Quum itaque medicum imitorem esse oporteat non naturæ solum, quod Hippocrates monet, sed etiam eorum quæ quum sua sponte eueniant, conferunt: in recenter autem acceptis vulneribus, præsertim magnis, & præualidis, expedit sanguinem effluere: hic certe si minime, vel minus quam par est effluxit, quod deest, ipsi adiciis oportet, sanguinem scilicet ex vena detrahendo. Trisariam autem vulnera, vt & reliqua omnia vitia, magna grauique, *Galenus ubi supra capite sexto teste*, redduntur: nempe vel propter laborantis partis præstantiam, vel propter affectus magnitudinē, vel propterea quæ sunt cacoethe, i. maligna: cuiusmodi sunt omnia in articulis accepta vulnera. Hæc enim doloris, vigiliæ, contusionis, & delirii periculum adferunt: quod scilicet ibi tendones, & nervi, & carne vacua atque ossa loca sunt. Vulneris igitur magnitudo, vna cum virium robore, mittendum sanguinem indicat: quanquam qui vulneratus est, prorsus redundantem sanguinis expers sit. Sanguis vero in recentibus & nuper acceptis vulneribus, nõ solum ne pars læsa, aut circumposita loca, aut comprehensum est, phlegmone tentetur: sed vt impetum quoque ruentis sanguinis cohibeamus, & nimium profusuum impediamus, detrahatur. Hi enim præcipui sunt mittendi sanguinis in recenter illatis vulneribus scopi. Ceterum si perpetuum est, quod ab Hippocrate didicimus, incipientem fluxionem ad contraria trahendam reuellendamve esse: si xum vero iam in laborante particula vacuandum esse, vel ab ipsa particula quæ affligitur, vela maxime viciosa: in promptu nobis & de sanguinis detractione colligere nunc est, quod in principio hæc longinquo, postea ex ipsis ulceratis partibus, *vt lib. 13. Ther. method. cap. 6. & lib. 3. ad Glauconem, & cap. 19. libri De curandi ratione per sanguinis missionem Galenus fusiim docet*. Quid autem per longinqua intelligendum veniat, & quando ex longinquis, & quando ex maxime longinquis sit mittendus sanguis, alibi luculenter exposuimus. Modum vero seu quantitatem vacationis, tunc ex redundantem modo, tum ex copia sanguinis quæ vulnere effluxit, inuenire oportet. At hæc ex ætate, natura, tempore anni, regione, & consuetudine, & antea hæc ex ipsa laborantis virtute. Qualis a vena secanda sit, ex laborante particula discitur. Si enim vulnus in capite, collo aut facie acceptum sit, humeralis in gibbero, vel manu secanda est. Si vero patet collo inferiores vique ad renes & vmbilicū vulnerata sunt, interiorē quæ vulgus medicorum basilicā vocat, incidere vtile est. Quod si vero partes quæ renibus inferiores sunt vulnerata fuerint, quæ venæ per poplites aut malleolos decurrunt secandæ erunt. Ac perpetuo quidem in omnibus siue reuellere, siue vacuare volueris, vena quæ directio est, & cum laborante parte reditudinem habet, incidenda erit, *vt a nobis copiosissime in commentariis, quos in libellum Gal. de Curandi ratione per sanguinis missionem excarnimus, monstratum est*. Porro si vulneratus alio adstricta fuerit, ea indurata glande, aut iniecto clystere subducenda est: vel casia fistulari, aut manna, aut oxyphenico, aut aliquo eiusmodi leniente medicamento deuorato, citanda. Quod si vero vixio in vulnerato corpore subsit redundantia, vel vulnus præualidum sit, puro etiamnum existēte corpore, & cacoehymia experte, iam dictis leuibus auxiliis nequaquam contentus eris, sed fortioribus pharmacis purgationem per aluum molieris. His autem præsertim vulneribus, *Hippocrate in libro de vlcibus teste*, quæ in capite sunt accepta, item quæ in ventre & articulis, purgatio per aluum vtilis est. Præterea in iis quæ fiuntur, & exeduntur, & quæ serpunt, & reliquis quæ vlcera diuturna reddunt, etiam quæcunque deliganda sunt: hoc est, adeo magna

De sanguinis in vulneribus missio.

Vulnera trisariam magna.

Modum vacationis.

Interior vena.

Depurgatione in vulneribus molienda.

A magna sunt, ut futuris indigeant, aut si non his, cetera deligantur. Purgatio itaque, ut attestatur libro quarto Ther. method. cap. 6. Galenus, vulneribus duabus potissimum de causis suscipitur, nempe vel propter redundantiam alterius cuiuspiam humoris, vel propter vim morbi. Ceterum portiones vulnerariz ex symphyto geranis quibusdam plantagine, lycopli, sanguisorba, fanicula dicta, pede leonis, ophioglossa, bistorra que appellatur hodie herbis, & id genus aliis confectum commodissime exhibentur, quoniam ipse est certa, circa alia auxilia has posse vulnera glutinare. Postremum & quintum, quod in curatione vulnerum est observandum, videtur ratio existit. Vulnera scilicet, primis septi diebus, intra quos ut plurimum a febre & phlegmone securi esse solent, victus tenuis, & parvus, frigidus quoque & humidus, præsertim si iuvenes & plethorici fuerint, atque ambiens aer calidus, præscribendus erit. A carnibus duris, & valentibus magnis piscibus, & primum succum generantibus, pane non fermentato, male subactis, & improbe coctis, eos arceto. Allia, cepas, sinapi, salita, & acrida omnia ne gustent vulnerati. Perdicibus, pullis gallinatum, auculis, & id genus aliis concoctis facilibus, & bonum sanguinem procreantibus vescantur. Ex oleribus lactuca, portulaca, & boragine. Vini vias omnibus usque ad septimum interdictus esto: nisi ex largo sanguinis profusio, viribus destituti fuerint. Tunc enim ante ullam curationem vino reficiendi sunt. Transacto autem die septimo illis, si nihil aliud obstitit, eitra noxam vinum modicum, & aqua multa dilutum, exhiberi potest. Nam si ad hunc usque diem nec phlegmone tententur, nec dolore afficiantur, in posterum iuti erunt. Aquam in qua parum cinnamomi coctum sic iniecit tempore bibant. Breui & frugali coena utantur. Ut quiescant iubeo. Optimum enim illis medicamentum quies est, moveri vero & ambulare alienum, iis potissimum qui in inferioribus partibus vulnus acceperunt. Venerem sum mope vulnerati fugiant. Iræ item, contentiionem, & omnes vehementes animi motus. Ceterum ubi vulneratus a phlegmone fuerit assertus, plenior e victu uti potest. Ut atar igitur tunc generosiore aliquo vino, & carnibus probum succum generantibus, ac vires refocillantibus. Atque hæc tenus vulnera id uniuersum curationem prolixius etiam tradidimus, ut scilicet ulcerum generalem curationem eo breuius subinde sequenti libro nobis tractare liceat.

De portione vulnerariz.

Victus ratio.

D De vulneribus magnis in superficie acceptis, & minime profundis.

CAP. II.

Horum vulnorum causæ ex ægri relatione parebunt. Notis ad dignotionem nullis opus est: oculis enim intueri possunt. In horum autem curatione hoc in primis attendendum, ut sanguinis in primis profusio inhibeatur. Quod si nec tum facit idem est, ubi moderatus aque assatim effunditur. Moderata namque sanguinis ex receniter accepto vulnere vacuatio, non parum sæpe multis profuit: quandoquidem & phlegmonas, & obstructions, & febrem subinde fieri prohibuit. Quæ quidem symptomata vulneribus, nisi diligenter providearis, superuenire, ipsiusque agglutinationem & curationem magnopere impedire consueverunt. Atque hoc est Hippocratis in libella De videribus præceptum, quod & a Gallo lib. 4. Ther. method. cap. 5. & relectur & approbat. Fit enim, inquit Hippocrates, effluens sanguine vulnus siccat, proinde sanum. Quod si vero tantus fuerit roentis sanguinis impetus, ut cum iis que sistendo sanguini in vulneribus admoveri solent, cohiberi nequeat, iis suppressendus remediis erit, quæ in capite De venarum vulneribus postea dicemus. Deinde prædictorum vulnorum oræ sola deligantur, vinculo scilicet, ut Galenus lib. 3. Ther. method. cap. 4. interpretatur, ex duobus iniunctis circumdato, nec adduci, nec committi possunt, futura autem fibulis coniungendæ erunt. Atque hæc sola partium dissidentium coniunctione vulnus glutinatur. Sunt tamen hodie, qui in hoc agglutinando vulnere, hoc videntur pulvere quem laborum vulneris agglutinatium, & futuræ conservatium nominant. Recipit boli armenij, terra lemnia singulorum drach. sex. Thuris, mastiches, serrocalle, singulorum drach. duas & dimidiam. Atyrrha, aloes, singulorum drach. unam & dimidiam. Tragacanthæ pistæ, sanguinis draconis, singulorum drach. unam. Farinæ hordei, & fabarum singulorum drach. dimidia. Vtrum interim vnicuique cauendum erit, ne vel pilus, vel oleum, vel quidpiam aliud in medio adductorum laborum vulneris interuenierit. Nam tunc eiusmodi vulnus sola dissidentium partium coniunctione glutinari non potest. Hæc enim quæ ita interiacent, Galenus etiam lib. 3. Therapeutica method. c. 4. attestant.

Causæ, Signa, Causæ;

Pulsus etiam vulneris aptus.

Cauendum ne quid inter vulneris partes accedat.

248. Operum Leonhard. Fuchsi Pars III.

iam unionem dissepunt, & earum quæ copulandæ sunt partium coalitum impediunt. ^A
Ex prædictis vero singula cum oui candido liquore agitari possunt, donec in corpus v-
num coeant, quod glutinis instar lentescat. Postea vero stupis leuibus excipiendū erit
medicamentum, & ita vulnere admoendum: supra quod & alix stupæ solo oui candi-
do imbutæ, & intra pannum lineum eodem madefactum liquore inuolutæ, apponendæ
sunt. Sed & supra vulnus nulla alia intercedente materia, pannus aliquis tenuis prædicto
imbutus liquore, admoueri debet, ne scilicet dum remouentur stupæ, futura iam facta
puncta abrum pant, aut dilacerent. Quod si etiam loca adiacentia vulnere tofaceo inun-
gantur, leçsam particulam ita a dolore & phlegmone vindicabis. Ceterum quæ cruento
vulnere primum apposita sunt, ante diem tertium, aut quartum remoueri non debent, ^B
nisi forte dolor aliquis vehemens superueniat, aut symptomata aliquod molestum in-
cidat. Porro si post quartum diem transactum vulnus nō coalescit, vino aliquo adstrin-
gente, eoque calente ablendum erit. Deinde stupæ prædicto vino imbutæ & expressæ,
supra vulnus ipsum apponendæ & alligandæ erunt, quas & quotidie mutare oportebit.
Intra enim dies paucos hoc modo vulnus agglutinabitur, & persanabitur. Recte itaq;
& decenter primo pulvis prædictis cum candido ouorum liquore adhibetur. Hic enim
& sanguinis profluium infrenat, atq; inhibet, dolorem sedat, & phlegmonem creari
vetat. Quod vero vinum omnis vulneris, qua vulnus est, optimum medicamentum sit,
Galenus *secundo paulo ante citato, & lib. 4. Ther. meth. cap. 5.* luculenter admodum ostendit.
Quippe vulnus omne, qua vulnus est, siccari atque adstringi desiderat. Atqui vinum
subauilicetum & adstringens, hæc duo commoda præstat vulnere: igitur optimum eius ^C
medicamentum. Vulnere itaq; ut Hippocrates etiam in lib. de Vlceribus docet, madefacere,
& abluere vino oportet. Post quam (ane abluentione infra scriptum puluerem, qui effi-
cax est, inspergere vulnere oportet. Recipit myrrha, drach. tres. Aloes hepatica, drachmas
quatuor. Thurū, drachmas duas. Miscantur, & fiat pulvis.

*De vulnere profundo, & recondito, citra amissionem substantia, in carne
accepto. CAP. III.*

Vulnus quod in profundum penetrat, & reconditum est, futura & decenti deligatu-
ra subinde curationem recipit. Si vero hoc modo curari non pōt, propterea quod
partes quæ diuisæ sunt, exacte ad unum vsq; ob nimiam diuisionis profunditatem, ^D
sibi coniungi nequeant: vel potius, quia in fundo collectæ sūt sanies, aut pus, cui nullus
pateat effluxus, ipsum per effluxionem, Galeni sequentes consilium, curabimus. Ipsum
autem effluxionem, tum ex eiusdem, tum ex contrarii loci diuisione, & sive seu figura
partis accommoda moliemur. Porro situm partis vulneratæ accommodum, seu con-
gruentem situs figuram intellige, qua vulneris hiatus & orificium semper deorsum spe-
ctat, fundū v. sursum ita vt sanies ex ipso vulnere ptona & libere effluat. Proinde si vul-
neris figura non ad superiora, sed ima potius vergit, nec futura, nec sibilis, nec deligatu-
ra, partes diuisas ad amissum cōmitti, et sibi applicari possint, atq; in profundo listæ
sanies: nisi ptius ad effluxū vitati hūmoris sectionem feceris, nihil vnquam proficies, siue ^E
carnem generare, siue agglutinare volueris. Vbi vero conuenientem positionis figuram
vulnus in laborante parte seruauerit, siue id ex natura vulneris, siue de industria contin-
gat, sectione noua opus non est, ut lib. 2. ad Glaucomem, cap. 14. Galenus copiosius docet. Verbi
gratia, si in coxa figura sinus ad ima vergit, & sinus ipse versus genn terminatur, os vero
altius, circa mediā nimirū femoris regionem cōsistit, molle ceruical poplini laborantis
subiiciendū, vt inferiorem sūrum habeat inguen, q̄ genu. Hac enim cōueniente positio-
nis figura in ista parte obseruata, facile per os sanies & purulenta colluies elabunt, &
effluunt. Quod si igitur hac conuenienti situs figura, laborans particula collocari non
possit, nec ex vulnere ipso sanies elabi, ex aduerso sectio molēda erit, vt scilicet illi efflu-
xus pateat. Effluxus v. molendi duplicem rationem, Galenus lib. 3. Ther. method. ca. ult. ^F
esse tradit: alias scilicet tota cauitate dissecta, alias in fundo tantum aperta. Quando vero
harum alterutra sit ineunda, docebit tum locorū ipsorum natura, tum v. vlcis magni-
tudo. Si namq; ea loca dubiam, seu fallacem, ac periculosa sectionem faciant, & vlcus
magnum fuerit, in fundo aperire magis expedit. Sin contra se habeant, præcindere seu
diuidere præstat. Deligatio vero eius incipiat quidem, vt dictum est, supetne, finiatur
infra,

Crustis vul-
neribus ad-
moens qui
do remo-
uenda.

Vini vice-
rib. & vul-
neribus op-
timam.

Pulvis opel-
mas.

Vulnus
quod per
effluxionem
curandum.

Sectione in
parte op-
posita qui
do sanies
da.

Effluxus
molendi
duplicem
rationem.

A ubi scilicet patet effluxus. Sectione etiam facta, aliquod medicamentum reputans leui stupra, aut panno exceptum imponi potest, & bis die mutari.

De cauo vulnere. C. A. P. IV.

IN cauo vulnere non modo ipsa petitur cuticula, quam Græci *σφελή* vocant, verum etiam relique cutis suppositæ natura vniuersa, & lubicetæ carnis portio aliquando nõ exigua. Quo fit, vt geminus in co curandi finis sit propositus, *Gale lib. 3. Ther. method. ca. 2. attestante*, vnio scilicet, & impletio: sicuti etiam duplex est affectus, nempe vulnus, quod est vitæ solutio, & cauitas, quæ ex amissa aliqua animalis propria substantia est contrahita. Proinde continui diuortium vnitioem, cauitas repletionem desiderat. Verum enimvero quoniam in proposito vulnere vnire, quæ dissident, non possumus, nisi prius cauitatem impleuerimus, ordinem curationis a cauitatis impletione ordiri necesse est. Particulares autem indicationes, ex quibus inuenire licet quæ cauitatem vulneris impleat, sunt quatuor. *Prima*, ex ipsius vulnetis substantia sumpta, nobis insinuat carnem eandem specie cum ea quæ petit regnendam esse. Inpleti enim non poterit quod cauum est, nisi substantia omnino similis ei quæ petit regnatur. Atqui carnis gignendæ materia languis bonus est, *Galenus libro iam citato cap. 3. testis*: opifex vero, seu effectrix cauitas, ipsa natura. Erit autem sanguis qui influit, & ex quo regnenda caro primordium habeat, bonus, si nec qualitate, nec quantitate vitiosus fuerit. Sed necessitas etiam hoc loco fuerit naturam dixisse, nisi etiam quorum natura, sit adiectum, & ubi. Constat itaque subiectorum corporum, quibus superinduci debet caro, naturam ipsam gignendæ carnis opificem esse. Opificis autem rationem natura subiectarum partium, quibus restituenda est caro, habere non poterit, nisi iustum & minime vitiatum calidi, frigidi, humidum, & seci temperamentum obuiat: si quidem ex horum temperatuta, cuiusque corporis natura consistat. In omni igitur cauo vulnere, duo illa primùm sunt consideranda: nempe quod subiectum est, iustane temperie sit, id est, an secundum naturam se habeat: & præterea sanguis qui influit, bonus ne, an modicus sit. Fingimus igitur & sanguinem esse partem subiectam, atque afflictam: & sanguinis confluxum citra vllum vel in qualitate, vel quantitate vitium. Porro his ita se habentibus, nihil est præterea quod obliet, quo minus prima carnis generatio prospere contingat, idque nullus externi medicamenti ope. Quippe causis ambabus vnde nascitur præsentibus, nulloque extrinsecus quod impediatur obstante, non potest prohiberi carnis generatio. Verum in ipsa primæ generationis generatione duplex provenire excrementum necesse est: alterum quidem crassius, alterum vero tenuius. Quod in vulneribus tenuius est, Græci *λεῖον* Latini *sanies* nominantur. Quod vero crassum est, *σφοδρὸν*. Ac ex tenui quidem excremento, vulnus humidum redditur: ex crasso, sordidum. Eoque duplicibus medicamentis eget, vtiq; vt humidum sit, siccantibus: vt sordidum, expurgantibus. Ergo quum nullo vnaquæ tempore natura cesset, certe nec tempus vllum erit, in quo nõ ambo hæc in cauo vulnere colligant. Quare nec tempus vllum erit, in quo non vtrunq; medicamenti genus desideretur: vtiq; quod siccat, & quod expuret. Verum non satis adhuc fuerit, cuiusmodi quidem genere esse medicamentum debeat, inuenisse: sed & species aliqua inuenienda est, quæ iustumodi vulnere sit commoda, & statuto ordine graduve circumscripta, vt carnem producere possit. Quippe quod super hunc fuerit, ita vt non modo humoris qui influit, redundantiam consumat, sed etiam affluentem sanguinem populet: id refici carnem, ceu materiæ eius absumens, prohibebit. Proinde præleni negotio aptissima sunt, *thuris lachryma, hordeacea, & fabacea, & erui farina*. Item *iris, aristolochia, cadmia, panax, & pampulyx*, quæ vulgo *zuzia* dicitur. Omnia vero hæc tum maioris minorisve discrimine inter se dissident: tum alia eorum simplices qualitates vincentes habent, alia compositas. Siquidem *aristolochia* & *panax*, tum ceteris plus siccant, tum natura magis calcat. *Hordeacea*, fabarumque farina, multo his minus siccant, nec vllum calorem obtinent. Tiusimo dicitur calcat, minus tamen illis siccant, adeo vt quædam corporum naturas omnino non siccet. *Erui farina, & iris, horu atq; aristolochia, & panax, medium locum tenent, vt loco paulo ante citato Galenus salsus monstrat*. Alia indicauo curandi caui vlcetis, tum ex totius corporis, tum ex partium elaborantis temperamento sumpta, insinuat nobis medicamenta vel calidiora, vel frigidiiora, vel humidiora, vel sicciora, ipsi vulnere esse adinuenda. Dux itaque sunt primatum in-

Insuper, Gemina in cauo vulnere indicationes.

Quaror indicationes partiales. Prima.

Hypotheca

In carnis generatione duplex excrementum. Crassius, ut duplex excrementum. Siccant.

Medicamentum. Crassa caro: gignendæ. Secunda.

dicationum differentiz: quarum vna ab eo quod secundum naturā se habet, altera vero ab eo quod præter naturam sumitur. Quod secundum naturam se habet, sui custodiam indicat, & propterea quæ similia sui sint, postulat. Quod vero præter naturam est, sublationem sui, eoque contraria requirit. Perit enim quidquid in contrarium, & a contrario. Igitur vulnus quidem, quia præter naturam est, quo est humidius, eo sane medicamentum quod magis siccet, indiget. Corporis vero natura, propterea quod secundum naturā est, quanto est humidior, tanto quod minus siccet, medicamentum postulat. Proinde si qua sunt in diuersis corporibus vulnera, quib. par sit humiditas: quod in siccitate corporis temperamento consistit, vtiq. magis siccari postulat: quod in humidior, hoc sane minus, quo natura naturæ interest. Siquidem productam carnem, ei quæ præfuit, similem esse oportet. Vbi igitur pristina siccior fuerit, nouellā quoque sicciorē fieri conueniet. Quare vberius hæc siccari postulat, quanto magis siccā fuerit, tanto quod admouet medicamentum, magis siccā facultatem habere debet. At in humidiorē natura, tanto rursus iis quæ minus siccet medicamenti est opus, quanto caro ipsa minus est siccā. Quo fit, vt tunc, quod cum temperatis & mediis naturis consentit, in quibusdā tum vlcibus, tū naturis, pus quidem mouet, carnem non producit: in quibusdā etiam carnem producit. In humidiorē namque natura siccari, & pro ducere carnem potest, in sicciorē non potest. Præterea in modice humidis vulnerib. carnem efficere potest, quod scilicet moderate desiccet. In iis vero quæ præhumida sunt, prorsus non potest, quod scilicet non satis desiccet. Quæ singula Gal. in eo, quem supra citauimus loco, fusius persequitur. Tertia indicatio, ab iis quæ coniugata & annexa humidi sunt, insinuat nobis inueniendum esse remedium, quod p. proportionē, & statuto quodam ordine, p. affectib. qui simul cū ipso vulnere incidunt, respondeat: illosq. ipsos affectus prius summouendos esse, q. ipsum vulnus carne implere tenemur. Itaq. si intēperies vulnere accesserit, atq. vulnerata caro, vel prius etiam ex quauis occasione, vel ipso vulnerationis tempore, iusto calidior, frigidiorq. est effecta: vtiq. modellā exigit quæ nō modo moderate siccet, sed etiam in tantum calefaciat, refrigeretq. in quantum subiecta caro a naturali suo habitu recessit. Fieri enim nequit, vt in vlcere vel carnis productio, vel sinus impletio, vel agglutinatio, vel cicatricis inductio recte vnquam cedat, nisi subiecta caro pro naturali modo se habeat. Quocirca legitimi vulneratarum partium temperamenti, quoties eas vel carne implere, vel glutinare, vel cicatrice inducere studeas, maior tibi sollicitudo erit. Cōgruis itaq. & oportunis auxiliis aduersus illos, qui cum vulnere incidunt, affectus, pugnare oportet, priusquam vulnus ipsius curationem aggrediamur. Veluti igitur si phlegmone vna cum vulnere esset, nemo vulnus ipsam vel carne implere, vel glutinare vel cicatrice inducere, attentare debet, priusquam illā discussa sit. Ad eundem modum etiam, si citra phlegmonem sola subsit intēperies, nullum horū fore prius putabimus, quam illa sit sanata. Quod si igitur hæc eia se habent, sicuti profecto habent, inspicitur etiam conuenit & circumdantis nos ætis temperies. Siquidem veluti medicamentum quoddam is quoque corporis. nostris forinsecus incidēs, vbi immodicus calore vel frigore est, sanationem remorat. Danda igitur opera est, vt medicamēta excessui eius occurrant. Ideoque Hippocrates, in calidioribus anni temporibus, iis, quibus frigidior facultas sit, medicamenti vtitur, calidiorib. per frigidiora. Adeo, inquit, perpetuo verum est illud theoremā. Quæ singula Gale. libro. 3. Therapeutica methodi, capite 1. copiosius profequitur. Quarta indicatio in sanando cauo vulnere obseruanda, a contrarietate indicationum sumitur: non quidem earum quæ in diuersis temporibus perficiuntur, sed earū quæ in vno eodemq. tempore ipsius curationis subinde offeruntur. Vt exempli gratia, si ægri temperamentum iusto sit humidius, particula vero ipsa quæ laborat, siccior: aut contra, si hæc sit humidior, & totius temperamētum siccior. Pan modo in calore, & frigore, quod contrario temperamento sit pars cum toto. Diuersa sane in his est ea, quæ a patiente particula accipitur, indicatio, ab ea quæ ex ægri sumitur natura. Proinde hæc quæ nunc tractamus indicatio, insinuat nobis medicamenta vel humidiora, vel sicciora, vel calidiora, vel frigidiora, aut prout res postulabit, media ac temperata, deligenda esse, quæ ipsi vulnere admoueant. Ponamus igitur, totum corporis laborātus temperamentum humidius esse, eoque medicamenta desiderare quæ minus siccet ipsam vero ægram particulā ex earū numero esse quæ sicciores sūt, qualia sunt ea quæ minus sunt carnis: cuius

Tertia indicatio.

Circumstantia non actis temperies consideranda.

Quarta.

Hypothesis.

- A** cuius generis sunt quæ circa digitos & articulos habentur: præterea quæ circa aures, & nasum, & oculos, & dentes sunt: ac ut semel dicam, ubi erubescit cartilagine, & membranula, & ligamenta, & nervi sunt: adeps vero, & caro vel omnino nulla est, vel perquam exigua. Quare si quanto ægri temperamentum medio temperamento est humidius, tunc particula iusto sit siccior, nec adiciendū, nec detrahendū medicamentū quicquid est, sed tale adhibendū, quale si vulnus in medio temperamenti particula consisteret. Sin siccior debito particula fuerit, quam corporis temperamentū iusto est humidius, utiq; in tantum intendi siccitatem medicamenti cōueniet, quantum particulae temperamentum, totius temperamentum excedit. Veluti si quatuor numeris pars vulnera medio temperamento siccior sit, ægri vero natura gradibus tribus humidior: manifestum est, particula in q̄ nunc vulnerata est, vno gradu siccior desiderare medicamentū, q̄ pars quæ sit temperata. Sed ut hæc omnia coniectura accipiunt & cognoscunt, ita diligenter in hominum naturis, & medicamentorū facultatibus contemplantis exercitationē postulat. Non est autem, quod de indicationibus, quæ a calido & frigido sumunt, dicamus, quando quidē ad portionē dictorū intelligi possunt. Quare certe singula Galenus copiosius lib. 3. Ther. method. cap. 9. docet. Ex iam dictis omnibus liquido patet, huic qui probe & certa methodo caui curare vuln^{us} voluerit, theorematibus opus esse. Quippe non modo de corporis natura meditatus sit oportet, quod si quis commode & ex arte tanare vulnus eiusmodi studet: verum etiam diligenter speculationem omnem de medicamentis didicisse tū siccū humidiorisq; corporum temperamenti notas callere ad hæc tū ambientis tēperiem, q̄ utiq; tum ad præsentis status, seu anni tempora, tum vero regionis extenditur, tū partium naturæ, tum indicationū inter se pugnantium cōsultationem considerare. Sed pro Deum immortalem, magna pars hodie medicorū, Theſidū illū impudentissimum nugatorem, imitantes, ista nec norunt, nec inquirere volunt. Quin potius imperiti tutoris exemplo, vno calopodio, ut in puerbio est, omnes calcant, nullo naturarum, aut partium, aut id genus aliorum facto discrimine. Cererum hoc modo in cauo curando vulnere recentiores chirurgi vtuntur. Stata iam sanguinis profusione, & labotante parte a phlegmone & dolore vindicata, vino calente vulnus abluunt: Mox ipso abluto ac desiccato, puluerem aliquem carnē regenerantem, aut vnguentum aliquod sarcoticum catenive generans admovent. Proinde immanenta his sarcoticis imbura, aut conspersa, in sinum vulneris demittunt. Post hæc stupas aridas, vel quæ vino maduerint, superponunt. Ac demum quæ medicamenta ad probe continere possit deligaturam adhibent: atq; æstare bis, hyeme semel duntaxat auxilia eiusmodi permittunt. Porro medicamenta quæ vulnērum cavitates implent, in medio citraque morsum abstergentia & siccantia sunt, ut lib. 3. Ther. method. cap. 4. falsus Galenus monstrat.

In imperi-
cos medi-
cos.

Communis
chirurgorū
periclit.

De aequali, sicut impletū vulnere. C. A. P. V.

- V**bi vulnus purgatum impletumq; carne fuerit, *æquale tunc, planum* atque *impletum* nominatur. Hoc autem cicatrice tantum induci postulat. Hæc igitur cum regnare, tum sibi vñire oportet. Ad cicatricem vero quod iam impletum est perducit ex ægreda cute, quæ ex subiecta creatur carne. Atqui quum ex semine ortum habeat cutis, talis omnino qualis erat quæ perierat, prius restitui non potest: simile tamen quiddam cuti, & quod eius officium suppleat, restitui potest, non tamen plane cutis. Quando igitur ut cutis regeneretur fieri omnino nequit, quod superest, efficere tentandum: nempe instaurare aliquod, quod cuti deperditæ simile sit, & carni veluti aliquod naturale tegumentū exstitat. Id est enim vulnus iam impletum, planumq; reddidit ad cicatricē ducere. Huius efficiendū hæc est ratio. Portio quæ prius subiectæ carnis nuper genitæ, & restituta, ea sc. quæ summiores euidenter apparet, sic alteranda est, ut non amplius caro permaneat, sed veluti cutis euadat. Quo pacto igitur, inquires, alterabitur? Profecto alicuius alterantium qualitatū ope. Ergo quoniam cutis ea ne ipsa tum siccior est, tum etiā densior, si carnem siccabimus & adstringemus, cuius euam per similem reddemus. Et hæc quidē est medicamentū, quæ cicatricē inducit summa. Verū ea non sufficit, nā & glutiniora tū siccabant, tum adstringebant, sicuti & ea quæ cicatricem inducunt. Adiciendū ergo est, quo ordine siccare debeant medicamenta quæ cicatricem in ducunt. Id autē ex ipsa rerū subiecta facile inuenies. Nam quoniam in glutinatione vulnē siccandū quæ cōstiterit,

Æquale
vulnus.

Methodus
inde erit
cicatrix.
Cuius modū
specie cum
ea quæ pe-
rit, regnat
nō potest.

252 Operum Leonhard. Fuchſii Pars III.

Tres deſic-
cantiu me-
dicamentorū
gradu. Scilicet
Quotidiano
sum.
Cicatricem
inducens.
Per ſe, &
primario.

Malicorū.

Cicatricem
ex accide-
ntia inducentia.

Cicatricem
vitiū vul-
nibꝝ corri-
pienda.
Lithargyri
nutritia.

quo videlicet pars laborāſ ſuperuacuiſ vacet: In cicatrice Inducenda nō modo q. inſiuit, **A**
verum etiā humor qui in ipſa ſubiecta carne continet, eſt coſumendus. Quo fit vt multo
pfecto ſiccior q. cicatricem inducat, q̄ quod agglutinet, medicamentū eſſe conueniat.
Tres itaq. gradus deſiccantium medicamentorū in curatione vuln. erum neceſſario ſta-
tuendi ſunt. Sarcoticorum n. id eſt carnem regnennium, facultas ex primo ordine eſt
deſiccantium. Agglutinatoriorum, ſecundo vel tertio ordine reſecat. Cicatricem in-
ducentium facultas, prædictas ſuperat. Nam hæc non modo eius quod præter naturam
eſt redundantiam conſumit, verum etiā ei, q. ſecundum naturam eſt aliquid deradunt,
Priuſquam igit. vulnuſ cicatrice poſſumus obducere, eo viſq. teſſicanda caro eſt, donec
calli ſimilitudinem induerit, & cuti ſimilis eualeſcit. Quod ſane per ſe, primario, ac prop-
rie, hoc eſt, peculiari facultate, medicamenta effecunt, quæ adſtringendi modice fa- **B**
cultatem habent: & euſmodi quidem vt plurimum frigida ſunt & ſicca. Cuius generiſ
ſunt, gella immatura, malicorū, id eſt, mali punice ſeu granati cortex, balanſium, fruſcuſ ſpina
Ægyptia, vel eius loco acacia, rhus, ſumacho officina vocant, & eius generiſ vniuerſa, quæ medicæ
adſtringunt atque deſic. cant. Ex accidente tamen, & ſecundo carnem alterando, & calli in-
ſtat indurando cicatricem etiam inducunt calida medicamenta, q̄ carnem detrabere,
ac colliquare ſunt nara, & Gal. li. 5. ſimpl. ca. 14. nabuſſum, hoc eſt, detraſoria, dicuntur. Vt
ſunt chalcitiſ, vtriuſque album nominant hodie, et vſum non lotum, æriſ ſquama, & myſiſ tra-
mentum ſuum officinū dicitur: & ſiſſum alumen quod piumoſum officina vocat. Hæc certe vere
primario, & per ſe cicatricem inducentibus multo ſunt valentiora. Myſi quidē, & chal-
citiſ præcipue. Mitior autem æriſ ſquama, atq. hoc etiam mitius æriſ vſum: q̄ etiam ſi la-
uabis, vtq. minus mordens medicamentum habebis. Vnde ſi quādois vt ad cicatricē
inducendam in aliorū penuria cogimur, parciffime iſpſis vtetur. Largius enim ad mora
mordicant, colliquantq. carnē, & vlcus cauum efficiunt. Summū igit tantū ſpecillum,
hoc eſt, ſpecilli cuiſdem, in ea ad exactiffimū læuorē tuſa diſmittemus, ac poſt velut te-
nuiffimū quenda pollinem partibus q̄ cicatrice induci poſſulant, leuiter eas contingē-
tes imponemus. Quod ſi illa etiam adurat, vt minus acia, ſic ad cicatricē inducendam
reddes magis apta. Si vero etiam laues adhuc ſient mitiora: quemadmodū lib. 3. Ther. meth.
cap. 5. & 6. copioſiffime tradit Galeuſ. I. eſtormes atq. in decora cicatrices tenetæ quidem
adhuc, & recentiores emendantur admodum diachylo, aut lithargyro nutrita. Lithargyruſ
autem nutrita dicitur, vbi tenuiffime teritur, ex aceto & roſaceo diu exercetur in mor- **D**
tario, vt quidam volunt, plumbeo. Moduſ eſt, vt inde craſſior termentetur & exſurgat.
Cicatriceſ nigraſ tollunt oleum in quo radix briariæ tum candida, tum nigra incolta ſit, diſ ſuc-
cum reddat poſitum. Calamintha ex vino cocta, argenti quoq. ſpuma cū roſaceo albo lota. Craſſio-
res vero & lā inueteratæ reparant oleo baſſamine poſſito, vel radice cucumeris ſylueſtræ triſta,
& admota. Quod ſi ſiſi, aut ſimilibus non tollantur, id totum quod ſupereminet atq. ex-
creſcit, cultro raſorio reſcindendum eſt, vel cauterio admouendum. Atq. ita quidem
faciendum eſſe, recentiores chirurgi cenſent.

De vulnere ſupercreſcentem carnem habente. CAP. VI.

QVemadmodum cauum vulnuſ morb. eſt ex eo genere, quod in magnitudine par- **E**
tium in decenti ac vitiaſta ſpectatur: ita vt vulnuſ quod ſupercreſcentem carnem
obtinet. Et vt vulnuſ cauum non vnū eſt vitium, ſed pariter cauitas & vulnuſ: ita vulnuſ
ſupercreſcentem habens carnem, non vnus eſt morbuſ, ſed ſimul caro ſupercreſcens, &
vulnuſ. Prior itaq. morbuſ, qui inſtrumentariuſ eſt, nempe magnitudō vitiaſta, primari-
in dicationem, quæ veluti meta eſt inueniendorum remediorum, nobiſ inſinuat, ipſiuſ
ſcilicet redundantiaſ, & ſupra modum excreſcentiaſ carniſ ablationem. Alter vero mor-
buſ, qui vtriſq. partibus, tam ſimilibus quam compoſitis communis eſt, nempe ſoluta
vniō, coniunctiōne indicat. Porro ipſa agglutinatio, ſeu diſſidentium coniunctiō, vt &
carniſ generatio, naturæ quidem opera perficitur. At ſupercreſcentiaſ carniſ detractiō
nullum quidem naturæ opuſ eſt, ſed ſoliſ medicamentuſ, ſeu medicamentorum quæ **F**
vehementer ſiccant, & natura acia ſunt, ope perficitur. Huiuſ generiſ ſunt arramen-
tū futorium, quod Græciſ chalcanthum, officiniſ vtriuſque dicitur. ſpongia, radix aſphodeli, her-
modactyli, ſtupa minutim incifa, linimenta & panniculi crepta muria acrituri imbuta & reſicata,
unguentum viride, & id genus alia ſum ſimplicia, tum compoſita. Ceterum id perpetuo ſideli
reti-

A retinendum memoria erit, pro diuersitate temperamentorum, tum corporum, tum partium eiusdem, varianda esse remedia. Eadem enim medicamenta quibusdam naturis carnem excrecentem infamunt, aliis vero cicatricem inducunt, aliis glutinatorio minus præstant. Quippe medicamenta, quæ carnem minuunt, proxima sunt, tum iis, quæ valenter detergunt, tum iis, quæ cicatricem inducunt. Sic vt non pauci interrim per errorem medicamentum, quod carnem minuat, vel pro eo, quod sordem deterget, vel pro eo, quod cicatricem inducit, accipiant. Exempli gratia, *myrsi & chalcidis*, quæ inter ea, quæ cicatricem inducunt numerantur, si naturæ humidæ applicantur, potius carnem demunt, quam cicatricem inducunt. Adde quod inter ea, quæ tenellam carnem vulneribus supercrecentem colliquant & absumunt, quædam valentiora sunt, quædam imbecilliora, & mediocria. Quocirca nonnulla mediocres carnes redundantias excedunt. Alia vero carnis immodicas excrecentias minuunt, & vsque ad penitiora crustis obducunt. Cuius generis est, quod recipit *calcem viuam, squamam arii, & manna thuris parietum modis*. De quibus omnibus copiosius lib. 3. Therapeutica methodi cap. 6. & lib. 5. simplicium, cap. 15. Galenus differit. Nos etiam infra, lib. nimirum 7. cap. 5. vberius de iis dicemus.

Carnis detractio-
ria medi-
camenta.

De vulnere contuso, & cum alio præter naturam affectu coniuncto, & implicito, C. A. P. VII.

Vulneris, vt in superioribus est dictum, simplicis, sanatio mediocri siccatio est. At vulneris, quod cum aliquo præter naturam affectu coniunctum est, eius curatio, vt vulneris solius non est, sed prior illius affectus, qui cum vulnere cõiungitur, secunda vero ipsius vulneris. Nam siue phlegmone quæpiam, siue nigritia, siue erysipelas, siue ædemia vulneratam carnem obfederit, primum eius molienda curatio est. Verum quod vulnus interrim non solum non commodè curatur, sed multo etiam maius redditur, id neminem latet. Proinde siue contusa fuerint circumposita vulneri loca, seu phlegmone, alii siue tumor præter naturam in his constiterit, propria eius affectus sanatio inuenienda nobis est: illud pro certo habentibus, fieri non posse, vt vulnus sanetur, nisi locus in quo constitit prius sit sanatus. Ceterum quum hi affectus præterquam quod vulnera ipsa ad malitiam præparant, fluxionem etiam in vnum locum dolentem concitant, ideo etiam si corpus nec sanguine, nec vilo vitiorum succo redundet, tamen prout res exigit, vel vena lætior, vel purgatio adhibenda erit. Post hæc ad topica seu localia remedia veniendum. Quocirca rectè in contuso, cruciante, & phlegmonoso vulnere feceris, si statim per initia, purgatio iam corpore loca circumiacentia illineris vel rosaceo, vel myrtino oleo: vel vnguento, quod constat *bolo armenio, oleo & aceto*. Supra vero dolentem partem oleum aliquod admouendum, quod vel leniendi, vel maturandi, vel res exigit, vim habeat. Ponamus igitur carnosam aliquam particulam telo, tum caesam, tum contusam esse: huic sane de Hippocratis in libello de vlcetibus sententia, medendum est, vt quam celerrime suppuret. Necessè est enim carnes sic contusas putrefcere, ac in pus verti. Vbi vero putrefactæ in pus veræ fuerint, liquari, & tandem nouam carnem nasci oportet. Adde quod hac curandi ratione obseruata, minus eodem Hippocrate attestante, phlegmone vrgebitur caro ipsa sic caesa, contusaque. Duo itaque scopi in curando contuso vulnere nobis proponuntur, nempe suppuratio, & nouæ carnis generatio. Porro quum pus fiat cum aliqua putrescentia, & omnia, quæ putrefiunt ex calido & humido, sic afficiantur, certe quæ calefaciunt humectantque hisce contusis vulneribus, adeoque omnibus affectibus, quibus pus moueri expedit, admouenda erunt. Cuiusmodi sunt *malua cocta, radix althea, tetrapharmacum*, quod Celso libro 5. cap. 19. testè, ex terra, *pice, resina, & fenestrario vel vitulino* constat: panis triticeus, hordei farina ex aqua & oleo, item panis ex aqua & oleo: præterea fomentum mulæ aquæ calidæ. Hæc enim & similia omnia, quæ sic calefaciunt & humectant, celerrime pus mouent. De quib. copiosius agit libro 4. Therapeutica methodi, cap. 5. Et libro 5. simplicium, cap. 5. & 8. Galenus. Inter composita vero medicamenta hoc, quod sequitur ad suppurationem in proposito vulnere plurimum conducit. Recipit *radix althea, eucumeris sylæstrii, singulorum vnciam dimidiam. Ori-* Malagand
gani sylæstrii seu vulgaris, hyssopi, singulorum manipulum semis. Florum chamæmelis, feminis lini,
singulorum pugillum vnum. Ficus pinguis sex, vnae passæ pari numero. Vna bulliant, ac tandem iis
pressis, ac diligenter infus, adde galbanum, myrrha, siccata, styracem liquidam vocant, assypi singu-
lorum drachmam vnam & dimidiam, Sanguis draconis, adipis porci, singulorum vnciam di-

Affectus
vulneri
coniun-
ctus pri-
mo iuan-
dus.

Vulneris
contusi
curatio.

Per mo-
urnia.
Tetraphar-
macum.

Empla- *midiam, forme tur malagma. Conducit haud parum etiam hoc quod in emplastro for-*
strum. *mam redactum est. Accipit foliorum maluarum & violarum, singulorum manipulum unum.*
Radix althea, libram semis. decoquantur in iure carniū absque sale, postea subigantur in morta-
rio, & cribro incernantur. Ex cribatura, cum praedicto decocto, & farina hordei ac tritici,
quantum satis esse videbitur, fiat emplastrum solidum, siue malagma: addendo butyri,
& olei communis singulorum uncias tres. Vitellos duorum ouorum, & croci momentum. Hoc au-
tem, vt & praecedens malagma, super vulnus, & contusam carnem imponendum est.
Deterge- *Vulnere autem medicamentum ex terebinthina resina, & ouorum luteis compositum,*
na. *imponendum. Ceterum perducto ad suppurationem vulnere, his quae pus mouent re-*
liktis, ad purgatiā & detergentia transeundū erit: vt suntuncta in melle linamenta, vel succo
apii, & id genus alia. In omnibus vero eiusmodi vulneribus recte inditur penicillus melle
refecto, aut vnguento Apollolorum nuncupato, imbutus. Supra autem id purgans detergen-
te medicamentum aridæ stupæ imponendū sunt, adaptandaque est deligatura, quæ
ad mota medicamenta probe retineat. donec perfecte expurgatum vulnus fuerit. Tum-
Puri vul- *demum vero purum vulnus est, quum tubet, ac nimium, neque siccum, neque humi-*
us no- *ridum est. Ac quodcumque sensu caret, quod non naturaliter sentit, quod nimium aut*
ta. *aridum, aut humidum est, quod aut pallidum, aut albidum, aut liuidum, aut nigrum est,*
id purum non est. Purgato, vt decet, vulnere, ipsum carne implere oportet, qui secun-
dus erat in curando hoc contuso vulnere scopus. Carnem igitur modo, quod dictum est,
generare oportet, & iam impletum vulnus ad cicatricem perducere. Quem scopum fa-
cile assequeris, si penicillum indies paulatim imminueris. Ita enim solus naturæ opera,
ac citra vllum medicamentum vulnus carne implebitur, & cicatrice obducetur. Quod
si caro contusa multum esset dilacerata, & sutura vnlis videretur, consuatur laxa qua-
dam sutura labra retinente. Ac si labra vulneris ab ambiente alterata fuerint, ac dura;
Gangr- *callosa; appareant, scalpello illa, modo alius nullus obstitit affectus, corium amouē-*
na ligat. *do renouare oportebit, deinde cōsuere. Porro si cæsa contusaque caro enumeratis modo*
auxiliis ad suppurationem perducere non possit, videaturque in gangrænam, ac partis cor-
ruptelam degenerare: quod ex tarda difficultique maturatione, & fulco, liuido, & nigro
loci laborantis colore deprehendes, vnguentum Ægyptiacum nominatum, aut ali-
quod aliud simile medicamentum, quod ad eiusmodi corruptionem & mortificatio-
nam sit idoneum, protinus erit ad mouendum. Quod si alia quædam symptomata, vel
affectus huic contuso vulnere superuenerint, vt dolor, pblegmone, aut quouis alius tu-
mor præter naturam, aduersus illa congruis, de quibus suo ducemus locū, remediis pugnan-
dum erit.

De Ecchymosi. CA. P. VIII.

Ecchymo- **E**cchymosis, siue ecchymoma, sanguinis subter cutem effusio & coitus est, adeoque
sis quæ- *solutæ continuitatis genus, quod, vt lib. 4. Ther. meth. cap. ult. testis est Galenus, vna cum*
contusione, ruptioneue incidit. Adeo vt non fuerit ab instructo alienum, si propter af-
Causa. *finatam, quam cum contuso vulnere obtinet, hoc loco de eo malo agamus. Incipit*
itaque interdum hoc vitium cum sola contusione, citra carnis musculosæ in profundo
hærentis corpore ruptionem, ex violento, verbi gratia, ictu, vel graui casu. Aliquando
vero cum sola ruptione, absque carnis contusione consistit, veluti quum motu quo-
piam valente & confertim facto citra graue aliquod extrinsecus incidens, caro disrum-
pitur. Nonnūquam etiam cum vitioque: vt quum graui, ac dntro quopiam corpore, quod
extrinsecus superciderit, vel casu ab alio, non modo carnosæ musculorum partes, sine
cutis diuortio contunduntur, sed etiam ex distentione violenta, & confertim facta ab-
rumpuntur. Tunc n. venis exiguis, in ea sic contusa ac rupta carne, diuortium expertis,
sanguis exsilit, vnde ipsa ecchymosis sub cute collecta nascitur. Fit aliquando etiam ec-
chymosis ex oris vasorum apertione, quam ἀνέστησις Græci appellant: & ex ea, quæ iis-
dem signis, id est exsilitu, vel transfusio, aut subsulsum, dicitur. Porro anastomosis, Gale-
Diapede- *no libro 5. Therap. method. cap. 2. teste, accidit propter tum vasis imbecillitatem, tum san-*
sis vnde *guinis qui ad os impetu ruit, copiam. Ad hæc ob acrem quampiam, quæ illi extrinsecus*
etatur. *incidit, qualitatem. Diapedelisis vero, ex tunica ipsa rarefacta, sanguine autem tenuato*
Species *oritur. Accidere præterea interim potest & ex gracilium vasorum ore aperto. Ex iam*
ecchymo- *dictis palam sit, sub ecchymosi cōplecti etiam ea, quæ Græcis ἰσχυρία, Latinis sigillata vo-*
manis *cantur.*
sigillata.

- A** cantur. Item *livores ex illo provenientes*, Græcis *νεκρόματα* nominantur, Latinis vero *vibices*. Ecchymomatis autem apparentes notæ sunt, mollis tumor, & tactui cedens, lividus, & magna ex parte dolore vacans. Proptet vnitatem vero solutam affatim factam, interdum etiam dolores, & ob sanguinis in profundo concursum abscessus nonnunquam insequuntur, qui tamen magna ex parte per halitum digeruntur. Ecchymoma vero, quod cum contusione accidit violenta, periculo non vacat. Solet enim frequenter, si negligatur, non modo affligere particulæ, sed & corporis totius corruptionem asferre. At in contusione, quæ cum ecchymosi consilist, cutis carne seiuncta maneat pendula, raro vel nunquam agglutinatur. Proinde satius est, eam præcindere, & efficaciantia medicamenta admovere, vel absque deligatura locum sic relinquere. Aer namque ambiens cutis ipsius infiltrationem non mediocriter adjuvat. In cutanda vero ecchymosi, initio fluentem ad laborentem locum materiam auertere & vacuare convenit. Quod optime fit venæ sectione, quemadmodum omnes artis periti testantur. *Secundo*, dolorem sedare, & laboranti patii, ne fluxionem excipiat, robur adferre, rebus frigidis, & adstringentibus eam perfundendo atque illinendo, oportet, in quem vsum oui crassum rosaceo permixtum, loco dolenti & laboranti admoventur. *Tertio* sanguis ipse totus, qui subter cutem effusus est, dissipandus ac resolvendus: idque confectum priusquam ingruerit, & in grumos iam coierit. Quod factum quidem non difficile erit, si & sanguis effusus tenuis, & prope summam cutem, non autem in profundo situs fuerit. Quod si discutiri non possit, tum inscriptis discutientibus medicamentis, tum scarificationibus educendus erit. Et si nihil iis profeceris, affectus is more abscessuum curandus erit. Quocirca sanguinis sic per contusionem ruptionemque subter cutem dispersi dissipatio, & vacuatio, propria est ecchymomatis curatio. Hinc est, quod in fine *quariti Ther. method. libri* Galenus sic scriptum reliquit: *Sane ecchymosis omnis vaccinationem pro remedio curationis indicat. Quare calefacientibus huius, & modice siccantibus medicamentis est opus. Quippe quæ vehementer siccant, discutiunt illa quidem in principia eulentius, quam quæ sunt imbecilla: ceterum nonnulli ipsius vitii scirrhusum, curatque difficile relinquunt.* Curandum vero est, ut ruptis, quæ in profundo hærent corpore, hæc tum vires habeant magis intentas, tum ipsa magis sacra, magisque incidentia sint: tum, ut semel dicam, tanto efficaciora, quanto magis a cute ad profunda ecchymosis recessit. In talibus sane, nec cucurbitæ vltus sit inutilis: id enim instrumentum ad violentum attractum a Medicis est excogitatum. Verum enivero quoniam tunicæ venularum, ex quibus sanguis exilit, contusæ sunt, per initia sane, ut *Galeno libr. 5. de compos. medic. local. cap. 1.* & *Paulo etiam visum est*, nonnulli adstringentium iis, quæ discutunt, admiscere oportet. Contusæ enim venularum tunicæ aliquam densationem requirunt, ut ad naturalem suum statum reducantur, & ne nova materia ob dolorem attracta ad locum contusum delabatur. Quandoquidem si sola discutientia facultatem haberet medicamentum initio admotum, non modo id, quod effusum est, discuteret, sed & per contusionem aliquid sanguinis, qui in contritis venis continetur, extraheret. Quando vero in naturalem statum venulæ redierint, tum ad sola discutientia medicamenta citra ullam adstrictionem venire tempestivum est. Porro in quibus sic modice adstringentium quiddam, nec non per halitum digerentium miscere convenit, perspicuum est, imbecilliora primò debere assumi, validiora autem inueteratis, & iis, quæ nigrescunt, admoventi. Ad inueterata itaque ecchymomata, *Paulo etiam auctore*, radícula illitu prodest: quippe discutit ea, ubi erodere inceperit. Vel ipsius radiculæ succus, cum micis panis indutus. Ex moderate discutientibus sunt, quæ vino, melle, & sale constant. Itæ quæ ex farina hordei, calamintha, & vino conficiuntur. Quæ ceram & cumini accipiunt, quæque ex chamæmeli floribus, meliloto, stichade, & cumino in vino decoctis componuntur. Præterea, quæ ex maluis, fursure, absynthio, cumino, aut anetho, aqua vel vino decoctis sunt. Item, quæ ex farina hordei, & scængræci, & croco, aqua decoctis constant. Solent & potiones quædam parari, quæ si assumantur, sanguinem concretum, & extra vasa effusum dissipare ac resolvere creduntur. Cuius generis est ea, quæ constat bdello, costo, centauro, & serapio acido, & huic alie quædam confimiles, in calu ab alto, offensione, & violento membrorum tractu, ac distentione offerri consueverunt. Quum vero totum ecchymoma discussum fuerit, sicca re iam vehementius id, quod ruptum est, permittitur, ac deligatura coniungere, omnia-

Vibices.
Signa ec-
chymo-
seos.

Curatio.

Propterea
ecchymo-
matis cu-
ratio.

Moderate
discuti-
entia.

Partibus.

que in ſumma, facere, quæ ut vlcus coaleſcat efficiant. Ergo ſi diſcuſſum celeriter totum ecchymoma ſit, facile coaleſcit ipſa caro. Sin longiore ſpatio, ſordes multa ſubnaſcens, medium inter vlcus labra ſpatium occupat, ita ut iam coire ruptio non poſſit. Atque inde adeo ſit, ut qualibet leui de cauſa nos hæc ſui admoneant. Nam ſive quis obrigit, ſive parum concoxit, ſive febris laborauit, ſive ſe vehementius ſaſtigauit, eiſmodi particulis illico dolet. Non enim in idem coire eruptionis labra, ſed tantum prope ſunt ad-mota. Quo ſit, ut vlcus occaſio ea facile ſeparet, & medium locum ſuperuacuo humore repleat. Et quid quæ ſo aliud quam aſſidue nouū ecchymoma his gignitur, & primo illi, quum videlicet primum caro eſt rupta, perſimile? niſi quod nunc ex tenui magis ſanie conſtat, quā a principio e ſanguine ecchymoma eſſet: ideoq; facilis etiam nunc, quam intra initia diſcutitur. Quæ ſingula etiam Galenus *cap. vlt. libri Ther. method. 4. docet.*

De vulnere ex morſu vel ictu animantium tum venenatorum, tum rabidorum. Cap. IX.

Morſus
iſtius a-
nimanti-
um dupli-
ces.
Venenati.
Non venenati.
Sæpius.

Morſus iſtius animantium duplici conſtant differentia: alii enim ſunt venenati, alii minime. Venenati dicuntur, qui a virulentis feris inſcruntur, ut ſunt ſerpentes, canes rabioſi, ſcorpio, mus araneus, & id genus alix feræ. Non venenati ſunt, qui ab animantibus non ita virulentis inſiguntur, cuiusmodi ſunt canes domeſtici, ſimia, homo, fues, equi, & ſimiles. Porro venenatos morſus aut iſtus ſequens nobis notis deprehendes. Vulnus inſixum valide dolet, punſtionis & mordicationis ſenſus vehemens in afflicta parte perſenſitur. Vulneris atque laborantis loci color perit, ac mutatur: aut enim rubet atque inflammatur, aut liuet, vel nigricat. Laborans grauibz angitur moleſtiis, ac iſtus ardet. Præterea vniuerſum eius, qui iſtus eſt corpus ita nonnunquam obſtupeſcit, ut tangentem non ſentiat. Verum nihil ſere in iſis perpetuum eſt. Neque enim dolor ſemper vehemens adeſt, aut atrociter moleſtans in omnibus eiſmodi ferarum ac beſtiarum venenatarum iſtibus aut morſibus: ſed in quibuſdam ſatis remiſſus eſt, ut in morſu canis rabioſi. Virulentorum autem omnium animantium morſus generalis & communis medendi ratio gemina, Galeno *lib. 13. Therap. method. cap. 7.* teſte, indicationem habet, nempe liquotus virulenti vacuationem, & eius quod dolore creat alterationem. Virus autem elaculatum vacuant, tū excaleſcentia medicamenta omnia, tum quæ citra calefactionem vehementer trahunt: veluti & cucurbitulæ, & cornua quædam, quibus nonnulli cucurbitulatum vice vtuntur. Sunt autem & qui ore ſuo virus extrahunt, ægræ videlicet particulæ ad moti, ipſumq; vulnus labiſ complexi. Huc ſæpe pertinet & cauterium, & medicamēta, quæ cauteriis ſimiliter cruſtam efficiunt. Atq; omnia totam eius, quod inſeſtat ſubſtantiam exinaniant. Alterum auxiliorū genus eſt eorum, quæ qualitatē per contrariam qualitatē alterant: ſcil. exhibentibus nobis, ſi vehementem calorem iſtus vel in ipſo, vel in toto corpore ſentiat, auxilia refrigerantia. Sin frigus ſentiat, caleſcentia. Proinde primis ſtatim diebus (deinceps enim fruſtra adhibentur: quod virulentam illam materiam, quæ iam ad intima penetrauit ſatis euocare nequeant) quæ venenum extrahunt atq; eliciunt medicamēta, admo-uenda erunt. Prius tamē ſupra vulnus, membrum id quod vel morſum, vel iſtum eſt, deligandum erit: non tamen vehementer, ne torpeat. Hac enim deligata impediēs, ne tam ſubito virus interna ſubeat. Quod ſi itaq; leuior morſus iſtus eſt, oris ſuſcitio appri-me conuenit. Homo igitur aliquis ſtatim adhibendus eſt, qui vulnus exſugat. Sugentē vero ieiunū nō eſſe, ſed & cibum ſumiſſe, & vino os colluſiſſe, neceſſe eſt: poſtea exiguum olei in ore continens, iſtum exſugat, & exſpuat venenum. Cauere etiam oportet, ne qui vulnus id exſuturus eſt, internam aliquam oris partem exulceratam habeat. Siquidem venena, ut ſupra ex Celſo retulimus, non gultu, ſed in vulnere nocent. Sed & locus ipſe priuſquam exſugatur, ſpongia in poſcam calidā immerſa, fouendus, ac proluendus erit. Alii vulnus abluendum aqua cenſent, in qua coctum ſit chamæmelum, & ſylueſtris lapathi radix. Sunt qui gallinarum, aut aliarum quarundam auium podicem vulncri admovent ad virus exſugendum. Quod ſi quæ applicatz fuerint volucres motiantur, venenum extractum eſſe ſuſpicantur. Poſthæc vero cinis aceto ſubaſtus pro cataplaſmate imponatur. Maxime ad hanc rem conducit cinis ſarmentaceus, id eſt, ex lignis vi-

Membru
demon-
ſtratum ſuper
vulnere de
liſſidem.
Oris ſu-
ſcitio.

Medica-
menta
magnis
morſibus
congrua.

tiſ: vel ficulneus, aut laurinus. Qui ſi non adſit, eo qui haberi poteſt, vtendum eſt: id digē-
tia ad hoc poſſiſſimum adhibita, ut phlegmone in loco excitetur, & materiæ ad morſum
euocentur. Morſibus vero aut iſtibus venenatis magnis ac vehementioribus commo-
de illi.

- A** de illinuntur cepæ, cum sale, & ruta, sinapi quoque & animalium quorundam sterora. *Medica-
mentis ma-
gis mor-
bus con-
grua.*
Item iuglandes nuces, cum alliis, tam sylvestribus, quam sativis coctis tritis, & cum fer-
mento, oleo, sale & melle mixtis. Emplastra quoque, & cataplasmata ex dictamno, & a-
liis medicamentis calefactis, quæ vehementer trahendi vim habent, apprata. Plu-
rima enim ex iis non modo virus ipsum potenter eliciunt, sed & vulneris oras latis &
hiantes seruant. Neque enim permittendum, ut hæc cito coeant, aut committantur. Præ-
ter opinionem autem facit, Aetio attestante, rheiace Andromachi emplastri modo
imposita. In magnis quoque, ac vehementioribus, tum ictibus, tum moribus potens est
hoc subsequens emplastrum, quod acrioris est potentie. *Empla-
strum.*
*Recipe galsani, figapent, opopa-
macis, assa, fetida vocata, myrrha, piperis, sulphuris, singulorum semunciam. Stercoris columbini, &
amatis, singulorum uncias duas. Calamintha, mentastri, singulorum unciam unam.* Dissolvantur
gummi in vino, & in vnum misceantur omnia cum melle, & oleo antiquo, & fiat em-
plastrum. Præterea in vehementiori morfu cucurbitulam cum largiori flamma ad vul-
nus affigito. Sed antea circumstantia loca altioribus vlcusculis scarificato, quo scilicet
plus vitiat sanguinis extrahatur: & ut hæc lege prohibeatur, ne venenum membrum
insinuetur. Si cucurbitula non est, tum quodlibet simile vas, vitrum verbi gratia, quod
idem possit, admoveatur. Optime autem auxiliantur, si statim in principio post amotas
cucurbitulas, super vulnus imponentur & coeoluantur animalia parva discerpta, & per
medium diuisa, intus adhuc calientia: veluti sunt gallinaceus pullus, sed mas præsertim,
hædus, agnus, & porcellus. Sic vero calida eorum statim caro percusso loco imponen-
C est, ut pars interior corpori iungatur. Venenum enim exsugunt, & dolores leniunt. Fe-
re autem inter cetera animantia magis profunt *gallinarum pulli*: quippe qui calidiore
natura sunt præditi, argumento quod deuoratum insigne virus eliquent, & aridissima
quæque femina consumant. Item nonnūquam harenas lapilloque, quos faucibus insinua-
runt dissolunt. Proinde animantis caloris spiritus ictæ pars impetum capellens, vene-
num extrahit. Quin etiam vltro, aduersus virulentos morfus, quum locus nervosus non
est, & tuto inuri potest, expeditissimum censetur auxilium, ut ipse quum ignis cetera vi-
ribus præstet simul quod vitæ domet, ipsiusque vitæ hebetet, & penitus ferri, hoc est, ad
intima illabi non patiarur: simul quod pars ignem experta, deinceps non vilem, nec in-
decoram loci instaurationem efficiat, in anente diuinus exulceratione. Præstat etiam
D interdum membrum, quod a virulenta fera ictum est, præcidere & amputare. Sic me-
moriz prædidit *libro 3. de laborantibus locis cap. 7.* Galenus vinitorem quandam a vipera
morsum, ubi feram agnouisset, confestim læsum digitum sibi falce abscidisse, atque in
totum sic periculo liberatum fuisse. Porto ei vulneri quod expertum ignem non est, ea
medicamenta, quæ vehementer exedunt, quæque adurunt, & crustas vlcibus indu-
cunt, adhibenda. Et animaduertendum ex eo tempore, quum crustæ, quæ vel per ignem,
vel adurentia medicamenta induitæ sunt deciderint, ne vulneris oræ coalescant, & ci-
catrice obducantur. Apertas enim longiori esse tempore conuenit, quo vitiosa mate-
ria semper effluat, non autem intus contineatur, & ad intima se insinuet. Id autem prom-
te præstabit vulncribus indicium *sulfamentum, & sylvestre allium detritum: nec cepa, & id ge-
nus alia.* Si vero ante legitimum tempus cicatrices committantur & coeunt, manum
postulabunt. Quare eas diducere, carnemque scalpello circinare, aut iterum inutere
expediet. Vbi autem legitimum tempus præterit, vulnus ad cicatricem perducendum
erit. Atque hæc est communis morfus ictusque animantium venenatorum medendi ratio.
Peculiare vero singulorum venenatorum vulnrum curationem ex Dioscoride,
Aetio, Paulo, Celso, & id genus aliis auctoribus petant studiosi. De iis enim hoc loco,
quod rarissime accidant, scribere superuacaneum iudicamus. Prætermisissimus igitur aliis
omnibus, de eo tantum, quod a rabido cane infertur, agemus: quod hoc animal frequens,
& plane domesticum sit.

De morfu canis rabiosi. C. A. P. X.

- F** Vum canis animal sit, quod do mi homines alunt, & rabie sæpius cortipiat, adeo-
que tale, a quo difficile sibi cauere possit homo, ideo reliquis feris venenatis præter-
itis, de vnius rabiosi canis curatione dicemus. Et quia periculū maximum ac inevitabile
hominē a cane rabioso manet, ideo notas quibus is dignosci queat, initio exponemus.
Rabiosus canis porum & escam auerfat, *Dioscorides etiam libro 6. cap. 35. nobis suffragans*
Cane ra-
biosus notus

23 Operum Leonhard. Fuchſii Pars III.

teſtimonio ſibi premitur, neque tamen bibit: anbelat pluriſimum, idque exſerta lingua: **A** aures inclinat, largam ſpumam ſeu pituitam naribus & ore prouicit. Mutus præterea non totum eſt, & veluti inſanus, vt ne domeſticiſque quidem agnoſcat. Torue, & ſolito triſtiſus inſuetur, in omnes paſſim ſine latratu irruit, & æque ferat homineſque, tam familiares quam ignotos mordet. Vbi autem momorderit, protinus nihil inſeſtum inſiſtit, præterquam ex vulnere dolorem. Progreſſu autem temporis morbus ille, qui ab aquæ metu *hydrophobia* appellatur, exoritur. Miſerrimum ſane morbi genus, *vt Celfi verbi gratia*, in quo ſimul æger ſit, & aquæ metu cruciatur. Porro magna ex parte circa quadrageſimum ſere a morſu diem, ſolet hic morbus ingruere, quibuſdam & poſt ſex meſes: aliis proditum eſt poſt ſeptem obueniſſe. Sunt & qui poſt annum vnum, vel etiam duos interdum a morſu impreſſo, morbum hunc erumpere teſtentur. Narrat & aliquos poſt **B** ſeptimum annum hoc aquæ metu fuiſſe tentatos. Quo fit, vt quia canes rabido morſi ſint, non valde tuti eſſe videantur. Non enim ſtato deſinitque tempore poſt morſum aquæ pavor exoritur. Quum itaque non conſeſſim a morſu huiusmodi aquæ metus homines inuadat, quidam decepti canem qui momorderat non fuiſſe rabie percitū arbitrati ſunt, & proinde vulnere cicatricem inducere properant. Atque hoc pacto ipſimet hominis mali auctores, ſibi perniciem attulerunt, dum ſcilicet huic malo cauſam dederunt. Hac autem viſus probatione atque experientia, facile deprehendes, rabioſus ſit canis, nec ne, qui momordit. Iuglandibus nucibus conciſis, & accurate tritis, vulnus diligenter obſtruitur, & poſtea circumligatur: ſequenti die ablatus, gallinæ ac ut gallinæ in cibo apponito. Ac primum quidem non attingent: fame autem urgente, ſi eas vorauerint, tematentius conſiderato. Nam canis qui momordit, ſi non fuerit rabioſus, ſoſpites, ac ſuperſtites aues, quæ nuceſ illas deuorauerint, permanebunt: ſi contra rabie correptus fuerit, poſtera die peribunt. Atque tunc ad vulnereſ dilatationem properandū erit, iterumque poſt paucos dies eadem experientia vrendum: & ſi non perierit gallinæ, tunc vulnus ad cicatricem perducemus, nullum iam veriti periculum. Si itaque rabioſus canis fuerit, cucurbitula virus eiſ extrahendum. Deinde ſi locus neque neruoſus ſit, vulnus id exurendum. Si viri non poteſt, ſanguinem homini mitti, *vt Celfi lib. 5. ca. 27. teſtatur*, ſi quidem plenitudine laborer, non alienum. In ſumma, omnia ea agenda, quæ in ſuperiore capite ſunt expoſita. Quidam poſt rabioſi canis morſum protinus, vt Celfi loco citato ſcribit, in balneum mittunt, ibique patiuntur deſudare, dum vires corporis ſinunt, vlceradapertio, quo magis ex eo quoque virus deſtillet, deinde multo meracoque vino excipiunt. Quod omnibus venenis contrarium eſt. Solet autem ex eo vulnere vbi parum occurſum eſt, aquæ timor naſci. Quo quidem malo oppreſſis vnicum remedium, *Ciſſo atteſtante*, eſt, nec opinantem in piſcinam non ante ei prouiſam prolicere. Et ſi natandi ſcientiam non habet, modo merſum bibere pati, modo attollere. Si habet, interdum deprimere, vt inuitus quoque aqua ſatietur. Sic enim ſimul & ſitis, & aquæ metus tollitur. Sed aliud periculum excipit, ne inſirmum corpus in aqua frigida vexatum, neruorum diſtenſio abſumat. Id ne incidat, a piſcina protinus in oleum vel ſolum calidum dimittendus eſt.

De vulnere cum ſanguinis profuſione ex venis & arteriis. C. A. P. XI.

Cauſa. **H** Atenus de vulneribus, quæ carnoſis partibus incidunt, diximus: nunc de iſ, quæ in arteriis & venis ſunt, vulneribus agemus. Proſiuit autem ex vena vel arteria ſanguis, aut tunica earum diuiſa, aut reſerato earum ore. Fluor autem ſanguinis ex diuiſione tunice vgnarum, aut arteriarum, ſunt *vulneratio, conſuſio ruptio, erſio*. Quæ autem vulnerant, ea ſunt acuta, atque ad ſecandum habilia: cuiusmodi ſunt *ſagitta, & gladii*. Quæ cõtundendo ſoluunt, ea grauiora, duraque ſunt: vt lapides, aut quæpiam grauiſſe moles. Quæ rumpunt, omnia id tenſionis interuentu faciunt. Idem & intenſior actionis vehementia, ſucci abundantia, non vtique virium reſpectu, ſed quæ quum a vaſe ſuo non continetur: etiam caſus ab alto, & graue quippiam durumque incidens. Eroſio autem venis arteriis intrinſecus ſaltem accidit, ex ſucco aliquo cui mordens natura inſit: vt eſt *ſilue F bilis, vel atra ſuperaſſata*. Ex iſ itaque manifeſtum euadit, quod venæ & arteria vulnerari non poſſunt, quin cutis & caro vulnerentur. Signum venæ atque arteriæ incifæ, eſt ſanguinis profuſio. Quod ſi ſanguis cum impetu, ac ſalendo prefluat, & tenuis ac ſlauus feruensque appareat, arteriam diuiſam eſſe ſignificatur. Si vero craſſior & nigrior conſpiciatur,

- A**pietur, ac quiete sine pulſu & citra ſaltum effundatur, indicium eſt iplum a vena effluere. Quam vero ſanguinis proſuſio ſit periculola (niſi enim ſupprimatur, mortem adfert inevitabilem) ideo in eius curatione celeritate opus eſt. Quinque autem poſtiſimum ſanguinis proſuſio ſiſtitur. Primum iis, quæ fluxionem auertunt, tum reuelendo, tum deriuando. Ex iis autem, quæ ſanguinis proſuſionem auertunt, tam a venis, quam arteriis ſanguinem fundentibus, quædam id efficiunt citra vllam extra corpus vacuationem, alia vero cum vacuatione. Citra vacuationem fluentem e vafis ſanguinem auertunt, & alio trahunt, cucurbitulæ leues, hoc eſt, citra ſcarificationem, & cum flamma admotæ. Item frictiones, & ligaturæ ſeu vincula, primum in propinquo-ribus partibus, dein in remotioribus adhibita. Cum vacuatione autem auertitur, atque ad alias partes conuertitur ſanguis, tum ad proxima deriuatus, tum ad contraria reuulſus, vena in ea parte incifa, quæ directo proſuſioni reſpondet, quæque iplis partibus ſanguinem fundentibus coniuncta eſt. Vbi autem paululum detraheris, mox vnam horam intermittens, rurfus modicum quid detrahes, poſt iterum atque iterum pro laborantis viribus, quemadmodum ſyſius lib. 5. Ther. method. capite 3. Galenus doct. Secundo, ſanguis proſuſus inſtenuantibus, atque fluxionem intercipientibus ſiſtitur. Horum quædam hunc ſiſtunt increſcendo, ac inſpiſſando vt ſunt lentæ, priæ, cotoneæ, & in vniuerſum omnes frictus adſtringentes. Alia ſtupefaciendo, veluti aqua frigida, tum epota, tum circa locum ex quo proſiuit ſanguis proiecta, & aduſa, non autem ſupra vulnus iplum. Vulneribus namque, Hippocrate atteſtante, frigidum mordax. Sed & poliæ, & vinum acerbum, aliaque quæcunque vel adſtringendi, vel poſtremo refrigerandi vim habent. Item ſyncope, ſeu animi deliquium, utpote præpter ſanguinis ad interiora reuocationem totum corporis habitum refrigerans, affluere ſanguinem prohibet. Quæ ſingula loca nuper è ſtato, cap. 5. Galen. copioſius docet. Et ante eum Hippocrates, qui lib. 6. Epid. par. 7. aph. 3. ita ſcriptum reliquit: Sanguinem e venis & arteriis premanentem ſiſtunt, animi deliquium, ſigura aliſtendens, interceptio, linamenti in orbem conuoluta, appoſito, & deligatur. His peractis, adeoque ſanguinis conſuſu auerſo, atque alioſum tranſlato, tercio iplius vulneris labra in idem adducenda ſunt noſtrarum manu operæ: vbi ſic ad manum vulnera ſe exhibent, tum per deligaturam, tum vero per ea remedia, quæ refrigerant & adſtringunt. Neque enim ſuere poſſumus arteriæ venæque vulnera, veluti dicerent, qui nullam a vulneratæ partis ſubſtantia naturaque indicationem ſumi aiunt. Non erit itaque abſurdum, ſi vulneris pulvis adſtrictioris aſpergatur, & ſtupæ oui candido liquore, & puluere aliquo adſtringente imbutæ ſuperimponantur. Quibus rite peractis, membrum laborans deligendum erit, & ſitu appoſito collocandum. Appoſitus autem vulneratæ partis ſitus eſt, Galeno loco citato teſte, vt dolore pars vacet, & ſuſtiam ſpectet. Si vero vel prona ſpectet, vel doleat, nõ ſolum proſuſium non ſiſtetur, ſed etiam nõ ſit prouocabitur. Obſtruetur, occludetur etiam ſanguinem fundentis vafis oſculum, & ſanguine ipſo concreto, ſeu in grumos conuerſo, & iis, quæ foris illi imponuntur. Grumofus enim ſanguis oſculum vafis fundentis ſanguinem obſtruit. Poſſunt autem ſuperimponi, tum carnoſæ ipſæ, quæ circa vulnus ſunt partes, tum in nonnullis vulneribus ipla cutis, ad
- E** hæc quæcunque ipſi comminiſcitur. Ea ſunt linimenta, & medicamenta ea, quæ idcirco, quod ex lentæ craſſaque ſubſtantia conſiſtant, meatus obſtruunt, Græci ἰμμεροὶ ἰμμεροὶ vocant. Linamenti autem vtendum primum ſiccis: deinde ſi hæc parum proſiciunt, acetum, vel iis medicamentis, quæ ſanguinis ſupprimendi facultatem habent imbutis ac madefactis, ſupraque ſpongiam ex aqua frigida expreſſam imposito, ac manu ſuperpoſita eam comprimito, vel alligato, & poſt hæc membrum appoſite, vt diſtium eſt, collo- caro. Medicamento totum autem emplaſticorum, & lenticia ſua meatus obſtruentium, ſanguinemque ſiſtendi vim habentium optimum eſt, quod a Galeno in libro toties cita- to, cap. 4. deſcribitur, & accipit: Thuris partem vnam aloes, partiæ vnius ſemiſſim. Mox autem quum vtendi tempus inſtat, tantum huius pulueris cum oui candido lubigendam, quæ- rum vafi iplum, tum vulneri toti liberaliter imponitur. Alligandum autem id forniceus fascia ex tenui linteo, culus fasciæ primi quatuor quinqueve amplexus ipli proſu- enti vafi iniiciuntur. Ab hinc vafis radicem verſus ducuntur, in quibus videlicet parti- bus radicem verſus ducere licet. Licet autem ſere in omnib. præterquam cerebri mem- branis.

Cucurbit.
Quinque
ſanguinis
proſuſio
ſiſtitur.
Auentes:
ta-
Cucurbi-
culæ le-
ues.

Inſtenuan-
tia.
A.

Aph. 3.
& 13.

Vulnera
occluden-
tia.

Venerum
& arteria-
rum vul-
nera ſui
occlude-
re ſunt
ſitus vul-
neris
pauca & p-
pulis.

Locaſia
remedia.

Medica-
menta
emplaſti-
ca.

Radix va-
bis
Palais.

branis: Radicem autem vaſis, cum Galeno vocamus ptio-^Arem eius partem, quæ velioci-
nori propior eſt, vel etiam cordi. Hæc in collo ab interiore iſt parte, in manibus & cru-
ribus a ſuperiore. Laudatur & hoc medicamentum, quod recipit: *Boli armenii, ſanguinis*
draconis, ſthuris, albei ſucco citrino, pares portiones. Terantur in puluerem: qui apponitur, vt
comprehenſum eſt. Ceterum medicamenti iam dictis admotis, ante tertium diem
deligatura ſoluenda non erit. Vbi autem tertio die ſolueris, ſi tuto adhuc medicamen-
tum emplaſticum vulnere adhæreret, aliud rurfus ſuper ipſum accommodabis, ac veluti
linamentum id quod ex pilis tactum inheſit madefaciens, deligabis ita vt initio deliga-
ſti. Sin prius ſua ſponte reiecerit linamentum radicem vaſis digito blande compri-
mens, ac videlicet quippiam conſuatur, hoc quidem ſuſpenſa manu ac ſenſim adimes,
atque alterum impones. Adhunc modum quod carne obducetur, ac munietur vas cu-
rare debebis, vtique a principio ad finem uſque partuculam ſupinam ſeruans. Sit tamen
figura ſicuri mediocris. Vitandum enim, ne dolor incidat, ac rurfus profluuium excitet:
quom nihil ſit quod profluuium magis quam dolor prorit, & phlegmonas augeat.

Crustam in
ducentia.

⁴Quarto, ſanguis e vaſis excretio ſiſtitur per medicamenta, quæ cruſtam efficiunt,
iæmque Græcis vocantur. Quippe hanc quoque ceu ſeptum quoddam huiusmodi
vulnibus veteres excogitarunt. Maxima vero neceſſitas vel cruſtificis medicamen-
tis, vel ignis ſerramentis, Galeno citato in loco teſti, vtendi eſt, vbi ex eroſione putrefcen-
tialicuius profluuium ſanguinis concitatur. Hic certe modus ſiſtendi ſanguinem perfi-
citur, cum caudentibus ſerramentis, tum medicamentis cruſtam inducentibus, quibus
cuni calore adſtringendi ſacultas eſt coniuncta. Cuius generis ſunt *chalcantros, mi-^Cſſy, & chalcitri, ſive iis uſſis ſive inuſſis utari.* Quæ autem ex calce viua, id eſt, non exſtincta
conſiciuntur, valentiora quidem hiſ ſunt: ceterum quia adſtringendi vim non habent,
cruſtæ quæ ab ipſis ſiunt, citius decidunt. Hærent autem diutius, quæ ab adſtringenti-
bus. Quod vtique eſt longe vtilius, quando ita prius naſcitur in imo earum caro, effici-
turque profluenti vaſi velut operculum. Vnde nec noſmet præcipites eſſe, veluti non-
nulli ſunt, ad cruſtas detrahendas oportet, vbi profluuii ſanguinis periculum imminet.
Si enim properes illas detrahere, taotum inde accidit interdum ſanguinis profluuium,
vt vix cohiberi queat. Quocirca aduſſio facienda eſt ſerramentoſis vehementer igni-
tis, & valentet in profundum adaſtis, quo cruſtæ ac profundæ cruſtæ ſiant, quæ nec ſa-
cile ſeparentur, atque decidunt. Hinc ſunt, qui cruſtificis omnibus præferunt *arſenicum,*
vt vocant, *ſublimatum,* idque ideo, quod protinus omnem ſanguinis proſuſionem ſi-
ſtat, & altam, ac diutius hærentem cruſtam indicat. Quinto, laoguis ſiſtitur, ſi totum vas
ſanguinem fundens per tranſuerſum præciditur. Huius autem neceſſitas, vt loco iam
ſapius citato reſtatur Galenus, in iis maxime incidet, quæ ex profundo loco teſtæ aſsur-
gunt, præſertim per anguſtas, vel principes partes. Quippe ita retrahitur ex vtraque
parte, pars vtraque, celatiorque, ac integitur ſupetiacentibus corporibus vulnus. Poſt
hæc pulvis aliquis ſanguinem cohibens vulnere inſpergendus, & ſtupæ vel ſpongia me-
dicamenti ſacultatem ſupprimendi ſanguinem habentibus imbuta ſuperalliganda
erit: & figura particulæ vulneratæ accommoda, adhibenda. Turius tamen eſt, vincu-
lum ſeu funiculum vaſis ſanguinem fundentibus iniicere. Proinde ſi alia auxilia pro-
fluuium compellere nequeant, vaſa nudanda ſunt, & hamulo apprehenſa, mox funi-
culo aliquo gracili, vt filo ſerico, excipienda, ac ſortiter ſtringenda ſunt. Poſt medica-
mentum agglutinans vulnere apponendum erit, & membrum ſalcis, vt oportet deli-
gandum, ſitue quo appoſito collocandum. Vinculum autem radici vaſis iniiciendum e-
rit. Hiſ peractis, implendum carne vulnus quam primum eſt, priuſquam funiculus a
vaſe decidat. Niſi enim producta caro prius locum, qui circa præciſam atteriam eſt im-
pleuerit, ſi locus aliquis vacuus ſuperuerit, vtique quod Græci *ſoluerum* dicunt, comi-
tatur. Vbi itaque vas vinculo eſt complexus, aut ſerramentis ignitis uſus, illudque ri-
bi curationis propoſitum reſtat, vt quæ circa vulneris labra ſunt carne impleas, iſſe-
dem omino medicamenti vtendum erit, quæ in caui vulneris curatione ſunt di-
cta. Siccioribus autem medicamenti, vt hoc etiam adiciamus, eget arteria, quam
vena, quanto ipſa eſt ſuapte natura ſiccioris temperamenti, quam vena: quemad-
modum hæc omnia Galenus copioſiſſime *libr. 5. Ther. methodi, præſertim eius caput. 7.*
proſequitur.

Crustæ non
temere de-
trahenda.

Arſenicum
ſublimatū.

Præciſio va-
ſis.

Arteria ſe-
ciore quā
vena medi-
camentis
 eget.

Depun.

A *De punctura nervi, seu punctim vulnerati nervi. CAP. XII.*

Nervi, *Galen. libr. 6. Ther. method. attestante*, quandoque punctim, quandoque casim vulnerantur. Eorundem quoque vulnera interdum sine contusione, interdum vero cum contusione accepta sunt. Ex puncturis autem quædam hiant, atque apertæ sunt: quædam cæcæ atque oclusæ manent, adeo ut earum ora sic conniveant, ac inter se coeant, ut conspectum effugiant. Quarum omnium vulnerationum causæ sunt ea, quæ in eis, ut conspectum effugiant. Quarum omnium vulnerationum causæ sunt ea, quæ in eis, ut conspectum effugiant. Causa.

B neque evulsionem moliri statim oportet, neque coacta, siue in vnum coniuncta conservare. Quin potius vulnus apertum, inglutinatumque custodire. Itaque infixæ duntaxat, si quæ nervis infixæ sint, extrahenda, & obliææ particulæ substantia servanda. Ceterum qua ratione nervis maxime aduersetur, calidus vero phlegmonem accersat. Partis vero ipsius laborantis, hoc est, puncti nervi substantia optime servabitur, si & dolori, qui ob exquisitum & excellentem laborantis partis sensum vehementissimus excitari solet, sedulo, ac mature occurratur, & phlegmonem fieri prohibeamus. Quæ sane duo necessarii, nisi obstruimus, nervi puncturam consequuntur, & subinde convulsionem accerunt. Proinde ut geminum hunc scopum assequamur, hoc est, dolorem ac phlegmonem prohibeamus, primum necesse erit, ut is cui nervus punctus est, victu extreme tenuissimo utatur. Locus etiam, in quo ille cubabit, rapidus esse debet, quum frigidus nervis maxime aduersetur, calidus vero phlegmonem accersat. Letulus vero mollis sit. Sed & pars ista cetera ratione collocari debet. Optimum etiam est, laborantem quiete uti: moveri enim & ambulare, nisi sanus, alienum est. In quiete igitur, ac lectulo molli hominem continere oportet. Secundum loco materiam, quæ doloris ratione nervi laborantem locum confertim conflueret, subtrahere oportet. Quæ qui dem in re Galeni nobis omnino sequendum consilium, qui *libro sexto, Ther. method. capite secundo*, sub x in nervi punctura totum corpus sanguinis missione manendum esse, utique si virtus robusta fuerit, & nihil aliud obstruerit, etiam si nulla ad sit in laborante corpore sanguinis redundancia. Morbi enim magnitudo, ac doloris vehementia, corpore etiam nequaquam plethorico existente, hoc genus auxilii plerumque, ut *capite primo capite octavo, libri de curandi ratione per sanguinis missionem Galenus ostendit*, desiderat. Porro in hac per sanguinis missionem vacatione, partium rectitudo & consensus, ut alibi scribitur, docuimus, semper servandus erit. Quod si vero vitiosis humoribus corpus repletum sit, protinus, *eodem Galeno teste*, illud congruo medicamento purgandum erit. Levis etiam frictio recte adhibetur, sed his partibus, quæ a vulnere longius absunt. Tertio loco dolorem plane sedate, & æruginosam saniem educere oportet. Quapropter quæ vulnes imponuntur medicamenta ad utrumque sint comparata, tum ut dolorem mitigent, tum ut exitum saniei patefaciant. Tutius vero fuerit etiam in nervis acu, aut pexillo, aut quopiam rali compunctis, præsertim si in altum punctura descendit, & conspectum effugiat, cutem in vulneris orificio aperire, ac latius incidere, quo melius sanies effluat, & commodius ad profunditatem loci, medicamentorum vires perveniant. Porro aliis cultro rasorio, aliis vero cauterio cutem ipsam aperiendam esse, magis placet. Galenus in id genus puncturis, orificium duabus in cures sectionibus rectis dividere, *lib. 3. de compos. medic. generalium* præcipit. Proinde nisi ora angustiorum eiusmodi punctum appetantur, convulsionis periculum imminet: quod scilicet obcaecato ita cutis vulnere, nihil a profundo extrorsum exspicit. Facta autem cutis apertione, mox vulnus exsicandum est aliqua substantia tenui, ac modice excalescente, adeoque citra dolorem exsiccante: quum sola hæc ex profundo trahere saniem, neque contra ista, neque demotisa particula, possit. Cuius quidem generis est oleum Sabinum, præsertim vetus, quod tanquam utilissimum ad præsentem curationem, *lib. 6. Therapeuticæ methodi, c. 3. de compositione medicamentorum generalium* Galenus deligit. Utandum autem omnino est oleum etudum, & quod adstringendi vim habet, cuiusmodi est oleum myrsinū, tribus saltem primis diebus. Hoc enim per halitum non digerit, sed obstruit, & perspiratum prohibet. Præstat igitur nervos punctum ictos tenui oleo, & adstrictione

Causa.

Signa.

Curatio.

Vitus rati.

Materie
qui h. rati
laborant.Sanguinis
missio.

Purgatio.

Dolores
sedatio.Punctura
in lacuna.

*Frigida ac-
rit non ad-
hibenda.*

aph. 18.

*Doloris se-
dato.*

*Remedia
per metho-
dum iust-
itae experi-
entia conſi-
lit. aut de-
bet.*

*Emplastru
Galen.*

*Conuulſio-
nis prae-
ſer-*

Vaguentu.

*Si nervi vul-
nerati phle-
gmoc oc-
cupentur,
aut putre-
ſcant.*

profus carente, perfundere: quale dulciſſimum eſt, quod longe melius erit, ſi duos aut tres annos tranſegerit. Sed neque Sabinum etiam ipſum oleum, quamvis ſit tenuiſſimum, aut aliud quodvis ſimile, frigidum ad mouendum eſt, calens: frigidum namque, praeterquam quod nervis adueſatur, Hippocrate atteſtante, tenues quoque meatus obſtruit, & ipſos anguſtiores efficit: calidum vero diſcutit, ac dilatat, doloreſque magis demulcet. Si vehemens dolor laborantem diſcruciat, oleum ex vitellis ouorum com-
mode adminiſtratur. Eandem ob cauſam Galenus ſepe vſuſe eſt terebinthina reſina, per ſequidem in pueris, ac mulieribus & generatiuiſis qui molli eſſent carne: cum eu-
phorbio veto emollita, in duris corporibus. Non ſecus autem & propoli, non per ſo-
modo, verum etiam cum euphorbio ipſam molliens, vſus eſt. Quod ſi durior eſſet, cum
tenui quopiam oleo. Quin & ſagapeno in duris corporibus vſus eſt Galenus, vtiq; cum
oleo & terebinthina id miſcens. Sed & opopanax ad eundem modum, quo & ſagapo-
no. Mihi veto & lacryma, inquit Galenus, Cyrenaiſica non inutis furo videtur, ſi quis
emplastrum ex ea faciat, cuiusmodi eſt, quod nos ex *Euphorbia* compoſuimus. Verum,
inquit, nondum alia experientia, *quemadmodum reliqua omnia*, comprobauimus. Quippo
praecedere oportet eam, quae vera methodo proficiſcitur, remedium inuentionem:
huius vero experientiam, ad certiotem etiam fidem ſubſcribere. Siquidem ex tali me-
thodo etiam ſulphur, quod necne ignem expertum, neque lapidum ſit, ſed omnino
tenuium partium, ei, cui nervus vulneratus eſſet, conducitur ſperauimus. Eandem
eius tenui oleo miſcens, dum quod ex vtriſque mixtum erat ſordium haberet craſſitu-
dinem. In valentioribus vero durioribusque corporibus etiam ſi ad mellis craſſitudi-
nem redigas, ſic quoque iuueris. Nam id quoque experientia comprobatum eſt. Re-
ſeruet etiam alia quaedam remedia ad inſtitutum noſtrum accedendum loco citato Ga-
lenus, quae apud eundem reperire licet. Inter multa vero alia emplastrum ſe ex cera, re-
ſina, terebinthina, picis & euphorbio compoſuiſe refert, quo plurimi ſua aetate Medi-
ci felici ſucceſſu vti ſunt. Recipiebatur autem ex cera partem vnam: ex terebinthina & picis,
vtriuſque partis vnius dimidium: ſic vtrique ex vtriſque conſtaretur, cera par eſſet: ex
euphorbio vero cerae partem duodecimam, etiam plus aliquando, vbi ſcilicet valentius
efficere eſſet in animo. Licet autem inrerim & plus ſit, quod ex terebinthina & picis
conſit, quam cera, ſicet ratius & alterum eorum tantum cerae admiſcere. Quin etiam
in penuria terebinthinae reſina abietina, aut laticem comode admixcebitur. Em-
plastro vero aliquo ex prius memoratis appoſito, lanam mollem oleo calente madefa-
ctam ſupra decenter alligabis, *quemadmodum lib. 6. Ther. method. c. 3. de compoſitione medi-
cament. generalium Gal. monſtrat.* Porro ſi puncto nervo, vel quouis modo vulnerato, aut
etiam coſuſo, coſuſio acciderit, aut eius metus ſaltem ingruat, protinus caput, collum,
atque vniuerſam dorſi ſpinam, oleo lilioru vel coſtino, laurino, ſpicato, vel ex pulegio,
vel communi, ad diro caſtorei & euphorbii momento, fouebis. Quod ſi in ſuperiori-
bus partibus, vt manu, vel brachio, id genus vulneris nervus acceperit, praeter iam co-
memoratas partes, axillas quoque vbertim calenti oleo delinies. Si vero punctus, aut
quouis modo vulneratus nervus, ex iis ſit, qui in cruce habentur, inguina, pubem, & lo-
ca vicina, largo ſtatim oleo imbues, per vniuerſam ſpinam ad collum & caput vſque
aſcendendo. Sed & tendones, & ligamenta, ac loca ipſa vulneri vbiuſ illato propinqua
eodem modo fouebis. Inter alia vero multa praefidia, hoc prolatum vnguentum, quod
accipit olei moſchati, muſcallinum vocant officina, vncias vnam. Petroles nomenclati ſemunciam.
Olei communis, iunyeri ſingularum vncias quatuor. Cera, vncias vnam. *Stiractis calamitha, ſti-
racis rubra ſingularum drachmas duas & dimidium. Muſtiche, olibani, lacryma hedera ſing. vnc.
vnam & dimidiam.* Ex iſ ſomnia quae liqueſcere poſſunt, igni ad moueantur. Alia vero
trita & in puluerem redacta illis remiſceantur, poſtremo addatur ſtyrax, & ſia vnguen-
tum: ex quo moderate caleſceto ceruix, & vniuerſa ſpina, vt comprehenſum eſt, inun-
gatur. Ceterum nervorum vulneribus, maxime punctum inſixis, perpetam a principio
curatis, maxima omnino phlegmone, & putredo ſuperuenit. Ergo quum netui vul-
nerati ſic iam phlegmone tentantur, & putreſcunt, ſarınam hordeaceam, aut fabaceam,
aut porius eruınam, in aqua hixia, aut oxymelite, vel ſerapio acido decoctam, loco
phlegmone occupato, & putreſcenti ſtatim illinere oportet. Non autem turticeam fa-
rinam, aut eius genetis cataplaſmata, quae particulam putrem efficiunt: imo vero ne-
que aquam

A que aquam calidam adhibebis. Hæc enim tamen reliquis phlegmonibus est accommodatissima, ut quæ eas valde mitiget. vulneratis tamen nervis est infestissima. Ab humedantibus namque, & calefacientibus medicamentis, putredo huiusmodi affectibus comparatur. Quod si vehemens phlegmone cum maximo dolore infestauerit, etuinam farinam, aut tabaceam, cum optima sapa, addito paucissimo aceto, decoctam, illi-
Aqua calida vulneratis nervis infestissima.
 nito, prius tamen laborante parte oleo calido assatim perfusa. Tanta vero interdum ex eiusmodi puncturis, & nervorum vulneribus oboritur putrefactio, ut candenti ferro, vel caustico aliquo medicamento, cuiusmodi est *Aegyptiacum*, eam adure re cogamur. Quo autem pacto ceteris quæ vulnera sequuntur symptomatis, ut sunt *resolutio & sympte-*
B *pe*, sit medendum, ex prioribus libris discendum erit.

De nervo casum vulnerato. CAP. XIII.

SI nervus non punctum, sed plane casum vulneratus fuerit, diligenter considerandum est, *Galeno libr. 6. Ther. method. cap. 3. restit*, quo pacto facta sit vulneratio: *utrumne per transversum nervum, an per longitudinem eius: tum vero, quoniam incumbens seu prela-*
centu cutis diu sum sit. Ad hæc spectandum etiam est, *num totus nervus diffusus sit, an non ex toto praecisus.* Eiusmodi namque vulnerum differentiarum curandi rationem non parum variant. Quapropter si cutis quæ incumbit scchio non sitis pateat, ampliori divisione aperienda est, vel supra etiam monuimus. Proponatur igitur primum, satis esse cutis ad-
C apertum, non ita tamen hiare vulnus, ut nervus ipse incisus sensui nudus adhuc appareat. Sane huiusmodi nervi scissura siue per longitudinem, siue per transversum facta diuisio sit, ultra communes tres in punctura nervi obliervandos scopos, tres adhuc alios obtinet. *Primum* est, ut in loco vulneris magis declivi linamentum aliquod molle, blande imponatur. *Alter*, ut aliquod medicamentum anodynum, leuimigatorium, nervis dicatum, vulnere superponatur. *Tertium*, ut lana mollis iuccida, vel oleo calente delibuta, desuper blande alligetur. Ergo non ita exquirere vulneris oræ committenda sunt, & glutinanda, quin e missarium aliquod relinquatur, per quod collecta sanies effluere queat. Hæc enim si in profundo retineatur, nervus putrefactionem & corruptionem inducet, atque ita etiam convulsionem accerset. Eam ob rem profuerit,
D primum saltem diebus, linamentum aliquod molle ex terebinthina, ouiluteo, & croci momento illitum loco vulneris, ut dictum est, decliviori molliter immittere, donec nullam amplius phlegmonem, aut convulsionis periculum sit. Medicamentum autem his nervotum, acetum tendinum vulneribus, casum non punctum ac ceptis expeditissimum, apprimere idoneum esse ab omnibus creditur, quod vnguentum ex ver-
 mibus vulgo vocatur. Recipit vero *centaurei minoris, cynoglossi, plantaginis minoris, polo-*
felles nuncupata, consolida maioris & minoris, singulorum men pulum unum. Lumborum seu
vermium terrestrium, libram semis. Olei communis, libram vasum, & semis. Subigantur simul, & ita septem diebus fermententur. Deinde illis addantur *sepi arctii a pilulis emunda-*
ti, libra una. Picis nigra, resina, singulorum quarta una. Ammoniaci, galbani, opopamaci in ace-
to dissolutorum, singulorum drachma quinque. Simul omnia lento igne decoquantur vique
E ad vini & aceti consumptionem, & colentur. Vbi vero hæc pene retrixerint, adde *tere-*
binthinam, quartam semis. Thuris, mastiches, serrocolla, singulorum drachmas tres. Croci, drachi-
mas duas. Spathi agitentur in mortario, & fiat vnguentum. Potro longe alia multa medica-
 menta, parata etiam facilia, hisce nervorum diuisionibus valde accommodata referuntur
 a Galeno libr. 3. de compositione medicamentorum generalium, & sexto Ther. method. Cuiusmo-
 di est quod ex *oxy-melisse, fabarum farina, veteruorum, vel lili, vel cicieris, vel lupinorum ama-*
rarum, vel hordeaceæ farina cataplasma conficitur. Item, *pix liquida fermento temperata, atque*
vulneris imposta. Erorum quoque, aut alia ex prædictis serina fermento permixta: Imo & in-
serti in fermentum ipsum solum. Quin etiam *ex oleum solum quod calcat, modo acutum abunde*
F *acre & rectum sit.* Propolis quoque recens liquida, & pinguis vulneri imposta, sæpe præsidio fuit,
 interim quid per se, interius fermento commixta. His itaq; præsidis ad nervotum vulnera tum in
 agitis, quæ in vrbib. felici admodum successu Gal. sæpe vltus est: non solum in his quos iam phleg-
 mone phendcrat, sed etiam protinus ab initio. In summa, oportet medicamenta omnia quæ
 nervorum vulneribus tam casum, quam punctum inflatis ex vltu futura sunt, ea pollere facultate,

Aqua cal-
da vulnera-
tis nervis
infestissi-
ma.

Vnguentum
ex vermi-
bus

Qualis in
vulnere
medicame-
ta esse de-
bent, nec-
essarium val-
entibus ac-
commoda

264 Operum Leonhard. Fuchsi Pars III.

quæ & modice calefacere, & citra dolorē exsiccare queat. Tum ea, ut dictum est, substantiæ quoque esse natura, quæ ex alto saniem atque humores educere, & discutere valeat. Atque ex iis minus molesta esse consueverunt, quæ liquida sunt. Super eiusmodi vero medicamenra lana mollis succida, vel oleo calente resperfa apponenda est, & leniter obstringenda. Ceterum quoniam frigus tum omnibus, tum vero maxime nervorum vulneribus infestissimum est, plurimum conferet lanam ipsam superpositam permanere calidam, siue oleo tantum, siue oxelxo quoque imbuta fuerit. Hoc fiet si aliæ lanæ siccæ vellera, aut pannicalidi subinde mutati extrinsecus circumponantur, & æget intra rectum, si modohyems fuerit, ad quintum vsque, vel septimum morbi diem lele contineat. Nam si eo vsque phlegmone non tentetur, vacetque prorsus dolore, & nullam sentiat tensionem, in postetum, Galeno attestante, tutus erit. Atque hæc de nervo casum vulnerato generatim dicta sunt, siue per transuersum, siue per longitudinem seu directum nervus diuisus sit. At si nervus per transuersum vulneratus sit, nō tamen ex toto præcisus, maior conuulsionis metus impender, phlegmone scilicet a dissectis fibris ad integritas & non lētas succedente & communicata: ceterum cōuulsione ab ipsis non lētis excitata. Huic sane prius memoratis præsiidiis quam citissime occurrendum est. Ergo in quiete omnino, & strato molliſſimo continendus æger est, plurimoque oleo affratim & assidue in inguina, spina axillæ, collum, & caput perfundendum. Ceterum in hoc vulnere Gal. lib. 6. Ther. meth. cap. 3. auctore, sanguis largius mittendus est, & victus tenuior adhibendus, quam in nervo per longitudinem inciso. Quod si conuulsio iam superuenerit, & nulla conuenientium medicamentorum vi remittatur, reliquæ fibræ quæ integræ remanserant, præcidi debent. Si enim totus nervus præcisus sit, nullum quidem præterea conuulsionis periculum sequetur, mutila tamen particula manebit. Verum læſio: quam mors, potius optanda. Porro si transuersa hæc diuisio, tam insigniter alta in musculo facta sit, ut deligatura nihil prodesse possit, non dubitabis musculi distantes inuicem pariter, præsertim si vulnus recens fuerit, futuris altioribus contrahere: cera tamen semper adhibita, ne ab acu nervus, vel tendo cōpungatur. Carnosa namque ipsa musculorum pars, dum acuisuitur, periculo vacat. Nervus vero aut tēdines, non mediocri periculo consueunt. Quod exemplo gladiatoris cuiusdam Gal. lib. 3. de comp. med. generalium, copiosius monstrat. Has aurem futuras in eiusmodi vulnere ideo non superhicietenas, sed altius moliri conuenit, neq; in imo sunt, inglutinata dehiscant. Reliqua vero quæ ad vulneris curationem attinent, hic quoque sunt eadem, etiam si totus nervus præcisus sit. In solo itaque per transuersum accepto vulnere, eodemq; insigniter alto, quum deligatura nihil prodesse potest, ex sola futura curatio absoluitur. Et enim in vulneribus iuxta membri longitudinē factis, deligatura vulnerati musculi partibus inuicem contrahendis sufficit Galeno. Porro futura decenter facta, biduo conluta, vulnus vouendum erit relacco, in quo lumbrii tetrestes prius decocti fuerint: ac supra puluis aliquis qui suturam contineat aspergendus erit, cui parem ipsorum lumbriorum desiccatorum & contritorum portionem, si lubet, adicies. Quidam enim memoriæ prodiderunt, eiusmodi terræ intestina contrita, nervisque diuisis imposita, protinus mirum in modum prodesse, ut lib. simpl. 11. Gal. refert. Sunt qui & centaurium arefactum, & contritum etiam inspergunt. Medicamen enim est admodum desiccatorium, mordacitatis expers: quodque si glutinatoris & desiccatoris miscetur, vlcera maligna sanat. Sed de huius stirpis facultatibus lib. 7. simpl. plura Galenus tradit. Nudato autem nervo, omne curationis consilium huc tibi dirigendum est, ut minima cum ratione siccis. Proinde si nervus non punctum, sed plane casum vulneratus fuerit, cure etiam quæ in cūmbebat diuisa, adeo ut vulnus appa-teat, nullum iam supra memoratorum medicamentorum, quæ ex euphorbio, ac similiter actibus emplastri specie sunt, applicabis. Nudatus enim nervus vehementem ipsorum vim ferre nequit, ita ut quum interposita cutis erat, tulit. Optime igitur eo casu feceris, si & calcem, & pompolygem, thuriam officinæ appellant, ac metalla omnia, resinas quoque, olea, mel & ceram, quæ eiusmodi medicamenti nudato nervo ac diuiso apprimedoncis miscenda sunt, eluens: quo scilicet citra rationem vlam sint siccatura. Quippe medicamenti omnibus, ut lib. 6. Therapeutica methodi, cap. 3. & lib. 9. simplicium restitit est Galenus, quæ laueris, acris, mordenæque humor eluendo detrahatur. Tunc igitur præstantissimum erit, calcem

Nervi per
transuersum
cui cura-
tio.

Hic nota de
gladiatoris
in semore
vulnerato.
Auctore aut
altiora et
sedebant.

Centaurii.

Nervi con-
sum vulne-
rati & vnde
curatione.

Nudatus
nervus ut
humorem
medicamen-
torum vim
ferre non
poteat.

æstatis

- A** zstatis tempore, in diebus canicularibus sub sole aqua salubri atque dulcissima sæpius lotam, & exsiccatam, plurimo optimoque oleo rosaceo admixtam apponere. Congruit & hoc casu medicamentum quoddam pompholyge, ut dictum est, elota sit, largiote tridem, ac probatissimo rosaceo salis omnino experte solutum liquatumue. Salubre quoque medicamentum est, quod ex melle optimo sub emplastris specie componitur. Solui vero id etiam rosaceo oportet, quod tum reliquis conditionibus sit optimum, cum salis omnino expert, ut scilicet minimam rosione siccet. Si vero robustus sit qui vulnus accepit, & cui sit corpus a superuacuis humoribus mundum, in hoc casus est id in valentioribus remediis nonnullis uti, ut pastillis seu trochiscis ex Polyida auctore, *lib. 3.*
- De compositione medicamentorum generalium a Galeno descriptis, sapa calida solutis, & in linamentum illitis.* Id autem vel in primis semper habendum curæ est, ne quid ex his quæ vulnus conungent, frigidum sit: quandoquidem ipsa laborant particula, & sensilis maxime est, & principum partium potissimum principi, cerebro nimirum, continua, & temperamento suo frigida. Quorum omnium occasione, & ex his si a frigido offendetur, & suam offensam cerebro impertit. Ceterum eiusmodi vulnus etiam operfundendum non est, præsertim quum nunc commemoratis pastillis curatio suscipitur. Nam oleum illorum vinibus aduersatur, & sordidum vlcus reddit. Neque enim parum intereit, nudone nervo oleum, an per interpositam cutem admoveas. Abluenda igitur a vulnere sanies est, molli lana specillo circumuoluta, in sapa tepida intincta, & in ox ex pressa. Quod si omnia bene atque ex animi sententia succedant, etiam vino dulci, non acri & mordaci, vulnus madefacere citra periculum licebit. Vulnere autem iam pene cicatrificato, nudone nervo oleum, utile etiam fuerit album, tenue, & quod inultam aquam tolerare nequit. Aquæ vero vltim, ob causam prius commemoratam, sicuti & relaxans cataplasma in eruo nudato semper deuitabis. Blande quoque ac suaviter vulnus, si necessitas vrget, detergebis vnguento ex vermibus facto, vel alio quo alio deterfitorio medicamento, quod recipiat probatissimum mel, terebinthinam, & farinam hordei, aut fabarum. Postquam autem nervum denudatum contexeris, linamenta extrinsecus circumducere oportet, ex medicamento, *inquit Paulus*, quod angustus vulneribus faciat: nempe eo quod ex euphorbio præparatur, aut simo columbino, sed ita ut etiam sanas partes ampliter comprehendat.

D *De nervi constitutione. CA. P. XIII.*

- N**ervorum contusio eandem habet cum carniū contusione generationem. Signa vero ex ægroti narratione cognoscuntur. Contusis autem nervus, ubi cum hoc vna cutis contusa exulcerataque est, medicamenta postulat, quæ partes per contusionem a se dissi dentes contrahere, constringereque sunt apta. Si vero absque cutis contusione nervus contusus sit, huic auxilia quibus euocandi ac discutendi facultas inest, adferenda sunt. Contuso igitur nervo, si cutis simul contundatur, & ulceretur, fabarum lomentum oxymelitem dilutum, aut si magis siccare voles, eruinam farinam cum sapa, & modico aceto illines. Quod si amplius adhuc siccare desideras, itum quoque illyricam, vel eam quam vulgo florentinam vocant, immittes. Recentiores in hoc affectu per initia rosaceum cum oui candido liquore admovent, & mitigato dolore laborantem particulam vino tepidato foveant, quod crasse sit substantiæ, & ad strictionis particeps. At si vna cum contusione dolor intellet, liquidam picem cataplasmati et farina fabarum adicies: & ubi simul bene decoxeris, calens medicamentum applicabis. Vniuersi autem corporis curatio eadem est cum ea, quam paulo ante docuimus. Verum si nervus quidem contusus sit, cutis vero nihil quod sensui appareat, a natura recesserit, oleo calente discusso, quale *anethum* est, & *rutaceum*, *irinum* quoque, continue locum irrigabis perfundisque læpissime, & lana oleo imbuta fovebis, ac totius corporis curâ prædictis similem adhibebis. Porro si nervus totus sit præcisus, metus præterea nullus instat convulsionis, mutila tamen particula manebit, præsertim si dissectus nervus insignis magnitudinis fuerit. Curatio vero eius communis est cum ea, quæ aliorum est vltimum.

Nihil frigidum nudone nervo ed mouenda.

Causa. Signa. Curation.

Si cum nervo cutis est tuta sit.

Si citra cutem nervus cõtus sit.

Si nervus totus sit, præcisus.

266 Operum Leonhard. Fuchsi Pars III.
LEONHARTI FVCHSII DE MEDICINIS VLCERIBVS, LIBER SE-

PTIMVS.

De vlcere simplici, & quod solum confistit. CAP. I.

Vlcus quid?



LCVS, quod Graecis ἡλκος dicitur, est solutio continuitatis citra vulnerationem, in carnosa parterelecta. Vlcus vero simplex, Galeno lib. 3. Therapentica methodi cap. 4. testis, est carnosae particulae diuisio, citra vilius portionis amissionem. Vlcus autem quod solum confistit, est, cui nec affectus vilius simul adest, nec symptoma. Causa vlcis est cacochymia, hoc est, succorum vitium, quod corporis ipsius particulas arrodere, & tandem corrumpere possunt. Signa vlcis, perinde atque vulnerum, & sensus, vilius praesertim, iudicio, petenda sunt. In vlcis autem curatione duo nobis spectanda proponuntur: nempe, num vlcus simplex & solum sit, ipsumque adeo per se, aut cum alio quopiam vno affectu, multisue consistat. De eius autem, quod solum est, & simplex, curatione hoc loco dicemus. Omne itaque vlcus, quia vlcus est, vnam communem habet curandi indicationem. Siquidem, ut Galen. lib. 4. Therapentica methodi cap. 5. testis est, vlcis, quia vlcus est, sanatio, mediocris siccatio est. Principio itaque necessarium est, ut humores prauos ac vitiosos, quibus laborantis corpus refertum est, quique in partem vlcisatam influunt, vacuentur, corrigantur, & fluxionem ipsam interceptiendo auertantur. Auxilia autem, quibus humorum vitium commodè tollitur ac corrigitur, sunt, purgatio, & proba vlcis ratio. De quibus iam saepe in praecedentibus est dictum libris. Fluxiones vero intercepti puerunt ligaturis, persufusionibus, epithematis, item vnguentis ex bolo armenio, & aliis refrigerantibus, ac adstringentibus. Quum igitur exulceratis partibus influit succus, nec multo plus iusto, nec multo deterior sit, auerti hunc regetique conueniet, adstrictis scilicet, refrigerantisque iis particulis, quae ante exulceratae sunt. Incoanda quoque deligatio est a laborantibus ipsa particula, deducendaque versus sanam. Talis enim deligatura meatus adstringit, per quos materia ad vlcisatas particulas influit. Quod si fisti compescique medicamentis influxus nequeat, causa eius inuestiganda est, atque haec prius adimenda. Ac si quidem ob partis, quae fluxum recipit, imbecillitatem id fiat, huic nimirum medendum est. Deinde vbi corpus iam a vitiosis humoribus abunde purgatum fuerit, & humorum influxus cohibitus, ad vlcis curationem, hoc est, vniotionem, quae per siccationem fit medicamenta, progredien dum erit. Dictum autem est de hoc copiose supra lib. 6. cap. 1. & 2. Quare ne cadē identidem vbiq; repetenda sint, ex iis locis, quae ad rem praesentem attinent, requirenda erunt. Haecenus vlcis simplicis, & quod solum confistit, curationem breuiter perstrinximus. Nunc reliquum esset, ut caui vlcis curationem subiiceremus. Verum quum caui vlcis curatio a caui vulneris curatione nihil differat, & superioribus haec ipsa petenda erit. Nam capite. 4. praedicti libri hanc ipsam copiose tractauimus.

Causa.

Signa.

Curatio.

Causa vlcis curatio.

De vlcere cum intemperie. CAP. II.

Signa.

COMPLICATUR interdum cum vlcere intemperies carnis calida, frigida, sicca, vel humida. Quod calidior, quam par est, aut frigidior caro fuerit, partim colore, partim tactu, partim laborantis sensu agnosces. Quippe alias calorem sentite se fatentur, aliam manifestum frigus in particula, gaudentque vel frigidis medicamentis, vel calidis. Haec alii quidem tubor levis insidet, alii calor magis albicat. Sicca, si squalens siccaque videtur caro, intemperies cognoscitur. Humida vero, si humidior quam pro naturali habitu caro fuerit. Quaeque autem partes vlcisat per intemperiem aliquam a naturali habitu recesserunt, eorum sanationem per quae contraria vitibus sunt, fieri omnino est necesse, calidam vtiq; intemperiem refrigerando, frigidam calefaciendo, sic eam humectando, humidam siccando. Squalentem igitur & siccam catnem, aequa temperata fouens humectansque corrigit. Quoties autem eo remedio vteris, esto rite persufusionis humectationisque meta, ut quum primum rubescit, attolliturque particula moles, tum desinas. Quippe si vltra profundas quod attraxisti, id discuties: itaque nihil profeceris. Quin etiam medicamentorum humectandi facultas plenior esto, quam in sana carne praecipuum est. Si vero humidior caro fuerit, contraria ratio ineunda est, & medic-

Curatio.

A medicamentorum facultas ad succius transferenda, aqua vero nullatenus admovenda. Imo si laqueandum vlcus videtur, vinum aut posca, aut decoctum cuiusquam herbae preparandum. Quod si frigidior humidiorque locus sit, calefaciendo pariter ac siccando, & in aliis ad eundem modum vincentem videlicet qualitatem contraria semper oppugnans. Atque ubi intemperiei affectum iam sanaueris, deinde etiam exulcerationis affectum sanabis. Non aliter plane nunc curata intemperie, quam si citra vlcus incidisset. Quo manifestum sit, non esse vlcis, sed intemperiei propriam, omnem eiusmodi curationem, quae tamen vlcis ipsius sanationem omnino praecedere debet. Siquidem fieri non potest, ut in vlcere vel carnis productio, vel sinus cavitatisue impletio, vel agglutinatio, vel cicatricis inductio recte vnquam cedat, nisi subiecta caro pro naturali modo se habeat, *quemadmodum lib. 3. Ther. meth. cap. 1. Galenus copiosius docet.* Hæc autem recte se habuerit, si proprium temperamentum tueatur. Ergo si exulcerata caro iusto calidior, frigidiorue effecta fuerit, utique medelam exigit, quæ in tantum calfaciat tefrigeretue, in quantum ipsa a naturali suo habitu recessit. Subiecta namque carnis affectus, causæ rationem obtinet ad id quod efficitur. Quippe ex hac, & per hanc tum quæ dissident glutinantur, tum quæ caua sunt carne implentur. Itaque temperatam esse subiectam carnem ad vlcera tum glutinanda, tum carne implenda, prius oportet. Non est autem necesse, ut de curatione intemperierum longiorem institamus sermonem, quum in præcedentibus etiam libris de corrigendis intemperiebus sæpe dictum sit.

De vlcere cum tumore particula. CAP. III.

Ad eundem sane modum & partium, quæ cum aliquo præter naturam tumore exulceratae sunt, prius sanandus tumor est: fieri enim non potest, ut vlcus manente tumore ad sanitatem perducat. Quapropter omni studio laborandum est, ne phlegmone, aut quouis alius tumor in loco vlcerato exciteretur. Quod si tamen id probideri non potest, remediis dicatis curari debebit, vlcere interim non neglecto. Quæ autem omnis præter naturam tumoris curandi ratio sit, libro quinto abunde expositum est. Nunc quantum eius rei coniunctum cum vlcis curatione est, obiter ac breuiter tractabitur. Compendiaria autem obfessarum phlegmone partium, vlcetatarum curatione, *Galeno libro quarto Therapeuticae methodi, cap. quinto, teste*, per id genus præsidia obitur, quæ sine vel affectum prius summovent: vel si quid exiguum quod suppuret res, liquerint, alterum medicamentum acre, quod educere hoc queat, requiritur: vel si tenuis circumposita cutis sit, vel si quæ celerius explicatum ægrum, sedulo petenda est. Quod si cataplasmate ex hordei farina, aqua & oleo, quod calefaciat humectetque, illinantur partes vlcerae, quæ phlegmone insistantur, lenientis tractatio est, non medentis, & aduersus malum pugnantis. Id enim non ex prima ratione sit, hoc est, non ut re medium affectus, sed ut symptomatis mitigatio exstiterit. Siquidem ipsius phlegmones remedia, *ut auctor est in libro de vlceribus Hippocrates*, succiorum sunt virinum. Proinde si phlegmone vlcera obideat, vsus esse debet medicamentorum quæ desiccant, atque phlegmonem arcent. Ex liquidis igitur, Paulo attestante, laudatissimum est vinum adstringendi facultate præditum, deinde posca. Si vero sordes quoque cum phlegmone occupent, mulla diluta conuenit. Ex us autem medicamentis quæ sicandi potestate prædita sunt, communiter quidem conferent phlegmonibus dicata, quæ libro quarto descripta sunt, si oleosa aëriaque excipias. Priuam vero hoc proficit. Malum puni, cum dulce, vino incoctum tritumque illinitur. Mirabile nimirum, & multiplici vsu commendatum est remedium. Facit enim tum ad capitis, tum naturalium vlcera, tum etiam ea quæ toto corpore excruciant, oculorumque phlegmonas. Quod de phlegmone diximus, id enī de reliquis tumoribus præter naturam, ac symptomatis intelligendum venit. Si itaque erysipelas, aut eiusmodi quippiam vlceri accesserit, ita vtendum est. **F**ir præsidia quæ aduersus illa superius scripta sunt. Quod si vero dolor (nam & is vnum est ex symptomatis quæ vlcis curationem remotantur, & impediunt) aliquis vehementer vlcerae parti incidat, protinus hic aut tollendus erit, aut saltem quoad hebet demulcendus. Dolor enim, præsertim vehemens, vires prosternt & fluxionem prouocat, adeoque vlcis ipsius curationem prohibet. Proinde tamen quæ vlcerae parti-

Phlegmonis
vulnus
curatio.

Malum puni
vulnus
dilat.

Vlcis excrucians.

In com-
plicitis
affectibus
quid fac-
endum.

bus ut dolor ſedetur ad mouetur, vlceri aduerſantur, tamen quia ex vehemēti dolore plerumque laboranti imminet periculum, & propriam vlceris curationem moratur, ne-
glecto ad rempus vlcerē, dolori tanquam ei quod magis vrget, primum maximeque in-
tendendum eſt. In complicatis namque affectibus, id ex quo primum maximeque homini
imminet periculum, quodque magis accelerat & vrget, primum curari atque tolli debet.
Quibus autem prædictis dolor mitigatur, in præcedentibus libris copioſe eſt dictum.

De vlcere contuſo. C. A. P. IV.

Pus mo-
uentia.

Tetra-
pharma-
cum.

Catapla-
ſma ſup-
puratorio.

Vlcerata omnia, Galeni loco citato, & Hippocratiſ teſtimonio, præterea, quæ contuſa ſunt,
ſiccari debent. In iſenim, quæ cum cōtuſione facta ſunt, quam celerrime pus mō-
uendum. Siquidem neceſſe eſt carnes ſic contuſas putrefcere, vt noua tandem caro gi-
gnatur. Pus autē ipſum, ſiue carnis contruſæ ſuppuratio, cum alia putrefcentia ſit. Por-
ro quæ putrefcunt omnia, ex calido & humido ſic afficiuntur. Proinde ſit, vt ea, quæ calefa-
ciunt & humectant, omnibus iſis affectibus, quibus pus moueri expedit ſemper ad mouen-
da ſint. Hordei namque farina ex aqua & oleo temperata, item panis ex aqua & oleo, præ-
terea fomentum multæ calidæ aquæ, tetrapharmaci viſ, omnia denique, quæ calefaci-
unt & humectant, celerrime pus mouent. Ceterum tetrapharmacum, cui non contem-
nendus plane auctor, Cornelius Celfus, primas mouendo puri tribuit, conſtat pice,
reſina, cera & adipe. Viſus tempore oleo, vel butyro ſubigitur. Pix ſit mollior, reſina fri-
cta, vel colophonia: quæ in teneris corporibus oleo molliſ potest: cera pinguis, adeps
in mollibus corporibus vel ſuillus, vel virilinus: in durioribus taurinus vel hircinus ſit.
Caraplaſma quoque, quod ex farina triticea in aqua & oleo temperate ac mediocriter
cocta conſtat, ad pus mouendum non inutile eſt. Celerrime enim, quæ digeſtioni non
ceſſerunt, ad ſuppurationem perducit. Siquidem & calorem habet noſtro calori per-
ſimilem, nempe temporatum & mediocre: & ratione farinæ & olei, quæ lentiori
quippiam habent, quo meatus obſtruendo partis calorem natiuum diſcuti prohibent,
vi emplaſtica præditum eſt. Quæ duo maxime in marurantiſ & pus mouentiſ me-
dicamentis deſiderantur. Laudatur etiam cataplaſma ex radicibus alibæ, & caricarum dul-
cium ac pinguium decocto, quod melius craſſitudinem repræſentet, & farina triticea compoſitum. Ac-
cipienda autem prædicti decocti, libra vna. Farina triticea, libra ſemis. Incoquantur ſi-
mul, & in formam cataplaſmatis reducantur. Eſt & puri mouendo apprime idoneum,
quod habet corticis radicis alibæ, radicis lilii ſemenionis, ſolborum malui, ſingularum manipu-
lum vnum. Farina triticea, quartum vnum. Farina ſeminis lini, vnam vnam. Acumgia ſuſſila
recentis, libra ſemis. Coquantur herbz in aqua, quantum ſatis eſſe videbitur, & tondantur
cum reliquis in mortario, fiatque cataplaſma. Vulgo quoque nora eſt medela & cepi,
meribus coctis. Mirabile & hoc ad ſuppurandum, quod accipit cera, ſerebint hinc, medulla
cerui, adipis vituli, anſerini, bubuli, butyri recentis, mellis optimi, olei roſacci, myrrhæ ſingularum
vnam vnam. Myrrha cum melle ſubigitur, & prunis leuiter incoquitur, ex quo reliqua
adiecta ſedulo miſceantur.

De carne in vlceribus ſupercreſcente, quam hypercarcin Graeci nominant,
tollenda. C. A. P. V.

Morbis, quem Graeci *hypercarcin* vocant, ex eo genere eſt, quod in quantitate magni-
tudine partium ſpeciat: ex quo etiam genere & cauſa exiſſit. Veluti igitur vlcus quod
cauum, appellat, non vnum eſt vitium, ſed pariter & cauſas & vlcus: ita vlcus, quod
ſupercreſcentem carnem habet, non vnum eſt vitium, ſed ſiſſal caro ſupercreſcens,
& vlcus. Indicat autem magnitudo, quæ præter naturam eſt, primam indicationem,
ipſius ſcilicet exſuperantis ablationem. Atque hæc ſola medicamentorum ope perſi-
citur, non opera naturæ: contra quam in carne reſtituenda aut glutinatione ſe habet.
Hæc enim naturæ ipſius ſunt opera, medicamentiſ tantum, quæ actioni eius obſtant,
ſummuuentibus. At ſupercreſcentis carnis detractio, nullum quidem naturæ opus
eſt, ſed medicamentiſ perſicitur, quæ vehementer ſiccant. E quorum ſane numero,
Paulo lib. 4. cap. 43. teſte, ſunt: Diſphryges inſperſum, aut cataplaſmaſ inſperſat indultum: item ſqua-
ma aris, omniaque teſſacea combuſta. Erinaſci præterea & vitrique, tam terriſſre quam marini, cum
ſoto corpore cremati. Verum hæc non admodum eximie, ſed modice a mediocriter duntaxat pur-

- A** xar purgant, & supercrefcentia compescunt, *ut lib. 3. simpl. cap. 114. & 15. Galenus fufius docet.* Aliæ v. c. opetra flos longe validius id muneris obit: atque hoc magis adhuc *furi, chrysocolle, chalcitidis, myfi.* Quæ si combusta fuerint, minus vellicantur, ac rodunt: item *ariæ flos.* Ceterum ærugo his adhuc omnibus valentior est. Sales autem cremati, carnes cum humore flaccidas consumunt, ac liquefaciunt. Sic etiam linimenta e paniculo discerpunt, muria actioni imbuta, & denuo resiccata atque imposita, mediocres carniū supercrefcentias liquefaciunt atque exedunt. At in maximas carniū excrefcentias ad vique penitiora crustis obducunt, Faustiani pastilli triti atque inspersi. Item medicamentum quod recipit calcei viuz, id est, aqua non exstinctæ, squamæ æris, & mannæ, quæ miscet thuris concussis seu attritu elisa, pares modos, hoc est, æquales partes. Faustini autem pastilli habent, *aureipigmētī, drachmas duodecim. Sandaracha, quæ est rubrum aureipigmētī, & a natura magis excoctum, drachmas sex. Calcei vīna, drachmas octo. Charta combusta, drachmas vīnam. Buccarum myrsi succo vel decocto excepta, in pastillos redigito.* Ad hoc institutum vītiacū admodum est *Ægyptiacum unguentum.* Ceterum dum hæc caustica atque erodentia admouentur medicamenta, partes quæ in circuitu sunt, refrigerantia desiderant: ne scilicet in partem ex rosione vlceratam calore, & dolore humorum fluxio aduectur. Deinde crustæ vlcerebus inductæ resoluendæ erunt, & vlcus ad sanitatem perducendum.

De vlcere cum duricia, & labrorum decoloratione. C A P. VI.

- C** Vum labra vlcis tanquam decolorata, duræ vel sculculum fuerint, excidenda ad sanam vsque carnem, *Galeno lib. 4. Ther. meth. cap. 2. auferre,* sunt. Alii eulmodi labra scarificanda esse præcipiunt, & ab eis sanguinem, admons etiam cucurbitulis extrahendum. Sanguine autem quod satis esse videbitur educto, spongiam siccam, hoc est, nullo liquore madentem, ac postea etiam medicamenta quædam resiccantia superimponere iubent. Nec ab Hippocrate instituto hæc curandi ratio abhorret. Hic enim quum vel liuidum, vel nigrum, vel rubrum conspicitur vlcus, scarificandum, ac sanguinem emittendum esse docet. Mox spongiam sicciorē magis, quam humidiorē, hoc est, siccam potius quam humefactam, superimponendum. Post hæc vero etiam siccantia remedia applicanda. Ab his, si res postulet, rursum sanguinem auferendum.
- D** Ac mox iterum talia peragenda, donec omnino parata sanitas sit. Quod si labra vlcis dura callosaque appareant, etiam ea excidenda moner. Quum vero amplius progressus huiusmodi affectus est, deliberatio incidit, excidendum ne omne id sit, quod præter naturam visitur, an spacio potius curandum. Proculdubio est, ægrī animū hoc casu consulendum esse. Aliqui enim longiut tempore curati citra sectionem maluit: alii qui diuis subire, dum modo citius sanentur, sunt parati. Ceterum excidere res est promptissima: natus vero quippiam, atque artis egeus, medicamentis sanare.

De vlcere cum varicibus complicato. C A P. VII.

- V** Aticum supra exulceratum locum existentium occasione, contumax ad sanandum sæpe vlcus redditur: quod scilicet ex iis humiditas aliqua ad exulceratas partes defluat. Eas igitur, *ut ressus est loco paulo ante citat Galenus,* prius sanare oportet, ut deinde mox vlcus sanemus. Igitur varices, qui cruribus, & alibi quam in testiculis provenire solent, hoc modo ex Hippocratis, Aetii, & Pauli sententia curantur. Primum in cure, vasi elato, seu venæ in fastigium tumefactæ, hoc est, varici, adiacente simplicem sectionem scalpello per longitudinem facito: ita tamen leuiter, ut venam sicut verticem elatam non diuidas, & scalpello penetres, sed sola cutis incidatur. Ducta sic leuiter in cure sectione, oras vulneris hamulis ducto, & membranulas cultro ad ramicem aquosum accommodo, sensim ac blande excoriatō. Mox vena detesta, nudataue, & a circumiacentibus corporibus vndique explicata, eam vulsella, aut obtuso hamo attrahito, ac suspensionem teneto. Deinde acum duplex linum, seu lineum funiculum duplicem trahentem sublicito, subterue transmittito, linique habenulam amputato, sic ut duo funiculi efficiantur. Tum venam dilatatam, non aliter quam in venæ sectione fieri solet, scalpello per medium diuidito, ac sanguinis quantum satis esse videbitur, detrachito. Deinde altero funiculo superiorem vasīs partem constingito, cuteque eleuato, san-

Calcei vīna.
Manna
Faustiani
pastilli.
Sandaracha quidē

Varicum
curatio.

guinem qui in ipſo apparebit, manum expreſſione vacuato. Quod ubi factum fuerit, A
venam ab altera parte lino altero rurfus deuincito. Partem veto illam venæ, quæ inter
duo vincula eſt, vel ſtatim excindito, vel manere ſinito, uſque dum putrefacta ſua ſpon-
te cum funib. excidat. Petacto opere ſicca linamēta in vlcus inſertenda ſunt, ſplenum
vino cui oleum adiectum ſit, madens ſuperi imponendum, ac deligandum. Tum lina-
mentis medicamento aliquo ad pus faciendum apto imbutis, curatio perſequēda erit,
cetera, quæ reliquis vlcetibus communia ſunt peragendo. Sed interim quies ægro im-
peranda, ſeruato accliuo membri decubitu, ne ſi decliue iaciat, humores ad ipſum con-
fluant. Præſo autem magis quam ieiuo, & parum pleno, potoque item concalefacto,
& vt Paulus *lib. 6. cap. 82.* ſuadet, loto, dieque calido potius, quam frigido, venā cuiusmo-
di ſecabis, atque ex ea ſanguinem mittes. Hæc enim omnia ſanguinem in venis craſſio-
rem diſſoluant, effluuique aptiorem reddunt. Proinde ſi varix crus, vt magna ex parte
ſolet, occupauerit, loto prius funiculum ſuperiori femoris regioni circumda-
to, ac vt inambulet iubeto. Deinde venam ita repletam attamento ſcriptorio, aut colly-
rio notato, iuxta eius ſitū trium digitorū ſpacio, aut paulo ampliori interpoſito. Poſtea
reclinato ſeu decumbente ægro, cruſque ipſum extendente, alterum vinculum paulu-
lum ſupra genui iniicito, ac mox qua atramētū nota eſt, ſectionem facito, & reliquam cu-
rationem, vt ſupra dictum eſt, proſequitor. Quidam ex veteribus, funibus ſive vinculis
minime utebantur: ſed venā, vel ſtatim ubi a carne abſoluta erat, & vndeque nuda-
ta, excindebant: vel ab imo etiam adhærentem, violenter extrahendo abrumpebant.
C
Alii vero vſionem eligentes, digitali bus interualis innixa cauteria valis admovent.
Atque ubi cruſta deciderit, vlcuſque incarnatum, & cicatrix inducitur, locum ro-
borant. Verum omnium tutiſſimus chirurgiæ modus eſt, quem ſupra expoſuimus. Por-
ro varices in imo ventre ſuborientes conſimiliter tractandi ſunt. Illi item, qui in tem-
poribus exiſtunt, earatione, quam in exentione vaſorum Paulus *lib. 6. cap. 5.* docuit,
tolluntur.

De vermiſo vlcere. CAP. VIII.

Vermes in
termentis. **V**T vermes qui in vlcetibus procreantur arceas, primum quidem eſt, Paulus *lib. 4. cap.*
42. atteſtate, vt humiditatem putredinemque eorum opificē tollas. Proinde vermes
in vlcetibus exortos interficiunt, & putredinem ſimul auferunt, ſuccus & decoctum D
abſinthii, & eupatorii, vel centaurei, vel marrubii, calaminthæ quoque: ſuccus iugiter in-
ſtillatus, atque id genus multa, quæ etiam aurium vermes enecant. Priuatim autem ad
vermes, qui vlcera infeſtant, commēdatur Archigeni & Theodoro, medicamentum,
quod accipit *ceruſſa & poli pærem meſuram, cum pice liquida illitum.* Conducit etiam ma-
gnopere linamentum ſaluæ ieiuni hominis illitum, & applicatum. Hoc etiam vermes
in auribus perimit, & concolores cicatrices, vt *Actium teſtatur*, reddit.

De vlcere diſrupto, & cum offis corruptione complicato. CAP. IX.

Vlcus nonnulla obducta cicatrice, poſtea tempore haud ita multo interiecto,
denuo phlegmone tentantur, ruſſumque ſua ſponte, & per ſe rumpuntur, atque a
ſua continuitate recedunt. Offe enim quopiam ſubtracto male affecto, hoc eſt, vitiatum
& corrupto, circumdata ac ſuperiacens caro, ex facili quidem interdum ad cicatricem
ducitur, & ſana ex toto ad vnguemque reſtituta eſſe videtur: verum cuſu humoris vali-
do, paulatim ex offe in alio contrahēte ac putreſcente, tum phlegmone, tum pus ob-
oritur, quod cicatricem lacerat, ac diſcumpit. Cetetum vitiatum ac corruptum offis ſigna
hæc ſunt. Primo ſere pingue ſit, deinde vel nigrum, vel carioſum. Quænam igitur hor-
um vlcetum curatio erit? Certe eatenus exſiccare, quatenus ſquama offis exciderit.
Offium autem ſquamæ facile excident, ſi ſilueſtris papaueris, & ſici arboris foliis cum
polenta leuigaris, atque ex vino illitis, ipſius offis ſinus concavos repleueris: aut alteri
ſue hyoſcyami ſemen, & atramentum ſutorum pari pondere contrita impoſueris.
Sed & peucedani radix contrita, ſubito ſquamas offium remouet, ac ſeparat. Squamas F
etiam offium breui detrahit, & nouam probamque carnem deſuper renaſci facit me-
dicamentum hoc, quod recipit: *Ariſtolochna, aridis, myrrha, aloes, corticiſ pœuſchi, terra cretrea
aduſta, ſcoria æris, corticiſ pœuſchi ſingul. aquæ portiones.* Melle omnia excipiantur, & in em-
plaſtri formam redigantur. Oportet autem ante omnia, vitiatum & corruptum os
nudare,

Si varia
crus opera-
pauit.Varicia
uulſio.Offis viti-
ti ſigna,
Curatio.Quæ offis
ſquamas ex-
ciderit fa-
ciat.

Emplaſtri.

A nudare, vlcere exciso: & si latus eius corrupti ossis vitium est, quam vlcus fuit, carnem subsecare, donec integrum os vndique pateat. Ossis autem sic nudato, totum id quod pingue & corruptum est, candente ferramento semel iterumue, vt res exigat, ad moto adurendum est, vt ex eo latu secedat. Aut certe eradendum, donec aliquid cruoris ostendatur, quæ integrioris & minime corrupti ossis nota est. Neque alia facienda sunt, vbi caries nigriciesue in summo osse est. Siquidem id vel paulo diutius eodem ferramento adurendum, vel radehdum est. Porro qui radit hæc, *Celsi teste*, adauiter imprimere ferramentum debet, vt & agat aliquid, & maturius desinat. Finis est, quum vel ad album os, vel ad solidum ventum est. Albo namque finiri ex nigritie vitium, soliditate quadam ex carie manifestum est. Accedere etiam cruoris aliquid integro, supra dictum est. Ceterum si caries alte descendit, pet terebram vrgenda crebris foraminibus est, quæ alitudine vitium æquent. Tum in ea foramina demittenda candentia ferramenta sunt, donec inde siccum os ex toto fiat. Simul enim post hæc & resoluatur ab inferiore osse quodcumque vitiatum est, & is sinus carne replebitur, & humor aut nullus postea feretur, aut mediocris. Sin autem nigrities est, aut si caries ad alteram quoque partem ossis transit, oportet excindi. Sed quod totum vitiatum est, totum eximendum est. Si inferior pars integra est, eatenus, hoc est, vsque ad subiectam partem ossis integram, quod corruptum est, excindi debet. Sunt qui post abrasionem cauterium admouendum esse suadent, nec immerito sane. Nam si corruptela ossis ex humiditate excrementosa & superuacanea ipsius ossis substantiam labefactante ortum habet: vt certe magna ex parte habet: nullum præsentius aut tutius remedium excogitari potest, ipsa vitione. Hæc enim decenter admota, & cito & tuto, in summo quoque & in alio, haud secus quam ignis ipse, desiccatur. Post vitionem vero ferro candente factam, rosaceum calefactum infundunt. Alii post vitionem cauterio, *vt dicunt*, actuali decenter factam, rosaceum oui candido liquore, permixtum, tribus primis diebus admovent: triduo vero alio sequente, albuminis loco luteum oui rosaceo commiscunt. Postea butyrum cum melle rosaceo infundunt.

De vlcerebus ægre cicatricem admittentibus, & malignis. CAP. X.

Vlcera, quæ ægre ad cicatricem ducuntur, Græcis *δυσήλιστα* nominantur. Quæ vero ægre sanabilia, dolosa, maligna, contumacia, & rebella sunt, iisdem *ῥαχίδες* vocantur. Multæ autem & variæ sunt causæ, quæ eiusmodi malignorum, contumacium, atque ægre sanabilium vlcærum cõtionem & sanationem temerantur & impediunt. Nempe fieri aliquando potest, vt labra exulceratæ partis callosa & dura, causâ sint quo minus sanescat vlcus. Potest etiam causâ esse intemperies, vel quæ citra tumorem præter naturam in vlcæratæ partibus consistit, vel quæ cum tumore quidem aliquo coniuncta sit. Potest & varix lupetiæcens, vel iecur, aut lien male affectus, aut imbecillitas ægræ partis, quæ ipsâ quoque intensâ quædam est intemperies, vlcæris curationem in multos menses protrahere. Quinetiam viriosus in toto corpore succus maximâ causarum est, quæ incommodate vlcæribus possunt, & ea diuturna contumaciaque efficere. Signis ad vitii cognitionem nullis est opus, vt pote quod tempus ipsum abunde prodat.

E Quod si vero eiusmodi vlcæribus ægre cicatricem admittentibus, maleficiis, contumacibus atque inueteratis mederi velis, necesse est causas, quæ illa creant, primum summoveas atque abscindas, deinde maligni vlcæris curationem aggrediaris. In morbis namque omnibus nedum vlcæribus, in quibus effectrix causâ adhuc manet, ab hac inchoanda curatio est. Magna igitur attentione inspiciendum venit, num corpus totum pleboricum vel cacochymum existat, vel lien, aut iecur male afficiatur: vel labra vlcæris dura & callosa sint. Item num aliqua insignis sublit partis vlcæratæ intemperies, aut etiam varix aliquis lupetiæcens fuerit, cuius occasione ad sanandum contumax vlcus redditur. Ergo si vniuersum corpus plethora vel cacochymia laboret, prius expurgare, vacuareque illud expedit, quam medicamentum vlcæri admoveas. Si vero lien, aut iecur male afficiatur, his prius providere, deinde ad vlcus curandum venire oportet. Ad eundem modum, & varices, quæ sæpe supra exulceratum locum sunt, prius, vt supra docuimus, tollendi sunt, deinde mox vlcus sanandum. In intemperies quoque atque imbecillitas, quam sæpe insignis quædam parit intemperies, antea quam ad vlcæris curationem accedamus, corrigenda erit. Breuiter ei quod fluxionis in vlcæratâ partem

Si caries
alte de-
scendat.

Vltio

Dysp-
lota quæ.
Cacochi-
mæ causæ.

Signa.
Curatio.

Ab effe-
ctrice
causâ, &
adhuc
manet,
inchoan-
da cura-
tio.

Maligno-
rum vice-
rem lum-
inis cura-
tionis ſco-
pus.

decumbentis eſt cauſa, atque ægre ſanabile vlcus reddit, providendũ, ac ſi fieri poteſt, A
medendum prius erit. Deinde maligni pluſ vlcetis & contumacis curationem aggre-
di oportebit. Malignorum autem & diſciculter cicatricem recipientium vlcetum cura-
tionis ſummuſ ſcopuſ eſt, valida citra demorſum exſiccatio. Hæc enim abaliis vlcetibus.
hoc vno diſſident, quod medicamenta citra demorſum atq; eroſionem vehemẽter ex-
ſiccantia deſiderant. Quæ enim mordendo vlcus, & manifeſtam in eo exaſperationem
excitando, dolorem inferunt, ſniores, hoc eſt, humoreſ vlcetatis partibus influentes, ir-
ritant, & phlegmonem concitant. Talis igitur medicamentorum materia, quoad eius
fieri poteſt, ad talia vlcera inuenienda eſt, vnde vlcus citra mordicationem & dolorem
ſicceſcat. Vt autem validam vlcetum exſiccationem aſequaris, duo tibi ſcopi propo-
nuntur. *Primo*, vt id quod inſiuit regeras, repellatue, ſi ſaltem qui vlcetatis partibus inſiuit B
ſuccuſ, nec multo pluſ iuſto, nec multo deterior ſit. *Alter*, vt quod laboranti parti inhæ-
ret, inſumque eſt, diſcutias. Atque ea contrariæ vires præſtant. Siquidem inſeſſum
reprimunt, quæ adſtringunt medicamenta. Digerunt, diſcutiuntue impaſta, iamq; ex-
cepta, quæ trahendi poteſtate prædita ſunt. Porro, quæ adſtringunt, vt pluſimum ex-
aſpetant, atque hac occaſione moleſta ſunt. Tabentia veto ac digerentia ex alto hu-
miditates, non citra acrimoniã id efficiunt. At actimoniam dolor aliquiſ neceſſario
ſequitur, vlcetaram partem moleſtans. Proinde propter dolorem, quem exaſperantia
rodentiãq; concitant, humoreſ vlcetatis partibus influentes irritati, & vlcuſ phlegmo-
ne obſideri, exedique contriungit. Vnde omnibuſ pater, prædiſtis vlcetibus maligniſ præ-
ſidia non ita promte inueniri poſſe. Quid igitur agendum erit, vt talia vlcera ad integram C
petducantur ſanitatẽ? Deligenda ſane medicamenta erunt, quæ vitæ facultate,
nempe adſtrictoria & diſcutiente, polleant, atque ita quod inſiuit repellant: quod
vero iam laboranti parti inhæſit, diſcutiant. Hiſ itaque miſta facultate prædiſtis medica-
mentis, vlcera, de quibuſ agimus, citra eroſionem demorſumue deſiccabis. Ceterum
tameñ medicamentum ex ambobuſ compoſitum, erodeute puta & adſtringente, ne-
ceſſario validum exiſtat, ſordes tamen & humiditatis copia id genus vlcetibus incum-
bens, veluti propugacula quædam vlcetatis particulis facta, roſionem valentibuſ me-
dicamentis adiungit, neq; pluſ producat. Porro artiſcio hac in te vti potiuſ, quam experimen-
to inniti debebit Medicuſ: quod nimirum rationaliſ Medicuſ ſciat, vlcuſ non alia me-
dicamentorum virtute curari, quam dum laborans pars eam ſiccitatem conſequatur, D
quam in naturali ſtatu ſita poſſidebat. Quod factum intelligimus, vbi neque tenuiſ am-
pliuſ ſuiueſ inſiuit, neq; pluſ producat. Eo autem peruenit, quo dicebamuſ modo
ſicceſcentia, hoc eſt, adſtricta, diſcuſſaque. *Dein* vbi ſicca quidem fuerint, verum ſordida
adhuc appareant, detetſotiſ medicamentis repurgantur. Ceterum quum manifeſto
conſtet omnibuſ in artiſ operib. exercitatis, rationem ſine operum exploitatione pro-
babilem non eſſe, Medicuſ diligenter attendere debet, quem effectum medicamen-
tum vlcetis adhibituſ, quotieſcunq; ipſum ſoluerit, in vlcetata particula præſtiterit,
quantum ſcilicet humiditatis in vlcere deſiccauerit: vel ſi etiam ſordes adſit, quantum
inde abſterſerit. Sed & animum intendere oportet, vtum vlcuſ catne, quæ ſub eſt ex-
eſa ac colliqueſcente, ſordidum euafet: an quia medicamẽ ſordidib. auferendiſ aptum E
requirit, impoſituſ vero tale non ſit: id quod Medicuſ etiam boniſ exiſtimatiſ, *Galeno*
aſſeſſante, nonnunquam impoſuit, ac noſtriſ quoq; chirurgiſ adhuc quotidie imponit.
Vbi enim vlcuſ poſt vnã aut alteram medicamenti appoſitionem ſordidiuſ conſpe-
xerint, ſtatim non cogitant an id ex roſione medicamenti acciderit, ad abſterſorium
valentiuſ acriuſq; ſe conferunt: vnde iterum vlcuſ etoſum ex æquo ſordidum, vel etiam
magiſ adhuc alreſa ſolutione viſitur. Carne enim a medicamẽto colloquata, id ſordatur.
Nam ita in prauam ſaniem degenerat. Quicquid autem in hiſiſ tenuioriſ ſubſtantia
eſt, a medicamẽto diſſilatur: reliquum ibidem vlcetibus inſum ſordes ipſiſ redditur.
Ceterum quum ſit ampla latitudo vtrinque in eo, quod alterum vlcuſ altero magiſ mi-
nuſque diſciculter cicatricem admitat, malignumque ſit, corporaque omnia quibuſ F
mederi cogimur, non eandem omnino temperatam babeant, ſed alia vicioſo ſucco,
alia plethora laborent, quædam dura & robuſta ſint, quædam veto tenera & molliã, at-
que adſentiendum inſigniter habilia: fieri non poteſt, vt vno eodemq; medicamẽto
omnibuſ indiſſerenter prædiſtis vlcetibus quæuiſ corpora occupantibuſ medeamur:
ſed

Diligen-
ter inſpi-
ciendum
vnde ſor-
des in vlc-
ere caſa
ſit.

274 Operum Leonhard. Fuchſii Pars III.

Curatio. gna ex parte oriuntur poſt herpetas, & prurientes puſtulas, quas acris & bilioſus humor excitauit: atque etiam poſt vulnera, quæ mordacibus medicamentis exacerbata æque irritata fuerit. Ceterum ad perfectam ſanationem vt perducantur eiſmodi vlceris, triplici egent auxiliorum genere: nempe victus ratione proba, & conuenienti purgatione, quæ prauo & acri ſucco, eroſionemque in laborante particula excitant ſit acceommoda, & localibus remediis. De victus ratione iam ſæpe in præcedentibus libris dictum eſt, ideo vt ea repetamus nihil attinet. Purgationem autem recte inſtitues, ſi quis humor redundet in corpore cognoueris. Inuenies, tum ex vlceris ipſius ſymptomatis, tum ex notis quas totum corpus præ ſe fert, cuius maxime generis ſitis, qui redūdā humor. Facta redūdantis humoris vacatione, ad curationē particularis affectus, hoc eſt, ipſius atrodentis vlceris, deueniendum erit, quæ quidem per localia vocata remedia perficitur. Ergo ſi particulam exulceratam atque roſam, ſupra modū calefactam videris, ipſam ſtatim frigidiſ adſtringentibus deſiccantibus. refrigerabis. Commode autem feceris, ſi vlcus ipſum, & particulam totam vlceratam aqua aluminofa ablueris: hæc enim ablutio magno viui talibus vlceribus eſſe ſolet, quod ſcilicet influentes humores potenter repellat, & ſiccandi facultatem obineat. Poteris etiam laboſum locum irrigare liquore ſtillatitio plantaginis & roſarum, vel aqua in qua candens ferrum extinguitur ſit: aut etiam decocto *cyperi, myrobalarum, cupreſſi, plantaginis, malicorii, balauſtri, & conſimilium*. Vt autem ab iniuria influentium humorum vlcerata particula vindicetur, optimum fuerit circumiacentes partes vnguento ex *bolo armenio* illinere. In medio vero vlceris, puluis aliquis, qui vim deſiccandā habeat apponendus erit, qualis eſt, qui ex *lithargyri, viſto plumbi, pumphyge, ſtimmi, arc combuſto, corallio, lapide hematite, & ſpodio lotis componitur*. Item *ſidiu, myrobalarum, & id genus aliorum*. Præterea pannorum lacinia in linamenta formata, ſive ſplenis vnguento albo illito, aut vnguento quod ſextam partem lithargyri recipit, vel vnguento, quod diſapomphyge nuncupatur ſupra vlcus ipſum componenda ſunt. Ceterum ſupra eiſmodi pulueris ac linamenta vlceri impoſita, puluilli aliqui, quem *plumaceorum* vocant, poſta aquoſa imbutus, adhibendus erit. Deinde conueniens deligatura, quam *experimentum* nominant. Guido a Cunliaco in talibus vlceribus. ſolebat poſt lotionem abſque vilo alio adhibito auxilio ponere laminam plumbi reuē perforatam, in qua virtus argenti viui, cum liquore ſtillatitio plantaginis erat inſixa, & ligare deligatura experimente. Itaque tria hæc, plumbum, aqua aluminofa, & deligatura decenter facta, miram ac ſere incredibilem vim habent in ſanandis eiſmodi vulneribus. Porro deligaturam talem eſſe conuenient, quæ ad vſum magis quam ad elegantem formam conducatur. Hoc autem duobus modis fieri: nempe vel vnico vinculo, ſeu ſcia vna, vel duabus. Proinde ſi vna tantum ſcia fuerit, principio eius verſus ſuperioris vlceris partem ſtatuto neſtenda erit, ſive ſura, ſive genu, ſive malleolus, ſive cubitus, ſive manus ſumma, aut alia quæz particulari laborauerit. At ſi duabus ſciis vti malueris, altera a parte laborante, hoc eſt, ab ipſo vlcere, ad ſuperiorem regionem ſeretur: altera deorſum prius ducetur, mox in ſuperiore parte deſinet, eo videlicet loco, quo prior incipit. Ceterum præter reliqua comoda, quæ ex hac deligatione proueniunt, illud etiam accedet, quod vlceris, quæ ob rotunditatem coaleſcere nequeunt, oblonga reddentur. Solutio autem non ſingulis diebus, ſed alternis facienda eſt. Neque in ſolutione vlcus aqua inſpergendum, ſed molli linteolo puro & ſiccato ſanies detergenda. Quod ſi partes vlceri adiacentes iam phlegmonodes quippiam repræſentent, plaryſinati, hoc eſt, linteo lato cui emplaſtrum illitum eſt, exterius plurimo ſpatio liquidum medicamentum illinere oportet: quale eſt Galeni *phœnicium*, hoc eſt, e palmulis confeſtum: vel aliquid ſimile, non quocunque contigerit dilutum, ſed vino adſtringente, quantum imbibi poterit. Sitque oleum, quod adicitur, refrigerans & adſtringens, cuiusmodi ſunt *myrrum & melianum*. Quod ſi hæc non adſint, omphacium nominatim adhibebis. At ſi durities circa partes vlceri adiacentes apparuerit, ipſum phœnicium oleo veteri, aut ricinino, quod officiæ oleum de cherrua nominant, diluendum eſt. Tutiusque fuerit, ſuperpoſitæ regionis quodpiam ex medicamentis repellentibus liquidis adhibere: quo, ſi quid vel prauum, vel pluſquam pareſt inſiuit, regetur. Atque id maxime, quum in crure vlcus obortum, ſuperpoſitam auxilium varicolum habet. Quæ dum magna eſt, ac ſinguinem, nec colorem rubrum, nec probum, ſed atriorem & melancholicum continere videtur, ex-

ſci-

- A** scindenda auferendaque est. Ceterum si vlcera eiusmodi admota medicamenta eouremnant, indiesque magis atque magis erosio serpat, & augeatur, corpus subinde a vitiosis humoribus repurgandum erit, ac materia ipsa depascens atque ardens, inustione seu actuali cauterio absumenda & desiccanda veniet: modo laborans id auxilium tutum atque vtile, ceterisque aliis longe præstantius, non reformidet ac renuat. Quod si ferrum candens obtimiditatem, aut delicatam nimis naturam pati, atque admittere noluerit, medicamenta actiora, & quæ ignis vires habeant admovebis: cuiusmodi sunt pastilli Andronis, Musæ, aut Pasionis, a Galeno *libr. 5. de compos. medic. generalium cap. 19.* descripti. His etiam atramentum scriptorium magna vtilitate admoetur. Quod si hæc parum profecerint, arsenicum, quod *sublimatum* nominant, modica tamen quantitate, tuto adhiberi potest. Locus autem ambiens, hoc est, circumpositæ vlceri parres, interrim refrigerantibus perpetuo muniendus erit, ne tam vehementibus admotis præfidis, fluxio irritetur. Porro si ne his quidem ram potentibus auxiliis vitium aliquando viduum fuerit, nec erosio ipsa depascens quouis modo lûsti possit, membrum amputare oportet.

De sordido & putri vlcere. Cap. XII.

- V**lcus sordidum, quod Græcis *ῥωγὴν* dicitur, est, quod crassiore illo ac viscoso tectemento, quod *sordidum* appellant, scater. Putre autem est, ex quo vapor aliquis graueolens, & cadauerosus exspirat, & attollitur, per similes illi, qui a putrescentiis ac corruptis iam carnibus exhalat. Ac tale etiam recentiores *fræudentum* appellant. Huius malitia vlterius progrediatur & serpat, in sphacelum, quem vulgus *Ephthorænum* vocat, degenerat, & homini vitam adimit. Horû vero vlcerum causæ sunt præui & crassi humores, sanguinis naturam quodammodo referentes, hoc est, sanguinei, qui teruore quodam velut ebullientes, venositatem atque malignitatem quandam indipsunt. Et hæc quidem magna ex parte carbunculos maleficos, abcessus, & vulnera male curata consequuntur. Signa ex vtriusque definitione innotescent. Ceterum talium vlcerum curatio consistit in proba victus obseruatione, de qua iam sæpe est dictum: & vacationibus commodis, quibus corpus vniuersum ab excrementis, atque a natura alienis humoribus expurgatur. Vbi autem iam putum ab excrementis vniuersum corpus tibi apparuerit, tum laborans ipsa particula, hoc est, vlcerata cucurbitulis, scarificationibus, iutudinibus, atque fomis a corruptis ac deprauatis succis ipsam occupantibus viradicanda erit. Post hæc veto propriam ipsius vlceris curationem aggrediens. Sordes igitur primo tibi abluenda erit, aut mulsæ, aut marinæ aqua: vel si eius copia non est salsa. Deinde mundificandum vlcus vnguento, quod vulgo *Ἀποσθολέον* dicitur, aut eo, quod *Ἀἰγυπτιακόν* nominatur. Post hæc, quidam desuper adhuc esse admoendum monent, quod mundificet, ex *succo abjynthii, rosæ, melle, myrrha, & farina hordeacea* compositum: & circumiacentes vlceri partes vnguento ex bolo armenio illinunt, ac supra cetera prædicta puluillo ex canabinis stupis studiose pexis, aut ex linenis pannis læuibus, poscæ aquosæ imbutos apponunt atque alligant. Si vero sordes in putredinem, aut corruptionem degenerant, locus abluendus erit poscæ, aut aqua cineris, vel saponis. Deinde emplastrum ex carnibus *piscinum salserum, farina probi, & aristolochia longa*, non autem *rotunda, & scylla*, omnibus ex *uino coctis, & cum melle mixtu*, super accommodandum est. Ad hoc sane institutum sequens medicamentum, vtpote multa experientia comprobatur, plurimum confert. Habet autem *tragacanthæ rubri, vnciam vnam. Calcis viuæ, aluminis, corticis granatorum, singul. drachmas sex. Thuris, gallurum, singul. drachmas quatuor. Cera & olei, singul. quantum satis fuerit.* Et hoc, quod accipit, vitrioli partes duodecim. Chalcitidis, partes decem. Tragacanthæ partes nouem. Coquantur in aceto, & ex eis fiat linimentum. Ac semper quidem vnguentum ex bolo in ambrivulceris, *ut supra monuimus*, apponito. Desuper vero stupeos puluillos, poscæ madefactos. Porro si vlcera eiusmodi depascencia putridaque, eousque feritatis & malitiæ deuenerint, vt partes adiacentes magis atque magis semper erodant, ac sine modo in illis corruptielam excitent, vehementissimis medicamentis, qualia supra in curatione malignorum vlcerum recensuimus, indigebunt. Imo vero frequenter inustiones, atque etiam excisiones illis erunt necessaria: ita vt quicquid vitiatum ac corruptum est, percussus extirpetur, & viua ac sana duutaxat caro relinquantur, quam ex nativo

Sordidum
vlcus.
Putre.

Ephthorænum
vulgo.
Causa.

Signa.
Curatio.

Linimenta
tota.

ipſius colore, & ſanguinis bonitate facile deprehendes. Inter cetera vero medicamen-
ta actia, quæ viuum a corrupto ſeparant, & in hoc affectu celebrari ſolent, omnium præ-
ſtantiffimum atque efficaciffimum quotidiana experientia deprehenditur *arſenicum*,
quod *ſublimatum* vocant. Hoc enim conſeſſum vitium ſiſtit, & id quidem ſine dolore.
Quod ſi medicamentis eiufmodi vitium non ceſſerit, membrum tali deſaſcente ac pu-
trido vlcere laborans cogimur abſcindere, vt reliqua parſ ſtata ſit. Id autem miſerum
atque extremum præſidium nunquam tentandum eſt, niſi ubi cetera nihil proficiunt,
& vitio proſus victa ſunt.

De profundo & cuniculoſo vlcere. Cap. XIII.

Vlcus cuniculoſum, quod alii *cavernoſum* appellant, cuius oriſcium ſtrictum & an-
guſtum eſt, profunditas vero in latum ſe diſſundit, & ſenſum effugit, multoſq; an-
fractus ſeu cuniculos modo rectos, modo obliquos, citra tamen duntiem & callum ha-
berit, dicitur. Græci hoc ipſum *καύκη*, Latiniſimum nominant. Fit, cum adiacens vlcibus
cutis diutius ſubiectis corporibus non coaleſcit, glutinaturque. Huius autem multæ ac
variz ſunt differentiz, ex cavernarum magnitudine, ſitu, figura, ac numero deſumitæ.
Aut enim breues ſunt, aut alte penetrantes, iuxta carnem deſcendentes: aut ad uſſa, vel car-
tilaginem ſubeuntes, ſuſum, deorſum, vel ad latus tendentes, recti aut flexuoſi, ſim-
ples ac duplices, triplices ſue. Cauſæ eiufmodi ſinum ſunt abſceſſus, ſive ſuppurantes af-
fectus tardius diſſecti, & vulnera perperam curata. Pus namque longo nimis ſpatio in
ſuppurato abſceſſu, aut in profundo vulnere, quod non rite expurgatur, retentum ac de-
ſiſcens, maligniſcit, & veluti acrem atque erodentem quandam naturam acquirit:
& tandem cuniculos molitur, qui difficile admodum carne impleri, ac glutinari que-
ant. Ad laborantem namque particulam, quæ iam imbecillitatem contraxit, vndique
ex circumiacentibus ac vicinis partibus, imo vero & ab vniuerſo corpore, ſuperuacua-
ni humores confluunt, atque ita ægre ſanabile redditur vlcus. Differentiz cuniculo-
rum deprehenduntur ſpecillis, ſive conis argenteis, vel plumbeis, aut alia conſimili
materia factis, in ipſos cuniculos leuiter & blande immiſſis. Item minatis quibuſdam
atque exilibus radicibus, & cereis candelis, necnon & coloratis quibuſdam iniectioni-
bus. Dolor vero matritz, quæ ab ipſis ſinibus egreditur, qualiterque eius manifeſte mô-
ſtrat. Si enim tenuis fuerit, & loturæ carnis per ſimilis appareat, calidam eſſe haud teme-
re eam iudicabit. At ſi candida viſitur & ſeroſa haud dubie frigida erit. Sed & puris boni-
tas & paucitas, doloris quoque ac tumoris, qui prius aderant priuatio, ſinum carne im-
pleri & glutinari demonſtrant. Si vero contraria his adſuerint, glutinationem nequa-
quam adhuc nobis fieri indicant. Ceterum ſive magnus, ſive parvus, aut brevis, vel al-
tus, aut iuxta ſuperficiem conſiſtens, ſimplex, vel duplex, triplexue fuerit ſinus, eadem
ſemper eſt eorum curandi ratio. Ac ſi vel ſuſum, vel deorſum, vel ad latus, vel intro ad
oſſa tendit, curationem variat. Quum enim ſuſum tendit, facile per eius oſſa ſanoſa col-
luuiet, atque ipſum pus effluit, adeuq; non multum negotii Med. co. in ſanando faceſſet.
Quum vero deorſum vergit, intus retentum pus, aut ſanies, contiguas partes erodit.
Quare niſi factio ex aduerſo emiſſario, nihilominus profeceris, ſive carnem generare,
ſive glutinari velis. Quum autem ad latus declinat, aut ſuſum vergit, aut intro fertur:
ſed ita locari laborans pars poteſt, vt libere ſanies aut pus e ſinu effluere poſſit: incifione
ex aduerſo facta opus non eſt. Quum vero ſuſus deorſum vergit, aut ad latus declinat,
vel intro fertur, vt ſitum laboranti parte commodum dare non licet, quo ſanies atq; pus
libere effluat, nihil promouebis, vt dictum eſt, niſi prius collectioni purulente & fluxum
molitus fueris. Porro ſanoſæ & putulente illi colluuii, biſariam effluxum moliri po-
reris: nempe vel factio tantum in imo ſinus vulnere, vel tota cavitare diſſecta. In imo, ſeu
radice ſinus ſit ſectio, ſi vlcus magnum fuerit, & locus totus ſine periculo ſecari non po-
teſt. Præſtiterit autem ſemper, ſi nihil obſtiterit, totam ipſius ſinus canitarem diſſecare,
quam ex aduerſo plagam facere. Ita enim facilis, ac citius multo ad ſanitatem vlcus
perducetur. Tota igitur cavitare diſſecta, ellychniis & pannorum laciniiſ in linamenta
formatis, congruiſque medicamentis ſic expurgandus atque reſiccandus ſinus erit, vt
liber caro regnaret, cavitatis impleatur, & ad perfectam ſanationem, modo quo
dant. 6. cap. 4. de cano vulnere docuimus, perducatur. Ceterum priuſquam ex aduerſo parte
diuiſio fiat, putulenta colluuiet ſinenda eſt magna ſatis copia in fundo ipſius ſinus colli-
gi, quæ

Arſenicū
ſublimatū
tum.

Cunicu-
loſum vl-
cus quod.

cau-
ſa & ſi-
gnis
differe-
ntia.

Cauſa.

ſigna.

Cauſa.

- Agi, quo sinus parietes magis attenuentur: atque ita melius specillum, supra quod sectio fieri debet, in cautatatem demittatur, sinu scilicet ex puris copia distento, & ampliore facto. Specillum autem ipsum, quod sic in sinum immittitur laue, hoc est, minime asperum esse debet, ac vntuoso aliquo, vt citra dolorem immitti possit, illitum. Ad hanc partem posteriore perforatum esse decet in modum acus, vt in eo imponi possit ceto aliquis, vt vocant, ex canabinis stupis, aut aliqua gracili fasciā, aut certe funiculo quopiam molli, vt canabino, factus. Incisione autem facta, dolor qui per eam excitatione est, sedandus erit: & impetus profluentis sanguinis, cui candido, atque alius id genus suppetimen de sanguinis profusione dicatis auxiliis compescendus. Post hæc autem cento alius, quando opus erit, detergente aliquo medicamento imbutus, indendus erit: atq; vt id commodius fiat, alteri, qui sinum adhuc occupat, aut assuetur, aut alligabitur. Poterunt & ellychnia seu linamenta mundificatio aliquo imbuta in sinum ipsum imponi, superq; atque in ambitu adhibenda sunt, quæ mox infra dicemus. Porro si neq; in imo sinuosi viceris plaga comode fieri possit, neq; cauitas tota dissecari, sinus totus eluendus erit colutionibus, primum quidem deterloris, si in hærens pus, vel saniem subesse suspicaris. Deinde carnem generantibus, postea vero ad glutinans medicamentum transeundum erit. Proinde Galenus libro 2. ad Glaucomem cap. 24. sinum ipsum nunc melicrato, hoc est, mulsa sola, nunc quidem puro vino, nunc vero mulso eluendum esse monet. Ad detergendum itaque, expurgandumque sinui inhærens pus, multa præferenda est. Præsertim in sinu cuius os deorsum spectat, per quod pus & sanies libere effluant. Huius namque sinus profunditatem totam, ad glutinationem aptam, Galeno ibidem attestante, sola redere potest iniecta mulsa. Ad purgandum vero simul & roborandum, vbi scilicet aliqua adhuc levis cuiusdam sordis derelictæ suspicio est, vel ipso etiam Aërio auctore, mulsum deligimus. At vbi carnem iam in sinu medioeriter regentam omnino puram esse coniecerimus, & glutinationem querimus, vino puro subadstringente sinum ipsum eluimus. Vinum enim eiusmodi, quod medium est inter dulce & adstringens, leuiter glutinat. Si autem cruentus fetidusque sit humor, qui e sinu excernitur, oxymeli ceteris præstat. Alii sinum, præsertim maligniorem & vehementer sordidum, detergent ad eluunt aut lixiuio, aut marina aqua, aut etiam aluminosa, quæ in hoc affectu præstantis firma est. Hæc enim præterquam, quod potenter sordes abluat, a parte quoque laborante fluxionem arceat, ac repellit. Alii vnguentum Ægyptiacum cura aqua & melle liquatum, in sinum eiusmodi deterfionis & corrigendæ malignitatis gratia immitti iubent. Galenus quoque vbi sinus ipse, aut situs, aut alterius cunfusus occasione sordidior aut humidior est, medicamenta, quæ valentius, quam mulsa de siccis, & desergant, admodum esse suadet: quale est medicamentum ex combusta charta compositum, quod ad hunc modum temperatur. Squama, galle, myrrha singulorum pondus drachmas octo. Sandracha, asfencici, elaterii singulorum pondus drachmas quatuor. Thuris pondus drachmas tres. Chalcantis, tantundem. Charta, quantum satis est ad inducendum colorem. Debet autem exigua eiusmodi medicamenti portio largo rosaceo misceri, quo & eius vehementia remittatur, & per angustum foramen in profunditatem sinus per fistulam aut æneam aut corneam, recto ductus foratam possit iniri. Iniecto autem medicamento, vlceris os linamento coniecto pro claudendum est, ne id ressuat. Nisi enim diutius maneat, exsiccare non poterit. Ceterum si vlcus sinuosum calidam intemperiem sibi adiunctam habuerit, non alienum fuerit ipsum ablucere aqua multa recenti, in qua lentacula, hordeum, rose, & balauitum incocta fuerint. Si vero frigidam sibi adiunctam intemperiem habuerit, mulsa in qua marrubium, absinthium, pimpinella vocata, & myrrha incocta sint, eluendum est. Porro vbi sic ab omni sordis puro sinus effecerimus, carne replentibus medicamentis, si caui saltem fuerit, deinde glutinantibus, & tandem cicatricem inducentibus, similiter reliquis vlceribus, vtendum erit. Quæ autem carnem generent, glutinent, & cicatricem inducant medicamenta, copiose admodum libro 3. Therapeutica methodi, cap. 2. & 4. docet Galenus. Ergo si cauus sinus carnem requirat, primum medicamentum, quod ex charta combusta constat, aridi paululum cum multo rosaceo inseri conuenit. Deinde capro linamento os obturari. Inde emplastrum Iliis, aut Machætionis, aut simile quoddam vna cum rosaceo cerato liquidioresolum iniicitur. Vbi medioeriter carne repletus est sinus aliquod ex glutinantibus medicamentis, non vehementer siccantibus,

278 Operum Leonhard. Fuchsi Pars II.

Enthema
medica-
menta.
Medica-
mentum
glutinosa.

Modus
deligandi
sinus post
glutina-
tioni me-
dicamen-
ti im-
positionem.

Cirrhum
medica-
mentum.

Spongia
qualis ef-
fe debeat.

adhibendum est, quod crescentem tenellam carnem blande & sine morfu cogat, non aliter ac recens ac si cruentum vulnus enaretur. Curatur autem hoc mollibus, blandis, minimeque dolorem excitantibus medicamentis: qualla sunt *enthma* vocata Græcis, quorum facultas est coniungere, & diuisas partes glutinate, vt in pristinam vnitatem particulareducatur. Horum autem multa sunt, quæ loco citato Galenus commemo- rat. Coterum sequens medicamentum, quod in frequenti apud Chirurgos vsu est, mi- ram in glutinandis vlceribus vim habet. Accipit *decocti hordei, libram vnam. Mellis reficet, uncias tres. Sarcocollæ, drachmas duas. Myrrha, thuris singul. drach. vnam. Vini odoriferi, uncias sex. Coquantur omnia simul vsque ad tertias.* Quibus adici potest aliquando aliquid aloes. Ceterum post glutinantis medicamenti impositionem, sola spongia poua ex mulso, iuxta Galeni consilium circumponenda est, quam fieri potest mollissima. Eius autem deligatura a sinus fundo incipiat, & eius ore finiat. Fasciarum vero spiræ suæ circumflexus, sinus profundum sine dolore ardent, ac paulatim vsque ad os eius elaxentur: ei- demque indatur medicamentum molle, circumducto forinfecus emplastro ad os ipsius sinus forficibus discisso, vt sanies effluere possit. Effluet autem & sinu sanies, suppo- sito aliquo alio paruo emplastro ad solutionem vsque: quam tertio quoque die faciens, hoc ipsum tanquam operculum circumpositum aufertes, relinqui eo quod totum ambit sinum medicamento. Tertio autem quoque die, aut certe citius aut tardius, prout res efflagitabit, demenda spongia est, ac paruum quod superpositum erat emplastrum, vt si qua humoris colluies in ore sinus collecta sit, vacuetur: explore mulque, an altæ si- nus partes coauerint, an minime, quod ex manante sanie deprehendatur, si scilicet ea vel multa, vel pauca, cocta vel cruda sit. Proinde altas ipsius partes coaluisse demon- strat pus coctum ac paucum, præsertim si neque in ipso sinu dolor sentiatur, nec tumor appareat, sed locus totus æquabilis sit, siccus ac doloris expers. Quumque spongiam rursus imposeris, rursusque ad alligaueris, postero vel tertio die, vt dictum est, soluto semper linteolum sinus ori admotum permutans, quod eodem emplastro illitum to- tum os ambitu cingat. Neque vero omnino appressum esse debet, sed ita vt per id tota sanies vacuari possit. Itaque quum secundo vel tertio quoque die, vt comprehensum est, spongia, vel paruum emplastrum eximitur, considerandum multane an pauca, cruda an cocta materia ad os vlcetis affluerit. Deinde expers ne sit, an participes doloris locus laborans: & an tumor remanserit, aut diminutus sit. Altas enim sinus partes co- lisse, vt dictum est, testatur pus coctum ac paucum, præcipue si dolor & tumor non adsint. Contra multum & crudum, & fetore, ac loci humiditate, dolore & tumore, nondum coaluisse significant. Neque vero, si primo vel secundo die tenuis quædam sanies ex si- nu manet, de glutinatione omnino desperandum est. Sæpe enim vis medicamenti la- boranti particulæ admoti, ex ipsa cute & subiecta carne tenuem humiditatem vehemē- ter exprimit, quoties eius qui curatur corpus ita affectum est: siue ex natua intemperie, siue mala victus ratione. Hac humiditate expressa, loca mediocriter siccata glutinan- tur. Quod si tertio, aut quatto ab initio die sanies cruda in ore apparuerit, scito sinum non esse glutinatum. Quare laboranti loco medicamentum quod vehementer qui- dem exsiccet, sed nec mordeat, nec cutem contrahat, circumponendum est. Cuius- modi est medicamentum Galeni, quod a fuluo colore cirrhum dicitur, ex concoctis metallicis, oleo ricinino, & aceto sine ceta confectum. Cuius compositionem & vsum *lib. 2. de compos. medic. generalium Galenus docet.* Exsiccet enim vehementer, idque sine mor- fu. Atque hanc curam dicitur Galenus sinuosi vlcetis Galeni *lib. 3. ad Glauc. copiosius docet.* Guido a Cauliaco iubet post glutinantis medicamenti impositionem, emplastra desuper esse imponenda, & pannos aliquo quod habeat, vt verbo illius vtar, rectificare illa, illitos, Cuiusmodi sunt, emplastrum quod a palma Græcis *quirtura* appellatur. Item empla- strum nigrum vel flauum cum gallis, & mel coctum cum puluere thuris, myrrhæ, & a- loes: vel quædam horum, vel omnia simul: & vinum adstringens crassum. Postea ligare præcipit. Pancis vero interiectis specillum imponendum esse canaliculatum, sic enim lo- quitur, aut duplicatum, vt pus continuo effluere queat: & spongiam super orificium ef- fo ponendam docet, vt pus sugendo extrahatur. Spongia namque ideo circumdatur & al- ligatur, vt exsiccet, manansque & sinu pus extipiat, aliqui partem et ofurū, aut pruritum excitaturum. Imbuta autem mulso spongia sit, vt detergeat: mollis, ne asperitate læ- dat:

A dat: noua uero, ut aqua marina adhuc imbuta laborantem partem deficcet. Ceterum quum sinus non sit nisi cauum vlcus, ordo curationis postulat, ut cauitatis impletione ordiamur. Ideo omnia, quae lib. 6. de canis vlcere curatione dicta sunt, hic etiam consideranda veniunt.

De Fistula. CAP. XIV.

- F**istula, siue fistulosum vlcus, a sinu seu cuniculoso vlcere nihil differt, nisi quod anfractuosa ac sinuosa meatus, callosos & duros habet. Est itaque fistula, quam Graeci *σινος* nominant, arcus oblongusque, & callosus sinus, aliquatenus indolens, qui magna parte ex abscessibus patum dextre curaris oritur. Quum enim quis sinum ex abscessu exortum statim curet, callo obducitur, durusque temporis progressu fit, nec conglutinare ipsum cum sibi subiectis est possibile. Atque sunt fistularum multiplices differentiae, quas omnes Celsus libris 5. cap. 28. recenset. Fistularum autem dignationes haec sunt. Simplicisne sint, an in plures partes diducantur, cognoscitur ex modo partis. Cuius si plus fertur, quam quod simplici spatio conuenit, plures sinus callosos esse manifestum est. Quumque fere iuxta sit caro & nervus, & aliqua nervosa: quales fere tunicae, membranaeque sunt: genus quoque partis docebit: num plures sinus intus diuersa corporis genera perfoserint. Siquidem ex carne pus laue, album, copiosius fertur. At ex nervo loco, coloris quidem eiusdem, sed tenuius & minus. Ex nervo pingue, & oleo non dissimile. Sed & ex aliis notis, quam ex pure, deprehenditur nervi fistula, nempe dolore: stuporis enim punctioisque sensum incutit. Deinde motus qui ab eo nervo pernici solet, deterior apparebit. Sed in specilli attractu molestus acutusque sensus redditus rem manifestissime indicabit. Porro si locum erodente fistula, vena subeat, plurimus, & is crassus sanguis effunditur. Sin arteria aperiatur, tenuis & flauus cum multo spiritu, stridoreque exibat. Ante omnia autem demitti specillum in fistulam conuenit, ut quo tendat, & quam alte perueniat, scire possimus. Simul etiam prociuis, humida, an siccior sit, quod extracto specillo patet. Si vero os in vicino est, id quod disci potest sic, iam necne eo fistula penetrauit quatenus nocuerit. Nam si molle est, quod vltimo specillo contingitur, intra carnem adhuc vitium est. Si vero magis id renititur, ad os venustum est. Ibi deinde si labitur per specillum, nondum caries est: si non labitur, sed aequali innituntur, caries quidem, verum adhuc levis est. Si inaequale quoque & asperum subest, vehementius os exesum est. At cartilago ubi subhaerit, ipsa sedes docet, peruentumque esse ad eam ex renixu patet. Ceterum si oblique fuerint fistulae flexumque aliquem, vel plures habuerint, ut specilli apex progredi nequeat, virgulam, vel ex nigro, vel albo plumbo confabimus, aut ceream potius candelam assumemus, qua iter pertentemus. Quum enim flexilis admodum sit, ad fistulae figuram accommodabitur. Porro fistulae si altius penetrant, ut ad vltimas demitti collitium non possit, si tortuosae atque anfractuosae sunt, si multiplices, maius in manu quam medicamentis praedium est: minusque operae est, si sub curet errantius feruntur, quam si rectae intro tendunt. Expedita quoque curatio est in fistula simplici, recenti, intra carnem: adiuuatque ipsum corpus, si iuuenile, si firmum est, inimica, contraria his sunt. Itemque si fistula os, vel cartilaginem, vel nervum, vel musculos laesit, si articulum occupauit, si vel ad vesicam, vel ad pulmones, vel ad vuluam, vel ad grandes venas, arteriasue, vel ad inania, ut guttur, stomachum, thoracem, penetrauit. Ad intestina quoque eam tendere semper periculolum, saepe pestiferum est. Quibus multum mali accedit, si corpus vel aegrum, vel senile, vel mali habitus est. Egre etiam confanescit in ano fistula, quae officio carentum quae delitescit, & in os terminatur, multifariamque fissa est. In curandis autem fistulis in primis genus vlcus conueniens, & quod substantia & qualitate causis, quae fistulae glutinationem, impediunt, aduersatur, summe est necessarium. Deinde ut corpus vniuersum a superuacaneis & noxiis humoribus, illis tamen prius, si ita res exigit, expulsionis paratis, idoneo medicamento purgante vacuetur. Mox potionibus roborandis & desiccandis interioribus
- F** paribus accommodis, fistula ad glutinationem praeparatur. Tamen si vero multae ad hoc institutum viles a variis auctoribus descriptae sint, duae tamen praecipuae, quae in frequentem usum, & felici successu sunt, a recentioribus Medicis inuentae sunt. Prior accipit *empasori*, *agrimoni* vulgus *Medicorum* vocat, partes tres. *Plantaginis* partes duas. *Foliorum glauae* partem unam. Scindantur min utrim, & contundantur, postea in vino albo coquantur.

tur, & fiat colatura, de qua singulis diebus sub anroram cyathus vnus exhibeatur. Altera, habet *filicem maris, partes tres. Gentiana, partes duas. Centaurei minoris, partem vnā*. Coquantur in vino albo, & fiat potio, quæ vt prior administretur. Optimum autem fuerit, si in prædictis decoctionibus non nihil ligui Guaiaci aliquot horis maceretur, postea moderato igne leuiter decoquatur, & ex colatura, quantum Medico satis esse videbitur, ægotanti mane bibendum offeratur. Quod vero ad localia medicamenta attinet,

Localia.

primum quidem fistulæ orificium, si non satis hiet, & nimis strictum fuerit, imo vero & sinus ipsæ fistularis vsque ad fines eius, si fieri commode possit, dilatari debet. Ergo si nec aduti ferro, nec incidi commode possit fistula, & eius os, aut sinus totus, siue vnus ac simplex, siue multiplex fuerit, non satis late pateat, immisso collyrio aliquo, seu specillo ampliare ac dilatari debebit. Materia autem ad conficienda collyria, dilatandis fistulis idonea, sunt radices *gentiana, aristolochia, bryonia, & draceni maioris, aut aris*. Sed in primis huic negotio accommodata sunt frusta spongiz contorta, & valide compressa. Ex his igitur fiant collyria, siue penicilli, altera quidem parte tenuia altera, paulo crassiora. Atque ea parte, quæ tenuia sunt, demitti oportet in fistulam, sed filo semper appendito, vt tutius, si altius descenderint, & promptius, si nimis hæreant, extrahi possint. Demittantur autem horis duodecim, aut certe longius aut breuius, donec scilicet satis dehiscat fistula. Ceterum orificio fistulæ atque eius sinu sufficienter dilatatis secundo loco ipsius destructio prorsus molienda est. Id autē trifariam fieri consuevit. Primum medicamentis acrioribus & callum exterentibus. Callos autem, *Galeno, Paulo, Actio, & Celsi*

**Trifaria
fistula de-
struitur.**

**Callos ex-
terentia.**

sestibus, elidunt atque excindunt, radix *spondilii*, officinæ Germanicæ nostræ *Brancæ* *versinæ* vocant, circumrasi, & fistulis impositi. Item *veratrum nigrum*, duobus tribusve diebus insertum idem præstat. Adhuc *amurco cocto, & in colationem adhibito*. Ad idem *eleterium terebinthina exceptum* in collyrio cogito, impositoque. Vel *la-
serpitii radicis succum* Infundito. Id quod sequitur, etiam, *Paulo attestante*, exterit. Habet *argenis, drach. duodecim. Ammoniæ, drach. duas*. Excepta aceto in longum inducuntur, & fiunt *penicilli*. In communi vsu apud recentiores chirurgos sunt penicilli siue collyria ex pastillis asphodelorum, quorum descriptio ex antidotariis vocatis petenda est. Item ex *calce & sapone*. Adhuc quæ arsenico illinuntur penicilli, neminem vnquam fefellerunt. Si vero fistulæ multos, & valde contractuosos atque cuniculos habent, ita vt in eos collyria eiusmodi, prout res exigit, indiri non possint, eadem ex aceto aut liquore aliquo ad rem accommo-

**Pastilli as-
phodelo-
rum.**

do, per auricularium clysterem intro infundenda sunt, vt scilicet per omnes multiplices ipsius fistulæ anfractus perferantur. Mirifice vero in antiquis fistulis, & admodum callosis, sequens iniectio prodest, quæ accipit: *Frugentis Aegyptiaci semunciam. Mercurii sublimati, drachmam dimidiam. Lixiui, uncias quatuor. Aqua, rosarum, uncias duas. Arsenici scrupul. vnum. Liquoris stillicitis plantaginis, uncias quatuor*. Bulliant vsque ad tertias. Iniecto medicamento fistulosi vlceris os linamento concepto, aut quouis alio claudendum est, ne refluat. Nisi enim aliquamdiu maneat, nullum effectum effatu dignum præstare poterit. Si autem duplices, aut multiplices eiusmodi fistulæ sint, sic tamen vt breues, intraque carnem sint, eadem etiam medicamenta, quæ callos elidunt, arida in calanum scriptorium coniicienda sunt: isque ori fistulæ aptandus est, inspirandumque, vt ea medicamenta intus compellantur. Aut eadem ex vino liquanda. Si vero longior & transuersa fistula est, demisso specillo contra principium huius incidi commodissimum est, & collyrium vtrumque demitti. Aqua fortis chymistarum, saltem prima, in eiusmodi tortuosis, atque labyrinthi modo flexuosis fistulis, mirifice prodest. Alter abolendi fistulas modus est, qui primum per incisionem totius cavitatis fit, deinde per aduersionem, quæ vel caustico medicamento vel ferro candente & ignito inducitur. Ceterum, quæ in magnas arterias, vel nervos, vel tendines notatu dignos, aut membranam costas succingentē, aut aliquam principalem particulam eueniunt, vel nequaquam, vt in superioribus etiam libris monuimus: vel certe cū multa artificiosaq; diligentia, ac prudētia attingendæ sunt. Reliquis vero hunc in modū manū admolierur. Primum quidem tentabimus, an rectæ sint vel obliquæ, demisso intro specillo, vel cerea candela. In quibus autem duæ pluresve oræ habentur, quæ specillo aut cōsimili instrumento tentari minime possunt, ita notantur. Clystere in sinu per vnum os liquorem compellimus, ex quo trans-

**Si fistula
longior &
transuersa
sit.**

tu eius

- A**tu eius reliqua ota facile deprehendimus, vna ne, quæ multas oras habet, an multæ sint fistulæ. His ita exploratis, si in summo fuerint sinus, atque is angustus, specillo demisso explicandus est, supposito id accommodata figura, scalpello incidendus. Idem faciendum, si plures se quasi ramuli ostendunt. Vbi ad fines fistulæ veniunt, diuisio viceri imponenda sunt specilla, ovi candido liquore imbuta, quæ labra solutæ continuitatis distendant, & inuicem coire non sinant. Posteta die locus adurendus erit, vel ferro candente, vel caustico, seu adurente aliquo medicamento, nempe vel puluere asphodeli, vel arsenico, vel consimili alio, quod facultratis sit vrentis. Alii *hydrargyrum*, id est, *argentum viuum sublimatum* admouent, quo efficitur, vt nihil corruptum, nihil callosum, nihil denique, quod præter naturam sit, in vlcere remaneat, quod non omnino desiccetur, elidatur, & absumatur. At si non summa occupauerint fistulæ, & sub cute non transierint feriantur, sed rectæ intro tendant, vbi quam profundissime potest, & quatenus licet, incisus fuerit sinus, orbiculatim totum callum, modo qui nuper dictus est, si fieri possit, auferemus. Quod si aliquid ex eo relictum fuerit, adurente id medicamento absumemus. Si autem multum sit, quod ex callo remansit, nec medicamento cedat, candentibus ferramentis adurendum est. Superponenda vero sunt, atque in circuitu semper admouenda, quæ refrigerent, & reprimant. Nam fere, quæ circa fistulam sunt, *Celsoteste*, aliquid habent phlegmonis. Signum autem quo dignoscimus medicamentum acce atque adurens suum affectum, quod satis est, induxisse, est vlcis elatio sine tumefactione, ac triduum diuturnum mora, vt communis vsus habet. Adulta itaque, & vt oportet resiccata fistula, mitigatorio aliquo medicamento primis diebus vtendum, vt oleo cum ovi luteo mixto. Deinde ea, quæ crustas ferro ignito, aut adurente medicamento indutas resoluunt ac deiiciunt, admouenda: cuiusmodi est burytum, aut aliquod aliud simile pingue ac vntuosum. A quorum vsu non prius desistito, quam crustæ deciderint, & in pus conuersæ fuerint. Mortificatæ autem fistulæ euident argumentum est, quum pus quod ante multum & crudum apparuerat, nunc paucum & coctum visitur. *Tertius* modus abolendi fistulas est, qui fit per incisionem citra vitionem, cum calli euulsione. Facta itaque, vt ante proditum est, incisione vsq; ad fines, seu fundum ipsius fistulæ, callus totus vel vnguibus, vel acie scalpri, vel rasorio cultro, id est, nouacula detrahi debet, ita vt locus, seu sinus ipse purus, & ab omni forde mundus appareat, quod viuz ac probæ carnis præsentia deprehenditur. Et hæc vera est fistulæ curatio, quam statim, si nihil obstitit, aggredi debemus, quoties fistula nobis sananda, & abolenda proponitur. Ceterum dilatarata fistula, atque in totum abolita, detergentibus si quæ fordes adhuc supersint, & carnem generantibus medicamentis vtendum. Ergo callo fistulæ eliso atque absumto, si fordes aliqua subsint, mulso, vel aqua in qua eruum coctum sit, sic vt huic quoque mellis paulum adiciatur, locum abluito, vel sequenti medicamento repurgandi fistulis, post remotum callum longe accommodatissimo vtendum, quod habet: *Terebinthina in aqua vasa, vt vocant, abluta, vncias tres. Succus apri succus cynoglossi, singulorum drachmas sex. Mellis rosacei colati sesquiquintiam. Aristolochia rotunda, drachmas duas. Farina lupinorum, semunciam.* Coquantur succi & terebinthina cum melle rosaceo, pargans & decurgens.
- E** vsque ad medietatis succorum consumptionem, deinde reliqua commisceantur. Si prædicto medicamento absterforio *myrrha, sarcocolla, radicis arida peucedani, & iridis*, singulorum momentum adieceris, optimum sarcoticum carnemue generans medicamentum effeceris, modo est eo linamentum aut penicillus illinatur. Aliud, *Aetii libro. 14. experimento comprobatum*, callum extereas, & carnem generans. *Radicum liliorum crematarum cinere* fistulam repleto, & callus excidet: quo ablato, *Elxinam* cissampeloso maiorem herbam sumto atundinibus se implicantem, flore candido, foliis hortensis similam similibus: quartefacta, vnta, & trita, fistulam repleto, & caro in ea procreabitur. Sequens quoque medicamentum fistulam agglutinat, insigniter desiccatur, & laboranti parti robur addit. Accipit aqua vitæ, vncias duas. Vini Chii, malaticum vocant, vnciam vnam. Mellis rosei, drachmas decem. Myrrha, radicis peucedani trita, vtrinque drachmas duas. Sarcocolla aloes spatit, vtrinque drachmam vnam & semissimam. Misceantur, deinde bulliant omnia ad ignem moderatum in vico seruire, & per orbiculatium clystetem, quam syringam vocat in fistulam inlicatur. Plura remedia alia apud Aetium, & alios reperies auctores.

Argentum viuum sublimatum. Si fistula sub cute intro tendant.

Mortificata fistula in signu.

Vera fistula curatio

Medicamentum fistularum pargans & decurgens.

Elxinam cissampeloniæ quam ovis volubilibus maiorem vocamus

Cancer.
Sugra.

Coracis.

Qui eam
cancer vi-
cerat &
fluorem
aut lectio-
nem desit-
deat.Vidua-
cia.

Vacuatio.

Localis.

Cancrorum, qui citra exulcerationem fatigant, curationem lib. 5. tradidimus. Nunc itaque de iis tantum, qui exulcerati sunt, differemus. Causas a quib. canceri excitantur, ibidem etiam exposuimus. In cancro autem exulcerato, ut de signis aliquid dicamus, præter *dolorem, duritiem, tumoremque*, vlcera erosa, ac inæqualia conspiciuntur, plurima ex parte sordida, labris prætumidis, aspectu horrenda, & concreta humorum colluue nigrata. Quod si itaque eiusmodi affectus manus operam desiderat, a vacatione humoris melancholici curatio auspicienda est. Deinde *totum carcinoma*, si locus patiat, prorsus rescindendum, sic ut nulla super sit radix: sinendumque ut sanguis effluat, nec statim is inhibendus. Immo pressis vicinis partibus, crassus ac melancholicus sanguis exprimendus. Postea aliis vlceribus similiter curandus, ut lib. 14. Ther. method. cap. 9. *cephesum Galenus* docet. Sunt qui exciso carcinomate, & crassiore sanguine ex circumstantibus partibus expresso, ferramentis igni flagrantibus locum adurant. Alii vero a sectione & vltione, quæ sit ignito ferramento abstinentes, corrosione valida ex adurentibus medicamentis facta vitium hoc totum extirpant & destruant. Porro medicamenta eiusmodi si quando adhibenda sunt, valentis admodum facultatis esse debent. Tanta n. est huius vitii malignitas, ut minora plane contemnat remedia. Inter cetera vero præstantissimum ac tutissimum in hoc malo auxilium Guidoni prædicatur, arsenicum sublimatum. Ceterum magna locorum circumstantium, interim dū admoveatur, cura semper habenda est, ne scilicet ipsa phlegmone, atque humorum cōfluxu, occupentur. Quod incommodum facile evitabis, si partes illas vicinas & carcinoma cingentes, bolo armenio illeueris. Sed tū iusta quantitate adhibendum arsenicum. Vbi autem effectū, quē desideras præstiterit, quod ex loci inflatione siue tumore, & mora tridua deprehendes, dolor mitigandus erit, & crusta casus, modo quo supra docuimus, procurandus. Cancro vero sic penitus extincto, ac radicitus extirpato, vlcus ipsum quod remansit, similiter aliis causis vlceribus curabis. Carcinoma autem prorsus extinctum agnosces, si proba & sana caro apparuerit, si & nulla virulenta proluues se in parte laborante ostenderit, nullaque amplius graueolentia eorum, quæ proxime astant nares offenderit. Ceterum soli illi canceri vlcitati curationem, quæ vltione vel sectione fit admittit, qui in summa corporis parte hærent, quiq. adeo laborantes fatigant & molestant, ut ipsi vltro chirurgi manum efflagitent: & simul in talibus consistunt partibus, quas refecare & exurere vna cum radicibus possis. Proinde si in penitioribus corporis partibus constituti sunt canceri exulcerati, aut in talibus quidem, quas nec adurere, nec excindere vna cum radicibus possis consistit, vel si loca principibus membris vicina occupet, vel laborans ob vitium imbecillitatem tale curationis genus sustinere non possit: aut forsitan, quia nimis timidus sit & pusillanimis, extrema hæc remedia subire nolit: adhuc si ex hac curandi ratione dereris aliquid malum sequeretur: breuiter, si periculum ex sectione aut vltione timetur, nec curari aliter malum possit, satis fecerimus, si hunc augeri prohibeamus, proba in primis victus ratione, & commodis vacationibus, solisque leuibus & quasi ad blandientibus medicamentis vntes. A vehementibus vero & acerbis, quibus vitium hoc veluti crabro irritatur & exandescit, prorsus abstinentes. Ergo imperanda ægris talis victus ratio est, quæ tenuis sit, bonumque & minime melancholicum succum generet. Quod si obiecoris caliditatem & siccitatem excedentem prohiberi non possit, quin crassus & melancholicus in corpore sanguis procreetur, cibis refrigerantibus & humectantibus erit vtendum, quibus iecoris intemperies paulatim emenderur. Conueniunt itaque tum pitifanæ cremor, *Galeno libro 2. ad Glauconem teste*, lactisque serum vinum, paucissimum & aquosum, pisces laxatiles, atque omnis generis aues, præterquam palustres. Ex oleribus malua, atriplex, bleta, cucurbita, & id genus alia. Acrum elus, & repletio omnis vitanda. Sed & crassior ille, qui in venis colligitur succus ex interuallo vtendus erit, interdum purgantem medicamento: interdum, nisi quid prohibeat, venæ sectione. In mulieribus quoque, si quidem liceat per ztatem, menses euocandi: atque etiam in viris hæmorrhoides proritandæ, si modo eas pati consueuerint. Loco autem laboranti imponenda remedia sunt, quæ dolore leniunt, & ita ipsum firmare possunt, tuius redundantiæ humorum amplius excipiat: quæ item refrigerent & exsiccant, hume vero, mordcant aut irritent. Cuiusmodi sunt *folani succus, & eliquor eius stillatissimus* cum succi

copia

A succi copia non est: plumbum vltum & elotum, vnguentum album, vnguentum ex lythargyro & plumbo vltiore medicamentum, quod ex *pompholyge*, vel *thalcite* constat, aut aliis id genus metallicis vltis & elotis. Aquæ etiam, vt vocant, camphoratæ, similiter & succi in plumbeo mortario ducti, huic vitio efficacissime admoventur. Laminæ quoque plumbeæ maximo & pene incredibili vltu cancris ipsis exulceratis superindueuntur. Modus autem vsus succi solani talis est. Solani succo lineum molle duplicatè imbuitur, & la boranti loco imposito. Extrinsecus lanam molliculam eodem succo madentem linteo circumdaro: atque hæc ne siccificent, eo succo subinde irrigato. Hoc remedium loco dolenti inductum, sine dolore ac molestia, *Paulo attestantis*, exulceratis cancris subuenit. Valet & hoc vnguentum ad viceratos cancris, quod habet *lithargyrum* & *cerusam* in plumbea pila cum alio rosaceo antiseptico contrita, dum plumbicalem, quod ex iis fit acqui fuerit. Aliud quod magnopere probatur. Recipit *plumbi vltis* & *eloti*, *pompholygis*, *thuris*, singulorum vnciam dimidiam. Absinthii, vnciam vnam. Olei *rosacei*, libram dimidiam. Cera, vnciam vnam & dimidiam. Succo solani, quod sufficit, ad vnguenti crassitudinem. Insigniter etiam leniunt, solanturque plurimum in ipsis exacerbationibus, & cruciatur rempore, aut malua alba in mullis subacta, liquefacta, & rosacei paululo lenigata, in istis que cataplasmatibus illita. Cataplasma denique ex ficibus aridis, meliloto, *thure*, *maspe*, diligenter cum oleo contusis.

Modus vsus
succicola-
na.

Vaguetatē.

C LEONHARTI FVCHSII DE MEDENDIS FRACTVRIS ET LVXATIONI.

BVS, LIB. OCTAVVS.

De fracturis in vniuersum. CAP. I.



Vandoquidem duobus libris præcedentibus de soluta continuitate, quæ carnosæ & mollionibus corporis partibus accidit, abunde satis diximus, ordinis ratio iam postulat, vt de ea, quæ in durioribus, adeoque ossibus euenit, hoc est, de fractura & luxatione differamus. Ac primum quidē de fractura agemus. Est autē fractura Gal. lib. 8. Ther. meth. c. 5. arrestante, omnis

Fractura
quid.

D vitionis, siue continuitatis, quæ in osse fit, solutio, Græcisque proprio nomine *κρηγμα* dicitur. Recentiores tamen chirurgi *fracturam* vocare consueverunt, solam eam ossis diuisionem, quæ sine incisione a violentia quadam, vt rupturæ extrinsecus accidentie, aut re quæ contundit, fieri solet. Vltus vero ossis appellat, præcisione mente, aut quopiam alio simili in profundum penetrante factam. Nos Gal. secuti, vtamque diuisionem fracturæ appellatione complectimur. Ceterum primariæ fracturarum duæ sunt differentie, aliz namque simplices, aliz vero compositæ. Ex simplicibus, quidem aliz sunt, quæ fracti ossis partes iam prorsus separarunt, ealque Græci *καυατὴρ*, id est, caulium fractorum specie, Gal. ubi supra teste, factas dicunt. Hæc etiam a iunioribus *καυατὴρ* & *καυατὴρ*, hoc est, *raphani* & *cucumerum* similitudine facta appellantur. Paret vero eiusmodi diuisionem per

κρηγμα
quid.Differentia
simplicium
καυατὴρ
καυατὴρ
καυατὴρ
καυατὴρ.

E tranuersum esse factam. Aliz vero per longitudinem sunt. In iis quidem non omnino separantur a se partes, sic affecti ossis, sed veluti per rectitudinem hinc iunguntur. Hoc genus Græci *καυατὴρ*, id est, *essulatum* seu *esseri* modo, fieri dicunt. Præter hæc sunt, quæ a iunioribus Græcis *καυατὴρ*, id est, *in istar vnguis*, aut *ad vnguis formam* fieri affirmantur, quum scilicet in aliqua parte rectæ sunt, in extremo ramentum lunatæ euadunt. Quæ etiam *καυατὴρ*, *καυατὴρ* *Pauli* lib. 6. c. 19. teste, appellantur. Aliz *καυατὴρ*, hoc est, *ad farina vel pollinis similitudinem*, *καυατὴρ* quum scilicet os in multas renes partes confringitur: quæ ipsæ, *καυατὴρ*, id est, *maciatim*, aut *nuci in similitudinem* facta, a quibusdam vocatur. Aliz *καυατὴρ*, id est, *iuxta refractionem* seu *abruptionem*, quæ pars ossis per suffutatis rupturam, seu superficiei abruptionem detrahitur, ita vt pars ea, quæ detracta est & recessit, supereminet, vt fere fit, quum

καυατὴρ
καυατὴρ
καυατὴρ
καυατὴρ.καυατὴρ
καυατὴρ
καυατὴρ
καυατὴρ.

F squamula ab osse reloluitur. Atque hæc fracturarum differentie ambitiose, vt Galeni verbis utamur, a medicis Hippocrate iunioribus, iis propriis nominibus appellatæ sunt. Breuiter autem, de Galeni sententia duæ sunt tantum fracturarum simplicium differentie, a quibus curandi indicationes sumuntur, nempe quæ per trāsuerum, & quæ per longitudinē fit. Compositæ ex simplicibus facile cognoscuntur. Iuniores medici morborum

Compositæ.

Causa.

Signa.

Curatio.

Notandum.
Fractura
per visum
sum quomodo
curanda.

In directu
ag.

& symptomatum cum ossium continuitatis solutione, compositas fracturæ differentias esse non recte statuerunt: proprie enim loquendo differentiarum non sunt. Nam quod consistere seorsum & per se potest, *Galeno lib. 3. Ther. method. cap. 20. attestante*, id nullius inquam erit differentia. Vulnus autem, phlegmone, gangrena, & id genus alia seorsum, & per se consistere possunt. Sunt namque corporis nostri affectus quidam præter naturam. Dolor autem & pruritus, ex symptomatum sunt genere: proinde veræ fracturatum differentiarum non erunt. Causæ fracturatum internæ nullæ sunt, omnes autem externæ, quicquid videlicet contundere vel diuidere ossa potest. Quæ contundunt, ea dura grauique, & mole non exigua sint oportet, vehementique impetu deferri ac irruere. Ossa diuidunt, quæ vulnerando incidunt: item casus ab alto, præsertim si ossa sicciora sint, nec admodum crassa. Fractura quoque interdum accidit ex circumtortione in luctantibus. Id quod in lignis quoque, quæ a nobis ipsius contorquentur, videre licet. Si enim lignum aliquod neque magnum, neque validum, sed paruum & imbecillū supra femur positum ex utraque parte deorsum vehementer manibus virgeat, statim id in medio frangi conspicies. Signa autem ossis fracti, præsertim per transuersum, atque in artubus hæc sere sunt. Tactu ossis partes disiunctæ, separatæ ac varix reperiuntur, membri figura inæqualis percipitur: dum membrum dimouetur, & manu varie tractatur, ossa colliduntur, & veluti crepitus quidam ex ea collisione auditur. Pars afflicta contacta dolet, corpus membro fracto haudquaquam iniuri potest: causæ prætereaque frangunt, aut contundunt, præcesserunt. In osse vero quod per longitudinem tractum est, substantiæ eius crassities non naturalis tactu percipitur. Cetera signa non adfunt, nisi quod dolor & inæqualitas iudicio sensus etiam deprehenditur. In curandis autem fracturis finis seu scopus saltem primus vnio est. Quod si is per laboratium partium siccitatem perfici non possit, restat alter: qui est, vt alterius cuiusdam interuentu disiunctæ ossis partes glutinentur. Quod si nec ipse comparabilis aduertitur, insanabile esse vitium dixeris. Quod igitur coalescere nequeat tam durum os, quam id quod in iuuenibus & adolescentibus, viris, multoque magis in senibus cernitur, id profecto vel cuius patere potest. Quæcunque enim concresecere ac coalescere debent, omnino mollia humidaque sint naturaliter oportet. Quæ igitur dura siccaque sunt eorum diuisæ partes coire simul nequeant, sed glutinum aliquod vinculinque, quo coacta maneat, requirunt. Itaque potest certe illud os tantum vñtionem per se, & nullius alterius interuentu recipere, quod abunde molle est: cuiusmodi in puerulis cõspicitur. In adultis vero & siccioribus corporibus, separatæ fracti ossis particule, non per se vnquam, sed substantia dumtaxat quapiam interueniente, seu glutino quodam, ferruminari, colligariq; secum possunt. Interuenit autem ea substantia, quoniam omnis particula sibi familiare trahit alimentum: os autem crassius ac terrenum magis quam aliud quoduis nostri corporis membrum, alimentum ad se allicit, exsugitque. Quod itaque ex hoc proptio & maxime idoneo ossis alimento redundat, & in labris fracturæ concresecit, suo ipsius interuentu ossis extrema dura licet ac sicca glutinat. Vocatur autem corpus *Græcis πύον*, Latinis vero *callus*: qui vt mediocritatem in crassitie & tenuitate, duritie etiam & mollietate feruet oportet. De quo quidē *infra latius* dicemus. Ceterum videamus, quomodo vñtionem assequi valeamus, initio sumpto ab ea fractura, qua per transuersum os frangitur, quod scilicet hoc fracturæ genus sæpius incidat. In hac itaque fracturæ differentia curanda, primum est opus, vt fracti ossis partes recte committantur, & in naturalem suum coaptentur, quum autem in ea partes fracti ossis sic a se dissideant, vt e directo non iaceant, clarum est, primum id esse agendum, vt in directum agantur. Sane eum situm habuerint, si quis ea quæ se disident, integræ partis exemplo vsus, in contrarium adducat. A qua nimirum certissima indicatio transpositionis eorum erit. Fieri enim potest, vt tum prorsum, tum retrorsum, tum in hanc partem membri, tum in illam facta translatio sit. Quæcunque igitur retrorsum magis sunt acta, ea prorsum impelli conuenient. Nec minus alteram quoque fracti ossis partem modice ad contrarium retrudi. Contra quæ prorsum sunt emota, hæc rursus ipsa quidem tectusum, reliquam verò partem sensim duci prorsum. Eodem modo, & eorum, quæ ad dextram sunt detorta, medicatio est, si ad sinistram ducuntur: contraque eorum quæ ad sinistram, si mouentur ad dextram: semper scilicet a tecta parte modice in contrarium acta. In directum itaque agi, non est nisi in pristinam

figura m

- A** figuram naturalemque situm reduci. In reductione igitur fracturæ aliqui præcipiunt, in primis membrum fractum, si ossa suis sedibus exciderint, aliudque super aliud effertur, deinceps intendendum esse. Deinde os de pressum attollendum, & eleuatum deprimitur, atque ita quatenus fieri licet sine dolore, donec fracti ossis fines recte concurrant, & in naturalem situm coaptentur. Cavendum autem semper est, ne immoderatus cōfractum membrum extendatur. Immoderata n. distentio in duris præsertim & siccis corporibus vehementes dolores, febres, convulsiones, & resolutiones interdum inducit. Quin etiam per eam diuelli ac dirumpi musculorum ac nervorum fibras aliquando contingit. Proinde summa in hac re prudeotia est opus. Igitur ægro in sedili locato, vel reclinato potius, ministris duobus iubebimus, huic supra fracturam, illi infra digitos circumponant, atque sic teosioem perficiat. Quod si valentior opus sit intensioe, nō solum manibus, sed etiam habenis aut funib. intendere aggrediemur. Ergo duos fuos æquales cōfracto membro circumdamus, unum supra fracturam, alterum infra: atque vni ministro ad xgrotantis caput consistenti, alteri iuxta pedes capita funium rudentes, iubebimus in diversā membrum perfractum distendere. Vbi paulo longius, quam naturaliter esse debet membrum vis fecit, distentio remittenda est, ac tum demum ossa manib. in suam sedem compellenda. Ossis autem repositi certum indicium est, dolor sublatu. Alius modus fracta ossa reducendi in suum locum, & naturalem situm per distentionem, ab Hippocrate in libro De fracturis traditur, qui etiam a Paulo lib. 6. refertur. Sed hic, quem retulimus, modus longe facilior, & magis ad maiorem est, atque in frequentiore usu.
- C** Oportet igitur aut manibus ipsi, utique si cōfractum membrum exiguum est, aut vinculis impositis, si maius est, & validiore tractu opus sit, retrorsum trahere ossa ipsa, ut e directo committantur, exactaque eorum coniunctio fiat, sic ut pristina viatione imitentur. Postea vero quam abunde retracta fuerint, & nullus amplius super sit metus, ne se in adduceodo cootigant, tum io directum opponere, vinculaque relaxare, ac musculis ipsi disduktorum in idem commissionem permittere opus est. Interim vero te ipsum quoque, qui operi præses, manibus sublevare expedit: ac sicubi aliquid paulum subsultat ac prominet, corrigere atque formare. Ceterum in adduceodis sic contratio motu paribus, ne aliquæ frangantur ossium extantia, nō laze periculum est. Nō eoim veluti in terra defectus visitur, lævis est semper utriusque partis hois. Nam si illæ frangantur, non
- D** porerunt adamussim secum coaptari fracti ossis fines, tum quia forsā fragmenta inter partes voieodas interciderint, tum etiam quod quidpiam ossium forte extra ceciderit, & comminutum perierit, unde spatia inter applicata simul ossa maneant inania, io quæ sanies collecta, atque temporis tractu putrescens, totum patiter membrum secum corumpet. Atque hæc tractuodæ fracturæ ratio omnibus propemodum cōfractis artubus conueoit, vbi præsertim ossa fracta suo loco exciderint, aliudque super aliud effertur. Neque enim semper, dum franguntur ossa, suis sedibus moveri contingit, sed interdum fracta in suo loco, & oaturali situ remanent. Quod ante omnia, ut Celsus admonet, considerari debet. Et sunt certæ notæ, quibus id discrimenprehenditur. Nam si suis sedibus mota sunt, resima apparent, punctioisque sensum exhibent, ac tractu, ut distam moti.
- E** est, inæqualia sunt. Vbi vero loco suo non exciderunt, oihil prædictorum adest. Festinandum vero est, ut in tempore ossa fracta, & suis sedibus mota, reponantur. Si enim primis diebus reposita non sunt, haud leue phlegmoos periculum iubeat. Io qua quidē & difficile, & periculose vis nervis & tendinibus adhibetur. Atque hæc primo loco agenda. Secundo anniteodum, ut ossibus probe iam coaptatis, & e directo ad motis, eorundem positura serventur, & exquisitè coniuncta maneat. Siquidem nequaquam prohibere poteris, quin diuisa eiulmodi ossa, quæ sic effinxeris, & adamussim secum coaptaveris, sua sede moveantur, & rursum dissideant, si laborans quoquo pacto, vel vigilans, vel dormiens membrum fractum dimoveat. Vnice itaque curandum, ut perfractum membrum prorsus immotum coosistat. At si ipsi quidem xgrotanti, ut quierudini membri propiciat, permittis, vigilans fortassis probe id curaverit, ac dormiens omoio membrum movebit. Vt igitur oō dormientis modo hominis, sed etiam ad desiderodū itemque quū cubile refternitur surgeotis, eorū quæ rite formata & exquisitè coniuncta sunt, positura servetur, iuta deligatura completi fracturam oportet, quæ fracti ossis partes secū coarctare ad amussim possit. Tuta a. nō erit deligatio, si vel nimis arcta, vel nimis laxa

Modi reducendi ossa fracta.

Immoderata distentio.

Æger quo modo collocandus.

Difficile quando remittenda.

Ossium extantia haud frangenda.

Notæ ossis fracti, & sua sede moti.

Deligatur
modis.

insuper
duo.

Cubitus &
digiti.

insuper
duo.

fuerit. Per laxiorem namque ossibus moueri licet, per arctiorem veto ac vehementius ^A adstringentem, & alimentis in locum laborantem distributio prohibetur: & dolor, qui humorum in ægram partem affluxus euocat, & phlegmonas creat, excitatur. Danda igitur opera est, ut utrumque declinemus excessum. Constrictio igitur mediocriter esto, tum nostri sensus, tum ipsius ægotantis iudicio. Ac si quid æqualis esset crassitudinis membrum quodque, utique latissima fascia commodissima esset, utpote quæ totum æqualiter contineretque ex omni parte fractum os complecteretur. Sed quoniam id non est, quod deest nobis ex fasciarum latitudine circuituum numero penlabimus, ut in artubus ipsis, qui omnium maxime fracturæ per transversum factæ expoliti sunt. In talibus namque utilior est angusta deligatura, quam valde lata & remissa. Quippe quæ ^B nec rugas, ut ea quæ latiore fascia sit, contrahat, & totius membri cui circumdata est, eutem contingat. Ea igitur vique augere tibi fasciæ latitudinem licet, quoad nulla eius pars laxior efficiatur. Ceterum in eiusmodi deligatura, quæ fracturis, in medio præsertim brachii, vel tibis, aut femoris existentibus adhibetur, duab. fasciis lineis, mollibus iuxta Hipp. dogma opus est: quas ille peculiari nomine *intra iugum*, id est, *sub ligamina*, seu *sub fasciis* nomen, appellat. Primæ fasciæ initium super fracturam iniici debet, ac circa eam bis terue conuoluta, sursum versus ferri, & quasi in cochleâ serpente, atque illic desinere. Id tamen perpetuo obseruandum est, ut multum partis sanæ fasciæ hæc cõplectatur. Ita enim fiet, ut & firmius reposita ac cõformata ossa contineantur, & magis a laborate loco in vicinas partes humores elidantur: magisque ne hia superiori patte eo defluant, impediatur. Altera etiam super fracturam incipere debet, priori aduersa: deorsumque, ^C ubi primos complexus super fracturam fecit, tendere: atque inde iterum reducta, in superiore parte vltra priorem fascium desinere. Quocirca dimidio longior priore esse debet. Terminus autem longitudinis earum fasciarum nõ vnus ac certus statui potest, sicuti nec etiam latitudinis, sed pro magnitudine fracturæ, & præfracti membri crassitie utraque dimensio varianda est. Hipp. tamen in lib. de med. offic. & lib. de fracturis, trium aut quatuor, aut quinque, aut sex cubitorum longitudinem, digitorum veto totidem latitudinem constituit. Cubiti veto & digiti intelligendi sunt eius qui deligatur, nempe vel viri adulti, vel pueruli. Hæc autem duplicis deligaturæ ratio ex ipsarum naturæ defumitur. Siquidem duos hæc prima lineæ fracturam muniunt, ac stabiliunt, nec phlegmonem orti sinunt. Ab integris enim ad laboratam partem sanguinis confluxum arcent, & quæ iam collectum in ea est, exprimunt. Prior namque deligatura quæ in laxa parte continetur, ad superposita loca expellit atque elidit: quæ veto ex iis in locum per fractum confluunt, repellit. Altera veto primis quidem complexibus, quos, ut dictum est, super fracturæ locum facit, itemque dispensatione deorsum tendente, quædam ad inferiora extrudit: quædam, ne quid ex iis in locum fracturæ confluat, prohibet. Reliquis vero deinceps complexibus, quibus videlicet ab infimis partibus sursum versus tunc recurre de iis, ut eodem scilicet loco cum priore fascia secunda desinat, tum ad superiora repellimus, tum confluxum ab iis prohibemus. Porro priusquam fasciis huiusmodi fracturæ deligatur, vnus aut alter panniculus lineus candido oui liquore & rosaceo delibutus, nudo membro non temere a recentioribus chirurgis accommodatur, ea quidem magnitudine, ut etiam aliquid sanæ partis comprehendat. Sunt autem eiusmodi fasciæ duæ prælongæ, nempe quatuor, aut quinque, aut sex cubitorum, & trium quatuorue digitorum latitudine, aqua aut potius posca madefactæ, & postea expresse, præsertim si fracturæ phlegmone vacet, recenscuntur. Si vero dolor vehemens, aut phlegmone adest, lanis tenuibus mollibusque, aut stupis leuibus oleo vel posca imbutis membrum contegendum est, & non ita arcte deligandum. Satis enim fuit, ut tunc deligatura adhibeatur, quæ & membrum utrumque fulciat, & ad mota medicamenta ad hæc symptomata prosiganda idonea contineat. Ceterum quum hæc duæ primæ deligaturæ ad ambos hos quos diximus vsus, nempe ad fracturæ munimentum, & ut phlegmone excitare prohibeatur, non satis adhuc faciunt, præsertim solæ, ad earum quidem tutelam, & fracturæ stabilitum Hippo- ^F crates excogitauit remedium, ut scilicet splenia, seu plagulæ vna cum exterioribus fasciis, quas *intra iugum*, id est, *super ligamina* vocat, desuper adhiberentur. Splenia itaque eiusmodi duarum primarum fasciarum, quas *intra iugum* appellat, firmamenta sunt. Ne autem phlegmone suscitetur, medicamento quoque ex iis, quæ phlegmonum iniurias arcent,

- A** arcent, uti censet. Quale nimirum est ceratum liquidum, quod a Galeno. *lib. decimo, Ceratū liquidum. Ther. meth. cap. 9.* describitur. Quod si vero ossis fracturæ carnis quoque vulnus accessit, neque ceratum, neque rosaceum ruto admouetur, quod scilicet hæc vitustum sordidum, tum potius efficiant: sed in vicem eorum puluelli prælongi nigro & adstringente vino imbuti, superiniiciendi erunt. Porro ubi decenter sic contractum membrum deligaueris, de apposita repositionis ipsius figura maxima tibi sollicitudo habenda est. Si quidem sub alia figura membrum perfractum deligare, in alia vero mutare ac reponere, non dolorem modo excitare potest, verum etiam ossa intorquere. Necessè enim est mutata figura alios musculorum tendi, ac velut contractos rotundari, alios vero solui ac remitti. Vbi autem tenduntur, tum premi eos a deligatura est necesse, tum ex compressione ipsa dolore. At ubi tensio remittitur, quo loco deligatura est laxa, ibi fracturam fulcumento destitui oportet. Ceterum appositissima fuerit in ossium fracturam repositione, sic uti etiam in retractione & coaptatione, & deligatione partis, figura, quæ a dolore & maxime abest, & in qua æger immorus diu persistere possit. Hæc enim rectissima est, & membro maxime naturalis, ac fere consueta. Rectissimam autem partis figuram cum Galeno vocamus, quæ venas, arterias, & musculos quam rectissimos habet. Proinde angulosa figura, quæ ἰσχυρὰ Græce dicitur, brachio quidem naturalis est: cruri vero, quæ paulo minus porrecta est. Hæc namque rectissima est, & a dolore maxime aliena. Est autem figura angularis, Galeno libro primo, *Prælia. comment. 11. & libro secundo, de motu muscularum, & lib. 3. de medicis officina, comment. secundo, teste*, in qua brachium cum cubito quatuor efficit angulum. Quo plerumque posita eos qui dolore afficiuntur, si diligenter inspexeris, manus tenere deprehendes. Porro ut dolor videretur, quum ad quietem reponitur membrum, non modo naturalis habitus cuius instrumentum est utilis, verum etiam consuetudo quoque non nihil conducere videtur. Ergo ut apte membrum perfractum & decenter ligatum reponatur, ea situs figura illi inuenienda est, quæ & naturalis est, & consueta, & a dolore maxime aliena. Ut autem in hac figura lenitum protinus membrum perfractum, recentiores Chirurgi secundum deligaturam protinus, ferulas etiam circumponunt, ipsas quidem constringentes, prout sensus & tumor ex phlegmone, si qua adsit, postulat. Veteres autem, ut Hippocrates & alii, a die tantum septimo, vel etiam nono & undecimo, ferulas accommodabant. Verum non in consuetudine sit, si statim etiam ab initio post deligaturam ferulas iniciantur, modo nimis premendo dolorem non excitent, aut phlegmonem accersant, vel præsentem exacerbent. Quæ igitur a principio adhibentur, non eo nomine ut adstringant, sed ut adaptationis figuram contineant, & ossa in suam sedem reposita utrinque fulciant, accommodantur. Quocirca primis diebus quum phlegmones diuitandæ consilium vincit, tutum non est, perfractum membrum ita ferulis premere. Quum vero nullus iam amplius futuræ phlegmones metusest, ut ea quæ prius discussa, membrum aliquantulo gracilius quam pro naturali habitu apparuerit, (quod intra septimum diem fere solet contingere) tum licebit ferulas circumponere, & eas ut fracturam stabiliant, valide sanis adstringere. Ferularum itaque usus idem est, qui & plagularum, seu spleniorum, nempe ut fractum os contineant, & deligationem stabiliant ac firmant. Sunt autem ferule leuigatæ & planæ, æquabiles: id est, neque inlatus, neque in superiorem aut inferiorem partem distortæ: in latis partibus, id est extremitatibus, resimæ, id est, leniter deorsum ac retrusæ minores hinc inde quam deligatio est: & ea parte erassiores, id est latiores & valentiores, qua fractura erupit. Quorum omnium rationem exponit Galenus libro tertio, *Hippocrates, de medicis officina, comment. duodecim*, quas consulto nunc præterire volumus. Modus autem & ratio adhibendi ferulas, talis esto. Splenia triplicia aut quadruplicia oleo delibuta super fascias similiter atque æqualiter, si membrum in crassie fuerit æquale, circumdato. Si vero inæquale, partibus magis concavis per splenia repletis, membrum vndique æquale ferulis accommodandis efficitur. Deinde ferulas lana aut stipam mediocriter inuolutas in orbem, non minore quam vnus digiti spacio inter se distantes, fracturæ circumdato, easque leniter ac moderate consistringo. Sed in hac ferularum accommodatione summopere cauendum, quatenus heri potest, ne articulus aliquis, & præcipue interior flexus pars, ab eis attingatur. Vlcera siquidem in ipsis nonnunquam, & nervorum phlegmones pa-

Repositio
nis specifi-
ca figura.

Rectissima
figura quæ
est

Figura an-
gularis.

Ferula quæ
do in fractu-
ra circum-
ponenda

Ferularum
usua.

Modus ad-
hibendi
ferulas.

riunt. Proinde iuxta articulos ipſos deligatione aliquando breuiore, tenuiore, laxio-
res, & magis flexibiles ſerulas eſſe oportet, quemadmodum valentiores qua fractura
excidit atque inclinatur. Ceterum ſi nulla prurigo, nulla phlegmone, nulla ſuſpecta ex-
ulceratio, nulluſue dolor adeſt, & oſſa recte commiſſa fuerint, fracturaque recte pro-
cedat, ſic manere ſerulas & ligamenta, ad decimum viſque diem, vel quintum & deci-
mum, aut etiam vigefimum vtile eſt. Si vero in membro perfracto pater ſolium eo o-
perto, vel dolor exciretur, vel pruritus creetur, vel eius quod iam infixum fractura eſt
perſpiratione prohibeatur, propter quam non modo noxiuſ pruritus quibuſdam acci-
dit, ſed etiam eroſa ſaniet a crimonia nonnunquam cute, exulceratio concitatur, non
temere fecens, ſi tertio quoque die, vt iuſſit Hippocrates, deligationem ſolueris, &

Calli gene-
ratio.

membrum ipſum aqua temperata perſuderis ac foueris. Hac enim perſuſione & ac-
torem atque erodentem ſaniet diſcuties, & dolorem mitigabis, ac prurigini pulcre
medeberis. Porro quum nec ſerulis, nec deligatione, nec figura ſituae membri appo-
ſito diuiſe oſſis partes, tamenſi ex acie atque admiſſim commiſſa fuerint, citra gluci-
num aliquod vinculum eo eire ac conereſcere poſſunt, maxima calli gignendi ſollici-
tudo habenda eſt. Ad hunc igitur gignendum cogi conereſcereque aliquid proprii
oſſium alimentuſ craſſi tetrenique oportet, vt dictum eſt, quod in labris fractura coale-
ſcit. Ipſum igitur nec eluendum, nec foras enocandum eſt, ſed ſinendum. Craſſa au-
tem hæc tetrenaque ſubſtantia ex genuino maximeque idoneo oſſis alimento redun-
dans (quæ propria eſt calli materia) diem circiter duodecimum, aut decimum quintum
ab oſſis fractura ſere gigni atque accreſcere incipit, vt aliqui recentiorum teſtatum re-
liquerunt. Huius autem generatio, quæ in aliis citius, in aliis vero tardius aduenit, iſis
ſere deprehenditur notis. Dolor qui priuſ aderat, ſedatur, nulla uſque phlegmones,
aut tumoris alicuius præter naturam metus eſt, in perfracto membro bonus ac natiui
color eſſe teſtit. Præterea vniuerſa victus ratio callo gignendo accommodata, talis eſt.

Callus qui
buſ novis
generati de
prehendi-
tur.
Victus cal-
logignendi
opora.

Cibi qui boni ſucci ſint, & multum nutriunt, niſi vultus adat, exhibeantur. Sed &
quæ offeruntur alimenta talia ſunt, ex quibus pronenire ſuccus ſoleat non tantum bo-
nus, ſed etiam tenax, ex quali maxime expedit callum fieri. Quippe quum ex ſeroſa ad
tenui humiditate gigni proſuſ nequeat, ex craſſa vero, ſed quæ fragilis ſit, ac pingui-
dinis expert, gigni quidem poterit non ſegnitè: ceterum tempore ſuccedeſſe friabili-
or, atque ita fractioni obnoxius reddi tur. Proinde callo gignendo conueniunt oriza, D
panis ſimilagineus, frumentum triticeum tam diu in aqua coctum, donec inſtar pulvis
efficiatur. Ad hæc pedes, ventres, & capita animalium, ſed præſertim hædi & vetueciſ.
Hæc enim & multum alunt, & craſſi & tenaciſ ſucci ſunt. Craſſa initium fractura viſque
dam callus gignitur (quod ſere circa decimum diem contingit) ægrum tenuiſſime ci-
bato. Cibi namque ſubexiles, vt cenſuit Hippocrates, & non validæ materiz tunc ſatis
ſunt. Venam interdum, quum icilicet res poſtulat, ſecato, & per ventrem ſuperuacua
expellito. Carne & vino viſque ad decem dies, ex Hippocratiſ præſcripto, abſtinet. Poſt
hoc tempus, vinum craſſum & adſtringens audacter concedito. Magnitudo calli nec
minor quam par eſt, nec maior iuſto ſit, ſed mediocritatem ad vngue ſeruet. Qui enim
iuſto maior eſt, dolorem muſculis inuehit: qui minor eſt, hic oſſa parâ tuta reddit. Bre-
uiter igitur, calli magnitudo ea ſit, quæ & oſſibus tuto vinculo ſit, nec muſculos tamen
comprimat. Attendendum vero diligenter eſt, vt vel promoueat, ſi minor iuſto pro-
ueniat: vel inhibeat, ſi immodice creſcat. Vtrumque autem vitium corrigitur perſu-
ſionis quantitate & qualitate, eiſorum etiam ac medicamentorum quæ extrinſecus
apponuntur, ſaculitate. Nam dum nimis ſiccantur oſſa, callus ægre prouenit. Expe-
dit igitur ita reſiccatis oſſibus, tertio vel quarto die mediocri quantitate calidam aquam
inſundere: hanc metam ſinuendæ perſuſionis habentes, quum carnes in rubrum tu-
morem attolluntur. Atque in iſis quidem priuſquam ſubſidire incipiant, deſiſten-
dum eſt. Contra ubi diſcuti quid volumus, non priuſ eſt deſiſtendum, quam q ex per-
ſuſione intumuiſ, ſubſidat. Si vero humiditas abundantior calli generationem impe-
diat, ibi hanc ſiccare conuenienti deligatura & perſuſione aquæ, quæ vel minima om-
nino ſit, vel plurima cenabimur. Quippe minima quum priuſ deſiſtat, quam aliquid
conſuat, & qui in ſuperficie ſunt humores per halitum digerit, & qui in alto ſunt mo-
dice liquat. Expedit autem ita ſolui liquarique ea, quæ per deligaturam ſunt expel-
lenda.

E

F

A lenda. Plurima vero perfusio plus discutit, quam attrahit: atque ita commodat superflua humiditati. De cibo, adeoque victus ratione, iam supra est dictum. Ex medicamentis vero quæcunque emplasticam substantiam habent, cuiusmodi est emplastrum, quod ex pice conficitur, ac modice calefaciunt, ea callos tum promouent, tum vero augent. Alimentum enim copiosius in locum perfractum attrahunt, sicuti & moderatæ aquæ temperatæ perfusiones, & idoneæ frictiones. Quæ vero discutiendi vim obtinent medicamenta, ea callos maiores iam factos imminuunt. Si vero nec augere callum, nec minuere studeas, sed eo sicut vltro provenit es contentus: medicamento aliquo enhamo, id est, quæ cruentis vulneribus adhibentur, utere: quæ quum modice siccant, etiam coagulari ac condescere medioeriter callum faciunt. Quum recens adhuc callus est, medicamentis valde adstringentibus, Paulus vltendum esse censet, compressamque admodum deligationem adhibendam, lamina plumbea etiam interdum imposita. Hæc enim calli excrecentiam mire reprimat, ac imminuit. Huic rei efficaciter quoque subuenit, *Celso teste*, multa leuissime ex oleo, & sale; & nitro, membri perfrictio, plurimifque ex aqua salsa totus. Post hæc malagma, quod discutiatur impoendū, adstrictiusque alligandum esse admonet: imo vero oleribus, & præterea vomitu vtendum. Siquidem per hæc vt existimat, cum carne callus quoque extenuatur. Confert etiam aliud aliquid de sinapi, cum siculo alterum par membrum imponere; dooec id paulum erodat, atque euocet materiam. Atque vbi is tumor extenuatus, & qui nimis supercreuerat callus ad mediocritatem reductus fuerit, rursus ad ordinem vitæ reuertendum erit. At si lapideus solidusve callus, qui sic immodice inest, euasit, appetta ibi cute deradendus est: partisque eius eminens scalpris, & terebris etiam, si res exigat, admotis, excidenda est. Ceterum solent aliquando in fracturis diuersa inter se olla conferuere, & membra distorta callo firmari, difficultate functionum obeundarum haud exigua subsequente. Quod vbi contingit, & breuius membrum, & indecorum sit, & si capita acutiora sunt, assiduas punctiones sentiuntur. Ergo vbi perfracta ossa sic conferbuerunt, & perperam ferruminata sunt, si tener saltem adhuc callus est, & non vltra sex menses radices egerit, frangere rursus, & dirigere ea oportet. Id autem hoc fit modo. Calida aqua multa, vel decocto aliquo emolliente diebus aliquot id membrum fouetur, & ex cerato liquido perficitur, aut emplastro exalthæa, vel cataplasmate ex caricis pinguibus, aliisque medicamentis callum soluentibus contegitur. Deinde facta sufficienti eruolutione, modo quem supra exposuimus a ministris duobus intenditur: & interea Medicus pertractans ossa, vt callo adhuc tenero existente, manibus ea diducit, compellitque id quod eminet in suam sedem. Et si parum valuit ab ea parie, in qua os se inclinat, inuolutam lana regulam obicit, atque ita deligendū assuescere iterum vetustæ sedi cogit. Nostræ ætatis chirurgi male ferruminatum os, in fractura non admodum diuturna, diebus plus minus quindecim primum emolliunt. Deinde in diuersa extendi iubent: & genu vehementer impullo, iterum frangunt: quod tamen vetustiores Medici non probarunt. Mox tracti ossis fines ad amussim secum coaptant, ac, vt supra exposuimus, curant. Si vero perperam ferruminatum os vetustas iam occupauit, ac callus vehementer obduraui, satius est manum illi non admolari. Quicunque enim id rursus frangere aggressi sunt, post vehementes cruciatus in extréma discrimina laborantes adduxerunt, adeo vt pauci admodum eorum qui hoc tormenti genus perpeffi sunt, mortem euaserit. Quocirca melius est, eum qui sic laborat, claudicantem aliquot adhuc annis superstitem fore, quam post talem tantumque cruciatum miserrime inter manus crudelis chirurgi occumbere. Quod si tamen laborans, & qui illi assident amici, importunis precibus te compellant, vt ossis cuiusmodi male ferruminiati, & cuius callus iam obduraui ac inueterauit, curationē suscipias, in angusto spem esse vbi coram illis præfatus fueris, opus aggreditor. Summam igitur cutem, & carnem callo superiacentem rasorio cultro aut scalpello dextre ac prudenter secato, magna cura habita, ne nervi musculive lædantur: deinde ossium quæ non recte coalescunt glutinationem excisoris scalpris dissoluit, mox veterum sic diductorum fines secum ad amussim coaptato, ita vt pristinam vimonem quoad licebit, imitentur. Demum cetera fiant quæ supra scripsimus. Ceterum fracturæ quædam supra definitam naturæ tempus sine callo interdum permanent: quod ob

Male ferruminiati os, si curatio, & delectatio, & cetera, tum chirurgorum.

Cur fracturæ diu sine callo interdundum perueniant.

varias cauſas ſolet acciderc, nempe vel ob aſſiduas ſolutiones, vel ob immodicas ſu-
perſuſiones, vel ob intempeſtiuum motum, vel ex ſciarum multitudine: non oun-
quam etiam quia totum corpus noo ſufficiens er altur, quo io caſu membrum quoq;
ipſum gracilius euadit. Oporter igitur cum aliis, rum præcipue maciei corporis oc-
currere: quod commodè fiet, ſi vel calidis admotis mareriam ad membrum perſtra-
ctum cuocemus, vel alimentum copioſius ſubmiſtrems, & balnea reliqua que a-
nimi voluptates adhibeamus. Porro corum, quæ iam callo firmantur, indicio eſſe cum
alia, rum illud præcipue poteſt, ſi ſcioræ cruentæ conſpiciuntur, nullo in parte obor-
to vulnere, Quod ideo fortaſſe accidit, quooiam calli dum coit ſubſtaota, in oſſium
cauernoloſos meatus petrumpeos, ſanguinis guttas aliquot inde extrudit, exprimitq;
Atq; hæc de pori generatione diſta ſufficiant. Poſtremum vero, vt ſymptomatum quæ
fracturam ſequuntur correſtioneem ſubiciamus oecſſe eſt. Hæc autem fere ſunt, dol-
lor, phlegmone, pruritus, vulnus, & gangræna. Si dolor aut phlegmone adit, deliga-
tionem, ſi iam facta eſt, ſtatim ſoluiri, & lãnã, oleum, & acetum, congruè quid genns
alia auxilia parti dolenti, atque phlegmone occupatæ admoueto. Sed neq; priuſquam
hæc ſedara fuerint, vel deligarum adhibeto, vel ſerulas circumpoſito, niſi duntaxat
catenus vr membrum fulciant, & vt impoſitum medicamentum cootineant: hoc eſt,
laxæ admodum. Si noxiuſ pruritus accidit, & eroſa ſaniei acrimonie cura exulcera-
rio concitatur, aque temperatæ tantum ſuperinfundere oportet, quãum ad euocan-
dam euſmodi ſaniem eſt ſatis. Hoc quidem Hippocratis & Galeni coſiliuſ fuit. Re-
centiores autem chirurgi aquam ſaltam inſuodi præcipiunt, aut albo vnguento, vel co-
quod vocant vulgo *papuleum*, membrum illini, & deligari. Quum oſſis fracturæ carnis
quoque vulnus acceſſit, ſiue ſtatim ab initio id factuſ ſit, ſiue poſtea a chirurgo indu-
ctum, vr oſſium fragmenta, & ea præſertim quæ pungunt, eximãtur, ſiquidem ſanguis
profundatur, huoc priuſ apertis remediis ſiſtito, ſi phlegmone oriatur, prædiſtis ad eam
efficiat: bus vitot. Si carnes contuſæ ſint, partem laborantem, vt gangrænæ periculum
eiſetur, ſcarificato, Quod ſi gangrænæ quoq; ipſa, aut alia quæpiam ſerpens putredo
iam occupauit, coouocentur occurrito, Ar ſi nihil horum adſuerit, neq; magna oſſis
pars nudata ſit, hamuliſ ſuturiſque vſu, hiſ medicamentis, quæ cruentis imponuntur,
medebimur, priuſ tamen fragmentis oſſium euulſis. Ceterum deligatio fracturæ eiſ-
modi cum vulnere factæ, hoc modo adhibenda erit. Orbiculares ſcioræ partibus vul-
neris vtrobiq; hoc eſt, ab vtraq; vlcereis parte, iniici debent: oblique vero ſupra ipſum
vulnus iolongitudinè collocandæ ſunt, ſic vt decuſſim ad literæ X ſimiliuſduoem,
iuxta hiaruſ ocluſio ex omnibus fiat. Hippocrates tamen a prima ſtatim circumuolu-
tione, ſcioræ latiore totum vlcus cõprehendit, ita vt nulla eius pars, ouden relinquantur.
Itaq; ſi ſordidum adhuc vulnus eſt, expurgantia medicamenta, quãdo opus eſt, im-
pones. Si purum, carnẽ producentia, lincolis illita, aliamq; vſu comprobata materiam
adhibebis. Hippocrates tamen ſtatim ab initio picarum ceratum, q; ceram in roſaceo,
aut oleo colliquatam, & picis ſiccæ aliquantulum aſſumit, ſupra vuluſ in lincolis ad-
hibet. At Galeno auctore, vitulus a tertio die, quũ ea, quæ in vlcere ſunt, concoquat, ad-
hibetur. Si zeſtium iẽpus eſt, Hippocrate atteſtante, ſpleoia vino frequenter ſunt irrigãda: E
ſin hyemalẽ, lãnæ multæ ſuccidæ ex vuo & oleo ſuperimpoendæ ſunt. Lanarũ nam-
que ſuperpoſitione, & olei commiſtione refrigerationis vchmẽtia, quæ in huiſmo-
di affectibus coouulſionis periculum in crdum aſſert, obtuodiur. Vno autẽ madafe-
ctæ plagulæ, ob vinũ reprimendi vim obtinent. Ceterum vbi purgata vlcera fuerint, a-
liqui ſerulas iniiciunt, aliqui vero etiam ab initio ipſas accommodant, vlcetis locũ eui-
tantes, & prout neceſſitas ac vſus rulerit, ipſas modo conſtringunt, modo remittunt.
Sed hæc curandi ratio Hippocrati non probatur. Hic enim pluribus tantum & latio-
ribus ſcioræ ſerulas, ne videlicet comprimendo lædant, ſimiliter & omoio canales
reiciens, deligarum in euſmodi fracturæ quæ cum vulnere incidit, ſicci iubet, laxius
ſcilicet, quam ſi ea plago non eſſet, ita vt aſſueſcit quidem, non compreſſet tameo ſcioræ
ipſæ eſſe videantur. Ira namque numero ſciorum efficietur, vt laxæ quoque æ-
que contineant. Ac ſariuſ quidem eſt ſæpius circuire, quam altringi. Sed & io eas ſcioræ
ſas multũ ces in gerendum ſubiole oleum eſt calidum, & vinum: magiſq; vbi cum
vulnere fracturæ a principio incidit, exquiſiſſimo vinctu vtendum, vulnus calida aqua
ſouent.

Fasciæ
euerſent
conſpiciun-
tur.Symptoma-
tum corre-
ctio.
Doloris.

Pruritus.

Vulnere.

F.

D

E

F

A fovendum, frigusque omni ratione vitandum, & transeundum ad medicamenta quæ puri mouendo sunt idonea, maiorque vulneris quam ossis ratio habenda. Quod autem ad ferulatum rationem attinet, sic statuendum erit. Quum fractura cum vulnere interdum in longitudinem membri contingit, tunc ex utraque vulnere parte ferulas etiam ab ipso curationis principio circumdare licitum est. Quum vero transeuerfum vulnus euasit, idque si maius sit, ferulas statim ne imponito. At si quamuala quæ ex ossis resolutur: id quod ex eo colligi potest, quod & copiosior, & tenuior humor profuit, & caro circa vulnus laxa & molis effecta intumescit: deligatur a laxiore vtendum est, ne scilicet pus intercludatur, sed effluere facile queat: frequentialque, vt *consilium Hippocrati*, religandum, quoad os recesserit, ferulæque nequaquam apponendæ. Vbi

Ferulæ quæ d. in fra. ctura cum vultu e ad habenda.

B vero vel hamulo, vel quopiam alio eiusmodi instrumento iquamam coule. is, deligatur iterum validiore membro adstringendum. Præterea per totum id quo vulnus curatur tempus, medicamentum aliquod ex iis quæ phlegmonem arcet, linamentum continens vulnere incumbet: & simplices fasciæ iniiciuntur, quæ singulis curationibus resoluntur, quum alix supra dictæ remaneant. Inter hæc autem si quod porum fragmentum ossis eminet, id si reuersum est, in suam sedem reducendum: sin acutum, ante acumen eius longius est præcidendum: si breuius, lauandū, & vtrinque: si prolimandum, tum ipsum recondendum est: ac si id manus facere non potest, vulsellis, quali fabri vtuntur, iniicienda est, recte se habendie apiti ab ea parte, qua sima est: vt ea parte, qua gibba est, eminens os in suam compellat sedem. Si id maius est, &

C membranulis fragmenta cinguntur, finire oportet ea sub medicamentis resolui, idque os, vbi nudatum est, abscindere: quod maturius faciendum est, potestque ea ratione & oscito, & vulnus sanescere. Nonnunquam etiam in magno vulnere euenit, vt fragmenta quædam velut emotiantur, neque cum ceteris coeant. Quod hinc quoque ex modo fluentis humoris colligitur, quo magis necessarium est sepius vulnus soluere, arque nutrire. Sequitur vero vt id os per se post aliquot dies excedat, quum tam misera antea conditio vulneris sit, tamen id interdum maius diutiusq; facies. Sepe enim integra cutis ossi abrumptitur, protinusq; prurigo & dolor oritur. Quæ soluere, si accidit, maturius oportet, & fouere aqua per ætatem frigida, per hyemem egelida, deinde ceratum myrtem imponere. Interdum fractura quibusdam velut æuleis carnem

D vexat: quo a prurigne & punctationibus cognito, aperire id melius, eosque aculeos præcidere necesse habet. Reliqua vero curatio in vtroque hoc casu eadem est, quæ vbi iussu protrinsum intulit puro iam vulnere, vt *Celsus lib. 8. cap. 10. præsequitur*. Ac de transeuerfis quidem fracturis hæc satisfaciunt. De longis vero, quæ non tam crebro contingunt, reliqua omnia ad eundem se habent modum: ceterum comprimendæ hæc magis, *Galeno lib. 6. Ther. method. cap. 5. attestante*, in ipso fracturæ loco sunt: tum quod recessit, retrudendum introctus est. Ac de fractis quidem ossibus hæcenus in vniuersum dictum sit. De particularibus autem fracturis *caluaria, narium, aurium, maxillarum, clauicularum, costarum, spina dorsii, humeri, brachii, femoris, crurum, & digitorum*, vt aliquid subiciamus, non esse necessarium iudicamus, quandoquidem harum omnium curationes

Fracturæ in longitudine cura.

E Paulus in sexto, a capite 60. vsq; ad 111. & Celsus lib. 8. a capite 4. vsq; ad 11. compendiose admodum tradiderint, adeoque nostram hac in re operam anteuerterint. Ad luxationes itaq; progrediemur.

De luxationibus in vniuersum. C A P. II.

QUæ luxationes fracturis proximæ sunt, ordinis ratio exposulare videtur, vt de his generationibus nunc differamus. Est autem luxatio, articuli & matris postum, seu proprii sui i. alienam atque insolitam sedem prolapsus; quo voluntarius impeditur motus. Græcis *thlaxia* vocatur. Huius veto, vt Paulus lib. 6. cap. 111. testatur, nullæ alix differentix habentur, præter eam quæ ex maioris minorisq; ratione sumitur. Quum enim articulus sua sede in totum excedit, communis generis vocabulo Græcis *thlaxia* dicitur. Si autem

Luxatio quid.

Differentia.

Thlaxia.

Fe compagibus suis paululum duntaxat emotus est, aut vsque ad unum superalium prolapsus, Græcis *epithlaxia*, nobis *subluxatio*, nominatur. Hoc fere innuere etiam videtur Celsus, quum lib. 8. cap. 11. inquit, ossa duobus modis suis sedibus moueri. Nam modo quæ iuncta sunt inter se duntaxat dehiscunt, vt quum latum scapularum os ab humero recedit, & in brachio radius a cubito, vel potius vlna, & in crure tibia a fura, vel fi-

bula, atque etiam interdum ſaltu calcis oſa talo, quod raro tamen fit. Modo articuli **A** ſuis ſedibus excidunt. Vertebrae namq; & articuli propemodum omnes, tamenſi valde ligamentis comprehendantur, ſæpius tamen ſuis ſedibus elapſi decidunt: aut vi ſcilicet expulſi, aut aliquo caſu nerveis ligamentis vel ruptis, vel infirmatis, facilinſq; in pueris & adoleſcentulis, quam in robuſtionibus. Itaq; modus poſterior, exarthrema: prior vero quo tantum oſſa dehiſcunt, & ſuis ex toto ſinibus haudquaquam prolabbuntur, pararthrema appellatur. Præter has tamen poſterioris ætatis Medici & chirurgi multas alias excogitarunt, quæ reuera differentiz non ſunt, ſed potius quidam præter naturam affectus, aut horum ſymptomata. Cauſæ luxatorum oſſium, & a ſua ſede motorum quædam ſunt extrinſecus ingruentes, vt caſus, percuffio, violenta & incongrua membri alicuius extenſio, aut diſtorſio. Quædam vero intrinſecus eueniunt, vt cum **B** mucoſus aliquis & pituitoſus humor in articulis aceruatur, qui articulationis ligamenta primum madefacit, deinde laxiora reddit, & tandem ob eius multitudinem ſua ſede oſiſpſum protudat. Luxatio deprehenditur mala partis laborantis compoſitione: in ea quippe tumor præter naturam ea parte qua oſ protumpit, & ſinus inſolitus ea qua receſſit, maniſeſta appaſent. Item a dolore, quo luxationem ſequitur, & a motus laborantis partis difficultate, aut priuatione. Ceterum vna communis omnium luxationum curandi indicatio eſt, nempe luxati articuli, & ſuo loco moti in propriam & naturalem ſedem reductio. Quod vt conſequamur, luxatum membrum decenter extendendum eſt, adeoque id oſ, quod ſuo loco excidit, ab ea parte, in quam prolapſum eſt, in contrariam partem impellete oportet, atq; in germanum ſuum ſinum reducere, vt ſinus ſeu inſolita cavitatis vacuitas impleatur. Non eſt vna eademque in omnibus extendendi ratio, ſed alia atq; alia, pro natura ſcilicet luxatz partis, proutq; nerui ac tendines valent, aut oſſa huc illucve ſederent. Modo enim manibus ſolis. modo habenis ac funibus iniectis, vt *1. libro expoſitum eſt*, vtendum: modo vero quædam alia machinamenta, quæ eſt *gloſſocomon*, adhibenda ſunt, vt *ex libro De fractis & luxatis Hippocratiſ diſcere licebit*. Gloſſocomi vero hæc eſt effigies.

Galenus libro 7. De uſu par. Et in ſecundam Hippoc. de fracturis librum com. 4. huius inſtrumenti deſcriptionem tradit.

Tam ad femur, quam ad tibiæ fractam.



Posthæc

- A** Posthæc membrum quod excedit, & iam repositum est, vt non amplius deinceps sua sede prolabatur, sed inibi continetur persistat, cutandum. Repositus igitur articulus modis omnib. statim firmandus ac robotandus est. Firmitur aut optime, si rosaceo petlinatur, ac postea pānus aliquis leuis gracilis, vetus, & leuis rosaceo delibatur, ipsi applicetur. Deinde si stupor leues, & panni multiplices ouorum cādido imbuti superatacco commodentur, & postremo si fasciis posca madentibus pro tatione particulæ longis latiq; subligetur. Quinetiā fetulæ ex eorio, aut densa papyro factæ, si necessitas postulet, circumdāde sunt. Cauenda vero semper est vehemens adstrictio, ne phlegmone moueat. Quibus tunc apparatis, membrum in figura ei maxime naturali, atq; a dolore alienissima, ad quietem reponendum est. Nec veto ante diem septimū, aut etiam decimum, si nullū symptoma prauum accesserit, ipsum soluere oportet. sed ita finire.
- B** Nihil veto incommodaueris, si dum legitimo tempore soluitur, & secundo curatur aqua modice calida foveat. Hic enim fortis tunc gemina ratione pdest. Nam & dolorem, si quis addit, demulcet: & quod in laborante particula noxiū cōceptum est, disecutit. Vbi aut ita vt res exigit, luxatum membrū foueris, mox huic emplastrum adhibebis, q̄ constet *polline, id est farina volatili, puluere rubro communiter appellato, & albo oui, in unguā corpus redactis*. Posthæc vero membrum strictius deligandum erit. Ad eundem quoq; modum vetus omnis luxatio, & quæ spatio temporis callo iam obduraui, nō modo totum eiusmodi aquæ simplicis calidæ, qui in hac re plurimum confert, anteq̄ reducatur, desiderat: sed et eum qui sit ex decocto *maluæ, alibæ, fenogreci, atq; id genus aliorum*, q̄ scilicet molliat, laxet, & discutiat, & membrum extensioni aptius efficiat. Recentes vero luxationes, & quæ nuper incidunt, eius naturæ fortis inquam sibi haud parum incommodantes auertantur & respuunt. Hi enim calefaciendo ac humectando relaxant, & dissoluant, vnde pars ipsa afflicta imbecillior redditur, & ad recipiendā fluxionē pronior. Proinde & phlegmoni opportunæ efficitur, & luxati membri sinus sup̄, et sua humiditate oppletur. Hinc consequitur, vt articulus in nativo suo sinu diu persistere nequeat, sed lubricus ac subterfugiens delabatur. Neq; etiam panni impense calidi mēbro tacentes luxato admoueri debent, ne videl. fluxionem euocent, & phlegmonem eo loci excitent. Quin potius eos cerato refrigeratorio, aut vino aliquo auilto imbutos adhibere conuenit. Ceterum luxato membro ita vt dictum est, in suam sedem
- D** reducto, firmatoq; & ad quietem conuenientem figura qua decet reposito, ipsum a dolore & phlegmone vindicandum est. Quod si consequi studueris, humorem in partem laborantem in fluxum modis omnib. prohibebis. Si enim fluxio ne tenetur, & dolorem statim persentiscet, & phlegmonem experietur. Quæ duo incommodatum in luxatis, tum etiam fractis maxime vitanda sunt. Hæc autem deuitabis, si quæ roborant & repellunt luxatæ parti apposueris. Si patet ea tenuem ab initio probamq; vitæ rationem ægro imperaueris illiq; venam, si nihil phibeat, secueris: & aluum, si opus est, purgante medicamento subduxeris. Vtroq; enim auxilii genere fluxionem a laborante particula auertimus. Verum enim vero, si anteq̄ curationē auspiciens, luxata pars iam dolore infestetur, aut phlegmone occupetur, nō prius eā in locum suum, a quo excidit, reponere tentabis, q̄ dolor finitus fuerit, & phlegmonem cōquaueris. Si n. mēbrum dolore aut phlegmone affectū, distendēdo laceraueris, peticulum est, ne cōuulsio, aut aliud prauum symptoma suscitetur. Proinde quicquid suo motum est loco, ante phlegmonem reponendum est, vt recte de Hippocrati sententia Celsus lib. 8. cap. 11. præcipit. Si vero illa occupauit, tum conquescat, haudquaquā enim lacerandum est. Vbi finita est, tentandum est in his membris, quæ id patiuntur. Oportet autem phlegmonem ipsam atq; dolorem leuate succedala nā ex aqua & oleo modestate calido, ac eoque momento, superposita. Si vero febris etiam accessit, & ossa quæ suis locis mota sunt, validis pleniq; musculis & tendonibus contineantur, curiosius omnia facienda sunt: sed maxime quæ ad victus rationem, vitæ sectionem, & purgationem attinent. Porro
- F** sedato dolore, & finita omnino phlegmone, pleniorē victu laborans resci potest, cibisq; vt bonis, ac vino modice. Ac sub finem quidem curationis, si elefantia res cesserit, luxatum membrum perfusione decocti rosarum, absinthii, & musci albi quercini roborabis. Petactio fortis, oxyceto cum imponi potest. Sed tum ad vsus quoque suos, id membrum sensim ac insinuatè promouere oportet. Motus enim, vt in dolore atque

Aquæ calidæ fortis cōmoda.

Pollinis ruber.

Lorsio cū
vulnere.

phlegmone, noxius, scilicet luxato, præsertim iam obfirmato, saluberrimus. Ceterum A
si luxatio ossibus vulnus quoque, ac cessit, multa diligenter, ac etiam prudentia est opus.
Dum enim hæc reponuntur, ingens periculum, non nunquam etiam mortem infer-
rent. Nam quum ex distensione adiacentes nervi & musculi inflammantur, dolores
validi, convulsionis, & acutæ febres oboriuntur, atque hoc præsertim in gibbero, genu,
superioribusque articulis magis. Quanto enim principalibus membris luxati cum
vulnere articuli viciniore sunt, tanto maior timor est. Sed eo quoque gravius periculum
conciatur, quo maius membrum est, quoque validioribus nervis aut musculis conti-
netur. Ideoque humeris femoribusque metus mortis est. Ac si reposita ossa sunt, spes, *air*
Celsus, nulla est. Non repositis tamen, nonnullum periculum est. Eoque maior in utroque
timor est, quo propius vulnus articulo est. Eam ob rem Hippocrates in libro *De luxato-* B
rum fracturæ omne ossium coaptatione, horum repositionem, valentiorēque deligaturam
omnino auctoratur, solusque phlegmonem abigentibus, & mitigantibus prædiis per
initia uti iuber. Sic enim, inquit, *ipsi superesse licebit*. Itaque nihil tunc reponi posse præter
digitos, plantas, & manus dixit: atque in his quoque diligenter esse agendum, ne præci-
pitem. Verum ne digitus quidem, in quo minimum ut malum, sic etiam periculum
est, reponi debet, nisi ante phlegmonem, aut postea quum iam vetus est res. Porro quod
ipse in solis digitis faciendum consult, id nos in reliquis quoque articulis facere ag-
grediemur, ac statim quidem inter initia dum pars adhuc phlegmone vacat, prola-
psum cum vulnere articulum mediocri intentione (validam enim citra periculum
perferre non potest) reponere tentabimus. Quod si luxatio animi institutum euenierit, C
in sola ratione, quæ phlegmonem arcet, perisitemus. Si vero phlegmone aliqua, aut
convulsio, aut quippiam ex supradictis reposito ossi acciderit, rursus id, si modo sine
vlla vi potest, suo loco protinus expellendum est. At si hoc quoque discernim metua-
mus, (non enim phlegmone laborans articulus sine vi fortasse cedit, & sua sede ite-
rum propelleretur) latius fuerit per initia in maioribus quidem membris, ut femoribus
& humeris, super sedere, ac repositionem differre. Vbi vero phlegmone quieuerit, id
autem fit communiter post septimum nonumve diem, præfati etiam periculum apud
necessarios agitant, quod ex repositione futurum sit, cum quod si non reponatur
debilem ea parte hominem & claudum proisus fore, conabimur tuto & sine vlla vio-
lenta, os in suam compellere sedem. Ulceris vero curationem eandem quæ propo- D
ta est in fracturis cum ulcere, administrabimus. Omne præterea membrum, quod
cum vulnere loco motum, neque repositum est, sic, *Hippocrate & Celsi auctoribus*, iacere
conuenit, ut maxime cubantem iuuat: tantum ne moueatur, neve dependeat. Quod
si luxatio cum fractura, sine tamē vulnere, euenierit, communi ratione membrum
extendendum est, ac manibus conformandum: ut in simplicibus fracturis superiore capite
docuimus. Si vero etiam vulnus accedit, rursus ab his quæ de fracturis cum vulnere, & lu-
xationibus etiam cum exulceratione incidentibus, priuatim a nobis dicta sunt, con-
grua repetenda curatio est. Sed, ut vno verbo singula complectamur, si cum fractura
luxatio incidit, hæc primum, si fieri potest, illa vero secundo curanda erit. At si ante E
fracturæ administrationem luxatum commodè reduci non possit, fracturam ipsam
primum curabimus: dein se cum fractura callo iam obfirmata fuerit, luxationis cura-
tionem aggrediemur. Quod si luxatio inueterauerit, & ob temporis spacium callosa
inibi durities contracta fuerit, ea decocto malæ & altheæ perfundenda est, deinde
unguento dialtheæ vocato illinenda. Post hæc emplastrum quod *diachylon magnum* no-
minatur, super imponendum erit: vel eius loco, lana succida, viscillagine quapiam e-
molliente delibata. Ad hoc etiam efficax habetur, cortex radicis altheæ in aqua decoctus, &
cum acungia, vel asferino pingui subactus, ut quasi malagmatis lentor contrahatur. Loco
itaque subius sufficiens et emoluit, luxatum in suam sedem reducendum est. Ex de lu-
xatis quidem hæc tenus in vniuersum dictum sit. De particularibus enim fracturis co-
pendiose scripserunt Paulus in sexto, a capite 112. usque, ad finem libri: & Celsus in
octavo, a cap. 21. usque, in libri illius finem. Ad eos itaque auctores
lectorem alegantur.

Lorsio cū
fractura.

A LEONHARTI FVCHSII PARA-

DOXORVM MEDICINÆ LIBER PRIMVS.

Proœmium.



NE MO est, qui nesciat, eum minime bonum artificem esse posse, qui sua instrumenta ignorauerit. Proinde haud conueniet fabrum lignarium, aut ferrum, aut asiam ignorare quemadmodum nec furorem subulam, aut saritorem forficem. Quod si itaq; in manuarius illis artibus, omnes eum videndum esse putant artificem, qui artis eius, cuius se peritum esse iactas, materiam non satis perspicillam habuerit: quanto magis ridendi erunt hi qui hodie Medici sese esse proferunt, quum tamē medica materia, qua illi in perscrutandis agri instrumenti vice esse debet, prorsus ignari sint? Qui enim probe mederi possent, quibus auxiliorum materia pensius, vel magna ex parte, incognita existit? Quomodo autem non incognita esset, quum ferme nemo Medicorum nostra tempestate sit, qui simplicium medicamentorum cognitionem Sepiasariis illis hominibus rudibus & dissipatis pene, non committat? Indignum enim existimant esse Medicis, eiusmodi rebus operam nauare: quasi cuiusque simplicis medicaminis nosse efficerent, non Medicorum, sed pharmacopolarum munus sit. Ipsi interim in scholis magna pompa desides inueniunt, de lana caprina disceptantes, & inanibus disputatiunculis tempus temere terentes, nec vel semel tantum cogitant, quo pacto veteres imitentur, qui haud quaquam assernati sunt altissimos perreptare montes, densissimas peragraye sylvas, longinquas terra regiones petere, ad intima etiam terra viscera penetrare, quo exactam medica materia notitiam assequerentur. Sic Dioscorides, ut ipsemet in primilibi sui prologo testatur, ob iuge ac indefessum materiae medicae

Boni artis-
eis est, ut
sua artis
instrumenta
cognita
habeat.

Nostri tamen
poris medi-
camentorum
cognitionem
Sepiasariis
obstituant.

Dioscorides
cognitionem
de medica
materie
studium.

Sepiasariis
qui herba-
rum notitiam
habebant,

B instrumenti vice esse debet, prorsus ignari sint? Qui enim probe mederi possent, quibus auxiliorum materia pensius, vel magna ex parte, incognita existit? Quomodo autem non incognita esset, quum ferme nemo Medicorum nostra tempestate sit, qui simplicium medicamentorum cognitionem Sepiasariis illis hominibus rudibus & dissipatis pene, non committat? Indignum enim existimant esse Medicis, eiusmodi rebus operam nauare: quasi cuiusque simplicis medicaminis nosse efficerent, non Medicorum, sed pharmacopolarum munus sit. Ipsi interim in scholis magna pompa desides inueniunt, de lana caprina disceptantes, & inanibus disputatiunculis tempus temere terentes, nec vel semel tantum cogitant, quo pacto veteres imitentur, qui haud quaquam assernati sunt altissimos perreptare montes, densissimas peragraye sylvas, longinquas terra regiones petere, ad intima etiam terra viscera penetrare, quo exactam medica materia notitiam assequerentur. Sic Dioscorides, ut ipsemet in primilibi sui prologo testatur, ob iuge ac indefessum materiae medicae

Cognoscenda a prima inuenta studium per multos remotissimos mundi tractus peragraye constat. Ita & Galenum ob vniuersam terram Lemnia veram cognitionem in Lemnum enavigare non piguit. Nostri itaque temporis Medici curam omnem & studium lucris causa insistentes, atque hunc tantum suum peritum agendam scopum proponentes, ut breui efficiantur diuites, leuorem quam in materia medica exacte cognoscenda veteres adhibuerunt, plane inutilem esse censent, ut quibus abunde a Sepiasariis remedium copia suppetet, quum tamen vix vna aut altera planta qua vitantur generantur sit, adeoque de his nihil apud illos nisi nomen super sit. Verum esse quod dicimus multa hodie planta ostendere possunt potissimum autem Endiuia, Bedeguar, Eupatorium & alia quaedam. Nam quisque pene peculiarem habet herbam, quam ignarus Medicus pro vera Endiuia, Spina alba, aut Eupatorio vendat. Neque mirum admodum inter se dissentire Sepiasarios, ut qui nullam aliam herbarum notitiam, quam eam qua a stolidissimis mulierculis tradita est, habuerint, a quibus certe, vixit indellie & delirio, boni nihil expectare possunt, ut qui a errore potius errare cumulent. Quum itaque vita hominum hodie plane Sepiasariorum manibus concredita sit, nihil mirum est, si multo plus periculi sit a medicamento, quam a morbo. Vixque vera medica materia nostri saeculi Medici ignari sint, falsisque & adulteratis pro veris & genuinis utantur, adhuc tamen illi se, haud secus quam olim Asculapius Tyndaridam, quamplurimum: ad vitam reuocari se diu placet. & regiam Plutem, quod olim de Galeno dictum est, deopulari credunt. Quantum autem fallantur primis huc Paradoxorum liber satis monstrabit, ut qui illorum in materia medica errata non tantum indicabis, sed & optimorum auctorum scriptis, addere etiam rationibus firmissimis, funditus explodes, ita & nihil sit quod posthac in erroris defensionem praeferere queant. Proinde veritatis amore flagrantibus hortor, quo singula haec nostra candido animo expendant, quando nihil sit in illa quod non in horum commodum produxerimus, discantque veterum (oro) potius in exacte perscrutanda medica materia sectari studium & diligentiam, quam nostra atque Medicorum inertiam, ut qui nullum plane sibi cum herbis, aliisque medicamentis simplicibus negotium habendum esse censcant, sed eo omnibus nervis tendunt, quo multis commensationibus assentiant: vniuersis & id genus scurrilissimis familiaribus fiant, atq; adeo plus pecuniarum emungere possint.

D Alacri per se ora venarum non aperire, neque sanguinem cedere quemadmodum multi Serapionis, Mesucrii, peruerso dogmate seducti opinantur, sed eadem potius accludere, atq; sanguinem vnde cunq; fluentem sistere.

Et iam rationibus firmissimis, funditus explodes, ita & nihil sit quod posthac in erroris defensionem praeferere queant. Proinde veritatis amore flagrantibus hortor, quo singula haec nostra candido animo expendant, quando nihil sit in illa quod non in horum commodum produxerimus, discantque veterum (oro) potius in exacte perscrutanda medica materia sectari studium & diligentiam, quam nostra atque Medicorum inertiam, ut qui nullum plane sibi cum herbis, aliisque medicamentis simplicibus negotium habendum esse censcant, sed eo omnibus nervis tendunt, quo multis commensationibus assentiant: vniuersis & id genus scurrilissimis familiaribus fiant, atq; adeo plus pecuniarum emungere possint.

F Alacri per se ora venarum non aperire, neque sanguinem cedere quemadmodum multi Serapionis, Mesucrii, peruerso dogmate seducti opinantur, sed eadem potius accludere, atq; sanguinem vnde cunq; fluentem sistere.

CAP. I.

NE haec paradoxorum tractatio nulla via ac ratione procedat, atq; adeo confusio- nem quandam pariat, semper hunc dicendi ordinē obseruare conabimur. Primū verba eorū qui errandi occasione nostrae aetatis Medicis dederūt, bona fide, nihilq; illo-

Ordo tra-
ctandi Pa-
radoxorum.

Aloe pro-
prietate ex
ca non ape-
rit venas.

Aloe etiam
extrinsecus
ad mioram
sedis venas
non aperit.

Aloe eroso-
nis experta.

Duo instri-
menta que
iis que re-
dicantur
sunt, fidem
faciunt.

Quibus
m-d. cam-
tis citra
instri-
mentis.

Galenus ca-
pit. 1. ad
Dioscori-
dis pro-
dromi
diligenter
expotuit.

raret, anoque noceret, & hoc pacto sese omnem reprehensionem evitate posse arbi-
tratur. Atqui fallitur, & *et si mior id, qd d. aperiunt*, bonus ille scnex: si enim Aloe infusa qua-
dam totius substantiæ proprietate venarum ora aperiret, tunc semper in catapotis,
aut alio quoniam modo deuorata id ipsū efficere: id quod tamen nemo sanæ mentis di-
cere potest, quum contrarium quotidiana experientia monstrat. Quod veto semper
quoties allumeretur sedis venas referat, ita colligi potest. Quemadmodum n. medi-
camenta purgantia substantiæ proprietate perpetuo humores sibi familiares attra-
hant, ut in sequentibus clarius docebimus, verbi gratia Scammonium bilem, Cnicus pituitam: ita
aloe nunquam non ob insitam sibi proprietatem venarum ora aperiret. Nam quum i-
psiū substantiæ aperire venas insitum sit, vt Montuus delirare videtur, fieri nequit, vt
non perpetuo quoties sumpta fuerit, hoc ipsum agat. Vel dicardiuersitatis rationem B
Montuus, & in suam nos pertrahet sententiam, Sed dicit fortassis aloem venarum ora
aperire posse, non quum intro in corpus sumpta, sed quum extrinsecus sedis venis illata
fuerit, tum enim maxime id ipsum ex ea illa proprietate efficere posse. Quantum au-
tem hoc veritatis, optimorumq; auctorum sententiis aduersetur, ex iis, quæ paulo ante
diximus, clarum esse potest. Pugnare vero non tantum rationi, verum etiam experien-
tiæ omnibus paulo eruditioribus in confesso est. Qui namq; extrinsecus ad miora aloem
venas aperiret, quæ Auicenna etiam, qui Montuus & eius satini Medici numinis in-
star habetur, auctore, citra erosionem valde exsiccatur. Quum itaq; non erodatur, & vehem-
enter etiam exsiccet atq; adstringat, qui per Deum immortalem venarum ora ape-
rire possit? Insuper quum a Galeno & Paulo inter ea medicamenta, quæ vlcera ea, quæ C
ægre ad cicatricem ducuntur, sanant, aloem connumeretur, quomodo inter ea, quæ e-
rodendo aperirent venas, collocari potest, quum omnia *intra miora*, hoc est, quæ cicatrice
inducunt, eodem Galeno lib. 5. de compositione medi per genera auctore, cum eo, quod citra ero-
sionem adstringunt, magis etiam exsiccant? Nulla itaque nec ratio, nec experien-
tia, quæ tamen duo sunt apud omnes homines instrumenta, *teste Galeno lib. 3. abier. miora*,
capite 3. quæ fidem huius, quæ recte inuenta sunt, faciunt, & eam illam suam aperirendi o-
ra venarum in aloem proprietatem Montuus probare potest. Iterum instat Montuus,
ac velut adamantinum & inexpugnabile argumentum producentis, ita colligit: *Idem*
medicamentum per sepe contrarias obtinet vires, aloem igitur & constringere & aperire ora venarum
potest. Fatemur quidem plerisque medicamentis contrarias tum qualitates, tum fac-
cultates insesse, id quod luculenter Galen. lib. 3. de simpli. medic. facultatibus capite 13. o-
stendit. Ita aloem adstringendi sistendive potestate præditam esse concedimus, ni-
hilominus tamen & per interna bilem excernere, ac ventrem etiam subducere posse
dicimus, quem admodum Galenus libro iam citato. 14. in eum modum scribens testatur:
*per multos huius rei admiratio detinet, remque rationis expertem absurdamque existimant, si cor-
pus quoddam adstringens purgare queat, veluti aloem.* Quibus sane verbis Galenus mani-
feste innuit, aloem & adstringere & purgare per interna corpus posse, id quod & nos fa-
temur. Inesse vero huic vini quandam referendi & constringendi venarum ora, *vt Se-
bastianus Montuus putat*, id est quod constanter negamus, nec perpetuo, vt nunquam E
se ex cruciet, probare poterit. Et vt finem tandem faciamus, si Galenus, quem omnia
a Dioscoride de simplicium medicamentorum facultatibus prodita diligentissime
excussisse, ac per experientiam, num vera essent comprobasse constat, vim talem,
quæ venarum ora referat, in Aloe esse cognouisse, hanc certe silentio non præterissi-
set, id quod eum in Coriandro, prunis Damasceenis, & plerisque aliis fecisse notum
est. Diuersam autem quum in ea esse facultatem, nempe adstringendi venarum ora,
experientia explorauerit, factum est, vt & illius constanter in suo de simplicibus medica-
mentis libro meminerit. Non est itaque, cur quempiam Montui annotationes in di-
uersum rapiant, leuioris enim momenti sunt, quam vt tot tantorumque auctorum
quos produximus, testimoniis, rationesque quas hic opposuimus enertere queant. F
Quod si vero quispiam ea de re plura scire desiderat, is nostras aduersus Puteanum ac
Montuum scriptas apologias legat. In iis n. multa institutum conducentia reperiet.

*Aloe mellis commixta non tantum, imo plus purgare, contra Auicennam & Mesues
erroneam sententiam.*

CAP.

macho reddat. Verba Dioscoridis *lib. 2. capi. 37.* hęc sunt: *per se visus est in natura* *id est: aloë aliū commixta medicamentis purgatoriis, pręstat ut minimū stomachum infes-* *Apertius idipsum Galenus lib. 8. de simp. med. facultat. docet, in hunc de aloë scri-* *bens modum: q̄d si dicitur in vasis purgantis, hoc est. Nam & gratum est stomacho me-* *dicamen. ut si quid aliud. Et Paulus libro 7. Est, inquit, aloë stomacho valde grata, ut si quid* *aliud. Et libro eodem, capite quarto. Quum medicamentum corpus purgantia omnia stoma-* *cho noxia sint, sola ventriculo amica & vitile est aloë. Quibus subscritbit etiam Orisalius in* *medicinz Compendio, dicens: aloë vehemens quidem catharticum non est, stomacho autē a-* *ptissimum. Plinius quoq; lib. 2. de victus ratione, aloë inter ea, quę stomachum cōfirmat* *recenset iis verbis: Maxime conduci bilis stomacho absinthium & aloë. Nec dissentit Plinius* *qui lib. 27. c. 4. scribit: Confirmat stomachum aloë, adeo ut nulla vis contraria infestet. Grata autē* *est stomacho aloë haud aliter, quam absinthium. Gal. lib. 8. de simp. med. fac. auctore, quia* *aliquam astrictiōnem obtinet. Quum vero veteres aloem stomacho siue ventriculo* *gratum esse medicamentum scribunt, de ea non simpliciter, sed quatenus est medica-* *mentū purgans loquuntur, ut ex verbis illorum satis liquet, & nos idipsum fusiis in a-* *pologia nostra aduersus Puteanū ostendimus. Quod autē iocur non offendat, probat* *Gal. ad Paternianum, qui cum oxymelite datā aloem stomachicis & hepaticis magnū* *adumentum asserre scribit, Paulus etiam lib. 7. docet, quum Dioscorici catapotia ieco-* *raria aloes vnc. vñā accipere ait. Et cum, Plinio testē, loco iā citato, aloë in regio morbo,* *qui plerunq; iocinoris vitio oritur, vtiliter bibatur, fieri haud potest, ut iocinori nocere* *queat. Hinc mirū admodum est Auic. in eam deuenisse opinione, quum tamen &* *iple fateatur, aloem iocinoris obstructionibus & arquato morbo esse perutilem. At-* *que perplures eiusmodi contradictiones, ut ex sequentibus petpiscum fiet, in Auic:* *libris inueniuntur, ut certe hoc nomine tyronibus medicinz nondum exalto iudicio* *ptz. itis valde suspensus esse debeat, ptz. letim in secundo suo Canone.*

Rhabarbarum nostrum & vulgare, in plerisque a veterum Rhabarbaro differre,
atq; adeo diuersum esse.

C A P. IIII.

Ambigua
diffinitio.

Q V M de rebus disceptantibus id vñce cauendum sit, ne qua vox illis ambigua
imponatur: nam alias non raro fieri solet, ut alter alterum non intelligens, acerrime
inter se de lana caprina rixentur, & in immensum temere sermo progrediatur: ani-
ma duertendum erit, ne nominum quempiā ignorantia fallat. Rhabarbarum nostrū
seu vulgare esse id, quo passim nunc ad subducendam, nobilium præsertim, aliu
Medicū vtuntur. Veterum vero, quod Dioscorides, Plinius, Galenus, & qui his etiam ve-
tustiores sunt, describunt. Quomodo autem veteres suum ratis nominib. vocant,
Dioscorides enim inter Jūm Rheon, interdum Rhion, aliquando Rhabenticum, Ga-
lenus Rheum & Rha, Plin. Rhaema, Celsus radicem ponticam appellat, ita Punici Raud-
seni, & vulgus Medicorum Rhabarbarum nominant. Rhabarbarum vero quo nunc
passim officinæ vtuntur, differre ab eo, quod veteres deplungunt, quicquid nostrę tē-
pestatis garrant Medici, nullibi rectius nisi ex notis, quę illi ab vtriusq; tribuuntur, col-
ligitur. Veterum nimirum Rha, Dioscotide li. 3. c. 3. teste, *panicem de rā vñā cūq; cūq; rā vñā*
id est, nascitur in iū, qua supra Bosphorum sunt regionibus, unde etiam asseritur: radix nigra. Centau-
rio magno similis, sed minor & magis rubens, sine odore, laxa, & parum lenis. Nec dissentit
Galenus, vel quisquis eius libri auctor fuit, capite 22. lib. de simplici med. ad Paternianum,
qui Rheon hī verbis describit: Radix est magna & nigra, laxa, lenis, moderata, gustu calefaciens,
& leniter adstringens. Libro quoque octauo de simplici med. facultatibus. Rha tum laxitatem
tum leuitatem in se habere scribit. Iam dictis subscritbit Plin. lib. 27. cap. 11. in hunc mo-
dum loquens: Rhaema asseritur ex his, qua supra Pontum sunt, regionibus, radix Cysto nigro si-
milis, minor & rufior paulo sine odore, calefaciens gustu & adstringens. Rhabarbarum autē a
a nostris vocatum, & quod hodie in frequenti Medicorum vsu est, alios a priori nata-
les habet, ex meridionalibus nanq; regionib. ad nos fertur, non a quilonatibus, vbi Bo-
sporus, & Rha fluius, qui radici huic nomen dedit, exsistunt. Nullum denique cum
Costo nigro, ut antiquorum, similitudinem habet. Adde, quę solo a veterum Rheo-
barbato discernere nostrum sufficiens nota est, vulgare & quo hodie vtuntur, habere

Locus nati-
us Rha-
barbari ve-
terum.

Natales no-
strum Rha-
barbari.
Rhabar-
baro nomen
vnde in adu-

- A** odorem vehementem, veterum autem plane sine odore esse. Præterea gravitatem in vulgari commendat Mesue, veteres contra a leuitate. Accedit, quod veteres suo Rheobarbaro nullam purgandi vim inesse scripserint, in quem tamen vsum, ætatis nostræ Medici suum & recte quidem, plurimum valere dicunt. Sed obtrudet quispiam, nihil mirum esse Rhabarbarum tam sicum odorum esse, veteres autem de viridi ac recenti locutes esse, quod odore plane caret, haud aliter quam alia quadam, qua humiditas superflua obtundens, domes ea resoluatur, absque odore perseverant. Obiectioni huic pulchre per historiam telponder reconditæ eruditionis vir I. O. MANARDVS, libro suorum epistolarum medicinalium 6. atque se a Sigismundi regis Sarmatarum Medicis didicisse, in eo bello, quod contra Molchos strenue gesserat idem rex: Rheon inuentum fuisse, quod etiam vulgari satis quidem simile esset, penitus tamen in odorem fuerat, in eoque omnes veterum note deprehense sunt: fuitque procul dubio id Rheobarbarum, quod veteres pingunt. Ceterum veteres suum Rheobarbarum non ad alui purgationem, sed a Jalioplerisque vsus adhibuisse, manifestum est, quàm vt probari debeat: neque enim Dioscori, neque Plinius, neque etiam Galenus, in vniuersis suis operibus, quæ hodie existant, ad aluium subducendam Rheobarbaro vsi sunt: sed quum huic maximam & præcipuam adstringendi vim adscripsissent, in contrarium potius vsum adhibendum esse præceperunt, atque adeo sanguinem exspuentibus, cœliaciis, & dysentericis conferre dixerunt. Aëtius quoque, qui sub Constantino Magno vixit, *sermone 9. cap. 47.* inter ea, quæ adstringendo ventrem cohibent, rheon ponticum recenset. Quin etiam constat nec Auic. *in cap. 58. secundi Canon.* Rheobarbaro purgandam potestatem tribuisse, sed diuersam potius id quod & Fen. *16. Canon. 3. Tract. 1. capite 4.* vbi Rheobarbarum inter medicamenta aluium cohibentia enumerat, & in plerisque aliis locis facit. Er certe veteres suo esse vsos ad cohibendam aluium testatur Abenrois Cordubensis, qui *lib. 3. Collect.* Galenum & alios Medicos Rheobarbarum ventrem constringere scripsisse: air, notans in hoc eosdem, tanquam falsa dixissent. Sed ignorauit impia illa bœstia, Galenum arque alios veteres diuersum a suo habuisse Rheobarbarum, ita vt non immerito illi alios etiam effectus tribuerint. Ex his itaque omnibus notum fir, nostrum hodie Rheubarbarum ab antiquorum differre, quod hoc ad aluium deiciendam, nunquam vsi fuerint. Atqui hic reclamat Monruus: atque Pauli auctoritate, veteres quoque Rhabarbaro ad ventris fanorum purgationem vsos esse probare nititur. Pauli locus est *in li. 1. c. 43.* vbi ita scribit: *Aluium soluebant, iubentes iam dormire resinas theobabbarum, qua alia magnitudinem aquæ ret, deuorare.* Quod si magis citare voluerimus, paulum radicis ponticæ miscbimus. Sed mœninerit velim, nos de antiquis, inter quos Paulus Aeginetæ, vt quilibet post Galenum & Plin. tempore vixerit, cœnumerari non potest, locutos esse. Neque mirum Paulum, vt alios recentiores Medicos, ad contrarios vsus Rhabarbarum adhibuisse, vt cuius tẽpore, Rheobarbarum, quo hodie vimur, innotescere mudo cœpetit: quum Medicis, qui ante illum fuerunt, quemadmodum in Corollario suo Herimolaus quoque testatur: plane incognitum fuerit. Vixit autem Paulus post Oribasium Luanarchiatrum. Hinc deceptus Paulus, haud aliter quam Abenrois, ac multi alii hunc sequentes Medici, idem Rhabarbarum, quod suo tẽpore inuentum erat, cū Rheubarbarum esse putauit, atque adeo tam antiquorum instar restringendi facultatem, iam vero recentiorum modo, aluium subducendi huic in esse existimauit. Proinde factum est, vt *cap. 1. lib. 1.* ad reprimendum prægnantium vomitum, & *li. 7.* ad dysentericæ curationem vsus sit, cum tamen in vtrisque ætate, in vtriusque purgatoria adhibere medicamenta, vt post dictum, minus consultum sit. Pari modo ad veterum Rheobarbarum respexit libro eodem, cum ex professo Rhabarbari vires describens, hoc ipsum sanguinem exspuentibus, cœliaciis, & dysentericis prodesse scribit. Fuisse autem notum Paulo Rheubarbarum nostri temporis, satis ex tribus illis compositionibus, quibus *lib. 7. cap. 11.* ad podagram vtitur, liquet. In illis enim rheubarbaricum instar Arabum, alias autem Rhe, & radicem ponticam nominauit. Primæ compositioni nomen Diacorallum est. Secundæ, Antidotus Agapet. Tertiæ, Antidotus Atractor. Quarum descriptiones quis scire cupit, a nobis iam citatum Pauli locum petat.

Rhabarbarum veteris purgandi facultate caret. Obiectio.

Iohann. Manardus.

Veteres soli Rhabarbarum ad alui purgationem non adhibuerunt.

Monruus auctoritatem Pauli adducit.

Paulus Aeginetæ inter veteres non cœnumerari debet.

Nostrum Rheubarbarum Paulo notum fuit.

Cassiam Arabum & recentiorum, a veterum atque Græcorum Cassia aliâ ac diuersam esse. C. A. P. V.

CCc

[illegible]

A facile. Non autem habere eam vim Eupatorii, præter experientiam, omnes tam Græci, quam Arabes alii consentiunt. Dioscorides enim lib. 4. cap. 1. contrariam potius in eo vim prædicat ut verbis: *αὐτὸν δὲ εἰς τὴν πύλιν αἰὲν ἐνὶ τοῖς ἀνθρώποις ἐκ τῆς ἰσχυρίας ἀφαιρῶν* quod est: *Semen & herba cum vino pota, dyfenterici, & serpentibus morfi opitulatur.* Id quod & Galenus facit, libro 6 de med. simp. facit. in hunc modum scribens: *πύλιν δὲ ἐν τῇ αἰσθητικῇ, διὰ τὴν αὐτῆς οὐκ ἐν τῇ ἀσθενείᾳ.* hoc est: *inest utidem ei & adstrictio quadam per quam robur visceri addit.* Et Paulus certe Ægineta lib. 7. adstrictoriam vim illi inesse quoque affirmat, perinde atque Oribasius: quorum intentionem Phinius lib. 5. cap. 6. etiam confirmat, ita scribens: *Semen Eupatorii dyfenterici in vino potum viuce auxiliatur.* Et inter Arabes Avicenna cap. 244. Can. 2. illi viceribus, quæ agere cicatricem contrahunt, danique

Eupatorii
non habet
vim pur-
gandi.

B in potu cum vino ad sananda intestinorum vlcera, Eupatorium suadet. Cui Serapion capite 77. quoque subscribit, adeo ut manifestissimum sit, neminē vel ex Græcis vel Arabibus præter vñ Meluē fuisse, q. Eupatorio purgandi potestatem adficeret. Neque hodie est, qui experientia se cōperuisse, talem in Eupatorio Græcorū esse vim, dicere ausit, ita ut merito tot pbatisimū sententis atq. experientia ei innixi, statumque Meluē Eupatorium, ab eo q. Græci & veteres alii descripterunt, diuerū esse, nec vllam purgandi vim habere. Meluē aut Eupatorio suo recte purgandi vim tribuit, q. illā habere posteriorū etiam experientia comprobatum sit. Reprehensione igitur dignus est Meluē, q. Eupatorium suū a Græcorū Eupatorio diuersū esse dicere nō indicat, adeoq. doctissimi erāt viri, Leonico, Manardo, & alii, tenebras effuderunt, ut

C fusius i. nostrorum de stirp. hist. commentar. tamē monstrauimus.

Arabum placita in depingendis herbis non esse sectanda, vel vnam radicem quam hodie sub Turbit nomine officina vendunt, argumento esse: hanc enim tam varie atq. ambigue depingere, ut impossibile sit diuineri quid per illam intellexerint. C A P. IX.

S T V D I O S I S summa diligentia obseruandum, quo in bonos peritosque eius artis, qui in discendū sibi propoluerunt, auctores inciderint. Nam Gal. lib. 1. de facul. natur. capite 14. teste in eo utitur: *αὐτὸν δὲ εἰς τὴν πύλιν αἰὲν ἐνὶ τοῖς ἀνθρώποις ἐκ τῆς ἰσχυρίας ἀφαιρῶν* quod est: *Semen & herba cum vino pota, dyfenterici, & serpentibus morfi opitulatur.* Id est: *Quisquisque præceptor primū incidit, talē in aperi. nihil præstolatus ab illo etiam didicisse, adeo ut illi inopiam habere vult ad discendū, & ad illi discipulo, hoc est, ut minus mirum sit si ab eis falsa cum veris*

Peritantiā
quam discē
dam nobis
proponi-
mus ad hoc
legendū.

D pari precio censentur. Id certe cōsiliū si nostræ ætatis Medici sequi voluissent, non esset cur hodie in tanta errorum, maxime in iis quæ ad simplicium medicamentorum cognitionem attinent, caligine versarentur. Plerique enim omnes Arabes potius quam Græcos sequi voluerunt, quum tamen nulli magis inter se disenserit ideoque factum, ut & nos haud aliter quam illi nobis non constemus, & clausis, quod dicitur, oculis Andabatarum more pugnemus. Dissensibile vero inter se Arabes, radix Turbit vocata indicio est: aliter enim de ea Serap. aliter autem Meluē tradidit. Serapionis siquidem hæc de Turbit cap. 320. sententia est: *Turbit, inquit, est planta qua nascitur in litoribus maris in locis scilicet quos mare cooperit, quando creuit, quando vero est quiescit, nō tangit eos. Nam enim nascitur intra aquam maris, nec est multum longe ab ea, & nisi quando mare turbatur, & cre-*

Arabes in
hoc se discē
sio.

E scit, & non tangit eam: habet folia similia foliis plantæ, qua dicitur Arasfati. Legendum autem ista, ut paulo post ex Dioscoride patet nisi quia sunt crassiora ei, & habet stipem longum duobus palmis, diuisam in summam etc. Et dicunt quidam, quod si eius mus colorēm suū ter in die, quia mane est albus, & in meridie declinat ad colorem purpureum, in vespertis vero fit rubens. Radix eius odorifera, alba, qua quando masticatur, calefacit linguam. Quæ si vera Serap. sententia est, a Tripolio Turbit nō differt: quicquid enim Serapion Turbit, hoc idem Tripolio Dioscorides tribuit, cuius hæc lib. 4. cap. 16. de Tripolio verba sunt: *οὐραίου θύρον ἐν τῇ ἰσχυρίᾳ αἰὲν ἐνὶ τοῖς ἀνθρώποις ἐκ τῆς ἰσχυρίας ἀφαιρῶν* quod est: *Semen & herba cum vino pota, dyfenterici, & serpentibus morfi opitulatur.* Id est: *Quisquisque præceptor primū incidit, talē in aperi. nihil præstolatus ab illo etiam didicisse, adeo ut illi inopiam habere vult ad discendū, & ad illi discipulo, hoc est, ut minus mirum sit si ab eis falsa cum veris*

Serapionis
de Turbit
sententia.

Turbit Se-
rap. est Tri-
polium.
Tripoli de
scipion.

F ista si similia, crassiora tamen caulem dedit autalem, in summo diuisum. Flores eius fertur ter quotidie mutare colorem: mane enim candidus, meridie purpureus, vespere puniceus conficitur. Radix illi alba, odorata, gustu calida. Dioscoridi subscribit Phn. lib. 2. c. 7. in hunc modum scribens: *Tripolium in maritimis nascitur saxi, ubi alidit vnda, nec in mari, nec in sicco solo ista crassiora, palma al-*

ia, in mucrone diuisa, radice odorata a, crassa, calidi gustu. In hoc aut vchementer errat Phn. quod

Plin. Tri-
polium com-
poin con-
foudit.
Pandeſtari
erro.
Meſuen de
Turbit ſen-
tentia.
Septem ſpe-
cies Thy-
malorum.
Turbit Me-
ſue non eſt
Pityula ra-
dis.
Pityula a-
pod ſera-
pionem
ſecbrum
dictur.
Lathyrus
quid.
Turbit no-
ſtrum non
eſt ſera-
pionis.
Turbit no-
ſtrum non
eſt Meſue.
Turbit ra-
dis.
Rhenbarba
a pondus.

Tripolium eandem herbam cum Polio eſſe putat. Hinc eſt, quod Polii foliis assigna-
uerit maculatum, quod Tripoli floribus veterum auctoritate debetur. Sic enim *lib. 27.*
cap. 7. de Polio ſcribit: *Folia eius mane candida, meridie purpurea, ſole occidente cerulea afficiuntur.* Ex iam dictis etiam Pandeſtari immenſus error agnoſcitur, qui in ſuis mendaciſ-
ſimis Pandeſtis duo facit capita, vnum de Tripolio Dioſcoridis, alterum vero de Tur-
bit Serapionis, quod Turbit apud Serapionem aliud ſit a Dioſcor. Tripolio: id enim
falſum eſſe ex prædictis euidentiffimum eſt. Ceterum Meſuen aliud a Serapionis
Turbit deſcriptiſſe, ex eiſdem verbis innoteſcet: ita enim Turbit ſuum depingit
Turbit eſt radix herbe, cuius folia ſunt ſicut folia Ferule, minora tamen: & eſt ex habentibus lac.
Quorum certe n. h. in Serapionis Turbit cernere licet: folia enim hæc laſtidis, quæ
Plantaginis ſimilia ſunt, habet: illa autem *Ferula*, quæ *Feniculi* foliis accedunt. Quod ſi
vero *Ferula* folia habuerit Turbit, ex iis quæ lac habent, *ut ait Meſue*, eſſe non poteſt:
nam ſi lac habet, tum vel aliqua ſpeciem Thyſmalorum, vel radix Pityulæ erit.
Quum autem ſeptem ſint Thyſmalorum ſpecies, *Dioſcoride libro 4. capite 155. auctore*,
nulla tamen ex his *Ferulæ* ſimilia folia, qualia Turbit Meſues habet, heri non poteſt,
villarum aliqua Turbit eiſdem eſſe queat. Nullam vero Thyſmalorum ſpeciem
Ferulæ foliis conſtare, Dioſcoridem diligenter excurienti patebit. Singularum enim
ſpecierum deſcriptiones afferre ſuperuacaneum eſſe duxi. Neq. etiam Turbit a Me-
ſue deſcriptum Pityulæ radix eſſe poteſt, ſiquid hæc non *Ferula*, ſed *Piceæ* folio con-
ſtat, *quemadmodum lib. 4. capite 156. reſtat Dioſcorides*, qui Pityulam *quam agnoscimus, reſtat agno-*
ſcimus, ſed quæ ſit in vno. quod eſt. *foliis acutis, tenuibus, Piceæ ſimilibus veſtitam eſſe* ſcribit.
Quibus accedit, quod Pityula apud Serapionem non Turbit, ſed *ſecbrum* nuncupa-
tur, id quod palam fiet, ſi quis vtriuſque deſcriptiones conſulerit. Denique Meſues
Turbit non poteſt eſſe, vel Lathyrus, vel Peplion, vtraque licet inter laſtarias a Dioſco-
ride connumeretur herbas, quod vtriuſque radix a Dioſcoride inutilis eſſe cenſetur.
Et certe Lathyrus ea eſt herba, quæ hodie *Cataputa minor*, barbaro vocabulo dicitur.
Qui iam fieri poſſet, ut quid eſſet Turbit, ex tam diuerſis ambiguiſque Arabum pla-
citis, noſtræ ætatis Medici ſcire poſſent? Non enim eſt Serapionis Turbit, quod nunc
palſum officinæ videntur, vel ex eo manifeſtum ſit, quo radix illa, quam Serapio de-
pingit odorata eſt, ea autem, qua nos vtimur, odore penitus caret, tantumabeſt ut
Serapionis Turbit dici poſſit. Neque Meſues eſſe poterit Turbit, quoniam, ut doctiſ-
ſimus Ioannes Manardus ex nonnullis fide dignis ſe audiuiſſe ſcribit, ex planta acci-
pitur, quæ Myrti folio, & minime *ferulæ* conſtat: ita ut nihil mirum ſit noſtræ ætatis
Medicos ignorare, quid ſit radix, quam ſub Turbit nomine officinæ vendunt, præ-
fertim cum Græci, ad quos tanquam ad ſacram anchoram in iis dubiis cõfugiendi
erat, de eardem ſub nomine Turbit nihil ſcripſerint: barbaræ enim vox eſt, & a po-
ſterioribus Medicis, ob vehementem ſorte, quam habet in mouenda aluo turbatio-
nem, ſic appellata. Neque obſtat, quod apud Dioſcoridem capite de Pityula hæc verba
in eadem ſententia inferat ſunt, nam ea ab aliis adieſta eſſe argumento eſt, quod in nullis
Græcis aut Latinis vox *Turbit* legitur codicibus. Proinde ſi verum eſt, quod Ioannes
Manardus ſe audiuiſſe dicit, nimirum quod planta cuius radices, quam *Turbit* hodie
nominamus, ſolium Myrti babeat, interque laſtarias herbas reſertur, certe aliqua Thy-
ſmalorum ſpecies erit, non tamen ex earum ſeptem numero, quæ a Dioſcoride cõ-
memorantur, ſed ea quam hodie Cretenſem Thyſmalum appellant, *ut abunde ſemo*
tertio noſtrorum de ſimp. hiſtor. commentariorum menſtramus, ubi iconem eius ſubiecimus,
& vniuerſam hiſtoriam luculenter expoſuimus. Ceterum Turbit Meſue, quod *feru-*
læ folia, ut dictum eſt, obtinet, ut a Turbit communis uſus diuerſum eſt: ita a Thapſia
Dioſcoridis non diſſert, quemadmodum *ſecbrum* iam citato pluribus, & iis quidem effica-
ciſſimis, argumentis demonſtraui, ut opus non ſit hic denuo reſerre.
*Prudenter ſalutem Adieciſti ſi Meſue Rhenbarbaro, Epithymo, Scammone, Poly-
dio, & Euphorbio exhibitio præſcribentem pondus, haud ſeſtati fueris.*

C A P. X.

EX multis aliis medicamentis, in quorum præſcribendis ponderibus Meſue aber-
raſſe videtur, pauca hæc enumeranda delegitur, quod cetera ex Manardi margi-
neis in hunc auctorem annotationibus ſtudioſius quiſque venari queat. Rbeubarbari
irag.

& triangularia, Meſue vero inſtat ſagittæ alaræ. Quæ eſt vero qui neſciat hedere ſolia anguloſa eſſe, & ſagittæ eius cuius Meſue meminit formam habere? Huc accedit quod Scrapio in deſcriptione Scammoniz Dioſcoridis & Galeni de Scammonia verba citet, quod nunquam ſædurus erat, ſi Arabum a Græcorum diuerſa fuiſſet Scammonia. Sunt & alia multa quæ vtriſque deſcriptionibus collatis, quadrare videntur. Proinde non erat cur Manardum atque me ignoranti inſimularet Campegius, neque enim verum eſt quod ille ſcribit, Scammoniam Arabum eſſe de genere peculiari laſtiorum, & de ea Græcos nihil ſcripiſſe, ſed tantum de ea quod in Colophone naſcitur: nam, ut iam diximus, Scammoniam Syriacam, quæ lacte Tithymalotum adulteratur, tam Græci quam Arabes cognouerunt: & ad hanc certe pondus Meſues referendum erit, nã Antiochena ſeu Aſiatica maiori quãtitate deuorari poceſt. Quod vetum eſſe teſtatur Auicenna, qui cap. 230. Canon. 2. ita ſcriptum reliquit: Scammonia in regionibus diuerſificatur, ita enim eius interpres loquitur: adeo quod ego viderim in quibusdam Medicorum libris exhibitionem eius plurium ponderis. Quibus ſane verbis Auicenna ſignificare voluit Scammoniam in diuerſis regionibus nunc validioribus, nunc vero infirmioribus virib. naſci. Non eſt igitur quod ob vires vehementiores, aut imbecilliores genus, ſed duntaxat pondus mutet. Errat ergo potius Campegius, quod Scammonium in Colophone tantum naſci putat, cum in Myſia Aſia, Priene & Antiochia etiam naſcatur. Haſtenus de Scammonio. Porro Polypodii doſim ſcribit Meſue eſſe ſiſe ad aureos quatuor: at ſatis conſtat vnciam integram parum purgare, id quod multa conſutatione non eget. De Euphorbio vero, ex Dioſcorido auctoritate, ſcribite iuſdem aureum vnum ſumtum interficere. Quo ſiquidem in loco, ut alias ſæpiſſime, in Meſue requiritur fides: neque enim vſquam hoc iplum Dioſcoridem ſcripiſſe legimus. Imo Paulus Aegineta lib. 7. cap. 4. Euphorbii drachmam vnam cum melle decocto potam, pituitam quidem, impenſius vero aquas, ſed ducere docet, Scrapion vero & Auicenna cap. 230. ſec. Canon. non vnum aureum, ſed drachmas tres interficere dicunt. Idem quoque Auicenna Fem. 5. cap. 3. tract. 5. cap. 7. de curatioe in cæci, drachmæ vni Euphorbii, Scammonii drachmæ 3. partem, & quartam colocynthidos addere præcipit. Quod non ideo dixiſſe putent ſtudioſi, quali tantam quantitatẽ exhibendam eſſe ſuadeam, ſed ut habent veritatis cultores, ſi quando neceſſitate ita vigente Meſues præſcriptum exceſſerint, quod impudentibus calumniatoribus obtruderent.

Centaurium maius Aſclepi, Auicennam in hoc ut plerique alii ſecutum, præter antiquorum exemplum, cum minore confundere ac vires vtriuſque indiſcriminatim commiſcere minus quoque non ſine magno errore maiori præferre.

C A P. X I.

MA I V S Centaurium confundere Meſuen cum minore, non aliunde certius niſi ex euſdem verbis ſciri poteſt, quæ in libro ſuo ſimplicium medicamentorum in hunc modum ſcribat: Centauria alia maior, alia minor, inter quas diſtinguuntur proprietates notæ. Minor melior eſt in omni re, cuius flores & crura habent colorem citrinum palearem, & melior pars planta ſunt flores & ſemina ipſius. Et melius tempus collectionis eius eſt principium æſtatis. Calida complexionis & ſicca in ſecundo eſt, & eſt compoſita ex partibus terreis aduſis. in parte dentibus ei amaritudinem, & ex non aduſis cum permixtione aquoſitatũ, a quibus inſeſti ſtypticitas. Et eſt in ea de dulcedine aliquid a partib. acris. Et in ipſa eſt ex acredine aliquid a partibus igneis. Et amaritudo in ea plus eſt ſtypticitate ipſius, & ſtypticitas plus dulcedine & acredine. Et credo in ipſo eſt remiſſa ſine mordicatione. Quare eſt ex maxime curantibus vulnera. Imo ipſa eſt abſterſiua, coſſecutina, conſumtiua ſuperfluitatum, & ſolutiua ventris. Et quando ſuperfluit purgatio, ex ea ſolutione educit ſanguinem: aperit enim oriſcia venarum, apertione ſanguinem manare faciente. Haſtenus Meſues verba reſenſimus, quæ ex cap. 102. ſecundo Canon. Auic. eſſe de ſumta intelligit quicquid capita hæc inter ſe conferre voluerit. Virunque autem in Auicennam & Meſuen Centaurium maius cum minori confundiſſe, etiam adductis verbis monſtrabimus. Neque obſtat, quod primo vterque idem in maius atque minus diuidit, mox enim obliui diuiſionis, vtriuſque proprietates atque vires indiſcriminatim miſcent, horumque hiſtoriam conſuſiſſime tractant, id quod ex ſequentibus euidentiffimè erie. Nam ut omni ordine excutiamus, falſum eſt quod vterque minus Centaurium maiori prætulit: id enim præter antiquorum auctorum exemplum eos feciſſe conſtat, qui cuius ſuas

Manardus
ab inſoria
vindicatur.

Campegi
eror.

Polypodii
pondus.
Euphorbii
pondus.

Meſue de
Centauria
ſententia.

Centaurium
minus ma-
iori non
præferen-
dum.

- A** *ἴδιον δὲ τὸ πάλαιον ἵππερ μὲν καλεῖται ὡς ἰσχυρὸν καὶ ἀντιπαραστήσει τοῦ ἐμμετοῦ καὶ καὶ διὰ τὸν ἵππον ἵππο* hoc est: *Aconitum seu Pardalianches putrescens & venenosus facultatis est. Itaque in cibis potius fugiendum: astamen ad putrescendum quadam extra os & sedem aptum est. De altero sic: αἰσθητὸν ὁ λαϊκὸς τοῦ μὲν παλαιούτου ἵππου διὰ τὸν ἵππον καλεῖται ἀντιπαραστήσει τοῦ ἐμμετοῦ παρδάλαν. hoc est: Aconitum siue Lycetionum similis alteri facultatis est, sed peculiariter lupos interficit, sicut illud pardos. Galeno subscribit Paulus libro 7. dicens: αἰσθητὸν τὸ μὲν παρδάλαν καὶ οὐκ αἰσθητὸν τὸ διὰ τὸν ἵππον καλεῖται ἵππο. ἵππος μὲν ἵππος τοῦ ἐμμετοῦ παρδάλαν καλεῖται ἀντιπαραστήσει τοῦ ἐμμετοῦ παρδάλαν. id est: Aconitum quod Pardalianches cognominatur, putrescentem & lethalem vim habet, quam ob causam intro non assumendum, foris tamen in carnibus, quas putrescere oportet, vitandum eo.*
- B** *Quod vero Aconitum Lycetionem vocatur, eandem cum priore vim habet: peculiariter autem lupos emecat, quemadmodum illud pardos. Plinius quoque libro vicesimo septimo, capite sexcento, omnium venenorum oculissimum Aconitum effelebit: nec est pater Auicennam, qui ad delendas albaras in potu utopinandum Aconitum vnquam dixerit. Atqui hic aduersatur Montuus, Plinium obtrudens, qui loco iam citato, scorpionum siliis aduersari Aconitum in vino calido datum, inquit. Cui ita responsum velim, me non ignorare Plinium ista tradere, idque ex Theophrasti auctoritate, qui libro nono de historia plantarum cap. 19. de Aconito sub Thelyphoni nomine ita scribit: χρίσμα δ' ἐστὶ καὶ τὸν ἀντιπαραστήσει τοῦ ἐμμετοῦ, quod est: Potum contra scorpionum ictus prodest. Sed ob id Aconitum ad delendas albaras seu leucem esse bibendum, adhuc constanter negamus. Nam si ea natura est Aconito, veluti Plinius scribit, vt hominem occidat: nisi inuenerit, quod in homine perimat, quomodo in ea vitiliginis specie, quam leucem nominant, in qua certe veneni nihil est, ad potandum potopinari potest? In potu itaque datur Aconitum, ac minime in vitilagine, sed vbi in corpore venenum est, cum quo solo, vt Plinius verbis utar, colluctatur, velut paritrus inuento. Sola hæc pugna est, cum venenum in visceribus reperit. Mirumque exitialia per se ambo cum tuerint, duoque venena in homine commorianrur, vt homo supersit. Quare Auicennam suum Montuus tueri non potest, quod non tunc extremo sumentis incommodo Napellus ad delendas albaras in potu dari queat. Putsisset itaque hæc vt alias omnes annotationes suas omisisse, quando parum frugis, vt pote frigidissimæ, lectori attulerint.*

Montui ob
recho re-
fellebat.

Quando
Aconitum
intro assu-
munt potest.

- D** *Radix Pentaphylli succum minime perniciosum, quemadmodum Auicenna sententiatur, sed potius contra lethalia venena admodum efficacem esse.*

CAP. XV.

- V**erbis Auicennæ, quibus radice Pentaphylli succum tanquam exitiosum damnat, habentur cap. 554. secundi Can. vbi in hanc sententiā scribit: *Succum radicis eius est medicina perniciosa. Errare autem toto cælo Auic. cuius constat, qui veterum de hac planta scripta, diligentius excusserit. Nemo enim ex veteribus Auicennæ opinioni subscribit, sed huic vno ore omnes reclamant. Etenim Diosc. lib. 4. cap. 39. ita de radice Pentaphylli tradit: ὁμοῦ τῆς ἵψης ἀντιπαραστήσει τοῦ ἐμμετοῦ καὶ τοῦ δαρδανίου. q. est Radix vena- *Pentaphylli radice succum non exitiosam.**
- E** *venera succum contra toxicorum pulmonisq. affectum & lethalia venena facit. Idem etiam lib. 6. ca. 20. radicem Pentaphylli contra toxica efficacem esse, his verbis ostendit: ἵππος δ' ἐστὶν αἰσθητὸν καὶ τὸν παρδάλαν καὶ τὸν ἀντιπαραστήσει τοῦ ἐμμετοῦ καὶ τοῦ δαρδανίου. id est: Primatum vero is conuenit Pentaphylli radice similiter sumta. Loquitur autem de illis, qui toxicum haurerunt. Cui Paulus lib. 5. cap. 54. subscribit, inquit: Peculiariter autem contra toxicum valde Pentaphylli radix eodem modo pota. Plin. quoque lib. 25. ca. 9. Pentaphylli seu quinq. folii radicem aduersus venena valere testatur his verbis: Aduersus serpentes bibitur etiam radix, quæ sparganton vocatur, ex vino albo. Quæ etiam sequitur Apuleius ille Madaurensis ca. 2. sui libri, quem de herbarū virtutibus conscripsit, ad mortum serpentis quinq. foliū potā & contritam, mire vult esse tradens. Proinde nemo est, nisi Leberide cæcior sit, qui non ballucinari Auic. videat. Id quod eo libentius studiosis inculcandum, vt vel tandem ab Auic. desistant, discantque huius decreti non nisi exacto adhibito iudicio esse imitanda. Neq. enim tantam esse Auicennæ auctoritatē volumus, vt radicem salutarē admodum & contra venena potentē, faciat lethalem. Quod si animaduertissent superioris seculi Medici, nunquā Pentaphylli radicem in vfu medico tanquā perniciosam abhorruissent. Saonarola n. celebris tui ætate*

Auicennæ
placita non
temerem
tanda.

318 Operum Leonhardi Fuchsi Pars IV.

Medicus, quemadmodum Leoniceus vir, & deliteris, & dare medica optime meri-
tus scribit, radicem Pentaphylli non alio nomine in quattana propinare non ausus fuit,
nisi quod damneretur a Principe. Iacobus quoque de Dondis, videm scribit, A uic. au-
doritatem seductus, huius radicem inter venena nuicrauit. Discant itaque studiosi bono-
ram virorum periculo in tempore sapere, ut medicinam ex puris fontibus potius, quam
ex turbidis lacunis hauriant, nec eo dementie perducantur, ut cum Auicenna errare
malint, quam cum eruditis ac bonis viris recte sentire.

*Harmel Arabibus non cicutam, sed rutam potius syluestrem alteram significare, vi-
cenz. Aude. ac huius sequacis reluctantur, veterum animimum testimonij
emendant. sicutum esse. CA. P. XVI.*

Verba Auicennae, quibus Harmel non esse rutam syluestrem asserit, habentur *Fen. A*
Can. 4. tract. 3. cap. 33. ubi in hunc modum scribit: *Ruta sylvestris non est Harmel, et quod-*
dam existimauerunt. Quae utique verba mulus non solum medicis, sed & pharmacopolis
errandi occasio fuerit, ut passim Harmel pro Cicuta interpretati sint. Ita interpretis Aben-
rois quinto Colliget. non sine maximo errore Harmel pro Cicuta interpretatus est: nec anti-
maduerit, quod hoc loci Abenrois, Harmel calidam & siccam in tertio ordine esse di-
cat. Cicuta autem veterum omnium testimonio, quemadmodum paradoxo 14. dixi-
mus, inter venena frigiditate nimia enecantia numeretur. Fuerunt etiam non pauci
pharmacopolae, qui falsa ista interpretatione seducti, semper pro Harmel Cicutam in
usum Medicum arripuerint. Testatur id vetustum admodum Antidotarium, quo annis
multis ad conficienda medicamenta usus est pharmacopola Onoltzbachensis, in quo
passim Harmel pro Cicuta leuissime interpretatum erat, nec animaduertit errorem, donec
per me tandem monitus fuit. Accessit tandem multorum errorum fator Mattheus Syl-
uaticus, quem Pandestanium alio nomine vocant, qui Harmelcum aspiratione apud A-
rabes scriptum Cicutam, sine vero aspiratione rutam syluestrem significare scripsit. Id certe
quod non solum non verum & minime otiosum, ut Montuus arbitrat, sed omnium
mendacissimum ac otiosissimum est, quod veterum sententiae, adde Arabibus etiam
ipsis, ex diametro pugnet, nec vlla ex hac distinctione doctorum concordia fieri possit.
Nemo enim eruditorum vnquam Harmel cum aspiratione pro Cicuta interpretatus
est, sed vno pre omnes rutam esse syluestrem affirmarunt. Testis est Dioscor. qui lib. 3. cap.
49. ita scribit: αλάν δ' αὖτε οὐρανόθεν ἔρχεται, id est: Vocant autem nonnulli rutam syluestrem
Harmela. Et Galenus lib. 7. de simpl. med. facult. dicens: Μόλν τινος ὀνόματι ἔχουσιν ἰσχυ-
ρυν, ὡς δ' αὖτε, quod est: Moly quidam rutam syluestrem vocant, nammulli Harmelan. Etsi
autem idem Moly cum ruta sylvestri altera, docet in 8. libro de simp. med. facult. Galeus
ita scribens: ἡ δ' αὖτε ἰσχυρὸς λίγος μολν, ὃς ἐστὶν οὐρανόθεν ἰσχυρὸς, ὡς αὖτε τινος ὀνόματι ἔχουσιν. Hoc
est: Quod superius moly & besanum nominari diximus & ipsum vltig. facit ruta sylvestris altera.
Non est vero, ut quispiam hic moly Homerum intelligat, quod ab eo, quod alio no-
mine ruta sylvestris altera dicitur, plane diuersum est, pingiturque scotim a Dioscoro.
Paulus quoque Aeg. lib. 7. rutam syluestrem alteram alio nomine vocari harmalam his
verbis ostendit: Μολν quod quidam rutam syluestrem nominant, nonnulli vera harmalan, Syri
besanum. Inter Arabes denique Serapion cap. 275. harmel pro ruta sylvestri interpretatur,
alioque nomine moly dici ait. Auicenn. quoque cap. 340. secundi Can. harmel esse rutam sylues-
tre alteram facit, id quod proprietates, quas illi tribuit, abunde monstrat: eadem
enim sunt cum illis quas ruta sylvestri alteri inesse Dioscor. Galenus, ac alii veteres scribunt.
Ait enim: Harmel est incisiva & subtilissima, est bona dolori tumidarum, & febricitans, cum de super-
illinitur: trita cum melle & vino & felle galianum & aqua facientis, est conueniens de huiusmodi vi-
sis: promouet urinam & menses, & confert calicem venis. Quas nimirum facultates omnes
ruta sylvestri veteres etiam assignant. Dioscor. enim loco iam citato in hunc modum de
illa scribit: αλάν δ' αὖτε οὐρανόθεν ἔρχεται, ὡς αὖτε τινος ὀνόματι ἔχουσιν. ἡ δ' αὖτε ἰσχυρὸς λίγος μολν, ὃς ἐστὶν οὐρανόθεν ἰσχυρὸς, ὡς αὖτε τινος ὀνόματι ἔχουσιν. hoc est: Ruta sylvestris
coxinducum doloribus prodest, menses mouet. Semen cum melle, vino, gallinaceo felle, croco, & sa-
rmacali succo tritum, ad aculeorum hebetudinem utile est. Galenus autem libro 7. de Simp. de ἰσχυ-
ρὸς ὡς αὖτε τινος ὀνόματι ἔχουσιν, ὡς αὖτε τινος ὀνόματι ἔχουσιν, ὡς αὖτε τινος ὀνόματι ἔχουσιν.
Id est:

Pandesta-
nium errorū
feminator.
Montuus
refellitur.

Harmel ru-
ta sylue-
stra.

Moly idem
cum ruta
sylvestri.
Moly Ho-
mericum.

- A** id est, vis eius tenuium est partium, & calida in tertio ordine, unde & crassos humores dissolvit & digerit, & urinam movet. Er libro octavo, ubi jam de humoribus diximus, ubi dicitur, quod si vis urinæ movetur, dicitur de vis urinæ movetur, quod est: Rata sylvestris incidere atque digerere crassos lentosque humores potest, ob eandem vim & urinam movet, quia & tenuium est partium, statimque exstinguit, quare ad inflammationes competet. Galeno subseribit Paulus verbis: Rata sylvestris tercia est et efficit caliditatem cum partium tenuitate: unde crassos & tenaces humores incidit ac dissolvit, urinamque movet. Porro harmelapud Abentroen descriptio ac proprietates in vniuersum cum iam dictis conueniunt: inquit enim: Harmel calida & siccata est in tertio ordine, incidit humores crassos, promouet urinam & menses, valet dolores excendicam, putridamque purgat. Ita vt euentissimum sit verorumque, tam Græcorum quam Arabum, testimonio, harmel cum aspiratione, imo vtrumque, scribatur, perpetuo significare rutam sylvestrem alteram. Nec ab re passim adieciimus alterâ dictionem. Quia n. geminæ sint Rutæ sylvestres, vt tomoterionosthorum de stirp. historiæ commentariorum ostendimus, ea quæ Harmel nominatur, altera eam exhibet. Præterea quum rutæ sylvestris crassos lentosque humores hu notet, vt eam ostendimus, incidere & dissolvere possit, manifestum est, eam commodius ad catapotiorum fortidorum & de hermodactylis confectioem adhiberi quam cicutam: non enim alio nomine deuota reut, nisi vt crassos lentosque humores educant: id certe quod cicuta non potest, cum eisdem sua frigiditate & humiditate potius crassiores & magis lentos reddat, atque ita membris & articulis impingat & infarciat, & nulla vi aut omnium difficilium eximi possint. Atqui hoc loci Montuius oblectitur, non omnem cicutam frigidam & humidam, adeo quæ lethalem esse dicens, sed quandam vt pote terrestrem calidam & siccam existere, quæ etiam intra corpus subintrare adhiberi posse, recentiorum medicorum, præsertim Conciliatoris auctoritate air. Mirum autem Montuium deaherare, vt me tam nullius momenti argumentis a concepta iam olim sententia deturbari posse existimet. Satis compertum habeo, recentiores Cicutæ duo facere summa genera, vnum aquaticæ frigoris & humens naturæ, alterum terrestris calidæ & siccæ. Sed quoniam qui hoc scribat, sententiam quillorum confirmet, auctorem nullum idoneum profert, quid est, cur non hallucinatos esse, vt fere solent, constanter dicamus? Nec enim Conciliator tantus est, vt huic errori patrocinari possit, quem constat in multis aliis ita ut pter erratis, vt conturbatoris potius nomen, quam conciliatoris meruerit. Quod multis mori quum nemo ex veteribus aut probabilis scriptoribus Cicutam, quod frigida & humida sit, facile intra corpus adhibendam censuerit, quid est, quod recentiorum quorundam temere excogitatis nugis in tantum moueamus, vt cicutam calidam & siccam dicamus, cum tamen constat, nulla abasatione Gal. lib. 5. de simplicium medicamentorum facultate cap. 18. Cicutam in potu damna esse, nisi quod frigida & humida sit? Verba eius subiciemus: inquit, & pter hoc & pter hoc, non est in potu adhibenda, quod est: Quæ frigida quam sint, humiditas item copiam obtineant, seu cicuta, ea potu non sunt utilis. Non ad re autem paulo ante a nobis dictum, facile intra corpus adhibendam censuerit. Si enim Cicuta in intra corpus adhibetur, id necessitate quadam compellente fit, quæ cogit, vt intet dum etiam opium propinetur deuorandum. Sic Galenus quidem lib. 10. de comp. med. loc. lium cap. 3. in vesicæ exulceratione ad mitigandum eius dolorem, Cicutam ex Andromacbi sententia bibendam præbet. Insuper prædictis fidei faciendæ, quod nec Dioscorides, diligenter herbarum scriptor, duplicem Cicutam, quatum altera simpliciter frigida, altera vero calida sit, quemadmodum Conciliator facit, ita vt sole clarius sit, recentiorum de duobus cicutæ generibus commentum, esse omnium frigidissimum. Sunt quidem duo Cicutæ genera, vt tomo 2. nostrorum de stirp. hist. commentariorum monstrauimus, tamen neutra eorum simpliciter calida existit, sed tantum alterius collatione, nempe maioris, quæ plus minore refrigerat. Sunt etiam duo Cicutæ genera

Cicuta ad Catapotiorum confectioem adhiberi.

Montui innotat unculæ respiciendæ.

Cicuta ad de- fuit genera.

Conciliator conuincitur per hoc dictum.

Ladanum, vel, vt Barbari, addita litera, loquuntur Ladanum, non ex Hederæ, perinde vt Aucenna somnasset, sed Cissibo potius fructu, quem Ladan alius nominant, coll. gi. CAP. XVII.

DDd +

324 Operum Leonhardi Fuchsi Pars IV.

Paulus Ga-
leni sententia.

facit Paulus Aegin. Galenum passim ita referens, ut Simia eius dici coeperit, qui li. 7. de A Populo nigra ita scribit: *Aegras excafcatis in primo temperatorum ordine, fuscis vero modio-
riter, est, paritatem tenendum. Verum quae ex ea stellas refina, steribus paulo calidior est.* Præterea
natura ipsa arboris ad tantum caliditatis gradum illam non posse extolli, satis indicat.
Qui enim sapor, quis odor, quæ denique qualitas tam præcellens hanc esse caliditatis
indicio esse potest? neque enim valde odorata, neque eximio aliquo sapore prædita est, sed
dum gustatur, primum quidem modice adstringit, postea amaritudinem quandâ sub-
obscuram inuehit, olfacienti quid non insuaue, verum exiguum id omnino repræsentat:
quæ ceteræ singula non excedere primum a calefaciendo ordinem argumento existunt.
Quod si quis etiam via regia, quam in libris de simpl. med. facit. Gal. ostendit, incedens,
illam in cotpotibus & temperatis & ægris experiri voluerit, non admodum calefacien-
tem inueniet. Quum itaque ex iam dictis satis constet populum nigrum primum calidita-
tis ordinem non excedere, quid obstat, ut non intrepide Auicennam errasse pronun-
ciemus?

*Carabe quod Græci electrum, Latini autem succinum vocant, non esse Populi nigra la-
chrymam, veluti Auicenna & alij quidam fabulosa sedulitate,
docent. CA P. XXI.*

Haurum Ro-
manum not.

A Vicenna cap. 331. secundi Can. Carabe gummi arboris Hauri esse docet iis verbis:
Gummi quod ex hac arbore romano est, Carabe dicitur. Et rursus cap. 374. ubi Carabe hi-
storiam ex ptolesso tractat, idem facit, dum, *Carabi gummi arboris, quæ max. romana vocatur,*
esse, inquit. Manifestum vero ex præcedentibus, Haurum romanum, seu nucem roma-
nam, Arabibus nihil aliud esse quam Populum nigrum. Auicennam sequitur Serapion,
qui cap. 266. sui de simpl. med. temp. Carabe Hauri romani gummi esse scribit, idque ex Ga-
leni sententia, quem tamen constar nullam de electro succinove mentionem fecisse:
ita passim in citandis Græcis, illorum auctoritate abutuntur Arabes. Ea autem de succi-
no sententia, ex fabula quorundam hominum mentes irrepserit, quæ Helias des Phaetontis lo-
tores fratrem mensibus quatuor fleuisse, ac tandem iuxta Padum in Populos arbores il-
lius desiderio conuersæ, pro lachrymis molle succinum iugiter stillare ferunt. Hanc
certe Ouidius lib. 2. metamorph. multis iisdemque elegantissimis versibus descripsit, inter
quos & illi leguntur.

Fabula Ele-
ctrum.

*Alaser tunc trançis auellere corpora tenet,
Et teneros manibus ramos abruptis, at inde
Sanguinea manans tanquam de vulnere gutta.
Parce precor mater, quæcumq; est faucia clamat,
Parce precor, nostrum laceratur in arbore corpus,
tamq; vale, cortex in verba nouissima venit.
Inde fluunt lachryma, stillatq; sole rigescunt
De ramis electra nouis, quæ lucidus annis
Excipit, & nubilum mittis gestanda Latinis.*

Refertur & a Diodoto Siculo lib. 6. de fabulis antiquarum gestis, iis verbis: *De electro qui-
dam veteres fabulas scripsere haud dignas fide, & quæ a posteris reprehensæ sunt. Nemo enim
tum poeta, tum historici tradunt Phaetontem solis filium, quum pater esset petiisse patre, ut vnicui-
quem solis currum regeres. Ille assensiente, summo currum, quum equorum fræna regere nequisses, ab
equis contempto puer, extra solitum currum esse currum delatum, & primo celum equorum error
inensum, circumlucque qui Galassia dicitur, exinde factum, deinde magnam combustam orbis por-
tem. Quare commotum Iouem fulmine Phaetontem traducere peremisse, solemq; in pristinum rede-
gisse eurrum. Phaetontem in fontibus eius, qui nunc est Padus, olim Eridanum dicebant, decidisse.
Eius mortem Nymphas fleuisse sorores, doloriq; magnitudine mutata in Populos fuisse versas: has
annis singulis eodem tempore educere lachrymas, & quibus electrum fiat, reliquam splendore superant.*
Hæc Diodorus. Fabulolum autem hunc errorem non tantum Arabes, sed & ex
Græcis plurimi, ut Arist. cap. 70. de admirandis in natura, secuti sunt, & inter Medicos
Paulus maxime Aegineta, qui lib. 7. ita scribit: *Populi arboris lachryma est electrum, prope-
rius nomen Eridanum, ut aiunt, ex ea destillans congelata calore anni.* Nihil autem miri in tam va-
riis scriptorum de succini proventu sententiis deceptum fuisse Paulum, qui in Græcia
Vluens

Paulus A-
gencia in
laccino de
cepro.

A viuens, ubi terrarum succinum generaretur videre non potuit: quapropter communem multis opinionem sequi voluit. Plurimam tamen fuisse qui fabulam hanc damnauerunt, veluti est Diodorus Siculus locum citato, & Herodorus libro tertio. Nemo autem veterum fere, ubi nasceretur succinum certius, quam Plinius, fidelissimus naturæ interpretes, indicauit, qui lib. 37. c. 2. varias de illo commentitias explodens sententias; in hunc modum scribit: *In succinum caussum ne delicia quidem adhuc excogitantur. Occiso est vanitas Graorum diligentia. Legentes modo aque perpetuantur me de ortu eorum, cum hoc quoque inter sit vita, fere posteros quicquid illi prodidere mirandum.* Phaenonius fulmine illi fratres fluitantatas in arbores Populos; lachrymæ electrum omnibus annis fundere iuxta Eridanum cernem, quem Padum vocamus; & electrum appellatum, quoniam sol vocatus sit elector, plurimi Pacta dicere, primæque, ut arbitror, Aschylus, Philoxenus, Nicander, Euripides, Satyrus; quod esse falsum Italia testimonio patet. Diligentiores eorum Electridas insulas in mari Adriatico esse dixerunt, ad quas dilaberetur Padus. Quæ appellatio nullas unquam ibi fuisse certum est. Nec vero vllas ibi appositas esse, in quas quicquam cursu Padi deuehi possit. Nam quod Aschylus in Iberia, hoc est, in Hispania, Eridanum esse dicit, eundemque appellari Rhodanum; Euripides, rursus, & Apollonius in Adriatico littore confluisse Rhodanum & Padum faciliorem vocant, facit ignorati succini, in tanta orbis ignorantia. Modestiores; sed aque falsum prodidere, in extremis Adriatici sinu rapibus inani arbores flare, quæ camu ortu hoc effunderent gummi, &c. nam varias aliorum quam plurimorum de succ. nō sententias recenlet, quas ne longiores sumus, misiss facimus. Capite autem tertio i post falsis multorum opinionibus, huius ortum cœtus monstrat, sic dicens: *Certum est gigni in insulis septentrionalis oceanus & a Germani appellari glessum, itaque & a nostris nam insularum ob id Glessariam appellatum, Germanico Cæsare ibi classibus rem gerente Austrauam a Barbari dictam. Nascitur autem defluente medulla pini generis arboribus, ut gummi in cerassi, resina pini. Erumpit humor abundantiæ, densatur rigore vel tempore autumnali. Cum intumescens affluat, rapit ex insulis, certe in littore expellatur, ita volabile, ut pendere videatur, atque confidere in vado, quod arboris succum esse prisci nostri credere, ob id succinum appellant. Pinea autem arboris esse indicio est pincum in attritu odor, & quod accensum sedemodo ac nidore flagret. Afferitur a Germani in Pannoniam maxime proueniam. Inde Veneti primum, quos Græci Henetes vocant, rei formam fecere, proximi Pannonia, id accipientes circa mare Adriaticum. Hæc ille;*

Glessaria.

D Plinio subscibit Solinus capite trigessimotertio in hunc modum: *Glessaria dat succinum, quod Germani gentilititer vocant glessum. Qualitas materiam istius summatim antea, Germanico autem Cæsare omnes Germani a oras seruant ante comperta est arbor pini generis, cuius medulla autumnali tempore succino lachrymat. Succinum esse arboris de nōminis capissus qualitate. Pinea arboris vnde sit gennitum, si offerri odor inducitur. Precium opera est ira longius, ne Padanæ fluvius credatur lapidem stenuisse. Hanc speciem in Illyricum Barbari intulerunt. Quæ cum per Pannonicæ commercia usu ad transpadanæ humidæ fores delata, quod ibi primum nostri eam viderant, ibi & natam putauerunt. Cornelius autem Tacitus succini prouenit meliorem tenuens in li de situ, moribus & populis Germania, tradit Effuorum gentes mater scrutari, & solos omnium succinum, quod ipsi Glesum vocant, inter vada atque in ipso littore legere: Glesum autem nō olim appellarunt, quod instar vitri pelluceat, nam Germani vitrum Glessi nominant. Sunt autem Effui, vel ut Rhennanus legit Aschi, qui hodie Pruteni seu Borussii vocantur, apud quos nunc ut olim succinum colligitur, cuius nuper magnam copiam multiuigæ eruditionis vir Martinus Gierbicus; Illustrissimus Principis Alberti Marchionis Brandenburgensis & Borussii ducis archiatros; pro amicitia nostræ iure ad nos transmisit. Abundare autem hanc ortam Borussii succini notius est quam ut multa demonstratione egeat: quum enim velut peninsula sit, ob sinuosos maris flexus, terramque spaciōse in freta excurrentem; sic vt vi tempestatum in hanc succinum aduehatur. De qua re multa quoque scribit Erasmus Stella Libonothanus libro primo, de Borussii antiquitatibus. Proinde aberrare omnes constat, qui ex populo arbore iuxta Eridanum fluvium succinum colligi putat, quum Plinio & experientia ipsa docentibus; potius in Borussia regione, a qua procul abest Eridanus, proueniat. Neque Dioscoridi, ut obiter moneam, ea quæ tum ferebatur fama, ex populi resina succinum dari probatur, ex quo inquit, ferri id & narrari, id quod etiam Marcellus Virgilius monuit. Dioscoridi autem hæc sunt verba: *inquit N. probo.**

Glesum sue
ciōd quæ
dictum.
Effui sue
Achi qui
Martinus
Gierbicus
Borussia.

Dioscoridi
fibula de
succino 26
probo.

Et si quis dixerit lachrymam esse in Padum amnem defuiss. durari ac densari, ferique quod electram vocant. Eo nanque quod ait, *fertur*, indubium est id commentum non probare, quod vulgo dicebatur succi in quodam effe populi arboris lachrymam in Eridanum defluentem illique induratum. Ceterum vniuersam Succini histioria fusius & verius, quam Plinius in *uestigio commentarii* in nonum Galeii librum de *simplici medicam facultate*, tradidimus. E igitur lector recurat. Quam incognitum vero fuerit Carabe Aueniennae, facile est et qui putigantes eius de huius temperamento sententias expendere velit. Capite enim 374. *secundum Canonis*, Carabe parumper esse calidum statuit: id quod & in libello de *tribus cordis tractat*. *secundum*, facit, calidum in primo, & siccum in secundo dicens. Mox vero pro sua inconstantia subdit, *Opinio tamen est quod sit frigidum*. Capite vero 344. eiusdem Canonis, *Carabe gummi calidissimum esse* docet, quod capite 510. iis confirmat verbis: *Et ius gummi est calidum in calidissimo*. Quod idem diximus, ut verum Aueniennae inconstantiam Medici & artis studiosis indicaremus, quo ita sibi facilius prouiderent ne in hunc auctorem impariti incidenter, nequillum magno suo & aliorum periculo sibi imitandum temere proponerent.

Haud recte Anticannum & Meijnen herbam Metzercon, qua a Gracis Chamelæa dicitur, inter laciariorum genera connumerare, ac cum Thymelæa confundere: multa quoque Chamelæonti debentur, nominibus vicinate deceptus Chamelæa tribuere. C. A. P. XXII.

FRASSE toto celo in Mezezon descriptione Auicennam, Arabesque reliquos, eorundem verba, vulgare commoñstrant. Auicenna eniū capite 467. secūdi Cane-
nis, Mezezon ita depingit: *Mezezon est lallicinium magnum quod est duorum modorum: v-
nus eorum est magna habens folia & spissa, & hoc est deterius amborū & quod nigrum est perni-
ciosum existit. Aliuū Mezezon est, in quo sunt folia plurima, & similia foliis oliuę, & subri-
liora: est acutius exortatiuū, & eius acrimonia est vebement. Nec aliter Mesue in suo de
simplicib. med. libro illud describit, dicens: Mezezon est planta vocata apud Persas rapens vi-
tam, cuius stirpes eleuatur super terram circiter cubitos duos, & eius folia sunt similia foliis oliuę
sed maiora, & producti grana nigra in magnitudine fructus myrti. Est & planta lallicinium
maiorum, cuius species sunt plures. Est enim quaedam magna habens folia & subtilia. Est & par-
ua habens folia sicut oliuę folia & spissa nimir: & est folia habens crispā & aspera, & ex eis aliud est
colorem habens viridem, & aliud habens colorem subnigram. Hinc animaduertendum om-
nium primum, Mezezonem esse herbam, quę Gręcis Chamelę vocatur, id
quod prater Serapionem, qui Mezezon Gręci Chamelazā dicitur, huius descri-
pti, quoque aperte demonstrat, hæc enim probe cuius, quę iam ex Arabum sen-
tentia regulum quę itar Chamelazā vero Dioscorides li. quarto c. 162. ita pingit:
χαμαίολος αἰθέρης ἄσπετον ἄνθος ἔχει, ἡ δὲ βλάστης ὀρεσάνθηται. φύλλον ἰσχυρὸν ὡς ὀλίβου, ἀντήρην δὲ τῆς ἀνθήκης ὡς τοῦ
καυκάου τῶν γαλαρῶν, ἀντήρην τὴν ἐν ἰνδοῖς. quod est, Chamelę adorientales ramos habet, frutes-
culosus folia olivę similia habet, tenuior tamen, frequentia & amara, gustum mordentia & arte-
riam scarificantia. Quam sane descriptionem pulchre cum eo Mezezon, quod melius
ab Auicenna, a Mesue autem minus dicitur, quadrare videmus, adeo vt nemo dubi-
tare possit Mezezon in Arabum, Gręcorum Chamelazā esse. Porro hoc demonstra-
to, nemo non videret errare Arabes, quod in iherusalatias herbas Mezezon connume-
rant, nullus enim ex veteribus Chamelazā, quę nihil aliud est quam Mezezon, vt
proximas, in herbas, quę lac habent, collocavit, id quod patet Dioscoridem, Gale-
num, & alios eius farinæ a doctores diligenter excutienti. Est ei genere lalatiorum es-
set, aliqua certe Tithymalorum species, aut alia quedam lalatia herba, a veteribus,
Dioscoride præsertim, descripta esset, id tamen quod affirmare nemo potest, quod
nulla illarum descriptio Mezezon competere queat. Quod autem Arabes, Mesue
pręcipue, Mezezon seu Chamelazā cū Thymelęa confuderint, ex illorum verbis
quoque demonstrabimus. Nam cum Mesue ait, eius stirpes eleuatur super terram cir-
citer cubitos duos, & producit grana nigra in magnitudine fructus myrti, ad Thyme-
lazā certe referendum erit, de qua lib. 4. cap. 162. ita scribit Diosc. *Thymelęa ἰσχυρὴ δὲ ἀνθὸς ὡς τοῦ
καυκάου τῶν γαλαρῶν, ἀντήρην τὴν ἐν ἰνδοῖς. ἡ δὲ βλάστης ὀρεσάνθηται. φύλλον ἰσχυρὸν ὡς ὀλίβου, ἀντήρην δὲ τῆς ἀνθήκης ὡς τοῦ
καυκάου τῶν γαλαρῶν, ἀντήρην τὴν ἐν ἰνδοῖς.* id est: Thyme-
lęa ramos edit speciosos & multos binum cubiterum. Folia Chamelęa similia, inter vna fructus*

Carabe Aut
cena inco
grano.

Meerion
Gracia cit
Chamela

Microsomus
invar lacta
riae herba
non comm
munda.

ArabisCh
melzam c
Thymelae
confundit

S. L. THAM

A tanquam acrimo quiddam simile gustu & odore refert. Valentis lingua inflammationem facit, omnia etiam excrementa supprimit, & cum animi deliqua intestinorum strepitum & tumultum excitat, nec quicquam tamen excrementum. Opem adfert post vomitionem, aut alui dejectionem, cum largiore vino, aut oxymelle, aqua in qua abstinendum maduerit posita, ita ut nihil clarius sit quam Auic. cum Ixia confudisse Thapsiam, atque adeo utriusque vires ac naturam ignorasse. Si enim Thapsie naturam satis perspectam habuisset, non quam certe illam esse sylvestris rotæ gammis scripisset, id tamen quod non solum vno in loco, sed variis facit, præsertim cap. 710. secundum Can. & Fen. 6. Can. 4. toties iam elati, Minime autem Thapsia alio nomine rura sylvestris, sed ferulæ potius sylvestris, aut ferulago dicitur. Testis Diofcor. qui ita scribit: *Thapsia autem est ferula sylvestris, quod est Thapsiam Romanam ferulaginem, alius ferulam sylvestrem, quod tota natura ferula similis sit, appellatur.* Perro ignorasse Thapsiam

Thapsia autem est sylvestris rotæ gammis. Thapsia alio nomine ferula sylvestris dicitur.

B alius ferulam sylvestrem, quod tota natura ferula similis sit, appellatur. Perro ignorasse Thapsiam Auic. inde etiam colligi potest, quod libi ipsi in Thesiis contradicit. In secundo enim Can. docet, quod in radice eius, & corticibus ipsius, & lachryma eius, est solutio, id quod & Diofcoridem, ut supra annotauimus, fecisse constat. Fen. vero 6. Can. quartum contrarium plane tradit, nempe quod accidat ei, qui Thesium bibit, retentio eorum omnium, quæ currunt ex utrisque viis. Quis autem tam stupidi est animi, qui retentionem & deiectionem excrementorum contrarios esse effectus non intelligat? Sed quid multis moror? Si Auicenna Thapsiam ab Ixia veneno secernere potuisset, non quam sibi tam pugnantia docuisset. Hic rursus monitus esse volo medicinas solidioris studiosos, quo sibi vel hinc etiam cauere discant, ne Auicennæ decreta, tanquam Del-

Auicenna libi ipsi in Thesiis contradicit.

C phica quædam oracula suspiciant, id quod magna hodie inruditorum Medicorum pars facit, quod vniuersa facere illius ambigua & inter se mire pugnantia sint. Neque est, cur de illo mirentur: transcripserim enim cum aliorum tantummodo fuerit, singula vera, falsa, sine iudicio & nullo habito delectu, ut eunque sese obtulerunt corrasit, nec aliud studuit, nisi ut Canonem suum ad iusti voluminis magnitudinem deduceret, non animaduertens, quomodo temere consarcinati centones sibi responderent, perinde ac si cæcæ, quæ collegerat, esset obtrusurus.

Auicenna vniuersa facere decreta ambigua & inter se pugnantia.

Herbas quatuor, Alsinen, Helxinem, Anagallidem, & Myosotida, natura & figura plurimum distantes, Auicenna uno eodemque capite sub Auricula muris appellatione confudisse.

C. A. P. XXV.

D A VICENNAM iam dictas quatuor herbas confundere, ex eiusdem verbis, quæ capite 12. secundi Canonis scribit, monstrabimus. *Auricula, inquit, muris est herba, cuius virtus secundum Galenum propinqua est virtuti herba, qua vitrum abstergitur.* Quibus sane verbis Auicenna herbam Alsinen dictam depingit, quæ helxini vitæ extremitati valisimiles vires obtinet. Testis est Gal. qui lib. 6. de simpl. med. fac. Alsinen ita describit: *Alsinen ipsa facultatem helxines habet, nempe refrigerantem & humectantem.* Diofcor. quoque qui lib. 2. capite 17. ita tradit: *Alsinen ipsa virtutibus vitæ admodum similis est.* Alsinen in vniuersum eadem, quæ helxine potest. Quibus subscribit Paulus in septimo dicens: *Alsinen vires omnino aequales habet ei quæ dicta est Helxine.*

E Et Plinius lib. 27. cap. 4. inquit: *Alsinen emendat omnia, quæ Helxine sed infirmum.* Per herbam vero, quæ vitrum abstergitur, Auicennam intellexisse Helxinem, notius est, quam, ut demonstrari debeat, illam enim in extergendis vitris esse videntem omnes testantur veteres, in primis Galenus, qui lib. 6. de simpl. med. fac. de Helxine in hunc modum scribit: *ut vitrum abstergetur, vitæ muris est herba, quæ vitrum abstergetur.* quod est: *Eadem extergenda experimentum præbet & in vitris vitreis.* Nec al. unde certe Viceolaris, seu, ut vulgo nominatur *Vitriola*, dici coepit, nisi quod extergendis vitæ oculis, valisque vitreis, experimèto esse efficax inuenta sit. Ceterum post id in citata verba Auicenna ita inquit: *Et hoc nomen concessum est duabus herbis, quarum una est, quam nominat Galenus. Quæ quidem verba vera sunt: inter-*

Helxine vitæ admodum similis est.

Vitriola.

F men alsinæ quoque herbæ ab auctoribus tribuitur, quod folia muris auribus similia habeat. Ita Diofcor. ad al. inquit: *Alsinen nonnulli auriculam muris vocant.* Et Gal. ad al. inquit: *hoc est, Alsinen, aut auricula muris.* Paulus denique: *Alsinen, quæ aliqui Græcorum auriculam muris nominant.* Plin. quoque: *Alsinen, quæ quidam Myosotem appellant.* Licet aut auriculæ muris alsinæ cū ea verba, quæ proprie Myosotem dicitur comune sit, tamen differunt

E E e 4

A dos, vllum eorum esse posse vsum expertus sit, adeo vt Arabum post Galenum medicatracantium experimentum nobis obici non queat. Si enim Galenus diligentissimus omnium medicæ materiæ facultatis explorator, nihil in illis, quod vel ad sanitatem tuendam, aut morbos curandos eonderet, explorari potuit, non est cur credamus, Arabes id ipsum inuenisse, qui ne vmbra quidem Galeni, quantum ad eruditionis & ingenij acumen atque perspicacitatem attiner, assecuti sunt. Galeno subscribit Plinius, non illenaturalis huiusmodi scriptor, sed huic posterior, Valerianus Medicus vocatus, lib. 4. de re med. cap. 46. de Ziziphis dicens: *Zizipha medicam cibum corpori præstant, licet illis sapor nonnulli gratia lenocinetur.* Habent tamen plurima incommoda, ægre concoquantur, sitim accendunt, prægrauant stomachum, difficultum reddunt officium ventris.

B Quinetiam Auicenna ipse capite iam citato Galeni sententiam probat, & suam acerrime damnat, suoque sese, vt dicitur, iungulat gladio, inquit: *Sermo quidem in eis bonus est ille, quem dixit Galenus: non reperi iuiubas in conseruanda sanitate, & remouenda agriualine aliquid operantes, sed reperi eas difficili digestione, & pauci nutrimentum.* Præterea ex iam dictis perspicuum fit, intingenter falsi iuniores Medicos, Razim imitantes, iuiubas ad purificandum sanguinem, ferè vt illi loquuntur, ad sanguinis mundificationem, & aluum leniendam, passim adhibentes, cum iam fieri non possent, quandoquidem ventriculo inutiles sint, difficile uterque concoquantur, vt sanguinem purificent: crassiores certe multo quantan ea fuerit reddunt, tancum abest vt puriorem facere possint. Id quod verum esse Auicennæ etiam illorum principis testimonio conuincimur, qui ita in capite de iuiubis inquit: *Ingressant sanguinem, & id ipsum viscosum faciunt.* Erilorum existimatio, qui putant, quod ipse clarificetur sanguinem & lauent cum, est existimatio corrupta, ad quam ego non declino; & nutrimentum earum & digestio sunt amandicia. Quid per superos oribus verbis aperius sita vt mirari non satis possim, qui factum sit, vt conuenientibus oculis hunc locum pertransierint, cum tamen assidue Auicennam, præ illo omnibus aliis contentis auctoribus, in manibus habuerint. Manifestissimum itaque est, errare id vniuersum luniores, quod iuiubas fructui aliquem esse in sanguine purgando, & aluo lenienda vsum docent, quom tamen constat quicquam ad eadem conducere posse. Facultates autem nonnullas quas illa fructui tribuunt, soli sradici & cortici potius eius arboris iuiubas ferentis conueniunt, vt est mellearescens, & ad vesicæ dolores prodesse. Testis eius reit Plinius ille Valerianus est, dum libro paulo ante citato in hunc modum scribit: *Folia tamen ipsa contrita & imposta spleneticos & hydropicos adiuuare certissimum est. Radices & cortices eadem virtus habet, quorum succus ex melle coctus in summitatibus, cum mero mixtus iedri medetur, vesicam leniat, urinam largiunt.* Quomodo autem Galeni, Plinique & Arabum sententia inter se pugnant concilianda sint, iam primo nostrarum de stirpibus commentariarum in historia Ziziphi monstrauimus. Ad hunc igitur locum, ne idem nobis ferè dicendum sit, lectorem amandamus. Verum hic nobis aduersatur Montuius, ac suam temeritatem pulchre prodit, telluris ratione simplicium medicamentorum commoditates effectusque commutari dicens, vt huius de Persica plantæ in Ægyptum translata: atq; adeo in Galeni patria iuiubas seu Zizipha vsui Medico inutilia fuisse faretur, nostras autem hodie salutares. Quomodo enim in Pergamo tantum inutiles fuisse iuiubas afferre potest Montuius, quasi illic solum & nusquam alibi medicinam professus sit Galenus, quom tamen constat, illum varia perustrasse loca, & in Italia etiam, Roma nimirum cibitate, omnium tum maxima, ægrotis curandis operam dedisse. Quare easdem, quas Montuius, ipse etiam agnouit iuiubas, illasque iuste, vt pote inutiles expertus, damnauit. Et ne id transeamus, merito accidit Montuius, vt dum Arabes suos ab errore vindicare nititur, ipse in errorem alium incideret, vt recte sibi illud occini possit: *non per se ipsa in Ægyptum, vt alij opinantur.* Neque enim Persica planta, vt ille putat, in Ægyptum translata pristinas in re sciendi vires amisit, sed Persica potius, quæ a Persica arbore diuersa est. Testis est Dioscorides, qui seorsum de vtraque scribit, id quod Galenus etiam facit. Libro enim 7. de simpl. med. facult. de Persica agit, in 8. autem de Persica. & in lib. 2. de alimentor. facult. ubi iterum seorsum de vtraque tractat. Quod vero Persica fuerit, quæ in Ægyptum translata vires amisit, testantur quæ scribit Dioscorides lib. 1. cap. 155. ubi inquit: in hunc modum: *non Dioscorides hanc esse affert, atque per se ipsam, per se ipsam de se ipsa Dioscorides &*

Montui ob
iudicio ca
piodit.
Arabes Ga
leno inge
nit acumi
ne impare
Plinius Me
dicus.

iuiuba su
pplent non
purificanc.

Nonnulla
que huius
radici &
cortici tri
buendo a
tate, Ara
bes perper
a fructum
estimant.

Montui in
dendens so
luta non
felleur.

Persica dis
tincta a Per
sica.

Persica in
Ægyptum
translata
vires inter
dicens a
misse.

C conuincimur, qui ita in capite de iuiubis inquit: *Ingressant sanguinem, & id ipsum viscosum faciunt.* Erilorum existimatio, qui putant, quod ipse clarificetur sanguinem & lauent cum, est existimatio corrupta, ad quam ego non declino; & nutrimentum earum & digestio sunt amandicia. Quid per superos oribus verbis aperius sita vt mirari non satis possim, qui factum sit, vt conuenientibus oculis hunc locum pertransierint, cum tamen assidue Auicennam, præ illo omnibus aliis contentis auctoribus, in manibus habuerint. Manifestissimum itaque est, errare id vniuersum luniores, quod iuiubas fructui aliquem esse in sanguine purgando, & aluo lenienda vsum docent, quom tamen constat quicquam ad eadem conducere posse. Facultates autem nonnullas quas illa fructui tribuunt, soli sradici & cortici potius eius arboris iuiubas ferentis conueniunt, vt est mellearescens, & ad vesicæ dolores prodesse. Testis eius reit Plinius ille Valerianus est, dum libro paulo ante citato in hunc modum scribit: *Folia tamen ipsa contrita & imposta spleneticos & hydropicos adiuuare certissimum est. Radices & cortices eadem virtus habet, quorum succus ex melle coctus in summitatibus, cum mero mixtus iedri medetur, vesicam leniat, urinam largiunt.* Quomodo autem Galeni, Plinique & Arabum sententia inter se pugnant concilianda sint, iam primo nostrarum de stirpibus commentariarum in historia Ziziphi monstrauimus. Ad hunc igitur locum, ne idem nobis ferè dicendum sit, lectorem amandamus. Verum hic nobis aduersatur Montuius, ac suam temeritatem pulchre prodit, telluris ratione simplicium medicamentorum commoditates effectusque commutari dicens, vt huius de Persica plantæ in Ægyptum translata: atq; adeo in Galeni patria iuiubas seu Zizipha vsui Medico inutilia fuisse faretur, nostras autem hodie salutares. Quomodo enim in Pergamo tantum inutiles fuisse iuiubas afferre potest Montuius, quasi illic solum & nusquam alibi medicinam professus sit Galenus, quom tamen constat, illum varia perustrasse loca, & in Italia etiam, Roma nimirum cibitate, omnium tum maxima, ægrotis curandis operam dedisse. Quare easdem, quas Montuius, ipse etiam agnouit iuiubas, illasque iuste, vt pote inutiles expertus, damnauit. Et ne id transeamus, merito accidit Montuius, vt dum Arabes suos ab errore vindicare nititur, ipse in errorem alium incideret, vt recte sibi illud occini possit: *non per se ipsa in Ægyptum, vt alij opinantur.* Neque enim Persica planta, vt ille putat, in Ægyptum translata pristinas in re sciendi vires amisit, sed Persica potius, quæ a Persica arbore diuersa est. Testis est Dioscorides, qui seorsum de vtraque scribit, id quod Galenus etiam facit. Libro enim 7. de simpl. med. facult. de Persica agit, in 8. autem de Persica. & in lib. 2. de alimentor. facult. ubi iterum seorsum de vtraque tractat. Quod vero Persica fuerit, quæ in Ægyptum translata vires amisit, testantur quæ scribit Dioscorides lib. 1. cap. 155. ubi inquit: in hunc modum: *non Dioscorides hanc esse affert, atque per se ipsam, per se ipsam de se ipsa Dioscorides &*

D conuincimur, qui ita in capite de iuiubis inquit: *Ingressant sanguinem, & id ipsum viscosum faciunt.* Erilorum existimatio, qui putant, quod ipse clarificetur sanguinem & lauent cum, est existimatio corrupta, ad quam ego non declino; & nutrimentum earum & digestio sunt amandicia. Quid per superos oribus verbis aperius sita vt mirari non satis possim, qui factum sit, vt conuenientibus oculis hunc locum pertransierint, cum tamen assidue Auicennam, præ illo omnibus aliis contentis auctoribus, in manibus habuerint. Manifestissimum itaque est, errare id vniuersum luniores, quod iuiubas fructui aliquem esse in sanguine purgando, & aluo lenienda vsum docent, quom tamen constat quicquam ad eadem conducere posse. Facultates autem nonnullas quas illa fructui tribuunt, soli sradici & cortici potius eius arboris iuiubas ferentis conueniunt, vt est mellearescens, & ad vesicæ dolores prodesse. Testis eius reit Plinius ille Valerianus est, dum libro paulo ante citato in hunc modum scribit: *Folia tamen ipsa contrita & imposta spleneticos & hydropicos adiuuare certissimum est. Radices & cortices eadem virtus habet, quorum succus ex melle coctus in summitatibus, cum mero mixtus iedri medetur, vesicam leniat, urinam largiunt.* Quomodo autem Galeni, Plinique & Arabum sententia inter se pugnant concilianda sint, iam primo nostrarum de stirpibus commentariarum in historia Ziziphi monstrauimus. Ad hunc igitur locum, ne idem nobis ferè dicendum sit, lectorem amandamus. Verum hic nobis aduersatur Montuius, ac suam temeritatem pulchre prodit, telluris ratione simplicium medicamentorum commoditates effectusque commutari dicens, vt huius de Persica plantæ in Ægyptum translata: atq; adeo in Galeni patria iuiubas seu Zizipha vsui Medico inutilia fuisse faretur, nostras autem hodie salutares. Quomodo enim in Pergamo tantum inutiles fuisse iuiubas afferre potest Montuius, quasi illic solum & nusquam alibi medicinam professus sit Galenus, quom tamen constat, illum varia perustrasse loca, & in Italia etiam, Roma nimirum cibitate, omnium tum maxima, ægrotis curandis operam dedisse. Quare easdem, quas Montuius, ipse etiam agnouit iuiubas, illasque iuste, vt pote inutiles expertus, damnauit. Et ne id transeamus, merito accidit Montuius, vt dum Arabes suos ab errore vindicare nititur, ipse in errorem alium incideret, vt recte sibi illud occini possit: *non per se ipsa in Ægyptum, vt alij opinantur.* Neque enim Persica planta, vt ille putat, in Ægyptum translata pristinas in re sciendi vires amisit, sed Persica potius, quæ a Persica arbore diuersa est. Testis est Dioscorides, qui seorsum de vtraque scribit, id quod Galenus etiam facit. Libro enim 7. de simpl. med. facult. de Persica agit, in 8. autem de Persica. & in lib. 2. de alimentor. facult. ubi iterum seorsum de vtraque tractat. Quod vero Persica fuerit, quæ in Ægyptum translata vires amisit, testantur quæ scribit Dioscorides lib. 1. cap. 155. ubi inquit: in hunc modum: *non Dioscorides hanc esse affert, atque per se ipsam, per se ipsam de se ipsa Dioscorides &*

E lutares. Quomodo enim in Pergamo tantum inutiles fuisse iuiubas afferre potest Montuius, quasi illic solum & nusquam alibi medicinam professus sit Galenus, quom tamen constat, illum varia perustrasse loca, & in Italia etiam, Roma nimirum cibitate, omnium tum maxima, ægrotis curandis operam dedisse. Quare easdem, quas Montuius, ipse etiam agnouit iuiubas, illasque iuste, vt pote inutiles expertus, damnauit. Et ne id transeamus, merito accidit Montuius, vt dum Arabes suos ab errore vindicare nititur, ipse in errorem alium incideret, vt recte sibi illud occini possit: *non per se ipsa in Ægyptum, vt alij opinantur.* Neque enim Persica planta, vt ille putat, in Ægyptum translata pristinas in re sciendi vires amisit, sed Persica potius, quæ a Persica arbore diuersa est. Testis est Dioscorides, qui seorsum de vtraque scribit, id quod Galenus etiam facit. Libro enim 7. de simpl. med. facult. de Persica agit, in 8. autem de Persica. & in lib. 2. de alimentor. facult. ubi iterum seorsum de vtraque tractat. Quod vero Persica fuerit, quæ in Ægyptum translata vires amisit, testantur quæ scribit Dioscorides lib. 1. cap. 155. ubi inquit: in hunc modum: *non Dioscorides hanc esse affert, atque per se ipsam, per se ipsam de se ipsa Dioscorides &*

F per se ipsa in Ægyptum translata vires amisit, testantur quæ scribit Dioscorides lib. 1. cap. 155. ubi inquit: in hunc modum: *non Dioscorides hanc esse affert, atque per se ipsam, per se ipsam de se ipsa Dioscorides &*

- A** argumentum negativæ ab illius auctoritate dictum invalidum penitus esset. Venon
 valem argumentum, *Dioscorides non meminit Sideritidis, nullas igitur vires habet.* Aut ita:
Dioscorides Sideritis herbam non depingit, minime igitur ex eo succus, quem sanguinem Draconis
appellunt, colligitur. Sed quid minus moror? Fateatur oportet Montanus, vt cunque rin-
 gatur, me neque hic neque alibi solus Dioscoridis auctoritate, quamvis, vt iam demon-
 strauimus, ad probationem sufficere posset, vsum esse, sed simul Galeni, Pauli, Plinii,
 ac aliorum probantissimorum Medicorum adiunxisse testimonia, ita vt rectius ferme
 huiusmodi argumenta a testibus, quam vnus auctoritate ducta esse videantur. Pro-
 inde quicquid garrat bonus ille senex, probare tamen nunquam poterit, sanguinem
 Draconis herbæ Sideritidis esse succum, quandoquidem succus ex Achillea Dioico-
 ridis, vel Sideritidis Achillæ Galeni expressus, sanguinis colorem non referat. Non ta-
 men inficiasimus, imo constanter affirmamus, Serapioni sanguinem draconis, non
 esse nisi inimitatam iam herbam. Quod nos etiam, primo nostrorum de stirpium commen-
 tarium, tom. in Achillæ historia, quam plurimis atque efficacissimis rationibus de-
 monstrauimus. Quare Achillæ herbæ succum Serapio sanguinem draconis appella-
 re huius debuit. Quinetiam hec Auicenna ipse sanguinem Draconis 2. Canone
 ex professoribus, eius herbæ aut alterius succum esse docet, sed rubeum esse suc-
 cum simpliciter scribit. Neque ego relictor, vt succum esse non credam. Vt credam
 enim mihi persuasit Alosius Cadamustus Venetus Patricius, qui cap. 4. *sua natiuitate*
nis, Sanguinem draconis lachrymam arboris cuiusdam Africanæ esse tradit. Nam
 C. *flato, inquit, anni tempore, arbore: ferre faciant, que ubi sunt incisa, anno sequenti gummam e-*
mitunt per incisiones. Gumma vero albenis desipita & defecata, sanguis efficitur, quem appellant
Draconis. Eius arbor producti fructum cerasi instar mense Martio, gustu eximium, coloris veneti,
 quemadmodum copiosius lib. de med. compositione cap. 10. monstrauimus. Hinc cisi succum
 esse arboris vel herbæ Sanguinem draconis esse fatemur, succus tamen Sideritidis
 non erit: neque enim hæc herba si uctum instat cerasi producit, nec vllus veterum e-
 iusmodi rubeum succum illum esse credere memorie prodidit. Ceterum duplex esse
 genus eius, quod sanguinem draconis in officinis appellant quibusdam videtur, alte-
 rum *rubrum*, quod illi sincerum nec adulteratum, ac Cinnabarinum Dioscoridis esse cum
 Leonico putant, quod potius pictores quam Medici ipsi, haud aliter quam olim
 D. Cinnabari vrantur, quodq; in picturis proprie sanguinem reddat, & antidotis, medi-
 camentisq; vtilissimum sit. Præterea quod hoc non minus care, quam Cinnabaris ven-
 datur. Atque horum sententiam probare non possum, quod Dioscorides suam Cin-
 nabarin inter metalla recenset, minimeq; succum ex arbore vel herba expressum
 quæat. Accedit quod is sanguis draconis qui illi sincerus esse videtur, & in officinis
 quibusdam prostat, carum haud vendatur, & satis magna copia afferatur, secus atq; Dio-
 scoridis Cinnabaris, que magno constabat, & tam pauca afferebatur, vt verticolori-
 bus pictorum lineis vix sufficeret. Quapropter alterum hoc officinarum sanguinis
 draconis genus, aut liquor ille Africanus, aut certe is qui ex herba exprimitur, quæ
 hodie vulgo sanguis draconis appellatur, de qua in nostris de stirp. hist. commentariis
 E. copiose scriptum est. Porro alterum sanguinis draconis genus, de quo prædicti scribunt
 atrum, inque orbem quasi circumactum, compressum tamen, & in globum non af-
 surgens, non est nisi sanguinis draconis genus factitium & adulteratum. Siquidem ex
 hircino sanguine, bolo armenia & Sorborum succo constat.

Cenabrium vulgo vocatum, a Cinnabari veterum diuersum esse.

C A P. XXX.

- C**ENABRIUM vulgo hodie dictum inter venena recenseri, notius est quam vt
 demonstratione opus habeat. Inter venena enim Antonius ille Guainerius col-
 locat, adeo vt inter ea medicamenta quæ intra corpus adsumuntur, ob veneni quod
 habet maleficium referri non queat. Factitium namque est, & a Chymistis ex argenteo
 F. viuo & sulphure conficitur. Argentum autem viuum a Dioscoride ac aliis veteribus
 inter venena connumerari nemo est qui nesciat. Veterum autem Cinnabaris diuum
 est generum. Vna quidem a Theophrasto & Galeno descripta, quæ non est nisi Mi-
 nium nativum. Hæc præinde a recentiorum Cenabrium, veneratum est. Alte-
 ra vero Dioscorides, de qua libro 5. de materia medica cap. 100. ita scriptum reliquit,

Alosius Ca-
damustus.

Duplex san-
guinis dra-
conis ge-
nus.

Cenabrium
notum ve-
terum
est.

Cinnabaris
antiquorum,
est aliorum
sanguinis
draconis
genus.

Acceperit. Proinde capite 4. 2. secundi Canonis suæ ætat s Medicos nota. quod non verò Buglossio uteretur, id est, quod non easdem eam illo facultates & communitates haberet. Cum l aque ex am dicitur eui lent r demonstratum sit B r agine. nostram veterum esse Buglossum, prudenter admodum facient Medici. sicuti B glossum veterum in vsum Medicum adhibuerit, ut pro illo B r aginem nostram potius quam illam quæ vulgo Bugl illa appellatur. & Græcorum Echion est, ac eperint id quod si fecerit. sentiant & securitas quas illi adscribunt aut qui facul. ases.

Sandaracam Arabum & horipissas sequentium a Sandaraca Græcorum & Latinorum non solam formam, sed virtutem etiam esse diuersam.

CAP. XXXIV.

A R A B U M Medicorum schola Sandaracam gummi quoddam esse credit. Testis est Serapion, qui cap. 57. sui desimpl. medicamentis libri de illa sic tradit: Sanda. æ est vernix gummi. Et paulo post ex auctoritate Illac: Est gummi, inquit, citrini coloris, simile Karabe, sed non est ita durum sicut Karabe, & est in eo parum alii ritudinis, & affertur a terra Christianorum. Arabes vulgus Medicorum sequitur, ac Sanda. acam hanc aliter quam illi gummi, quod Vernix dicitur, esse putant. Cœotta Græci & Latini auctores suam Sandaracam inter metallica recensent, duplicemque faciunt: vnam fossililem, quæ in auratis & argenteis metallis reperitur. Hanc teste Dioscoro lib. 5. cap. 77. conuenit esse *gummi, inquit, citrini coloris, simile Karabe, & est in eo parum alii ritudinis, & affertur a terra Christianorum.* quod est: *affatam rissam, friabilem, plantam, puram, Cinnabaris colore, sol-*

Sandaraca quid locum Arabum.

Sandaraci Græcorum.

C P H Y R S I Q U E virtus redolentem. Quod Plin. etiam l. 13. 4. cap. 18. confirmat, sic de Sandaraca scribens: inuenitur in a rariis & argenteis metallis: melior quo magis rassa, quoque magis sulphuris virus redolens, & pura friabilisque. Alteram ficticiam & adultericiam, quæ ex Ceraussa fictile coniecta, ac super carbonibus quo ad colorem rubrum ducta fuerit crematur. Testis Vitruius lib. 7. suæ archite. quæ lib. dicens: Ceraussa cum in fornace equitur, mutato colore ad ignem incendi Sandaraca fit. Hanc ipsam Gal. lib. 4. desimpl. med. fac. Saodycem appellari testatur, ita scribens: *nam ipsi de Arabibus lib. 35. cap. 6. Sandycem aliter sic vult, utpote si hæc ipsa torrea, æqua parte rubricæ admixta. Disserit itaq. forma inter se Arabum & Græcorum Sandaracæ & latr dictis præbarum satis arbitror, quod hæc metallis, illa vero gummi annumeretur. Viribus autem inter se quoque differre quis est qui dubitet? quoniam emittunt res sunt, ferino potest vt in vniuersum æquales facultates habent. Vix enim inquam res duas forma & substantia differentes inuenias, quarum vires non alio modo differrent. Verum eum Arabes Sandaracæ quam illi depingunt, omnia ferme tribuant, quæ Græci suæ etiam adscribunt, videntur omnium euidentissime esse lapii, quod gummi acceperunt ferunt, quæ metallo potius, veterum omnium testimonio fudendur, Ea vt rem apertius cognoscant studiosi, ecce vires ab utrisque illi auditoribus assignatas conferemus. Int r Græcos certe Dioscorides de viribus Sandaracæ ita tradit: *nam ipsi de Arabibus lib. 35. cap. 6. Sandycem aliter sic vult, utpote si hæc ipsa torrea, æqua parte rubricæ admixta. Disserit itaq. forma inter se Arabum & Græcorum Sandaracæ & latr dictis præbarum satis arbitror, quod hæc metallis, illa vero gummi annumeretur. Viribus autem inter se quoque differre quis est qui dubitet? quoniam emittunt res sunt, ferino potest vt in vniuersum æquales facultates habent. Vix enim inquam res duas forma & substantia differentes inuenias, quarum vires non alio modo differrent. Verum eum Arabes Sandaracæ quam illi depingunt, omnia ferme tribuant, quæ Græci suæ etiam adscribunt, videntur omnium euidentissime esse lapii, quod gummi acceperunt ferunt, quæ metallo potius, veterum omnium testimonio fudendur, Ea vt rem apertius cognoscant studiosi, ecce vires ab utrisque illi auditoribus assignatas conferemus. Int r Græcos certe Dioscorides de viribus Sandaracæ ita tradit:**

Sandaraca alio nomine Sandycæ dicitur.

Etiam Sandaraca Arabum dicitur.

E U R O P A E virtus est: *nam ipsi de Arabibus lib. 35. cap. 6. Sandycem aliter sic vult, utpote si hæc ipsa torrea, æqua parte rubricæ admixta. Disserit itaq. forma inter se Arabum & Græcorum Sandaracæ & latr dictis præbarum satis arbitror, quod hæc metallis, illa vero gummi annumeretur. Viribus autem inter se quoque differre quis est qui dubitet? quoniam emittunt res sunt, ferino potest vt in vniuersum æquales facultates habent. Vix enim inquam res duas forma & substantia differentes inuenias, quarum vires non alio modo differrent. Verum eum Arabes Sandaracæ quam illi depingunt, omnia ferme tribuant, quæ Græci suæ etiam adscribunt, videntur omnium euidentissime esse lapii, quod gummi acceperunt ferunt, quæ metallo potius, veterum omnium testimonio fudendur, Ea vt rem apertius cognoscant studiosi, ecce vires ab utrisque illi auditoribus assignatas conferemus. Int r Græcos certe Dioscorides de viribus Sandaracæ ita tradit:*

Sandaraci virtus.

F I N hanc sententiam scribens: *nam ipsi de Arabibus lib. 35. cap. 6. Sandycem aliter sic vult, utpote si hæc ipsa torrea, æqua parte rubricæ admixta. Disserit itaq. forma inter se Arabum & Græcorum Sandaracæ & latr dictis præbarum satis arbitror, quod hæc metallis, illa vero gummi annumeretur. Viribus autem inter se quoque differre quis est qui dubitet? quoniam emittunt res sunt, ferino potest vt in vniuersum æquales facultates habent. Vix enim inquam res duas forma & substantia differentes inuenias, quarum vires non alio modo differrent. Verum eum Arabes Sandaracæ quam illi depingunt, omnia ferme tribuant, quæ Græci suæ etiam adscribunt, videntur omnium euidentissime esse lapii, quod gummi acceperunt ferunt, quæ metallo potius, veterum omnium testimonio fudendur, Ea vt rem apertius cognoscant studiosi, ecce vires ab utrisque illi auditoribus assignatas conferemus. Int r Græcos certe Dioscorides de viribus Sandaracæ ita tradit:*

- L**ibro 7. de simplicium medic. facult. sic dicens: *si colasque si nolisque, suntque in eis magis rari & rariore* 2. *quoniam quoniam, ut dicitur in libro de part. animal. lib. 2. cap. 1. quod est: Sed ut Sacchar, ut* *vocant, quod ex India atque felix Arabia conuectitur, calamus, ut aiunt, conuerfetur. Est vero et* *ipsum mellis species. Hunc Paulus etiam sequitur, & mel esse Sacchar, c. tchis Arabi* *p. attatum ait. P. inus quoque libro duodecimo capite octavo, a iam dictis nihil va-* *riat. in hunc modum scribens. Saccharum & Arabia fert, sed laudatius India. Est au-* *tem mel in arundinibus collectum, gummiu modo candidum, dentibus fragile.* *Amplissimum nucis aulanæ magnitudine ad medicinæ tantum vltim. Quibus in-* *scribit etiam Alexander Aphroditæus lib. 2. probl. 74. in eam sententiam scriben. Quod* *Sacchar Indi appellatur, mellis coagulum est, siue cogente rores, conuerfenteque ad mellis dulcedinem,*
- Q**uam idem in monte etiam Libano fieri certum est. Fit Sacchar id proximum salu glebulu candi-
dum, fragile: vim quoque tergendu & purgandū mellis similem habet. Ex quibus tane verbis eu-
identissimum fit, Saccharum iniquorum nihil aliud esse quam mellis speciem, adeo-
que eadem tane est materia mellis apum, Mânæ & Sacchari, ita ut parum admodum,
quemadmodum ex Alexandro Aphroditæ dictis colligitur, a nunc vocata Arabum
Mannâ differt Saccharum. In hoc autem differre videntur, quod Manna supra alias
plantas, & aliquando supra petras, variis in regionibus reperitur. Saccharum autem, in
felicitatibus Arab a & India in arundinibus, maioribus fructu suo orique duritia, ob
vehementiores illic solis radios, aptioraque ad id tolerandum arundinis folia, co-
agulat. Hinc fit, quod non perinde, ut Manna, alium leniat, quando & inter vocatur
- C**hodie Mannæ, hæc magis subducere alium videntur, quæ sunt in quibuslibet. Saccharum
diuerum esse Saccharum antiquorum iam dictum ab eo, quo hodie zuccarum,
appellatur, satis patebit, ubi quid zuccarū sit, explicauerimus. Est itaque nostrū zuccarū,
quod hoc tempore videtur, sua aptiori generis planta bene contrita expressus, & a
lone ignis plus minusve excoctus, & defæctus. In zuccarum vero tanto can-
didius ac durius euadit, quanto plus ex concoctionis defæcatione lique sustinuit. Proin-
de primam plantam arundinis similem excoquunt, deinde si sua pars secectur, &
zuccarum existit. Hoc iterum coqui potest, atque ita candidius & cōcretius. Quod
si tertio coquatur, maxima in eo & candoris & densitatis fit accessio. Quantum
quantiūque coquoque i flet, donec specie aluminis scissilis fere transluceat.
- D** hocque genus Candidum seu, ut hodie loquuntur, Candium, atque Taberzeih barbaris
vocalibus nominant. Perinde ut olim Saccharum, quod ex India & felix Arabia de-
ferebatur, suapte natura, quia sic nimia solis ex canlescentia obdurauerat, candidum
erat, & dicebatur: ita nostrum zuccarum Candis res factitia est, ex zuccaro quater vel
quinque excocto, maioris quæstus faciendi gratia per seplarios Venetis confe-
cta. Hi harundines etiam immittunt, ut supra hæc videri possit conglomeratum. Glosio
denique inuoluunt si nauis ex orientibus regionibus aduectum putetur. Esse autem
plantam quandam unde zuccarum exprimitur, abunde testantur ea quæ scribit Ma-
nardus nolter, immenitæ & eruditionis & experientia vir. libro suarum Epistolarum mi-
sternatum 2. c. lificet a Lusitanis & Siculis cognouisse plantam, a qua Zuccarum ex-
primitur, humicis locis proprio semine feri, exteriori quidem specie arundinis ma-
gnæ similem, interiore substantia valde dissimilem. Pulposam enim esse, grauem,
mollem, & locci plenam, quam arundo sit e contrario levis, dura, & vacua. Ex qui-
bus omnibus appertus fit, quam ut iterum in dubium vocare debeat antiquorum sac-
charum a Zuccaro nostro esse omnino diuersum. Antiqui enim sacchari materia mel
aceros exsistit, noui autem Zuccari plantæ succus quæ certe ita distant, ut planta ab ac-
qua. Accedit quod forma vtrorumque etiam diuersa sit. Dioscorides enim ac alij
vereres suum saccharum quo ad consistentiam ac concretionem salis modo den-
tibus fragile dicunt. Plinius gummi instar candidum esse etiam scribit. Nostrum contra
priusquam excoquatur, colore potius nigricans & sublaeuum, quam candidum ex-
sistit, nec dentibus perfringitur, sed per succum deglutitur. Efficiens quoque nostrum pri-
mum est forma ipsa plantæ, secundum artem ex calore ignis coquens & defæcans, & de-
um in hanc, quam v demus, metæ formam in ligneis quibusdam vasculis deducens.
Vetere vero saccharum nostris primo frigore agglutinant, dehinc superueniens solis
calor obdurat. Nostrum insuper Zuccarum plantæ & Canaræ im-

Saccharum
antiquorum
accessio
hodie nica
no dicitur.
Zuccarum
quod.

Zuccarum
candidum.

Zuccarum
candis res
factitia

Mannardus

346 Operum Leonhard. Fuchsi Pars I V.

Cadamo-
nus Venet-
tus.

fulis, continet, effigie tantum arundini similis. Hoc Cadamustus Venetus capite A
sexto suar nauigationis, Sacchara harundineta in Medera insula Canarie proxima ef-
fic scribit, non quod arundines sint, sed quod illatum speciem effigie nive prae se fe-
rant. Verba eius haec sunt: Quoniam vero haec insula frequentioribus irrigatur flumi-
nibus, memoratus princeps lachareum harundinetum ibi plantari iussit, ex quo
Sacchari quae plurimum legit. Inde veniunt scitissima Sacchara toto orbe prae-
cipua, primae decoctionis, nec non mixta, & quantum ex aliorum relatu colligere po-
tui, indies meliora Sacchara sperant, quoniam ea insula temperie caeli meliore Sac-
charum suapte natura gignit: nam ea qualitas est plagae illius quae Cyprae & Siciliae. B
Animaduertendum autem quod dicat Sacchara primae decoctionis, quibus verbis
iterum innuit Zucearum hoc quod ex Medera affertur non esse tale, nisi per deco-
ctionem. Confirmat hoc ipsum Brocardus monachus, qui inter alia in tertia sanctorum
descriptione ita inquit. Crescunt ibi cannae molles, ex quibus colligitur Saccharum.
Habent enim haec cannae medullam quandam humidam in modum Sambuci, quae in
peluim expressa, atque in aeneis caldulis decocta, optimum efficitur Saccharum. An-
tiquorum veto in India & Arabia tantum felici in arundinibus, & illarum foliis gigni-
tur. Hoc ad medicinam tantum usum, ut ex Plinio didicimus, accommodabatur: mo-
strum autem ad dapes suauissimas faciendas adaptatur, adeo ut nullum magnificum
iam sit epulum quod non multo sic Zuccaro conditur. Nam qui hoc tempore Prin-
cipum ac potentiorum sunt vel cogni, iuxta proverbium, nullum ferulum
corrumpi Zuccaro existimant. Porro utriusque etiam vires illa inter se differre decla- C

Sacchari
Antiquo-
rum facili-
tates cum
recenti vi-
ribus con-
feruntur.

rant. Antiquorum namque Dioscor. teste, in descriptione saccharum sic dicitur: id est: *alio*
idoneum est, & stomacho utile: nostrum thotaci potius quam ventriculo accommodatum
experitur. Antiquorum denique Galeno & Paulo testibus, hoc est, *situm non*
afferens: nostrum autem non minorem situm, quam mel ipsum excitat: quod certe
quotidianae confirmat experientia. Matthiolus quidem hoc loco meam suggillat in-
terpretationem, quod vel linguae graecae ignorantia, ut multi suspicantur, vel nimio a-
lios reprehendendi studio factum esse constat. Quod vero Saccharum antiquorum
situm non afferat, & cum melle collatum, non minus illo, ut Matthiolus cenet, situm
excitet, & verbis Galeni sit manifestissimum, qui simpliciter dixit illud in *de indur. alim.* id
est, *situm non afferre*, melis nulla facta mentione. Paulus quoque disertis verbis ait, D
quod antiquorum & nostrum saccharum non solum materia, sed & forma, effi-
cientie, loco, viribusque varient, quis tam praefrae contentiosus erit, ut post hac non
differre dicat? Insuper saccharum antiquorum a sale ludo, ut Auiennae enarratores
somniauerunt, non differre, ostendit in primis antiquissimus medicinae scriptor Archi-
genes, id Salem Indicum, & harundinum mel vocans. Paulus quoque *Agnetia lib. 2.*
capite 4. ex Archigenis auctoritate Salem Indicum non diuersum esse a Saccharo in-
nuit, dum ad asperam linguam plurimum conferre scribit, id quod omnium maxi-
medescriptio eius indicat quam ille ponit, ita dicens: dicitur in Indis quod sit in primis inquit E
quod dicitur, Salem Indicum id est: Sal Indicum colore quidem & concretione cum communi sale nihil diffi-
det, gustu autem mellis. Quibus utriusque verbis euidenter admodum ostendit, Salem
Indicum, quandoquidem mellis instar gustanti dulces appareat, a Saccharo antiquo-
rum, quod & substantia & gustu huic simile est, nihil distare: Paulum sequitur Aui-
cenna *Fena Can. 4. tract. 2. cap. 29.* de asperitate linguae febricitantium, ubi inter cetera
sic scribit: Aut teneat in ore tuo salem, qui asportatur de India, & est in colore salis, &
dulcedine mellis. Et sumat de eo secundum quod dixit Archigenes, quantitate fabae
vnius. Quid multis opus est verbis manifestum est voceres, Graecos potissimum,
Saccharum appellasse Salem Indicum, quod scilicet sua concretione sal simile esset,
candoremque ac friabilem in eo siccitatem, & cum dilueretur humore aliquo lique-
factionem, instar salis, ostenderet. Plura in suis epistolis eade re Manardus habet: F

Saccharum
a sale ludo
differt.

Num vero Galenus, ac alii veteres Graeci ac Latini, hodie etiam vicarum Sac-
charum cognouerint, libro primo de compositione medicamento-
rum capite decimo, luculenter ostendimus.

Mem.

Adonequod morbo regio, qui hepatis vitio prouenit, affectus conferat, contulerit, huic ita responsum volo: Lichenem herbam non intro sumtam ad tollendum regium morbum, sed extrinsecus potius adhibitam efficacem esse, idque non alia ratione, nisi quia extergendi facultate prædita sit, qua ut impetigines, ita & cutis forsitatem in regio morbo obortam auferre potest. Proinde si qua herba propter insignem iuuandiceur facultatem hoc nomen insigniri metetur, ea certe Eupatorium Græcorum erit, quæ Hepatorium & Hepaticum Dioscoride etiam teste dicta est, quod hepatis non parum prolixa enim Dioscorides de eadem libro quarto, capite 38, scribit: *vis illiusque & in ian per eum modum in morbo, id est: Semen aut herba in vine pota, iocurorasis confert.* Et Galenus libro 8. de simpli med. facult. in eam sententiam: *vis illius hest in eadem morbo, id est: Obstructiones iecoris expurgat. Inest ei isidem & adstrictio quadam, per quam robur addit visceri.* Quare quod Eupatorium debetur, Lichenem, quam *Hepaticum* vocant, tribuendum non erit. Sed hic nobis reclamat Montuius, ac suis siccis copis nobiscum congredi aude, dicens, aliquot simplicium medicamentorum effectus, & per multa alia quæ priscos latuerunt, posteriores reperisse. Fatemur quidem multa esse hodie in Medicorum sit: quenti vlt, quæ veteribus incognita fuerunt, ut est *Casia Arabum*, & alia nonnulla, nec easse inutilia ob id dicimus quod priscos ignorata sint, quis enim eo stultitia progredietur? Negamus autem constanter quod illarum herbarum quæ veteribus cognita fuerunt, nunc hodie, ac ab illis ignoratos, inuenerint effectus. Nam, ut supra quoque diximus, tanquam experientiam nostri seculi Medici nondum consecuti sunt, ut gloriant possint se quicquam iis medicamentis, quæ Galeno ac veteribus aliis cognita fuerunt, addidisse, inuenisseque in isidem, quod vitis illis ignotum fuerit. Non est itaque par argumentatio, veluti Montuius dialectice rationis non satis petitis putat, si quis ita colligit: Arabum Casia Galeno incognita fuit, ad leniendū igitur alium inutilis, ac si quis in hunc modum argumentetur: Hepatica a Dioscoride ac aliis veteribus probe cognita, ac sub Lichenis nomine descripta, nullas isidem auctoribus iuuandiceur facultates habere inuenitur, iecori igitur minime confert. Prima siquidem colligendi ratio plane inuitis est & invalida, quod argumentum ab eius auctoritate qui rem illam de qua testari debeat ignauit, deductum inefficax sit, quemadmodum supra etiam multis docuimus. Altera vero argumentandi ratio valida admodum existit, quod ab eius auctoritate deductum sit, qui rem de qua testatur absolutissime agnouerit & perfecit. Nec tantum ab vnus Dioscoridis, sed multorum aliorum recta cognitione herbarum prædicatorum auctoritate deductum est, adeo ut hoc genus argumenti a testium numero quoque ductum videri possit. Quare cum suis ineptissimis argumentis Montuius sese in angulum aliquem tutum recipiat, nam talia sunt quæ in planitie ac in aperto consistere non possunt. Et ut id silentio non transeamus, nemo inficias ibit herbam Lichenem, Hepaticam ideo dici posse, quod iecoris fibræ similis sit, & ideo ita nominatam primum ab Herbatilis arbitror, donec Platearius & alii quidam succedentes, aliam quandam & erroneam eius nominis causam confinxerint.

Eupatorium
Hepatorium
quare di-
ctum.

Montui an
nocitio ec-
furat.
Mules ho-
die in fre-
quenti sunt
Medicorū
vlt veteri-
bus inco-
gnita.

Quando ar-
gumentum
ab auctori-
tate ductū
valens, &
quodam mi-
nus.

Lichen est
Hepatica
primum
dicta.

Burgen di & oblatione Hepaticam, & hest illis in eadem morbo, id est: Obstructiones iecoris expurgat. Inest ei isidem & adstrictio quadam, per quam robur addit visceri. Quare quod Eupatorium debetur, Lichenem, quam *Hepaticum* vocant, tribuendum non erit. Sed hic nobis reclamat Montuius, ac suis siccis copis nobiscum congredi aude, dicens, aliquot simplicium medicamentorum effectus, & per multa alia quæ priscos latuerunt, posteriores reperisse. Fatemur quidem multa esse hodie in Medicorum sit: quenti vlt, quæ veteribus incognita fuerunt, ut est *Casia Arabum*, & alia nonnulla, nec easse inutilia ob id dicimus quod priscos ignorata sint, quis enim eo stultitia progredietur? Negamus autem constanter quod illarum herbarum quæ veteribus cognita fuerunt, nunc hodie, ac ab illis ignoratos, inuenerint effectus. Nam, ut supra quoque diximus, tanquam experientiam nostri seculi Medici nondum consecuti sunt, ut gloriant possint se quicquam iis medicamentis, quæ Galeno ac veteribus aliis cognita fuerunt, addidisse, inuenisseque in isidem, quod vitis illis ignotum fuerit. Non est itaque par argumentatio, veluti Montuius dialectice rationis non satis petitis putat, si quis ita colligit: Arabum Casia Galeno incognita fuit, ad leniendū igitur alium inutilis, ac si quis in hunc modum argumentetur: Hepatica a Dioscoride ac aliis veteribus probe cognita, ac sub Lichenis nomine descripta, nullas isidem auctoribus iuuandiceur facultates habere inuenitur, iecori igitur minime confert. Prima siquidem colligendi ratio plane inuitis est & invalida, quod argumentum ab eius auctoritate qui rem illam de qua testari debeat ignauit, deductum inefficax sit, quemadmodum supra etiam multis docuimus. Altera vero argumentandi ratio valida admodum existit, quod ab eius auctoritate deductum sit, qui rem de qua testatur absolutissime agnouerit & perfecit. Nec tantum ab vnus Dioscoridis, sed multorum aliorum recta cognitione herbarum prædicatorum auctoritate deductum est, adeo ut hoc genus argumenti a testium numero quoque ductum videri possit. Quare cum suis ineptissimis argumentis Montuius sese in angulum aliquem tutum recipiat, nam talia sunt quæ in planitie ac in aperto consistere non possunt. Et ut id silentio non transeamus, nemo inficias ibit herbam Lichenem, Hepaticam ideo dici posse, quod iecoris fibræ similis sit, & ideo ita nominatam primum ab Herbatilis arbitror, donec Platearius & alii quidam succedentes, aliam quandam & erroneam eius nominis causam confinxerint.

Curgen di & oblatione Hepaticam, & hest illis in eadem morbo, id est: Obstructiones iecoris expurgat. Inest ei isidem & adstrictio quadam, per quam robur addit visceri. Quare quod Eupatorium debetur, Lichenem, quam *Hepaticum* vocant, tribuendum non erit. Sed hic nobis reclamat Montuius, ac suis siccis copis nobiscum congredi aude, dicens, aliquot simplicium medicamentorum effectus, & per multa alia quæ priscos latuerunt, posteriores reperisse. Fatemur quidem multa esse hodie in Medicorum sit: quenti vlt, quæ veteribus incognita fuerunt, ut est *Casia Arabum*, & alia nonnulla, nec easse inutilia ob id dicimus quod priscos ignorata sint, quis enim eo stultitia progredietur? Negamus autem constanter quod illarum herbarum quæ veteribus cognita fuerunt, nunc hodie, ac ab illis ignoratos, inuenerint effectus. Nam, ut supra quoque diximus, tanquam experientiam nostri seculi Medici nondum consecuti sunt, ut gloriant possint se quicquam iis medicamentis, quæ Galeno ac veteribus aliis cognita fuerunt, addidisse, inuenisseque in isidem, quod vitis illis ignotum fuerit. Non est itaque par argumentatio, veluti Montuius dialectice rationis non satis petitis putat, si quis ita colligit: Arabum Casia Galeno incognita fuit, ad leniendū igitur alium inutilis, ac si quis in hunc modum argumentetur: Hepatica a Dioscoride ac aliis veteribus probe cognita, ac sub Lichenis nomine descripta, nullas isidem auctoribus iuuandiceur facultates habere inuenitur, iecori igitur minime confert. Prima siquidem colligendi ratio plane inuitis est & invalida, quod argumentum ab eius auctoritate qui rem illam de qua testari debeat ignauit, deductum inefficax sit, quemadmodum supra etiam multis docuimus. Altera vero argumentandi ratio valida admodum existit, quod ab eius auctoritate deductum sit, qui rem de qua testatur absolutissime agnouerit & perfecit. Nec tantum ab vnus Dioscoridis, sed multorum aliorum recta cognitione herbarum prædicatorum auctoritate deductum est, adeo ut hoc genus argumenti a testium numero quoque ductum videri possit. Quare cum suis ineptissimis argumentis Montuius sese in angulum aliquem tutum recipiat, nam talia sunt quæ in planitie ac in aperto consistere non possunt. Et ut id silentio non transeamus, nemo inficias ibit herbam Lichenem, Hepaticam ideo dici posse, quod iecoris fibræ similis sit, & ideo ita nominatam primum ab Herbatilis arbitror, donec Platearius & alii quidam succedentes, aliam quandam & erroneam eius nominis causam confinxerint.

Durgen di & oblatione Hepaticam, & hest illis in eadem morbo, id est: Obstructiones iecoris expurgat. Inest ei isidem & adstrictio quadam, per quam robur addit visceri. Quare quod Eupatorium debetur, Lichenem, quam *Hepaticum* vocant, tribuendum non erit. Sed hic nobis reclamat Montuius, ac suis siccis copis nobiscum congredi aude, dicens, aliquot simplicium medicamentorum effectus, & per multa alia quæ priscos latuerunt, posteriores reperisse. Fatemur quidem multa esse hodie in Medicorum sit: quenti vlt, quæ veteribus incognita fuerunt, ut est *Casia Arabum*, & alia nonnulla, nec easse inutilia ob id dicimus quod priscos ignorata sint, quis enim eo stultitia progredietur? Negamus autem constanter quod illarum herbarum quæ veteribus cognita fuerunt, nunc hodie, ac ab illis ignoratos, inuenerint effectus. Nam, ut supra quoque diximus, tanquam experientiam nostri seculi Medici nondum consecuti sunt, ut gloriant possint se quicquam iis medicamentis, quæ Galeno ac veteribus aliis cognita fuerunt, addidisse, inuenisseque in isidem, quod vitis illis ignotum fuerit. Non est itaque par argumentatio, veluti Montuius dialectice rationis non satis petitis putat, si quis ita colligit: Arabum Casia Galeno incognita fuit, ad leniendū igitur alium inutilis, ac si quis in hunc modum argumentetur: Hepatica a Dioscoride ac aliis veteribus probe cognita, ac sub Lichenis nomine descripta, nullas isidem auctoribus iuuandiceur facultates habere inuenitur, iecori igitur minime confert. Prima siquidem colligendi ratio plane inuitis est & invalida, quod argumentum ab eius auctoritate qui rem illam de qua testari debeat ignauit, deductum inefficax sit, quemadmodum supra etiam multis docuimus. Altera vero argumentandi ratio valida admodum existit, quod ab eius auctoritate deductum sit, qui rem de qua testatur absolutissime agnouerit & perfecit. Nec tantum ab vnus Dioscoridis, sed multorum aliorum recta cognitione herbarum prædicatorum auctoritate deductum est, adeo ut hoc genus argumenti a testium numero quoque ductum videri possit. Quare cum suis ineptissimis argumentis Montuius sese in angulum aliquem tutum recipiat, nam talia sunt quæ in planitie ac in aperto consistere non possunt. Et ut id silentio non transeamus, nemo inficias ibit herbam Lichenem, Hepaticam ideo dici posse, quod iecoris fibræ similis sit, & ideo ita nominatam primum ab Herbatilis arbitror, donec Platearius & alii quidam succedentes, aliam quandam & erroneam eius nominis causam confinxerint.

Eurgen di & oblatione Hepaticam, & hest illis in eadem morbo, id est: Obstructiones iecoris expurgat. Inest ei isidem & adstrictio quadam, per quam robur addit visceri. Quare quod Eupatorium debetur, Lichenem, quam *Hepaticum* vocant, tribuendum non erit. Sed hic nobis reclamat Montuius, ac suis siccis copis nobiscum congredi aude, dicens, aliquot simplicium medicamentorum effectus, & per multa alia quæ priscos latuerunt, posteriores reperisse. Fatemur quidem multa esse hodie in Medicorum sit: quenti vlt, quæ veteribus incognita fuerunt, ut est *Casia Arabum*, & alia nonnulla, nec easse inutilia ob id dicimus quod priscos ignorata sint, quis enim eo stultitia progredietur? Negamus autem constanter quod illarum herbarum quæ veteribus cognita fuerunt, nunc hodie, ac ab illis ignoratos, inuenerint effectus. Nam, ut supra quoque diximus, tanquam experientiam nostri seculi Medici nondum consecuti sunt, ut gloriant possint se quicquam iis medicamentis, quæ Galeno ac veteribus aliis cognita fuerunt, addidisse, inuenisseque in isidem, quod vitis illis ignotum fuerit. Non est itaque par argumentatio, veluti Montuius dialectice rationis non satis petitis putat, si quis ita colligit: Arabum Casia Galeno incognita fuit, ad leniendū igitur alium inutilis, ac si quis in hunc modum argumentetur: Hepatica a Dioscoride ac aliis veteribus probe cognita, ac sub Lichenis nomine descripta, nullas isidem auctoribus iuuandiceur facultates habere inuenitur, iecori igitur minime confert. Prima siquidem colligendi ratio plane inuitis est & invalida, quod argumentum ab eius auctoritate qui rem illam de qua testari debeat ignauit, deductum inefficax sit, quemadmodum supra etiam multis docuimus. Altera vero argumentandi ratio valida admodum existit, quod ab eius auctoritate deductum sit, qui rem de qua testatur absolutissime agnouerit & perfecit. Nec tantum ab vnus Dioscoridis, sed multorum aliorum recta cognitione herbarum prædicatorum auctoritate deductum est, adeo ut hoc genus argumenti a testium numero quoque ductum videri possit. Quare cum suis ineptissimis argumentis Montuius sese in angulum aliquem tutum recipiat, nam talia sunt quæ in planitie ac in aperto consistere non possunt. Et ut id silentio non transeamus, nemo inficias ibit herbam Lichenem, Hepaticam ideo dici posse, quod iecoris fibræ similis sit, & ideo ita nominatam primum ab Herbatilis arbitror, donec Platearius & alii quidam succedentes, aliam quandam & erroneam eius nominis causam confinxerint.

Phascelum non a Phascolo, sed a Phascolo legumine, quod Dolichum alio nomine vocant, diuersum penitus esse.

C A P. XXXVIII.

MVLTIMO nostræ ætatis tæte cruditionis viri, Phascelum cum Phascolo, non sine magno errore confundunt. Inter quos ette Marcellus Florentinus, Dioscori interpret, existit, qui p. lib. 2. eius auctoris caput de quantitate de phascolo quidem non recte interpretatur, quod & namque Dioscoridis, a Phascolo est diuersus; ut post ostendemus: erat etiam quod in commentariis Dioscoridi esse eundem suspicatur, cum Smilax eiusdem hortensis sit, ut ex sequentibus parebit. Nullam denique inter Phascelum & Phascolum diuersitatem faciunt Copus, & Albans Torinus, Pauli Æginetæ interpretes, cap. 79. lib. 2. vbi tamen idem auctor manifeste Phascelus a Phascolo distinguit, hos dolichos alio nomine, illos autem Phascolos tantum vocans, P. oinde diligenter admodum animaduertendum quid auctores Græci Phascelum, quidque Phascolum nominauerint. E nullo autē id ipsum rectius discemus, quæ & Galeno, qui libro primo de alim. entoribus facultatibus eorundē leguminum cognitionem exacte tradidit, & ecce illa

Marcelli
Florentini
error.
quodam.

potius esse ingeren las, quam citra alas, testatur grauissimus auctor Galenus, qui *lib. 11. A de simpl. med. facul.* ita de Cantharidib. scribit: *αἱ δὲ τῶν ἐντομῶν διὰ τὸν αἵμα καὶ τὸν οὐρὸν πρὸς τὸν οὐρὸν φέρουσι. ὅθεν αἱ αἰσθητικαὶ τῶν οὐρῶν ἀσθενεῖαι, αἱ δὲ διαστολαὶ φασὶν ἀπὸ τῶν οὐρῶν ποιεῖν αὐτῶν. ὅθεν αἱ αἰσθητικαὶ ἀσθενεῖαι τῶν οὐρῶν ἐκ τῶν οὐρῶν ποιεῖν αὐτῶν. ὅθεν αἱ αἰσθητικαὶ ἀσθενεῖαι τῶν οὐρῶν ἐκ τῶν οὐρῶν ποιεῖν αὐτῶν.* *Quidam praeceptorum medicorum eorum paulum quiddam in medicamenta urinae momentia solet inticere. At quidam solas alas & pedes inticunt, qui aiunt esse remedia ut qui corpora ipsorum bibissent.* Id quod & in commentario centesimo decimo quarto libri quarti de victus ratione in morbis acutis facit, vbi inscitiam Medici cuiusdam Hippocratem non recte intelligit nisi notat, qui corpora potius Cantharidum quam caput, pedes & alas exhibere non sine summo aegrotantis exitio voluit. verba Galeni haec: *Ταῦτα μὲν ἀναγινώσκοντες οὐκ ἔστιν ὁρῶντες, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀναγινώσκοντες οὐκ ἔστιν ὁρῶντες, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀναγινώσκοντες οὐκ ἔστιν ὁρῶντες, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀναγινώσκοντες οὐκ ἔστιν ὁρῶντες.* *Quidam distinctionem hancquaquam intelligens audax Medicus, praedictas partes a cantharidibus abiecit, deditque hydropicos, cui quum a primo die abscessus in iura comparuisset, post tres alios dies factus est. effusaque copiosa aqua, curatum esse visus est, quod plurima pars tumoris praeter naturam statim ad moderationem redacta sit: verum tamen non multis post diebus obiit. Quam ob causam Medicum quidam increpauit perperam datam esse Cantharidum corpora iniquius, etenim propinanda ablatis corporibus tum caput, tum pedes, tum alas idque esse quod in distinctione libri diceretur. Quare non emittatis audax ille Medicus, aliter ita propinauit, moxque facto similiter in femore abscessu, scilicetque multis post diebus hominem mori contigit.* *Ex quibus iterum satis liquet corpora Cantharidum sola, citra alas praeteritum, pedes, & capita, non esse exhibenda: ita ut vehementer erreat qui dicitur parte abdicunt: nihil mirum si vlus earundem male cesserit. Praeterea cum vis illarum, teste Dioscoride libro iam dicto, sit erodere, vlcetare, caloremque elicere, curandum ut iis tantum medicamentis misceantur quae extrinsecus ad mota ploras, lepras, ac septa quaedam sanant. In iure autem vlu plane suspensae sint, nam iis qui hauserunt Cantharides, Dioscoride *lib. 8. cap. 1* esse, ab ore ad vesicam cuncta eroduntur, ac cum lotio subinde sanguinem emittunt. Proinde cum multa alia sint medicamenta quibus vrinam ciere datum sit sine noxa, caueant hortor a tanto periculo medicamento Medici, ne infelicem quorundam audaciam secuti, multo, neci tradant. Del. gi. D*

Mumiam vocatam non solum esse humanorum cadauerum tabidam sanicem, ut multi crediderunt, sed etiam quod Pissiphalium Dioscorides nominat.

CAP. XL.

Ratis de Mumia seu tencia.

NE M o hodie ferme est Medicorum qui non pertinaciter et edat Mumiam tantum humanorum cadauerum sanicem, aloe & myrrha comixtam & sepulchris effluentem esse: id quod vt crederent effecit in suis synonymis Razes, qui de Mumia ita tradit: *Mumia res est quae inuenitur in terris vbi mortuorum corpora aloe coniunguntur, a quibus humor mortui cum aloe mixtum resoluatur. Razes se cuius est interpretes Serapionis cap. 283, praeter tamen huius, vt paulo post monstrabimus, mentem, ita si ribens: Mumia sepulchrorum cum aloe & myrrha, & quae adhaeretur eis ex humiditate corporis humani.* Hos duces tandem vniuersus & Medicorum & pharmacopolarum chorus sequi coepit; Mumiamque hanc vnicam, tanquam rem preciosam admirari, in vsum medicum adhibere, cum tamen vera, iuxta etiam illorum sententiam, haberi vix possit, timor quod sit ne impotiores quidam simulam illius, accepta scilicet et patibulo, aut rota tortricae cadauerum sanis, coruorum iter conibus pro aloe & myrrha, commaculata, conficiant, ac alii pro vera vendant. Et eouque etiam processit pharmacopolarum stoliditas, vt non sanicem tantum cadauerum venalem exponant, sed tota etiam corpora in vulgi admirationem, tanquam aliquid ex septem illis orbis spectaculis, ostendunt. Quod quidem damnandum non erat, modo abiectis ossibus ipsis, sanicem tantum cum aloe & aliis cum mistam in vsum medicos adhibuissent. Ceterum, vt Mumia iam dicta, & hodie etiam sola a plurimis tum Medicis, tum pharmacopolis vsurpata, artificialis est ita quoque

Pharmacopolarum mira stoliditas.

Monet: ad-
gumata
confutan-
tur.

Similitudine
non
identitate
substantie
esse oportet

Medicamentum purgans non per manifestum quod licet et acribit.

NO AMMA
SILVER &
COPPER.

[illegible]

[illegible]

အာရှတိုက်
အိန္ဒိယ
မြောက်ပိုင်း
မြို့

Aristocles
dicitur et
intelligen-
tiam.

Respondemus hoc unum, Montium hoc loci abusi in esse tanti pli lof. ph. testi-
monio, neq. enim ille vnaquam dixisse offendit, etiam totum illud add. *non enim* & *ph.*
librum perulit, omne acti. nexa. contrario fieri. Et vtem per n. habet ite-
dioti in cap. 7. eius libri Arist. duas veterum rer. enset sententias, quar. m. prima dicit,
de vi pli. q. 1. v. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810.

Cilicet attrahens, quod huic portum similis, parum dulcissimi exigit. Similis quippe secundum substantiam, quia pirutofus est, vix milis autem secundum qualitatem manifestat, eo quod piuita frigida. Cincus autem calidus sit, huic quod adeo sit, ut Cincii manifestus calor indicem sibi tradicere facultatem. ut paulo ante dictum est, uuer, Erraticus. Moutius quod simpliciter et omnem actionem a contrario fieri putat, cum hanc sententiam Aristoteles ut a veritate alienam penitus impugnet. Proinde ipse fallitur, Aristoteles non recte intelligens, potius quam Manardus aut ego, qui ira, Dei benignitate, Galeni placita ac dogmata tenemus, ut Moutius in hoc probe tractat de preceptoribus esse non de tractatibus. Reliqua quod prolixi et *ut sic dicitur*, ob id necesse non est, villa diluamus. Nos hic simplicium medicamentorum peritoxico colopho-

Denem imponeamus, quod alibi de his multa dixerimus, & quod facile quisque ad illorum exemplum reliqua, etiam suo Marte scrutari ac colligere possit, atque composita aliquor, in quibus a vulgi sententia disseniamus, attingemus.

*Theriacam, enim vix hodie verum existat nomen, cui quos veteres pollicentur effectus
nostro saeculo non praeferre, quod multi huius confessionem consuetudine,
medusa a Pharmacopoli sed a Medico etiam ignorantur.*

CAP. XLII.

Nemo est qui sciat hodie nobilissimam illam Andromachianidum, corrupto passim nomine Thiriacam, a Thuro nimirum serpente Arabibus nominato dicti cum Phetia recte us diceretur, ita enim veteres nominandum esse voluerunt,

**Therese
trude dale**

E Galeno in libro de Theriaca ad Pisonem testis: *ὅτι καὶ τοῖς αἰσθητοῖς καὶ τοῖς ὁρμητικοῖς καὶ τοῖς ἐκείνων*
καὶ τοῖς ἐκείνων καὶ τοῖς ἐκείνων καὶ τοῖς ἐκείνων id est, *non solum quod ferarum morsibus probe con-*
ueniat sed etiam quod feræ ipse decipit in confectura miscerantur. Cuius certe mira a veteribus
 traduntur eff. cūs. v. v. d. licet apud Galenum in libris de Theriaca ad Pisonem &
 Pamphilum, ita vt vix motus fuerit cui n. non commode adaptari potuerit. Arque
 hinc factum vt ^{alibi} eti. m. Graecis dicta sit, non sine a Galeno Medico, vt Nicolaus
 Præpositus vulgo vocatus nesci. iur, sed a tranquillitate, quam ægrotis afferre solet. Te.
 stis Andromachus qui ita scribit.

Miri apud
veteres The
ricat effe-
ctus.
Theriacu
cur galene
dicta.

Անքան թաւ ինքնակոտոր շահագործող,
Եւ ինչ, ի սրտով զիտ Բնորոտ Աստուծոյ, իմ գիր:

F *Dicitur hac Gratia bilare simul Eudius, atque galene. Quæ verba Gal. expliat de nceps,*
in eam sententiam scribens: quia idem morbus quorundam tunc in Anterioribus, tunc in Posterioribus
locis, et uterque in utroque locis se mutuo excipit, ut si in utroque locis sit, tunc morbus in utroque locis
quædam inque ipsam in propolis versibus. Andramachus arbutor idcirco vocant, quoniam cum ex
galieno affectum tempore et tranquillitatem quandam ipsam nempe faciem corporis comitatur.

Theriac
hodie pri-
stina effe-
ctus amittit
Viperam A-
rabes non
seris cogni-
tam habue-
re.
Viperæ
quid.

Thirus a vi-
pera non
distinguitur.

Viperarum
in Italia ma-
gna copia.

Amisisse autem nostra tempestate pristinos effectus iam dictam antidotum nihil mi-
rum, multa enim sunt ad composicionem eius necessaria medicamenta, quæ penitus
ad nos non afferuntur, vel si afferuntur aut adulterina, aut plane nedom Medicis;
sed & seplasiariis ipsis incognita sunt. Nam vr a vipera initium sumamus, quis est Ara-
bunt ac iuniorum de cretis hodie additus, qui illam agnoscat: tam varia enim imo in-
constantia de hac ipsa produnt, vr nemo sit qui certi quidpiam ex illis colligi ac vena-
ri queat, quem admodum videre licet apud Leoniceum in libro de Dyspnoea & aliis ser-
pentibus. Item in libro de Thiro seu Vipera. Est itaque Vipera serpentis genus, quod Græcis,
ἰχθυό, Arabibus Thirus, nominatur. Arabes autem nomen generis speciei tribuerunt:
tunc enim viperæ hic, hoc est, feræ species sit, illi tamen pro Thetio, corruptio & ex
Græcorum lingua de toto vocabulo, Thirum dixerunt. Quod vero Thirus Arabum
ab Echidna Græcorum Latinorumque vipera nihil differat, vnus Serapion docet:
quæcunque enim sit cap. 448. sui de simplicium temperamentis libri de Thiri carne ex Gale-
ni & Dioic, sententia scribit, hæc omnia de Vipera dicta esse vtrorumque scripta con-
ferens manifeste compert. Proinde vehementer errant qui Thirum aliud a Vipera
animal esse credunt: cum in nomine tantum, nulla autem re ipsa sit diuersitas. Hinc
Trochisci eius passillii & Thiro a Trochiscis e vipera nihil differunt. Est autem vipe-
rarum in Italia magna copia, vulgoque dicitur Marasus, nomenclatura nec barbara,
nec citra rationem excogitata. Quippe a Marforum populis nomine ducto, qui id ge-
nus serpentis olim maxime conestabantur, circumferebantque. Testis eius rei, ne-
quis nullo auctore confictum putet, Aulus Gellius lib. noct. att. lib. cap. 11. in hunc mo-
dum scribens: *Gens in Italia Marforum oritur a Circes filio. Marso propterea Marso homi-
nibus, quorum duntaxat familia cum externis cognationibus nondum citam permissa corruptaque
sunt, ut quidam genitili datum, ut serpentium virulenterum domitores sint, & incantationibus
herbarumque succis faciant medelarum miracula.* Gellio subscribit Plinius lib. 7. cap. 2. Marfos
itidem a Circes filio ortos esse, & naturalem illis vim quandam contra serpentes inef-
se dicens. Et Virgilius libro Æneid. 7. sic scribens:

*Quis & Mairubia venit de gente sacerdos,
fronde super galeam, & felici comptus æliua,
Archippi regis iussu fortissimus Umbro,
Viperæ generi & grauius spirantibus hydræ,
Spargere quis somnos, cantuque manuque solebat,
Atulci batæ iras, & morsus arte leuabat.*

Syllius quoque Italicus lib. 8 eadem de Marfo cantat, ita dicens:

*He bellare aeres norant, ac Marfo pubes,
Et bellare manu, & Chelydræ cantare superem,
Viperæque herbis hebetare & earum dente.*

Idem denique restat Galenus lib. 11. de simpl. med. facult. qui se Marfos Romæ viperas
venantes interrogasse scribit, num quid haberent signi, quo genus dyspnoeæ & vipe-
rarum discerneret. Marfos autem interrogauit, tanquam eius rei peritos, ac quo-
tidie manibus viperas tradantes. Inde discere possunt nostræ ætatis Medici, quan-
to hætenus fuerint in errore versati, qui Thirum seu Viperam ex terris admodum
calentibus aridisque, ex Ægypto nimirum & Arabia petierunt, quum tamen in Ita-
lia hunc haberent serpentem, multo petegris & Memphisæ meliorem. Hinc
nisi ad Theriacorum orbiculorum seu passillorum confectionem veram illam & ge-
nuinam viperam adhibuerunt, id quod hætenus factum esse vix crediderim, non est
cur pristinos illos effectus sperare debeant. Sed fas veram adhibitam esse viperam,
quæ adhuc in Hedychroo magmate, quod sic a coloris iucunditate ac hilaritate di-
ctum est, sunt medicamenta simplicia, quæ a nemine ferme hodie probe agnoscentur:
qualia sunt Aspalathus, Calamus aromaticus, Xylbalsamum, Phu, Cinamomum, A-
momum, Casia, Rhapontium, Myrrha, & alia quædam, ita vt nec illorum ratione ge-
nu ni effectus sperari queant. Aspalathum enim fruticem quousque est qui agnos-
cat? Hunc certe Auicenna in descriptione Trochiscorum Alindaracon, ita enim He-
dychroon appellat, Darisahan nominat, quemadmodum & Serapion capite 26. de sim-
pliciis med. temperamenti facit, vt patebit conferenti caput hoc de Darisahan, cum
capl-

Hedych-
roon vnde
dictum.

Aspalathus
frutex ho-
die igno-
tus.

A modum scribens: *Dictamnus ostendere, ut indicauimus, vulnera ea eo statim deciditibus selo.* Non est alibi, quam in Creta, ramis pretenue, pulegio simile, feruens & acre gustu: foliis tantum vtuntur. Flos nullus est, aut semen, aut caulis: radix tenuis & superuacua. Deniq; Dictamnus in Creta tantum nasci præter Plinium Virgilius quoq; *sc. Aeneid.* ita canens indicat:

Dictamnus
in Creta tan-
tum nasci-
tur.

*Tum Venus indiguo nati comussa dolore,
Dictamnus genitrix Creta acacpie ab Ida,
Puberibus caulem folijs, & flore comantem
Purpureo: non ille ferus incognita capris
Gramina, cum tergo volucres basare sagitta.*

B Cum itaque ex veterum testimoniis vera dictamnus ram flore quam semine careat, no-
stra hæc vulgaris pseudodictamnus sit, ut pote istis maxime abundans, oportet, Etcum
in Creta tantum nascatur, fieri non potest, ut passim in Germania producat. Veram
tamen Dictamnus me vidisse apud pharmacopolam Georgij Ellingerum puto, cuius
equidem folia multa lanugine obduta erant. Præterea Petroselinæ semē, quod miscen-
dum Theriacæ iussit Andromachus, non est id quod passim in hortis nascitur, & nusquā
nō venale habetur, sed quod in Macedonia præruptis locis prouenit, quod Diosc. teste
lib. 3. cap. 71. *αἰθρια ὀξυῖστος ἀμυγδαλίς* quæ ὁ *ἰσχυρὸς* & *ἀμυγδαλίς*. hoc est: *Semen habet ammi simi-*
le, odoratum tamen, acre, & aroma oleus. Lemnia rubrica, quam hodie terram figillaram vo-
cant, quæ in officinis iam habetur, nec facie nec viribus germanæ æqualis existit: illa
enim alba quædam terra esse apparet, cum hæc rubra sit, q; ex collo in Lemno, Galeno
teste, qui totus colore fuluo est, accipiat, vnde & Lemnia rubrica appellata est. Lemnia
figulidum quod ex Lemno insula cōporteretur, dici cœpit. Animaduertendum vero, ru-
briam Lemniam alio nomine etiam dici terram Lemniam, aut figillum Lemnium, id
quod *nunc de simp. med. facule. libro Galen.* iis verbis docet. *τὸν λευκὸν τῆς ἐν αὐτῇ τῶν ἀμυγδαλῶν γένους*
ἔστιν, ὃν πλεον ἐν τοῖς ἐσθλοῖς ἀμυγδαλῶν, ὅτι τὸν αὐτὸν ἀμυγδαλίς, διὰ τὸν ἰσχυρὸν αὐτοῦ ἀμυγδαλίς
ἀμυγδαλίς ἰσχυρὸν, quod est: Tale quiddam & in Lemnia terra sit, quam cognominant quidam rubri-
am Lemniam, & alij quiddam figillum Lemnium, ab impressum videlicet illi figillum Diana sacrum.
Adeo ut commentitium plane sit, quod scribit Dioscorides libro quinto capite 63. Le-
mniam terram caprinis sanguini permistam incolas cogere in pastillos, & imagine ca-

Dictamnus
vera flore &
semine ca-
ret.

Petroselinā
verum non
habemus.

Lemnias ru-
brica uō est
germanæ,
figillum
Lemnian.

Dioscoridis
in terra Le-
mnianæ.

C præ signare. Quem errorem etiam Galenus cum aliarum rerum ad medicinæ vsum
necessarium, tum huius præsertim terræ diligentissimus vestigator, libro iam citato iis
verbis expodit: *Ceterum quam & apud Dioscoridem & alios quosdam scriptum legissem, Le-*
mnia terra hircinum misceri sanguinem, atque ex luto quodæa missione conficiebatur sacerdotem
Lemnias figillatum conformare, tum consignare, cupiebam profecto, & ipse missionis modum inspi-
cere atque symmetriam. Itaque quemadmodum in Cyprium navigaram videndorum qua in ea sunt
metallorum gratia, & in cananum Syriam Palestina partem profectus fuero, buxiniū & aliorum
quorundam inspicendorum causa, ita nec in Lemnum ensaigare piguit, ut quantum sanguinis ser-
ua adfereretur conficerem. Nam quum iterum Romanam pedestrē peterem itinere per Thraciam &
Macedoniam, primum a Tronade Alexandriam in Lemnum adnauigans, nactus illic nautem qua ad
Thessalonicam cursum destinabat. Conueniebam autem cum nauclero, ut in cursu Lemno appeller-
et. Et sane ille præstiterat, sed non ad eam ciuitatem ad quam oportebat. Antea enim nescieram
duas esse in Insula ciuitates, sed credebam, ut Somus, Chius, Cus, Andrus, Tenu, & omnes
adeo qua in Aegea sunt mari, unam duntaxat ciuitatem habens tota insula cognominem, ita &
Lemnum nominis sui unam habere ciuitatem. Porro ut ex uani descenderam, intellexi ciuitatis no-
men esse Myrina: nec in regione ciuitatis illius aut Philolettis templum esse, aut sacrum Neptuni
collem, sed in altera qua vocaretur Hephæstia: nec ciuitatem eam Myrina esse propinquam. Quamq;
me nauclerus expectare non posset, distuli, ut quum Roma in Asiam redirem, tunc Hephæstia
viserem: id quod feci prout speraueram & proposueram. Nam ubi ex Italia in Macedoniam trans-
cissem, caræ, pena totam pedestri itinere pertransissem, peruenissem, Philippo, qua ciuitas est fini-
ssima Thraciæ, inde ad mare descendi, quod proximam aberat citum virginis stady: primumq; Tho-
sa transissem, distantem plus minus ducentis stady: atque illuc in Lemnum sepius gentis, ac uisum
serme septingensis in Alexandriam Troada iraleci. Ac proinde sane ex industria tum de nauiga-
tione, tum de stady adscripsi, ut si quem eadē qua me caperes Hephæstia uisendi cupiditas, cogiti-
o eius sitū sit nauigationem insisteret. In tota namq; insula Lemno orientem spectos Hephæstia,

D præ signare. Quem errorem etiam Galenus cum aliarum rerum ad medicinæ vsum
necessarium, tum huius præsertim terræ diligentissimus vestigator, libro iam citato iis
verbis expodit: *Ceterum quam & apud Dioscoridem & alios quosdam scriptum legissem, Le-*
mnia terra hircinum misceri sanguinem, atque ex luto quodæa missione conficiebatur sacerdotem
Lemnias figillatum conformare, tum consignare, cupiebam profecto, & ipse missionis modum inspi-
cere atque symmetriam. Itaque quemadmodum in Cyprium navigaram videndorum qua in ea sunt
metallorum gratia, & in cananum Syriam Palestina partem profectus fuero, buxiniū & aliorum
quorundam inspicendorum causa, ita nec in Lemnum ensaigare piguit, ut quantum sanguinis ser-
ua adfereretur conficerem. Nam quum iterum Romanam pedestrē peterem itinere per Thraciam &
Macedoniam, primum a Tronade Alexandriam in Lemnum adnauigans, nactus illic nautem qua ad
Thessalonicam cursum destinabat. Conueniebam autem cum nauclero, ut in cursu Lemno appeller-
et. Et sane ille præstiterat, sed non ad eam ciuitatem ad quam oportebat. Antea enim nescieram
duas esse in Insula ciuitates, sed credebam, ut Somus, Chius, Cus, Andrus, Tenu, & omnes
adeo qua in Aegea sunt mari, unam duntaxat ciuitatem habens tota insula cognominem, ita &
Lemnum nominis sui unam habere ciuitatem. Porro ut ex uani descenderam, intellexi ciuitatis no-
men esse Myrina: nec in regione ciuitatis illius aut Philolettis templum esse, aut sacrum Neptuni
collem, sed in altera qua vocaretur Hephæstia: nec ciuitatem eam Myrina esse propinquam. Quamq;
me nauclerus expectare non posset, distuli, ut quum Roma in Asiam redirem, tunc Hephæstia
viserem: id quod feci prout speraueram & proposueram. Nam ubi ex Italia in Macedoniam trans-
cissem, caræ, pena totam pedestri itinere pertransissem, peruenissem, Philippo, qua ciuitas est fini-
ssima Thraciæ, inde ad mare descendi, quod proximam aberat citum virginis stady: primumq; Tho-
sa transissem, distantem plus minus ducentis stady: atque illuc in Lemnum sepius gentis, ac uisum
serme septingensis in Alexandriam Troada iraleci. Ac proinde sane ex industria tum de nauiga-
tione, tum de stady adscripsi, ut si quem eadē qua me caperes Hephæstia uisendi cupiditas, cogiti-
o eius sitū sit nauigationem insisteret. In tota namq; insula Lemno orientem spectos Hephæstia,

E Thessalonicam cursum destinabat. Conueniebam autem cum nauclero, ut in cursu Lemno appeller-
ret. Et sane ille præstiterat, sed non ad eam ciuitatem ad quam oportebat. Antea enim nescieram
duas esse in Insula ciuitates, sed credebam, ut Somus, Chius, Cus, Andrus, Tenu, & omnes
adeo qua in Aegea sunt mari, unam duntaxat ciuitatem habens tota insula cognominem, ita &
Lemnum nominis sui unam habere ciuitatem. Porro ut ex uani descenderam, intellexi ciuitatis no-
men esse Myrina: nec in regione ciuitatis illius aut Philolettis templum esse, aut sacrum Neptuni
collem, sed in altera qua vocaretur Hephæstia: nec ciuitatem eam Myrina esse propinquam. Quamq;
me nauclerus expectare non posset, distuli, ut quum Roma in Asiam redirem, tunc Hephæstia
viserem: id quod feci prout speraueram & proposueram. Nam ubi ex Italia in Macedoniam trans-
cissem, caræ, pena totam pedestri itinere pertransissem, peruenissem, Philippo, qua ciuitas est fini-
ssima Thraciæ, inde ad mare descendi, quod proximam aberat citum virginis stady: primumq; Tho-
sa transissem, distantem plus minus ducentis stady: atque illuc in Lemnum sepius gentis, ac uisum
serme septingensis in Alexandriam Troada iraleci. Ac proinde sane ex industria tum de nauiga-
tione, tum de stady adscripsi, ut si quem eadē qua me caperes Hephæstia uisendi cupiditas, cogiti-
o eius sitū sit nauigationem insisteret. In tota namq; insula Lemno orientem spectos Hephæstia,

F Thessalonicam cursum destinabat. Conueniebam autem cum nauclero, ut in cursu Lemno appeller-
ret. Et sane ille præstiterat, sed non ad eam ciuitatem ad quam oportebat. Antea enim nescieram
duas esse in Insula ciuitates, sed credebam, ut Somus, Chius, Cus, Andrus, Tenu, & omnes
adeo qua in Aegea sunt mari, unam duntaxat ciuitatem habens tota insula cognominem, ita &
Lemnum nominis sui unam habere ciuitatem. Porro ut ex uani descenderam, intellexi ciuitatis no-
men esse Myrina: nec in regione ciuitatis illius aut Philolettis templum esse, aut sacrum Neptuni
collem, sed in altera qua vocaretur Hephæstia: nec ciuitatem eam Myrina esse propinquam. Quamq;
me nauclerus expectare non posset, distuli, ut quum Roma in Asiam redirem, tunc Hephæstia
viserem: id quod feci prout speraueram & proposueram. Nam ubi ex Italia in Macedoniam trans-
cissem, caræ, pena totam pedestri itinere pertransissem, peruenissem, Philippo, qua ciuitas est fini-
ssima Thraciæ, inde ad mare descendi, quod proximam aberat citum virginis stady: primumq; Tho-
sa transissem, distantem plus minus ducentis stady: atque illuc in Lemnum sepius gentis, ac uisum
serme septingensis in Alexandriam Troada iraleci. Ac proinde sane ex industria tum de nauiga-
tione, tum de stady adscripsi, ut si quem eadē qua me caperes Hephæstia uisendi cupiditas, cogiti-
o eius sitū sit nauigationem insisteret. In tota namq; insula Lemno orientem spectos Hephæstia,

A Siquidem multa ex iis, quum illa scriberem, prout medicis & Sepiasariis incognita, hodie sunt notissima, vult Dictamus, Thalpi, & multa alia. De plerisque etiam nunc secus quam olim sentio. Quare qui scire cepit quid hodie de singulis iam ordine commemoratis sentiam, is nostris de comp. med. libris, & commentariis de stirpium historia inscriptos adeat. Hinc enim facile nostram de iis omnibus sententiam cognoscat.

*Syrupū, ut vocant, de Eupatorio, eos quos Mæsus pollicetur effectū præstare nō posse: quod multa
huius compositionem ingrediuntur medicamenta, quæ Septaliis ut prorsus ignota sint.*

Cap. XLIII.

Compositio Syrupi de Eupatorio apud Mesuen hæc est: Radicum apj, Funiculi, Endivia singulorum uncias 2. Glycyrrhiza, Schenit, Cuscuta, Abfynthij, Rosarum, sing. drachmas 6. Capillorum Pneni, Bedegari, Florum Buglossi, Anisi, Eupatori, singulorum drachmas 5. Ramedij, Mastich, sing. drachmas tres. Spica, Asari, folij, singulorum drachmas duas. Coque in aqua libris 8. donec tertia ex parte consumatur, & cum libris 4. Sacchari, & succi Apj. & endivia idemæ quantitate, fiat Syrupus. Quis vero est talis caliginibus oculis, qui non videat multa hic Mesue recentior, quorum hodie nulla apud Pharmacopolas est exacta cognitio? Et, ut aliqua exiis attingamus, quis est, qui hoc tempore Endiviam, quæ in rybi species est, agnoscit? Aliæ enim est, quæ in Italia, alia quæ in Germania videntur nunc Pharmacopolæ, & vix est hodie Pharmacopola, qui non propriam offendat. Et, quod mirum

C admodum est, ſcio, qui pro Endiuia herbam accipiant, quæ hodie *Cardus Maria* nomi-
natur, idq; maximo errore. Paſſim tamen iam pro Endiuia la Zucca ſylueſtris vntur, id
quod latius liquor qui in ea eſt, ſuis indicat. Schæno denique, hoc eſt, odorato iunco,
ſeu, vt noſtri nominant, Squinanto, nos carere nonnullos, paradoxo præcedenti mon-
ſtrauimus. Sed quid de Bedeguar dicam herba, in qua Pharmacopolæ noſtri magis variæ
quam hydra exiſtunt, neq; quicquam illorum, quid Bedeguar ſit, certo agnoſcit? Vnus
eſt Chamæleonem album, alter Chamæleonem nigrum, hic Cardopacæ vulgo di-
ctam, ille aliam quandam ſpinam eſſe ait, neq; eſt, qui non peculiarem afficit. Prohæ-
citate noſtram, qui in tam manifeſtis cæuemus. Qui enim eſt, qui non videat Bede-
guar Arabum nihil aliud eſſe, quam eam herbam, quam Græci *Agrostis Mariti*, Latini vero

D *Spinum album* vocant: nemo sane nisi qui talpa caecior fit. Nam ita Bedeguar descriptio apud Serapionem cum descriptio spinæ albe apud Dioscoridē convenit, vt eandem herbam esse euidētissimū fit. Descriptio autem Bedeguar apud Serapionem capit. *gg. hæc est: Bedeguar nominatur Acanthi leues, & est in Græco spha alba. Nescitur in montibus, & habet folia similia Chamaemeli albo, nisi quia sunt striatūra & albiora, & super ea est simile boræ, & sunt spinosa & habet stipitem longum duobus brachijs, vt crassitudine digiti pollicis, vel plus: color eius est vergens ad albedinem, & super summmitate eius sunt capitella spinosa similia cricio marino, nisi quia sunt minora & oblonga, & stipes eius est coloris purpurei, & semen eius est simile grano caritami, nisi quia est rotundius eo. Spinæ vero albe libro tertio cap. 19. apud Dioscoridē illa: *Spinæ albe vocantur: sunt in Græco spha alba. Nescitur in montibus, & habet folia similia Chamaemeli albo, nisi quia sunt striatūra & albiora, & super ea est simile boræ, & sunt spinosa & habet stipitem longum duobus brachijs, vt crassitudine digiti pollicis, vel plus: color eius est vergens ad albedinem, & super summmitate eius sunt capitella spinosa similia cricio marino, nisi quia sunt minora & oblonga, & stipes eius est coloris purpurei, & semen eius est simile grano caritami, nisi quia est rotundius eo.**

Echinops, ἀγριοκάρδιος, ἄγριον καὶ καρδίαν ἐν τοῖς ποταμοῦσι καὶ περὶ τὰς πόλεις· οὐρανίου, ὅτι πρὸς τὴν οὐρανίαν δύσιν φέρειται.
Σελήνη δ' αὖτε παρὰ τὴν γαστέρα διαβύδου, ὑπερὺν δαυκαλίαν κρημίζει· ᾧ διόλου αὖτε οὐδὲν εἰς τοιαύτην, ὡς πεποιθός,
ἐν ταῖς τε σελήμασι καὶ τοῖς κυνοκέλεσσιν ἂν quod est: Spina alba nascitur in montibus & j'y uogit locus, folia
albo Chamaeleontis similia, angustiora tamen & candidiora, aliquantulum hispida & ascutata. Can-
tem supra a binis cubitis altum, digitis magnis om̃e pollicem cōstituit, subalbam, intus canam. In ca-
mine eius caput adest spinosum, Echino marino simile, autem minutius & oblongum. Flores purpurei,
in quibus semen ceu Cuscum, sed potius melleū. Ex his itaque descriptio nibus sole clarius fit Bede.
guat a spina alba non differre: id quod si verum est, vti et sane neque Chamæleon albns,
neque niger esse potest, quod diuerse a spina alba herbe sint, lecorū que a Dioforide
diuersis capitibus descriptz. Ceterum qualis sit herba hodie spina alba in nostris de stir-

primæ historia commentarij diximus. Herba veto quæ hodie *Cardus Maris*, germanice *Wendelst*, appellatur, non est nisi *Leucacantha* diuersa à spina alba, ut altero loco commentarij de stirpium historia monstrauimus. Ceterum pro Buglossa, nisi quis è botanico sumerit, violæ confectio erit. Quæter in Eupatorijs passim omnes hallucinantur Medici, in paradosi septimo diximus: omnes enim herbam esse putant, quæ vulgo *Kunsgand*, herba dicitur, cum ea, nec Græcorum, nec Melus, sed potius Auenæz sit Eupatorium. Pro Buglossa accipienda Borago.

ad Agrimo-
nia nostra.
Folium ho-
die ignoscit.

vi primo nostrorum de stirp. historia comment. tomo docuimus. Si itaque Mesue Eupatorium
præcipuum, quod huius Syrupi compositionem ingreditur, & vnde illi nomen indi-
catur, est, ignoratur, quid de eius facularibus sperare possent ægrotantes? Folium præ-
terea, quod Græcis pariter & Romanis *Melobastrium* appellatur, hodie ignotum est, nec
eo propter pretii imminutionem uti licet. Est autem hoc, *Discloridis* liberis, capite n. teste,
cum nigredine quadam candicans, non facile fragile, edere sensum ferens, & odoris suauitate deu-
tium permansens, & Nardum gustu referens. Has certe notas nostrum Folium non habet, ad-
ulterinum enim est, neque mirum quod germanum ex India asserti debeat. Scribit
& Manardus te toto vitæ suæ tempore vix vnicum videre Folium potuisse. Proinde sit tot
medicamentorum Syrupi de Eupatorio compositionem constituentium cognitio nos-
ter, quales, quos Mesue pollicetur, effectus præstare possent? Quare Mesue Eupato-
rium adhibeant, aliaque iocorum locum, quæ haberi non possunt, succedanea accipi-
ant, ubi hoc genere Syrupi posthac uti voluerint. Hic libro primo colophonem impo-
nemus, quod superuacuum esse putamus, plurium medicamentorum compositorum
confectiones, in quibus hodie multa desiderantur, indicare, quando quiuis ad priorum
exemplum, agnus ratum simplicibus illa cognoscere, atque adeo tandem has etiam e-
meodare possit. Et hic certe vnicus est modus, quo hodie Pharmacopolarum ignauia
mederi licebit, ut scilicet nostratum herbarum viribus probe agnitis, peregrina & exo-
tica medicamenta, ea maxime, quæ nobis suspecta & ooo exacte cognita sunt, abiciamus,
& in illorum locum, alia, quæ indies oculis conspicere datum est, substituiamus. Nam
quod hodie neglectæ iacent herbar, vno hoc nomine, quod omnibus cognitis sunt, & pe-
dibus fere calcantur, quarum tamen mira vis medica exsistit? Has itaque ambabus mani-
bus arripimus, & exotica profus, vel, si non licet omnia, saltem nonnulla, quæ nobis
non satis cognita sunt, remouemus. Sed ea de re alias forte multa.

Pharmaco-
polarum
ignauia
medendi.

LIBRI PRIMI FINIS.

LEONHARTI FUCHSII PARADOXORVM MEDICINÆ, LIBER SECVNDVS.

PROEMLVM.

Simplicia
medicamentorum
cognita
et vnde illi
nomen indi-
catur, est,
ignoratur.



Quia in le-
cundo hoc
libro tracta-
tur.
In offi-
medici a
pneuma
medendi
ratione de-
scribitur.

Par ad rectam medendi rationem perdiscendam non parum momenti simplicium
medicamentorum cognitio offert, quemadmodum Galenus in libro, quem de meden-
di ratione inscripsit, monitu in locis testatur, primo siquidem libro paradoxa quædam,
quæ quantum in materia medica exacte cognoscenda Arabes olim, ac nunc nostri seculi
Medici aberrarint, demonstrarunt, produximus, ut hac scilicet ratione solide medi-
cine studio sit viam quandam præstiterimus, quæ ad simplicium medicamentorum veram cogniti-
onem peruenirent, atque adeo expeditius medendi methodum aggrederi possent. Secundum autem hoc, quæ
anticipamus, liber paradoxa nonnulla habebit, quæ ad causam morborum, gerendamque curandi veram
rationem attinent, in quibus a frequentissimis illis vulgarium medicorum opinionibus recedimus, ita
ut ex his ipsis iterum discere queant veri ac studiosi, quantum a præfata & germana medendi ratione
nostra tempestatis distulerint. Medici, ubi quisque sibi peculiarem in medendo magistrum ac ductorem
proponit, extra omnem methodum quicquid ille præscripserit adhibent. Nemo enim sana-
mentum nescit maximam hodie medicorum partem non antea curâ agroti manus admoovere, nisi vbi
præter remedia ab alijs, quos præfatos, rectius meo iudicio quævis nominans, sine omni delictum & iudi-
cio emendicari: sicut enim esse arbitrantur, ubi remedium magnum acutum miseris obulerint
ægris, magnique visus medicos se esse censent, quoties semper aliquid noui moliri videntur, nescientes
alterum alteri impedimento esse, & hoc paulo non raro in longius tempus protrahunt iri morbum.
Longe itaque consilium esset, si methodo curare vellet, morbum imprimis naturam eorumque caus-
as inquirerent, & quibus tandem curationis indicationes, haud aliter quam Gale. in suis de medendi
methodo libris docuit, crûda essent, quæ deinceps pulcre remediis inueniendorum rationem, sine
prædictorum auctorum spe & subsidio, ostenderent. Ceteri personæ suos ensuendi doctores, in
quibus nisi dux quidam, qui iter commonstrat, contingens, nusquam progredi possunt. Et accedit
plerumque, ut ceteri illi ceteri dux obtingat, atque adeo verique in sanam incidunt. Hic certe Medicus
ab aliorum præscriptis non velatum quidem vnguem recedens, Manardus noster appose
dixit: ex commentario dixit, quod scilicet non in pulvere & mente, sed in chartis & membranis.

Morbos
cuisse pri-
mum inque-
rendum.
Medici no-
stri seculi
ceteri simi-
les.
Medici ex
commentario
dixit.

Theophrastus
Philosophus

- A** suæ remedia ac curandi rationem sepositam habeant: neq. enim mederi morbo sciunt, nisi nomen prius habito proprio eius capite a libro remedia requirant. Nemo autem me hac dicere posset quasi ad libros plane non esse recurrendum existimem, atque adeo in totum reiiciendis medendi rationem præscribentes aulicos vellem, id quod superioribus annis Morophrastus quidam (ab Theophrasto dicere volui) docere ausus fuit: absit enim ut in eam dementiam deducar: sed ut monerem ne se, tanquam cæci essent, a nudis nominibus illuc duci patientur veluti ad iudices, & ut ea quæ apud illos legant ad examen rationis vident, nec illorum placitum tanquam Delphicum oraculum passim obtemperent, sed illa patius ad suar indicationes præsequendæ exigant. Neque enim adeo nos scriptorum, Arabum potissimum, nominibus mancipare conuenit, ut posthabita ratione, solis eorum auctoritatibus innitatur. Id autem quam necessarium, quamque utile fuerit, probe paradoxa nostra qua hoc libro tractamus monstrabunt: euidenter enim nostra astatu Medicos, Arabum ac inuicem decreta in medendi ratione scilicet, toto cælo errare docent. Quare ea diligenter expendant, ut ad illorum exemplum reliqua quoque medicorum placita, quæ hic non attingimus examinare possint: neq. enim omnia quæ in dubium vocari possunt præsequi animus est, sed pauca saltem, atq. ea sane quæ quotidie fere inter medendum accidunt.

Non esse nisi duo tantum causarum salubrium genera, externam scilicet & internam, vel ut hodie loquuntur, primitiuam & antecedentem, contra Auicennam, totamque inuicem medicorum ceterum, coniunctum enim in morbis Galenum ne somniasse quidem.

CAP. I.

- C** Avicenna *Fen. 2. Canonis primi, Summa 1. doct. 2. ca. 1.* tria esse causatū morbiicarum genera his verbis innuit: Causæ dispositionum corporis sunt tres, primitiua, antecedentes, & coniuucta. Exemplum coniunctæ causæ putredinem in febribus esse inquit. Auic. in sua Isagoge sequitur Ioannitius Monachus ita de causis scribens: Modi occasionū infirmitatū facientium sunt tres. Nam alix sunt quæ vocantur primitiux, q̄ exten accidit corpori, vt calor & frigus. Sunt & antecedentes, quæ admoventur intrinsecus in corpore, vt repletio & inanitio. Sunt & alix quæ vocantur coniunctæ, q̄ cum adfunt, adest infirmitas, & abeuntibus his infirmitas abest, vt putredo in febribus. Ioannitium deinceps forte q̄ Monachus fuerit, illum numinis loco colentes: sacrosancta namq. iis temporib. fratrculorum illorum auctoritas fuit: imitati sunt omnes in vniuersum medici recentiores, eadē in suis libris cuius morbo assignantes. Errare autem illos vehementer studiosi videbunt, vbi definitionem, quam illi causæ coniunctæ adscribūt, falsam & mendacē esse demonstrauerimus. Neq. enim Putredo, vt Ioannitius & Auicēna, q̄ se falso Galen. gloriatur esse interpretem, sentiunt, febris causa cōiuncta existit, si enim esset, tunc putredine amota calor quodq. febrilis amoueret: quod non sit, nam si fieret tūc infrigidatio, vltima nimirū in curacione febris medici operatio, esset superuacanea, q̄ tamē Galenus, vt necessariā valde post deuitam putredinē, adhibendā esse passim admonet. Præsertim v. e. *Sp. ar. in parua*, vbi ita scribit: Eadē ratione in aliis tribus intemperaturis, vnum commune præceptū obseruauimus, vt vnamquamq. prius, q̄ efficit causam rescindamus, deinde ita ad illam quæ ab eadē causa facta est, ægritudinem accedamus. Quibus vtiq. verbis generatim Galenus semper causam morbi facientem primū rescindendam esse docet, ab ea v. & ægritudinem a causa factam: ita vt euidentissimum sit causam morbi immediatam, quā coniunctam nostri appellant, auferrī posse morbo adhuc remanente, quod tamen definitioni eius repugnat. Sic post rescissam putredinem, quæ febris putridæ causa efficiens est, remanet calor febrilis accensus in corde, & per arterias ac venas in totum corpus diffusus, qui tandem quatinū per refrigeratā extinguī debet. Hunc sine ordinē in curanda febre putrida Galenus etiam *li. 1. ther. mit. ca. 4.* obseruat, ita scribens: *Fieri non potest ut febris sanetur, nisi inhibita prius putredo sit. Quare summo iudicio putredo ipsa primū, mox febris sanari debet.* *Ex lib. 2. ca. 1.* sic dicens: *Itaq. si iam profusa febris est, sed causa, quæ eam excitauit iam desit, huc tantum sananda eius consilium daretur, ut refrigeretur.* *Extorsus li. 11. cap. 10.* Hoc vero tempore, inquit, etiam vires roborare, quæ & putredinem superent, & succos conuoluant, studebimus. Quod vero febris ipsius iam accensum est, id refrigerabimus. In auxiliorum enim inueniendorum ordine, vltima est quæ ab hac sumitur indicatio, quamuis alia ratione sit prima, quippe cum a febre cœperit inueniendorum præsidiorū nunc methodus. Quibus vtiq. verbis Galenus manifeste docet, quod in ordine præsidiorum vltima indicatio sit remouere febrem per refrigeratā,

Auicenna & illam sequentem
causam de
causis
antecedentibus

Putredo ad
est causa
coniuucta
febris.

Causa est
febris potest
remoueri
adhuc remanente
morbo.

auferti. Morbos autē esse res permanentes, fatetur Montuus ipse, & idem doceretiam Galenus. Morbi enim affectus sunt. Affectus autem, vt ait Galenus lib. de symptom. differ. constans & permansens est. Imo lib. 2. meth. medendi cap. 3. disertis verbis, sanitatem & morbum ex constantium & permanentium numero esse ait. Morbus autem qui adhuc fit, nō dicitur morbus iuxta Galenum, sed pathos, vt videre licet loco iam citato, & lib. 2. ther. metho. falsum præterea est quod Montuus causam coniunctam in morbis Galenum lib. 1. de sympto. causis statuere ait, neque enim vllibi eius meminit. Morbum quidem symptomatis esse causam coniunctam illic statuit, id quod nos etiam fatemur. Septimo quoque aphorismorum. tom. 10. causæ quidem coniunctæ mentionem facit, at non vt morbificæ, sed tantum vt spumose pituitæ. Sic & in libro de pulsibus causæ coniunctæ mentio fit, quod pulsus vt pote ex fientium numero, habere causas coniunctas indubitatum fit. Proinde patum quid dicatur hoc loco animaduertit Montuus, nobis enim de morbificis, hinc vero de quatuordecim rerū causis coniunctis sermo est. Stat itaq; firmā adhuc sententia Galeni, nullam plane in morbis esse causam coniunctā, quicquid Arabes, ac barbarissimi illorum sectatores nugentur. Fatemur autem iuxta definitionē, morbum actionis læzæ quæ symptoma est, causam eōiunctam dici posse. Perinde enim vt morbo posito, actio quoque læsa ponitur ita illo remoto, & hæc etiam remouetur. At qui morbi ipsius plane nullam esse causam coniunctam constanter affirmamus. Exquisitiorem & copiosorem eius rei tractationem studiosi in eo libello quem de causa continente edidimus, & in eo etiam, quæ filius meus Fridericus, aduersus Iacobum Schegkin scripsit, reperient.

Medicos iuniores repletionis species confundere, neque quod turpe admodum est, easdem recte definire. CAP. II.

Notum est.
peffans me-
dicorum re-
pletionis
distinctione.

NOstræ ætatis Medici duplicem faciunt repletionem, vnam quidem ad vasa, alteram vero ad virtutem nominantes. Quæ ad vasa fit, alio nomine repletionē in quantitate appellant: eam vero quæ ad virtutem, in qualitate repletionē vocant. Quæ in quantitate fit Plethoriam, ita enim loquuntur, alio nomine dicunt, quemadmodum eam quæ in qualitate fit, Cacochymiam. Plethoriam seu repletionem in quantitate describunt esse, vbi omnes simul humores sua quantitate excedunt, aut vnus tantum. Cacochymia autem vbi humores sua qualitate tantum, puta caliditate vel frigidityte, humiditate aut siccitate exsuperant. Hæc quidem iuniorū de repletionē sententia est, quæ quam erronea sit satis cōstabit, vbi primū quid repletionis nomine intelligendum sit & explanauerimus. Repletionem hoc loco magis generatim inaudire oportet, quæ vt cum plenitudine coincidere possit, quam Galenus πλεθρα & πλεθρῶν nominat, vt sit eadem cum eā quæ Hippocrati, & Galeno πλεθρῆς, latinis redundantia dicit. Id quod ideo monendum esse duxi, ne scilicet temere me postea cacochymia inter species repletionis enumerantē ignorantiz arguere, ac plane obtrudere Galenū queat, hanc neque plenitudinem, neque plethorā vocari posse in libro de plenitudine asserentē. Lōge enim alia nobis ratione hoc loco de repletionē sermo fit, quam Gal. illic de plenitudine, quam duplicē tantum facit, quemadmodum in li. de curandi ratione per sanguinis missionē, & tom. 17. secund. aphor. tom. 1. Neque simpliciter de eo quod redundat in eo libro agit, sed tantū de plethora plenitudine, quæ est humorū in animantis corpore abundātia, vel vasa extendens, vel vires grauās. Adeoque repletio generalius multo quā plenitudo vocabulū est, quod hoc ad plethoran, & ad vires, multitudinem tantum, illa vero vltra iam dicta, ad qualitatē redundantiam & cacochymiam quoque genus fit. Quare repletionē hoc loco de omni eo quod in corpore redūd dat dictum esse, genusque ad plenitudinē existerē, atque idem quod redundantia significare, & minime cū illa in significato coincidere intelligamus, atque veterū sententia eam ira diuidamus: Repletio seu redundantia duplex est, vna in quantitate, altera in qualitate. Repletio in qualitate, in qua nuda qualitas citra humoris affluxum iustā mensuram excedit. In quantitate vero, vbi cibi potusue, aut humoris in corpore tanta est quantitas, vt nobis molestiam exhibeat, vel morbum aliquem cōciliet. Hæc vnum est generum. Vna quidem cibi, quæ Græcis πλεθρῆς. Latinis satietas vel saturitas dicitur. Atque hæc vtiq; gemina est, ad vasa licet, & ad vires. Altera autem humoris, quæ Græcis vt cōprehensum est, πλεθρα & πλεθρῶν, Latinis plenitudo & multitudo vocatur. Repletio vero siue redun-

Repletio
quid.
πλεθρα.
πλεθρῶν.

Repletio
duplex.

dantia

Obiectis
dilatis.Nuncquid
quid.Nuncquam
sincerus
sanguis in
venis con-
tinetur.Montui ob-
jectiones
diluuntur.Sanguis re-
liquis hu-
moribus
largior.In cacochy-
mia humo-
res non ita
sua qualitate
molestantur.Repletio
curatio.

cacochymia dicitur, quemadmodum Galenus post verba iam citata docet, & paulo supra eius sententia adscripta est. Sed hoc loco posset quispiam in hunc modum iam dictis ob-
 jectis Fateor quidem neque solum pituitam, neque vitramque bilem solum, plenitudinem dici
 posse: solus autem sanguis vehementer adauctus, ita ut venæ amplius distendi non possint,
 plethora dicenda est. Cui ita responsum volo. Licet tantum sanguinis incrementum, ut
 testatur Gal. in lib. de plenitudine, ut venę distendi amplius non possint, exacte loquendo,
 plethora dicenda non sit, sed *πλεθώρα, πλεθώρα γὰρ πλεονεξία, καὶ ἐν τῇ πλείοντι περιτρίβει*. i.
 Plethora enim humorum in toto corpore redundans ita est, ut idem ait: atque adeo si humorum est
 abundantia, non vnus erit: contingit tamen interdum, ut in sanguine solo plethora
 generatio statuatur, idque dum fit, sanguinis copiam per excellentiam dictam esse putan-
 dum erit, non segregando, ut diximus, reliquos humores, qui simul cum illo in venis
 continentur, cumque eo pariter abundant. Nunquam enim sincerus in venis sanguis
 continetur. Proinde idem est dicere humores, & sanguinem abundare. Testis est Gale-
 nus, qui libro iam sæpius nominato ita inquit: *ἀδύνατον εἶναι ἀσύνθετον αἷμα πρὸς τὰς λοιπὰς ὑγρὰς καὶ στερεὰς*
οὐσίας, ὅτι μὴ αὐτὸ μὴ γὰρ ἐκ τῶν ἰσχυρῶν, μὴ πλεονεξία, μὴ ἰσχύος ἕνεκα. Ἐν τῷ αἵματι ἡ ὑπερβολὴ
*ἀδύνατον εἶναι, ἀδύνατον τοῦ χυμοῦ πλεονεξίαν, ἢ αἷμα πλεονεξίαν. τὸ δὲ πλεονεξίαν ἔχειν τὸν αἷμα ὑπερ-
 πλεονεξίαν εἶναι τοῦ αἵματος πλεονεξίαν.* quod est: Fieri non potest ita exacte sanguinem vniquam in
 venis contineri, ut nihil vel bilis, vel pituita, vel serosa sanies inferatur. Unde & ego in superiori-
 bus idem intellegi volo, siue humores, siue sanguinem abundare dixerim: quippe immixtus, & ab ali-
 is humoribus sincerus sanguis nunquam in venis detinetur. Ex iam dictis & Montui delira-
 mentis occurri potest, dum in plethora humorum omnium non ex æquo semper abun-
 dantiam esse contendit, quod in ea sanguis vehementer præcellere possit, Galeno teste,
 aliorum humorum nullus. Nam nihil obstat quin phlethora dici possit, etiam si vnus
 humor reliquis antecellat, ut antea abunde demonstrauimus: satis enim est ut omnes
 ex æquo, hoc est simul, & non vnus tantum aduictus sit. Cut autem sanguis in omnibus
 plethoricis itatibus præcellat, nulla alia ratio est, nisi quod is semper reliquis humoribus
 ut recte in problematis Aphrodisæus asserit, largior sit. Hinc cum omnes incrementum
 humores, quid mirum si sanguis, utpote copia sua ceteros vincens, in plethora vehemen-
 ter præcellat. Proportio enim eius ad reliquos humores nunquam non maior exi-
 sit. Quid multis opus est in plethora non ita ex æquo se habent humores, ut omnium
 æqualis sit copia, semper enim sanguis largior, dein pituita, tertio bilis flaua, & postre-
 mo atra, sed quod secundum iam dictam proportionem omnes simul augeri & incre-
 scere contingat. Vnus enim tantum si redundauerit, tum non plethora, sed cacochy-
 mia vocatur. Ita nemo non videt nihil plane illorum, quæ diximus, intellexisse Montuū,
 minimeque falsum esse, ut ille impudenter contendit, in plethora ex æquo seu simul om-
 nium humorum abundantiam esse. Porro errant iuniores Medici, quod in cacochy-
 mia humores tantum sua qualitate molestante putant, cum satis constet eosdem etiam
 sua quantitate nocere, ut de flaua bile in morbo regio affectis liquet. Alia utique est reple-
 tio in qualitate ab ea quæ cacochymia dicitur, veluti ex supra dictis satis manifestum est.
 Nec minus errant, dum cacochymiam repletionem ad virtutem nominant, quando
 antea ostensum sit cacochymiam non posse simpliciter dici plenitudinem, multo mi-
 nus ad virtutem, ita ut plane ab illa differat. Hactenus itaque ex Galeni ac vererum sen-
 tentia repletionum nomina, quæ a nullo hactenus ita explicata esse constat, enarraui-
 mus, idque non ab re, quod iis ipsis exacte cognitis, cuique etiam sua cutatio facile adhiberi
 queat. Redundantia enim in qualitate, alteratione tantum, manente adhuc substantia,
 curatur. Cacochymia vero purgatione, quæ cuique superanti succo sit accommoda.
 Plenitudo seu plethora tum sanguinis missione, tum frequenter balneo, & aliis quibuslibet,
 quæ a Galeno lib. 13. lib. meth. cap. 3. enumerantur. Vnde iterum abunde dilucidum fit, ca-
 cochymiam a repletionem in qualitate, & ab ea quæ ad virtutem dicitur, differre, diuersas
 namque curationes habent. Vnus autem & eiuſdem morbi diuersa curatio esse non po-
 test. Sed ea de re satis, plura enim ad hanc tem pertinentia lib. 2. Institutionum nostrarum
 sect. 6. cap. 1. diximus.

Quandocumque, vitruum, auxilij, & vena scilicet sectione, & purgatione opus erit, tum venam
 potius incidendum ante purgationem, quam purgandum ante vena sectionem esse, conſensu
 omnium ferme hodie medicorum facientium sententiam.

Nam si vasa sanguine repleta sint, & purgatorium de deris medicamentum, non poterit
 ppter plenitudinē in corpus differri, sed subſtar, & nihil efficit, aut id quod efficit, male
 efficit. Hac ſiquidem ratione nihil efficacius eſſe poteſt, nam ira aduerſariorum ſenten-
 tiam expugnat, vt nullus plane ſit qui contra mutire audeat, aut queat, etiam ſi maxime
 id facere cupiat. Et mirum certe admodum eſt, cur nō Auicenna ea in re conſiliū ſecuti
 fuerint, quem tamen in aliis tanquā ducem optimum ſequuntur, qui *Fen. 3. Can. 3. traſt. 1.*
ca. 39. de cauonibus vniuerſalibus idem etiam docuit, quod veteres iam docuiſſe moſtra-
 uimus. Inter reliqua enim ſic inquit: Etſi alii etiam dominantur humores, tamen ab ea
 incipimus, quoniam phlebotomia eſt communis humorum euacuatio. Cogitent itaq;
 noſtri ſeculi Medici, quanto hactenus in errore verſati ſint, dum paſſim omnibus maxi-
 me iis, quos ab imminenti morbo præſeruare ſtuderunt, purgationem ante venæ ſec-
 tionem adhibendam eſſe docuerunt, & reſiſcant tandem, iuxta veterum præſcri-
 ptum ac veram medendi rationem, ſanguinis miſſione primum, vbi nimirum vtriſque
 præſidiis opus erit, vti diſcant.

*In internorum viſcerum phlegmonibus ſatius reſectum, e diſſectio, quam in oppoſito latere, con-
 tra Arabum, ac recentiorum ſerme omnium ſententiam, venam ſecandam eſſe, idq; non
 modo vacuandi, ſed & reuellendi gratia faciendum.*

CAP. IV.

Apologia
 contra Hiero-
 nimum.

A Vice nna loco præcedenti, capite citato, comuniſſimi eius erroris, quem omnes
 fere hodie medicinā exerceſcentes ſequuntur, auſor fuiſſe videtur, dum venæ ſectionē
 in contraria doloris parte fieri debere ſuadet. Hunc & alii Arabes veluti ducem imitati
 ſunt, illiſq; ſuperioris ætatis Medici ex æquo omnes, licet non nihil diuerſi inter ſe fue-
 rint, id quod horum ſcripta abunde teſtantur. Quantum autem a vera mediēdi ratione
 aberrant, conſpicuum hec, vbi veterum Græcorū medicotū ea de ſententiam præ-
 cemus, rationibusq; Arabum tandem opinionem explodemus. Breuioribus autē erimus,
 quod ſuſius, imo ita copioſe vt nihil deſiderari poſſit, in apologia noſtra contra Hiere-
 nimā Thriuerum Brachellum illā & aliis multis locis conſutauerimus. Peruerſam itaq;
 hanc Arabum, recentiorumq; ſententiā, in internorum viſcerum phlegmonibus venā
 ex oppoſito latere ſecandam eſſe, in primis explodunt ea, quæ de curatione pleuritidis
 & peripneumoniz ſcribit Hippocr. lib. 4. de rat. viſſ. in morb. acu. aph. 67. dicēs: *ἡ πύρις τοῦ
 ἀνθρώπου ὅτε καὶ δὲ ἡ πύρις ἐν τῇ ἐνδοκρίῳ φλέβῃ, τὸν πόνον, ὃς ἐν τῇ πύρι
 τῇ πύρις ἐν τῇ φλέβῃ, id eſt: Si dolor ſuſſum penetraverit ad claviculā, mammillā, vel brachiū, inter-
 nam brachiū venā ſecare oportet, ab ea videl. parte qua dolore fuerit affeſta. Et in li. primo de morbis,
 vbi itidem de iam dictis affectibus agit, in eum modum ſcribens: *ἐν πύρι τῇ φλέβῃ ἀνθρώπου
 τῇ ἐν τῇ πύρι, τὸν πόνον καὶ τὸν πόνον, id eſt: Lienarem vocat venam, vel iocinorālē in manu ſecare cōſe-
 re, qua morbus fuerit ſit, dolor lateris & aliorum lenitur. Quod autē huius loci in pleuritide & peripneu-
 monia faciendum ſuadet, hoc in ſexto epidemion, aphor. 7. in omnibus doloribus ſimpliciter
 eſſe tentandum docet, nimirum ex proximis loco dolenti venis ſanguinem detrahē-
 dum fore. Verba eius hæc ſunt: *ἡ δὲ πύρις τῇ ἐνδοκρίῳ φλέβῃ, ἀπὸ τῆς πύρις τοῦ πόνου, hoc eſt:
 Dolorum proximū ventrem purga, ſanguinis vero ventrem ſeca. Quare autem non ex di-
 ſtantiſſimis venis, vt quidam temete docent, ſanguinem mittendum docuerit, nulla
 alia ratio eſt, niſi ea, quam Galenus in libro de artis conſtitutione aſſert, ita dicens: *ἡ
 πύρις τῇ ἐνδοκρίῳ φλέβῃ, τὸν πόνον καὶ τὸν πόνον, id eſt: Quoniam ex proxi-
 mioribus & comuniſſibus laborantiū partibus venis, vacuatio optima & ſaciliſſima. Atqui ne quis
 hic dicere queat, verum eſſe euacuationis ratione ex proximioribus venis ſanguinem
 detrahendum eſſe, reuulſionis autem gratia ex diſtantiſſimis, aut ſaltem parti laboran-
 ti oppoſita: age demonſtrems & eam venæ ſectionem, quæ reuellendi etiam cauſa
 ſit, e diſſectio locis laborantis faciendam eſſe. Galenus ſiquidem libro ſecundo ad Glauco-
 nē ca. 7. euidentiffime vtuntq; euacuationis gen^u per cōmunes fieri debere venas præcipit,
 dū ſic ſcribit: *τὸν πόνον τῇ ἐνδοκρίῳ φλέβῃ, ἀπὸ τῆς πύρις τοῦ πόνου, id eſt: Quoniam ex proxi-
 mioribus & comuniſſibus laborantiū partibus venis, vacuatio optima & ſaciliſſima. Atqui ne quis
 hic dicere queat, verum eſſe euacuationis ratione ex proximioribus venis ſanguinem
 detrahendum eſſe, reuulſionis autem gratia ex diſtantiſſimis, aut ſaltem parti laboran-
 ti oppoſita: age demonſtrems & eam venæ ſectionem, quæ reuellendi etiam cauſa
 ſit, e diſſectio locis laborantis faciendam eſſe. Galenus ſiquidem libro ſecundo ad Glauco-
 nē ca. 7. euidentiffime vtuntq; euacuationis gen^u per cōmunes fieri debere venas præcipit,
 dū ſic ſcribit: *τὸν πόνον τῇ ἐνδοκρίῳ φλέβῃ, ἀπὸ τῆς πύρις τοῦ πόνου, id eſt: Quoniam ex proxi-
 mioribus & comuniſſibus laborantiū partibus venis, vacuatio optima & ſaciliſſima. Atqui ne quis
 hic dicere queat, verum eſſe euacuationis ratione ex proximioribus venis ſanguinem
 detrahendum eſſe, reuulſionis autem gratia ex diſtantiſſimis, aut ſaltem parti laboran-
 ti oppoſita: age demonſtrems & eam venæ ſectionem, quæ reuellendi etiam cauſa
 ſit, e diſſectio locis laborantis faciendam eſſe. Galenus ſiquidem libro ſecundo ad Glauco-
 nē ca. 7. euidentiffime vtuntq; euacuationis gen^u per cōmunes fieri debere venas præcipit,******

cum aliquot annis poſt Galeni tempora vixerit. Sunt enim qui ſub Conſtantino Magno, qui etiam ſub Theodoſio iuniore, quod veriſimilius eſt, & qui ſub Iuliano ipſum vixiſſe putant. Quod ſi verum eſt, contemporaneus Oribaſio fuit, qui eius Cæſaris archiater fuit, quemadmodum epigramma hoc, quod in quarto libro habetur epigrammaton, reſtat.

Oribaſius
Iuliani
archiater.

*Vixit pater vixit Tullius Cæſar
Atque Cæſar vixit Oribaſius
Ergo ſi ſua pater vixit vixit, Cæſar vixit
Tunc archiater vixit Oribaſius*

Id eſt:

*Magnus Iuliani Aedæſus qui Cæſariſſim,
Divino cultu dignus Oribaſius,*

Hinc animo ſapienti apic inſtar carpere flores

Novit quos Medicus priſci ubique tenet.

Medico ad
id quod
magis vixit
reſpicien-
dum.

Dolor &
tensionis uti-
lit.

Quo pacto
beſtat do-
lor proba-
bitur Me-
dicus.

Humorem
impetum in
phlegmoni
buſtulan-
dum reſtitu-
ere ſi.
Medicus
tunc mori
obſervat.

Reliquum eſt vt & ratione ſententiam noſtram firmemus, quam tamen adverſarii plane nullam, vt omnium frigidiffimam habent. Incidendam itaque in internorum vicerum phlegmonibus venam eſſe quæ & directo eſt, & minime eam quæ in diſtantiſſimis, aut oppoſita parte doloris, hac ratione oſtendi poteſt. Quum in omni morbo ad id quod magis vixit reſpicendum ſit, vt ſcilicet idipſum quam primum fieri poteſt rollat, debet certe in omnibus internorum vicerum phlegmonibus omnium maxime animum advertere, vt humorum deſluxum, impetumque, dolorem ac tensionem immenſam in parte egra facientes, amoveat: nam niſi id ipſum ſecerit, dolor ſemper auſtor fiat nec eſſe eſt, eoque auſto maior quoque humorum copia confluat oportet. Nam Galenus cap. 5. artus Medice teſte, *Id eſt: vixit vixit vixit vixit vixit* quod eſt, *Dolor omnis fluxiones irritat.* Et lib. theriaca meth. 3. cap. 4. *Id eſt: vixit vixit vixit vixit vixit* hoc eſt: *Quod dolet plus vt affluat efficit.* Tum autem humorum deſluxum dolorem ac tensionem in parte egra potius creare prohibebit, ubi non ſolum humorum imperum in contrarium auertet, ſed etiam plurimum, & celeriter a phlegmone vacuabit. Id vero faciet, ſi venam quæ parti laboranti eſt directo eſt, quæque cum ea communiter habet, petruſerit. Ita in pleuritide internam venam quæ eſt directo eſt Galenus ſecundam monet, quod hæc partem eam quæ phlegmonelaborat non ſolum plurimum & celeriter vacuet, verum etiam ab ea reuellt. Verba eius lib. ſecundo de viſt. rat. in morbo. *Id eſt: vixit vixit vixit vixit vixit* acut. comment. 10. hæc ſunt: *Id eſt: vixit vixit vixit vixit vixit* id eſt: *Cum igitur ſuperiorum partium condolentia ſignum ſecerit, venam in gibberu ſecare eam oportet, qua ſanguinem laborante parte & magis & velocius ſum reuellt, tñ vacuare poſſit.* Et paulo poſt: *Id eſt: vixit vixit vixit vixit vixit* tum etiam ceteras partes plus præſertim in acutū morbu, vacuare contendimus. Quod ſane interna gibberu vena ſaci, multoque magis ubi ſanguinis redundantia ad ſuperiora vergere videatur, aut ſuperiores thoracis partes laborant. Quid multa? in omnibus internis phlegmonibus quoniam multum & celeriter a parte afflicta vacuandum eſt, ideo vena quæ eſt directo eſt, & com ea parte communiter habet, inter initia etiam ſecanda, quod illa non tantum celeriter evacuet, ſed & in contrarium deſluxum imperum vertat. Ceterum cum in phlegmonibus humorum impetum ſere nunquam non ſecundum reſtituendum fiat, veluti parte 2. ſexti epid. 7. H. ppoerat. demonſtrat, dicens: *Id eſt: vixit vixit vixit vixit vixit* ſecundum reſtituendum ſi lateram dolere, præcordium diſtentionem, ſicentium ſanguinis ex naribus erupientes, & angina & robore. Conuenit maxime Medico motum hunc naturæ obſervare, vt ſi licet ſciat, promptus per id larum humores phlegmone procreantes, & reuelli & vacuiri poſſe. Proinde vena potius quæ eſt directo loci laborantis eſt quam oppoſita incidenda venit. Per illam enim ſanguis qui nuper deſluxit, neque adhuc vehementer adhæſit affluus eſt, remanebit in ea loca a quibus in partem egram delatus eſt,

A negatur, cum constet non solum numero auctoritatem, sed & rationibus firmissimis nos esse superiores. Vanum quoque est quod olim homines non sic, ut hodie, in videndo deliquisse existimat, ob idque plethoricis dispositionibus minus tentatus, ut hoc nomine recte venam quæ e directo loci laborans est, secandam præceperiat. Nam, utcumque Hippocratis tempore verum sit, Galeni tamen seculo, qui idem in omnibus Libris docet, verum esse non potest: cuius tempore quanta fuerit comportandi coniectura, nemo non nisi quilibros eius non degustavit, ignorare potest. Nonne in primo ther. methoth. libro conqueritur neminem esse qui præ inexplorabilibus voluptatum deliciis veritatis studio ac inquisitioni deditus sit? Non exiguum enim numerum esse inquit eorum, qui vesperi omnes ad symposia colliguntur: ubi postquam vino se impleverunt, non lyra citharaue, aut aliud musicum instrumentum circumsertitur, sed nec sermones vili habentur, quales in symposiis agitari solere veteres prodiderunt, nec alius honestum quicquam, imo inuicem sibi propinant, & de magnitudine poculorum certant, utpote inter quos optimus censetur, non qui plurimum instrumentis musicis, aut etiam sermone Philosophico uti novit, sed qui multos eoque maximos calices exlicavit. *In comment. quoque a s. sexti aphorismorum*, propter immodicum sui seculi otium, & victum intemperantem eunuchos podagra laborantes faceret. Quid multa? satis ex Athenæo perspicuum sit Græcos fuisse bibacissimos. Hinc quod veteres eam quæ e directo est in pleuritide & aliis phlegmonibus inter hæc venam secandam docuerint, non ideo factum est, ut Montanus putat, quod eorum seculo homines in victus ratione non deliquerint, qui enim alias Galenus, cuius tamen tempore haud secus quam hodie intemperatissimo victu vili sunt, hoc dogma inculcare sine inficitæ nota potuissent? Quare longe alia subest ratio oportet, quam Montanus somnauit, ea scilicet quod Galenus ac alii veteres ad id quod magis vrgeret respexerint, atque adeo non tantum reuellere, sed & euacuare a loco affecto voluerint. Hic præterire non possum, quin ad Ioannis Agricolæ amici optimi, in Galenum annotata non nihil respondeamus: enim *lib. 13. cap. 3. ther. method.* eum manifeste nihil statuit, latentem tamen sese in aduersariorum sententia adhuc esse, vel litem hæc, ne nostram penitus amplecti queat, indicat: Nec puto ægre feret si eius coniecturas confutauerim, quod quidem nec ego ægretulerim Brachelii contra me iudicium attulisse, cui tamen apologia quadam per me responsum esse non ignorabat. Vellem tamen penitus siluisse Agricola, ita enim plerisque errandi occasio non fuisset, neque mihi ab illo dissentienti animam præbuisset. Boni itaque pro candore suo facilio consulat, quandoquidem veritate viro bono nihil esse antiquius contemptum habeat, si & nostram de his argumentis quæ producit sententiam attulerimus, ut scilicet hæc lege multis qui eiusmodi argumentis in contrariam duci sententiam potuissent, consulatur. Locus igitur Galeni, quem adfert Agricola, quemque contra me in sua disceptatione affert Brachelius, quod manu laborante scarificanda crura sint, & altero crurum male habente, reliquum, nihil nobis aduersatur, ut multis in apologia nostra comprobauimus. Nobis enim de venæ sectione, Galeno de scarificatione sermo existit. Nobis de interiorum viscerum inflammationibus contentio est, Galenus autem de externis, manuum nempe & crutum, loquitur. Phlegmone interna magnis adeoque acutus morbus est, externa contra paruus, ac periculo vacans. Aliter autem tractandos esse morbos magnos, aliter exiguis quis est qui nesciat? Hinc cum Medicis studium in internis phlegmonibus in hoc vno situm sit, vt celeriter & plurimum non solum a loco afflicto reuellant, sed & vacuet: sit vt ad venam quæ e directo est, secandam, sibi festinandum sit. In externis contra humores in partem ægram decumbentes, ex vna parte in aliam traducere æque ignobilem, repemina quoque medicamenta adhibere, ac digerentia quæ suppurationem prohibere possunt, quamuis neque ex supputatione, etiam si superuenierit, aliquod periculum ratione dignum imminet, licebit. Cum itaque tum quouis modo humorum imperum ad laborantem partem sistere liceat, loco laborante neglecto, fasisque sit utcumque ab afflicta particula reuellere, posthabita euacuatione, potest Medicus a distantioribus etiam, & ex opposito, linguam detrabere. Neque Manardi ratio, quam adfert Agricola, ad firmendam aduersariorum sententiam satis ponderis ha-

Galeni seculo comportandi mos iudicatur.

Græci bibacissimi.

Obiectio Brachelii ad Agricola diluuntur.

Aliter magnos aliter exiguis esse tractandos morbos.

protius accent. nulli acceptum fecendum nisi vni Razi, qui *trahit*, 10. cap. 4. de tertianæ curata scribit: Cum febris ægrum dimiserit, adhuc eodẽ regimine quo prius post febrem per tres dies erit regendus. Quibus transactis pullina caro aut hecina danda est. Interim tamen à balneo & sole & vino abstinendus est. Quod si de Iacobi intellex. Razes, nihil illi aduersamur. Si vero de balneo aquæ dulcis, nihil decreto illo mendacius. Quicquid tamen sit, euidentissimum existit nostræ ætatis Medicos etiam ab aquæ dulcis balneo prohibere febricitantes, id quod erroneum esse multoties veterum test. monium euincimus. Primum omnium Hip. qui 1. aph. 17. ita scribit: *οἱ ἐν τῇ διάρῃ μὴν τὴν ἀποκρίσιν ἐκτρέφον*, quod est: *Vitius humidus febricitantibus omnibus confert*. Quod si ergo in vniuersum humidus vitius febricitantibus utilis est, consequitur, & balneum aquæ dulcis eisdem conferre, quandoquidem illud non solum humedat, sed & refrigeret, vt testatur Hippoc. lib. 2. de rat. vit. dicens: *ὁ ἰσχυρὸς ὁ ψυχρὸς*. id est: *Dulcis aqua humedat & refrigerat*. Galenus quoq. lib. 10. therap. meth. cap. 7. lulum aquæ dulcis inter remedia quæ extrinsecus adnota cor; vsu refrigerant, & humedant, recenset, inquit: *ὁ ἰσχυρὸς πρὸς τὴν ἀποκρίσιν τὴν ἐκ τῆς διάρῃς ἐκτρέφει*, & τὴν διάρῃν παρακρατεῖ τὴν ἐκ τῆς διάρῃς ἀποκρίσιν, & τὴν διάρῃν παρακρατεῖ τὴν ἐκ τῆς διάρῃς ἀποκρίσιν, & τὴν διάρῃν παρακρατεῖ τὴν ἐκ τῆς διάρῃς ἀποκρίσιν. id est: *Extr. infusus corpori accendunt tum acris ipse qui nos ambat, tum medicamenta quacumq. humedandi refrigerandiq. vim obtinent*. Et tertium præter hæc *dulcis aqua solum*. Et libr. 3. de tennenda valetud. vbi sic ait: *ἴσως δὲ τὸν ἰσχυρὸν ἐκτρέφει τὴν διάρῃν, ἀποκρίσιν δὲ τὴν ἐκ τῆς διάρῃς ἐκτρέφει*, & τὴν διάρῃν παρακρατεῖ τὴν ἐκ τῆς διάρῃς ἀποκρίσιν, & τὴν διάρῃν παρακρατεῖ τὴν ἐκ τῆς διάρῃς ἀποκρίσιν. hoc est: *dulcetum calassarum aquarum, si media temperie sint, vis calida & humida est: sin tepidiores sint, humida & frigida: quod si iusto calidiores fiant, calida quidem, sed non perinde humida*. Ex quibus ver-

Balneum a-
quæ dulcis
humedat
& refrige-
rat.

bis Medicus non solum balnei vim, sed & applicandi in febribus modum discere potest, vt scilicet et tepidum sit, vt in frigide atq. humedat voluerit. Balneum aquæ dulcis humedat & refrigerare Alexand. quoq. Trallianus lib. 3. cap. 43. docet, ita scribens: Nouimus quippe & experti sumus balnea dulcis aquæ frigidificam & humedantem obtinere facultatem. Si itaq. balneum, maxime vbi tepidum fuerit, refrigerare & humedare potest, cur febricitantibus non suo tempore, cum qualitate sua febrium naturæ in vniuersum aduersetur, adaptari queat, non video. Quod autem in omnibus fere febribus balneo commode vtiliceat, ordine iam quodam demonstrabimus. In diariis siquidem febribus, quas ephemeræ Græci vocant, vtile esse balneum docet Galenus lib. 1. cap. 2. ad Glaucum, sic de curatione illarum scribens: *ἡ δὲ διάρῃς τῆς διάρῃς ἀποκρίσιν ἐκτρέφει*, & τὴν διάρῃν παρακρατεῖ τὴν ἐκ τῆς διάρῃς ἀποκρίσιν. id est: *Operet siquidem eos confestim ducere ad balnea, atq. ad curationem vtilis rationem*. Id quod & lib. 2. therap. meth. cap. 3. facit, dum ita de diariarum curatione scribit: *ἡ διάρῃς πρὸς τὴν διάρῃν ἀποκρίσιν ἐκτρέφει*, & τὴν διάρῃν παρακρατεῖ τὴν ἐκ τῆς διάρῃς ἀποκρίσιν. hoc est: *Quippe in prima accessione inclinante ducendi in balneum omnes sunt*. Ex quibus verbis tempus quoq. balnei insinuat Galenus, & paulo post ait: *ἡ διάρῃς πρὸς τὴν διάρῃν ἀποκρίσιν ἐκτρέφει*, & τὴν διάρῃν παρακρατεῖ τὴν ἐκ τῆς διάρῃς ἀποκρίσιν. hoc est: *Non enim quouo tempore febricitantes lauantur, sed in accessione remissione*. Lauandos præterea esse diatia febre correptos Paulus etiam Aegin. libro secundo, cap. 10. docet. Et Alexand. Trallianus libro 5. cap. 2. præsentissimam febribus diariis curationem balneum esse inquit. Ceterum quod in putridis febribus etiam conferat balneum, libro 10. & 11. therap. meth. Galenus multis in locis ostendit, præsertim autem cap. 10. libr. 10. vbi balneum febribus per se & ex accidente vtile esse scribit. Nam cum vacuatio excrementorum sub cute detentorum illis vtilissima sit, certum est in balneo necessario ob æqualem per unne corpus calorem, exiguoque meatuum rarefactionem fieri, atque adeo cutim laxari, & sic quæ detenta sub hac fuerunt vacuari, balneumque sic per se, quandoquidem vacuat prodesse. Quia vero densatam atque coarctatam curim ipsam, vt superuacua illic educi queant, laxat, sit vt ex accidente refrigeret. Tempus autem lotionis eodem quoque loco Galenus monstrat esse febris inclinationem, & putridum humorum concoctionem. Hinc est quod in libro quoque de tabe febribus putridis balneum esse vtile statuit, at non nisi post concoctionem: Verba eius hæc: *ἡ διάρῃς πρὸς τὴν διάρῃν ἀποκρίσιν ἐκτρέφει*, & τὴν διάρῃν παρακρατεῖ τὴν ἐκ τῆς διάρῃς ἀποκρίσιν. hoc est: *Februm quidem ex putredine humorum accensarum, balneum post humorum concoctionem adhibendum*.

Diariis bal-
neum esse.

Quando
lauandi fe-
bricitantes.

Putrida fe-
bribus bal-
neum con-
ducit.

rem-

Aremedium est. In intermissentibus vero febribus esse saltem hunc Cuius liquoris, qui
 Galienum lib. 1. therap. meth. ad Glaucum, ita de tertiana ex quo scribit: cum ingit
 duntaxat huiusmodi febribus, et ab ipso rebus huiusmodi duntaxat. Et si 12. huiusmodi purgationes, repetantur
 sed quod ipse duntaxat huiusmodi duntaxat. id est: Saltem calida ex aqua potabili profusa, tum quod ipse
 la intermi
 nentibus
 3. et 4. di
 12. huius
 12. huius

[illegible]

care videtur Galenus, etiam ante conceptionem morbi in tertium febris exquisita eos qui deficiunt semel aut bis tuto lauari posse: coctionis autem notis apparentibus etiam si tertia usque quis lotus fuerit, nihil obesse. In tertia vero nota balneum quoque expedit, at non nisi ubi coctionis signa apparuerint. Hinc est quia scribitur: *si febris cum alacritate regatur veli ducere debet* quod Hippocrates dicit, *et sic de quatuor diebus non prima nisi melle*. Idem hoc quod iam ex Galeni sententia diximus docet Paulus lib. 2. cap. 2. 4. 5.

In quarta denique non solum Hippocrates lib. 2. & 3. de morbis balneum probat, sed & Galenus lib. i. ad Glauconem. Denique in libro de tafe inquit : « τα βαλάνια πάντα πρὸς τὴν ἀναισθησίαν καὶ τὴν ἀναισθησίαν καὶ τὴν ἀναισθησίαν καὶ τὴν ἀναισθησίαν quod est: Hic est solus sine quidem alium alterum febris complicatione constituit, omne tempus ad balneum idoneum exiliet. Item docet lib. 10. cap. 10. lib. 10. method. Sed oportet ut prius e

Contra laborem zger in balneum super lectulo deponetur, ne vires resoluantur. Aulicenna denique in febribus balneum non raro probat, quem mitum est cur hic vt principem suum non sequentur. Inter Arabes etiam balneum febribus vtile esse sta-

ruit Ahenrois, qui 7. cap. ap. ita scribit: *Et fias quoddam balneum in declinatione febrium collaudatum, quoniam superfluitates enecat subtiliter. Adeo ut mirari satius non posim, cur nostra astate medicinam exercentes in vimmeris omnes, tertiana etiam exquisita correptos, febri citius ad balnea accedant. Sed tantum ex Valeio colligere licet, id nulla alia ratione fieri, nisi quod hodie arbitrantur sudorem in fine accellionis factum sufficere. Post verba Valeii sic modicus, quæ scribit lib. 7. cap. 7. in eum modum: Antiqui possi dissolvenda summa balneabant in aqua dulci tepida, & valeo eis, ut vult Galenus. Iam autem*

Dicunt vulgares, quod vera, brevis est terminationis, ideo nunc tales non ponuntur in balneo, sed sufficit eis quod fudent in fine paroxysmorum. Quibus sane Valscii verbis quid stultius, quid denique magistridum esse posset, non videri. Et enim si balneum febricitantibus, ut faceret, vtile est, quid est cur non adhibendum putet: neque enim plus, multo minus Medicus censeri debet, qui commoda aegrotanti auxilia denegar. Rursi præterea dignum est, quod tertiana ex quivis correptis ideo non balneandis esse existimar, quia brevissima sit, quasi Hippocratis ac veterum seculo non itidem brevis fuerit tertiana, quam tamen 4. aphorism. 59. scribitur: *tertiana quædam est, quæ non debet balnari, quia brevis est, id est: Tertiana ex quivis septem circuitibus, quod semper tertium est, indicitur.* Nemo tamen veterum hoc propter breviam abhor-

Eribus baino interdixit. Scutissimum autem est, quod ait hodie a baino prohibendos esse, quia in accessibus sine fudent. An non Hippocratis Galénique temporibus Videant itaque studio quam scilicet sit Valeat & aliorum, qui hanc imitantur ratio, ut puer penicillam refellere possit. Quapropter probatissimos potius medicos et scriptores, quam frigidos illos sophistas sequantur veritatis amatores monito: e quibus præter sterilem ac inconcinnam loquacitatem, nihil plane fructus sperare possunt.

*Flammam bilem tenuemq; succos: et facilius ex corpore educantur non indigere: et crassiores: edantur, quemadmodum prater omnem rationem
Auscenna credidit.*

VICENNA *Fem. 1. Cap. 4. traſſ. 2. cap. 7.* de intentione ad curationes vniuerſa-
 les febrium putredinis inter cætera ſic ſcribit: *Non cuacnet materiam indigeſtam in*
 KKk †

A humores meatus corporis pertransire non possunt, atque adeo in aliqua parte corporis firmati manent. Si itaq; tenues existentes nisi prius crassiores fiant educi non possunt, quare Hippocrates illos eadem die purgantibus medicamentis esse vacuandos mouet? Respondet hic Auicenna, aut quispiam eius hominis patronus, rationemq; afferat cur tenues humores Hippocrates, omnesq; alii veteres sine præparatione, vel vt Auicennæ more loquar, sine concoctione, hoc est, abiq; eo crassiores fiant, inuocandos docuerint. Nullam certe aliam efficaciorē quam vacuandi facilitatē, quæ & ex parte humoris vacuandi, nec non impellentis naturæ se tenet, afferre poterunt. Quod enim tenue est, mobile quoq; sito porte, ita vt hoc nomine facilius per medicamenta trahi posse nemo non videat. Resste itaque Hippocrates

B & veteres alii crassos tantum atque tenaces humores, quique aliqua corporis parte firmati sunt, antequam vacuentur præparatione egere scribunt, neque aliquis præter Auicennam in eam insaniam delapsus est, vt hilem præparatione, vel vt ipse appellat, concoctione indigere putauerit. Hæc enim cum semper acutos morbos, testē Galeno 7. aphor. comm. 32. faciat, & in acutis morbis, vt idem 2. aphor. comm. 24. docet, circa principia statim, primo videlicet die medicamentis purgantibus sit vacuandum, ne vt nihil necesse sit hunc fieri crassierem. Ex his igitur omnibus satis probatum est, tenues humores non indigere vt crassiores fiant, quo ductu faciles sint, cum quanto tenuiores sint, tanto promptius trahentia medicamenta sequantur. Hinc Galenus libro 2. aphor. 9. vbi de humoris præparatione agit, crassificum duntaxat

C & visciditatem corrigi oportere docet: illam quidem, eo quod crassus humor motui ineptus sit, ac per angustos meatus transiituri nequeat: hanc vero, quoniam quæ suo lentore adhærent, auelli haud facile possint. Hac ratione motus & integrum de extenuante vultu huius conscripsit. Porro iam Auicennæ rationes, quibus vt in eam deueniret sententiam motus est, expendamus. Intentio, inquit, in digerendo est æquæ substantiam humoris, materiei, hoc est medicamento, vt fiat præparata ad expulsionem faciliem. Quibus verbis se in eo esse errore, in quo libro 1. cap. 41. Mesuen quoq; versari diximus, indicat, medicamentum scilicet purgans attrahendis humoribus non esse simile, quod quam vetitati ex diametro pugnet, multis ibidem ostendimus. Cum itaque medicamentorum purgantium naturam atque operationem ignorat Auicenna, nihil mirum, si tam vana ac frivola tatione seductus sit. Non enim opus est, æquare humores medicamento, cum illa antea attrahendis humoribus similia sint. Neque enim attractiones substantiarum sine similitudine fieri possunt, vt in naturalem facultatem commentarij demonstrant Galenus. Proinde cum quodlibet non trahat nisi sibi familiare ac simile, nihil ad faciliorem a medicamentis expulsionem opus est illis æquare humores attrahendos, cum antea iisdem similes sint. Nisi forte æquare dixit pro præparare humorem, vt facilius a medicamento trahi possit. Nam ita nihil absurditatis eius haberet oratio, modo non adiecisset eam esse vbi his crassior cedatur. Sin secus æquare vethum vsurpauit Auicenna indoctus admodum ad medicamenta retulit, quod ad humores tantum referendum erat. Cur

D namq; tenues humores difficilius a natura expelluntur, non medicamentorum fit ratione, sed ideo quia humores tenues ab vna parte in aliam transfluunt, atq; adeo cum in continuo sint motu, & natura eo tempore veluti furis agitata, haud recte motus suo insisteret ac dirigere possit, fit vt ab illa superari non facile queant. Ob id igitur opus est quopiam manum portigente, atq; ad excretorios meatus humores agitato dirigente, atq; adeo illico medicamentum purgans adhibendum, quod humores sic turgentis familiaritate sua attrahat, id quod omnium facillime fit, eo quod tenuitate sua promptè per angustos venarum meatus ferri possint. Sed inquit Auicenna, Subtile facile membrum immergitur, vel, vt ipse loquitur, imbibitur, ideoq; difficiliter educitur. Respondeo, minime. Nam quæ facilitate immergitur, eadem quoq; educitur immergitur autem nullo alio nomine, nisi quia tenuis, eadem igitur de causa rursus attrahente medicamento facile educitur. Inefficaces igitur sunt iam dictæ Auicennæ rationes, vti aliz multæ, quas vt cunq; tanquam possibiles, et si omnium maxime impossibiles sint, consugit atq; imaginatur. Verisimum enim est: quod de eo scribit

E namq; tenues humores difficilius a natura expelluntur, non medicamentorum fit ratione, sed ideo quia humores tenues ab vna parte in aliam transfluunt, atq; adeo cum in continuo sint motu, & natura eo tempore veluti furis agitata, haud recte motus suo insisteret ac dirigere possit, fit vt ab illa superari non facile queant. Ob id igitur opus est quopiam manum portigente, atq; ad excretorios meatus humores agitato dirigente, atq; adeo illico medicamentum purgans adhibendum, quod humores sic turgentis familiaritate sua attrahat, id quod omnium facillime fit, eo quod tenuitate sua promptè per angustos venarum meatus ferri possint. Sed inquit Auicenna, Subtile facile membrum immergitur, vel, vt ipse loquitur, imbibitur, ideoq; difficiliter educitur. Respondeo, minime. Nam quæ facilitate immergitur, eadem quoq; educitur immergitur autem nullo alio nomine, nisi quia tenuis, eadem igitur de causa rursus attrahente medicamento facile educitur. Inefficaces igitur sunt iam dictæ Auicennæ rationes, vti aliz multæ, quas vt cunq; tanquam possibiles, et si omnium maxime impossibiles sint, consugit atq; imaginatur. Verisimum enim est: quod de eo scribit

F namq; tenues humores difficilius a natura expelluntur, non medicamentorum fit ratione, sed ideo quia humores tenues ab vna parte in aliam transfluunt, atq; adeo cum in continuo sint motu, & natura eo tempore veluti furis agitata, haud recte motus suo insisteret ac dirigere possit, fit vt ab illa superari non facile queant. Ob id igitur opus est quopiam manum portigente, atq; ad excretorios meatus humores agitato dirigente, atq; adeo illico medicamentum purgans adhibendum, quod humores sic turgentis familiaritate sua attrahat, id quod omnium facillime fit, eo quod tenuitate sua promptè per angustos venarum meatus ferri possint. Sed inquit Auicenna, Subtile facile membrum immergitur, vel, vt ipse loquitur, imbibitur, ideoq; difficiliter educitur. Respondeo, minime. Nam quæ facilitate immergitur, eadem quoq; educitur immergitur autem nullo alio nomine, nisi quia tenuis, eadem igitur de causa rursus attrahente medicamento facile educitur. Inefficaces igitur sunt iam dictæ Auicennæ rationes, vti aliz multæ, quas vt cunq; tanquam possibiles, et si omnium maxime impossibiles sint, consugit atq; imaginatur. Verisimum enim est: quod de eo scribit

KKk 4

Auicenna
rationes
sistunt.

Non opus
est æquare
humores
medica-
mento.

Obiectio
distinguitur.

proque adeo intestinatandem frustra impet alium excerountur. Hinc reſultat

[illegible]

Dysentery
laborantes
animo de-
cunt.

Aucenna
dylentrix
curatorem
relicta
de.

Paulus in-
est veniens
non cor-
numera-
dos.

A purgandi virtute dum affatur: quod autem adhuc de illa remanet tantum existit, ut ad perrendos dysentericos sufficere possit, id quod quotidiana etiam nos experientia docet. Lupus namque utcumque cicur est, lupus tamen permanet: ita theubarbarum utcumque torrefiat, thabatharum tamen manet, nec purgandi facultates suas penitus amittit. Quum itaque dysenteria correpti purgandi non sint, ut iam ostendimus, ideo nec etiam torrefactum Rheubarbarum tuto illis dari potest. Nam, ut Galenus lib. 9. simpl. testatur, relinquitur in eo, ut omnibus aliis visulatis, id est, ignitio quædam, quam per abluionem abstergere oportet. Præfaretur igitur non costum exhibere. Quum enim Mesue etiam testimonio, Rhabarbarum sit tantum amarum & adstringens, atque minime acre, visum, ut Galenus libro 1. de simplicium medicamentorum facultate capite primo, auctor est, acrimoniam assumit, adeoque exulceratis intestinis magis nocet. Quid multis opus est: si dysenteria correptos quis probe curare voluerit, veteres imitetur oportet, qui vnum hoc studebant, ut primum abstergerent, ac dein mox exulcerata intestina glutinarent, nam hæc vera dysentericæ medendi ratio est. Erroneam vero hodie medicentium methodum plane fugiat, quæ purgantia medicamenta adhibenda docet, nam ipsissima ægrotantis mors est, id quod non pauca hodie multorum sic intersectorum exempla monstrant. Et nisi nominibus parcendum esse mihi impetrassem, aliqua his interficerem, ut saltem aliorum periculo quidam sibi cauere discerent.

Colico cruciatu tentatus validis medicamentis purgantibus, ut hodie multis faciunt, non esse purgandos.

C **Cap. XIV.**
MVTROS hodie Medicorum in colico affectu valida exhibere medicamenta purgantia non aliunde certius nisi ex practicum, ut vocant, quos imitantur, libris deprehendere licet: passim enim electuaria Indi & diaphenicon coli doloribus correptis propinanda esse docent, quarum tamen compositionem turbit, scammonia, aliaque similia medicamenta ingrediuntur. Quantum vero à vera medendi ratione aberrant vel hinc colligi potest, quod magnam humorum, valida sua vi, copiam ad ventriculum, atque dein ad intestina trahunt, qui illa plus subinde distendunt, atque adeo coli dolorem auctiorem reddunt. Is autem eo vehementer fieri solet, quo maior illi obstructio fuerit, quod tum una cum excrementis, humorum quoque purgantia medicamentorum attractorum multitudo in intestinis detineatur, quod sane non sine magno dolore & periculo ægri accidit. Quare consultum est medicamenta exhibere ea quæ humoribus noxiis tantum educere, nec aliunde alios attrahere possunt. Testis Galenus lib. 2. ther. meth. cap. 7. ubi ex duabus historiis docet fortia medicamenta colicis non esse exhibenda. Vna est de quadragenatio quodam, qui cum colo laboraret, non modo nihil a fomentis tum humidis tum siccis leuatus, sed nec cataplasmas nec clysteribus ex rutaceo oleo, castoreo, melle cocto cum pipere confectis, verum potius exacerbatus est. Cum igitur mordentes succi in tunicis intestinorum immergi dolore facerent, hiera picra non semel, sed iterum atque iterum ex moricis quibusdam intervallis vacuatus, prorsus sanatus est. Altera de iuvene quodam qui non raro ante colico cruciatu affectus fuerat, accepto scammonia succo purgatus est. Cum autem bene largiterque fuisset vacuatus, aliaque multa, quæ ibidem Galenus recenset, adhibita fuissent, post deinde per circuitus similis rediit cruciatus. Audiens autem eius symptomata Galenus, intellexit noxam ex scammonia, quæ aliquid a toto corpore ad loca ventris detulit, in illis maxime intestinis, per cubuisse, quæ prius etiam imbecilla fuerant. Ex quibus sane historiis nemo non videt Galenum diligenter monere, ne colico affectu laborantibus purgantia medicamenta, fortia præsertim, propinemus, quod inde æger nihil leuetur. Hinc ut cautos faceret Medicos, ne simili noxa ægros afficerent, lib. 1. de affect. loc. modum, quem in adhibendis medicamentis purgantibus, his qui coli cruciatibus detinentur observare debent, præscribit, dicens: Non est dubium quin possint ea exhiberi, quæ educunt humores ex intestinis, nec aliunde alios attrahunt, Paulus denique Ægin. lib. 3. cap. 43. curationem coli doloris ex professo tractans, medicamentorum purgantium nullam mentionem facit. Acque quoque sequens, p. cap. 39. & sequenti, haud aliter quam Galenus nullum nisi hiera picra

Quare colici affectus purgantia medicamenta non exhibenda.

quod lepram interdum pro cutis vitio, interdum etiam pro elephantiasis accipi
 apud Græcos ait, idque exemplo satyriasis ostendere conatur, ita colligens: *Quemad-*
modum satyriasis iuxta Græcos diuersos denotat affectus, ita & lepra. Quis autem nisi plane a-
 mens sit, illam sequelam admitteret? Fateor quidem verum esse, satyriasin diuerlos
 denotare affectus, elephantiasin scilicet, & pudendi præter naturam erectionem;
 nam id abunde Græcorum testantur scripta. Quod vero itidem de lepra dici possit,
 constanter nego. Nam producat vnum saltem testimonium ex Græcotorum Medico-
 rum libris, quod lepram elephantiasio esse vocari, & astuat Montuus, & viduum me
 fatebor. Tantus est ergo dialecticus Montuus, vt sequelas eas etiam admittat, quæ o-
 mnium maxime pugnare videntur si rectius expendas. Sed verum esse puto, quod
 vulgato iactatur pro uerbo, *Sic pueri senes*: anxie enim laborat in eo, vt ostendat saty-
 riasin significare diuersos affectus id quod tamen nemo ita inficias: at ne vno quidem
 verbo, quod omnes eruditi negant, lepram cum elephantiasin apud Græcos nonnun-
 quam coincidere, probare studeat. Verum valeat cum suis deliramentis ac ficulneis
 argumentis Montuus, discatq; potior vel meliora proferte, vel penitus sileat.

Aterbum quem vulgo Gallicum vocant, non esse eum quem Græci Lichenem, Latini vero Impeti-
ginem appellant, sed nouum potius & veteribus incognitum.

CAP. XVII.

INIURIUM me sibi fecisse hoc loco conqueritur Symphorianus Campegius, quod in
 Ica sententia illum esse suspicatus sum, quasi Gallicum morbum nō disserere a liehe-
 ne seu impetigine putauit, cum tamen omnium notissimum sit id ipsum in lib. 2.
 cap. 2. Aggregatoris Lugdunensis eum astruxisse. Et certe nisi librum hanc ad se per-
 tinere negabit, fieri cogetur hoc, quod scripsimus se sensisse. Titulus enim capitis
 in ipsum satis monstrat, qui sic habet: *De lichenem seu mentagra siue pudendagra, quam nostri*
Neapolitanum morbum vocant, Itali vero Gallicum. Quibus verbis quid (oro) apertius esse
 potest? Afferunt enim, lichenem nihil aliud esse, quam eum morbum, quem hodie
 quidam *Neapolitanum*, aliqui vero *Gallicum* vocant, ita vt mirari satis non possim, qua-
 re se sic non tenuisse ausus fuerit negare Campegius. Confinxit denique nescio quā
 annotationem, eamque passim suis libris inseruit isto lem mate. *Hoc capite respondet do-*
minus Symph. Campegius Leonardo Fuchio, qui eum de pudendagra siue morbo Gallico immerito
reprehendit. Quibus verbis iterum satis monstrat, se in ea esse sententia, vt menta-
 gram a morbo Gallico nihil disserere putet. Præterea quæ ibi contra me annotauit,
 plane ad institutum nihil faciunt. Mihi contentio est morbum gallicum non esse li-
 chensem: ille theologum agens ostendere conatur iram esse Dei, id quod nemo ne-
 gavit. Optaret certe eiusmodi nanis bonas chartas non commaculari. Mendacii
 itaque arguendis uobis potius venit Symphorianus, qui non tantum mihi, sed &
 Leonicensi iniurius exsistit. Leonicensi liquidem, quod hunc lichenem a morbo
 gallico nihil disserere docuisse asserit, cum tamen idem in libro de morbo gallico edi-
 to eam opinionem quæ morbum gallicum esse lichenem astruit, penitus explodat.
 Mihi potro, quod me morbum Gallicum ab impetigine diuersum non facere putat, &
 cum tamen constet confutationes meas legenti, me ab ista sententia fuisse olim, vt
 hodie sum, alienissimum, vt qui docuerim lichenas non esse morbum Gallicum, sed
 eum potius qui impetigo Latinis dicitur. Scio autē quid de ceperit Campegium: præ-
 positione enim in themate ad lichenem referendū, ad Gallicum morbum retulit perpe-
 ram. Atqui erroris sui eum monuisse confutatio mox sequens potuit, ita vt mirum
 sit, eum hoc loco in nostris legendis tam negligens fuerit, cum alias non raro totas pa-
 ginas, imo folia etiam integra, in sua transferre e nostris solitus sit. Sed vt hæc missa fa-
 ciamus, ad institutū reuertentes monstremus, quam turpiter errēt, qui morbum Gal-
 licum vocatū eundē cum lichenem putent. Nouus cum sit morbus is, quē hodie Gal-
 licum aut Neapolitanū nominant, fieri non potest vt lichen dicatur. Lichenas enim
 seculo etiam Hippoc. fuisse constat, harum namq; in *tertia parte aphor. 20.* inter vernales
 morbos meminit, & in *lib. de morbis*, multisque locis aliis. Quapropter recte cen-
 set Plin. qui *lib. 26. cap. 1.* lichenem morbum non Italiæ modo, verum etiam vniuer-
 sę propē Europę ante Cl. Tibetii Cæsaris principatum incognitum fuisse scribit.

Ergo

cette non estea, de qua Arabes scribunt, nec cum lichene eadem, sed potius cum lepra Græcorum, id quod hinc colliges. Paulus lichenas celeriter in lepram transire scribit. Celsus itidem de pabulis, quas in impetiginem verti inquit, doceris verbis: *Quæ minime potunda est, difficilis sanescit: nisi sublata est, in impetiginem vertitur.* Nul- lum denique in Celsi de lepra caput est, adeo ut hanc sub impetiginis nomine defecisse non levis suspicio sit. Sed sunt præter iam dicta alia multa, quæ Celsum hoc capi- te lepram Græcorum depinxisse argumento esse possunt, quæ lubens prætereo. Ceterum hic postremum cum Montuo in eunda pugna erit, qui iterum in illa, imo stolidissima annotatione sua probare nititur, morbum Gallicum dici posse lichenas, quandoquidem a symptomatibus morborum nomina interdum mutuari liceat. Quapropter ita colligit: *Morbo Gallico affectus lichen magna ex parte committari solet, morbus igitur Gallicus lichen dici potest.* Validum plane argumentum, quod vel puer infringere possit colligens: *Celi dolores paralyticis magna ex parte sequi solet, colic igitur dolor paralyticus dici potest.* Vel ita: *Pulmonis phlegmonem non raro, Hippoc. testis, phrenitis sequitur, pulmonis ergo phlegmonem phrenitis dici potest.* Quibus argumentis quid per Apolo. oro insulsius? quid magis ridiculum? Tanta est Montui in dialecticis ignorantia, ut plane minima eius artis principia non calleat. Perperam denique Galenus & Auicenna citat Montuus, cum ait, ex illorum sententia aliquando a symptomatibus morborum mutuari li- cere nomina: quasi dicat, si nomen morbi proprium ignoscatur, non licet cum sui symptoma- tis nomine appellare. Ofensem delirum, quid hic confusionis non faceret Galenus? Absit autem ut Galenum, artis Dialecticæ, quæ a confusione maxime abhorret, tam ignarum fuisse puremus. Ut vero Montui insentiam hic studiosi clarius agnoscant, locum Gale- ni, quo abutitur, breuibus explicemus, *Is in 2. liber. meth. diuersitate nomi- num, quæ morbis imposuerunt ipsorum primi auctores, indicare volens, inter ce- tera scribit, quibusdam ab ipso symptomate indita esse nomina, in quorum numero Ileos, hoc est, conuulsus, ab ipso recensetur.* Huic enim morbo a circumactione doloris in intestinis, qui illum sequitur, nomen impostum est. Nam *αἰνός* Græcis *ειρ- enomagi* & *circumulsus* significat. Tinelmos quoque morbus est, cui a symptomate, quod inducit, nomen impostum est, nempe ab assidua desidendi cupiditate & conatu, *νῆμα* enim Græcis *conari* est, & *ire contendere*. Talis etiā Dyspnœa, hoc est difficultas spirandi, & Spasmus, id est conuulsio, morbi sunt: huic enim a cōnellendo nomen inditum est *δυσπνœα*, namque conuello Græcis significat, illi autē a spirandi difficultate, quam affert, *νῆμα* enim *spiro* est, *νῆμα* autē particula adiecta difficultatem indicat. Mens itaque Galenilo- citato est, quod morbis quibusdā a symptomatis, quæ faciunt, sint imposta nomi- na: minime autē quod liceat morbos eorum nominibus appellare, in quos interdum commutantur. nā alias atr. in bilem, aliquando hæmorrhoides dicere licebit, quod absurdissimum erit. Ita passim Montuus in citando Galeno frequens est, at illorum, quæ affert, plane nihil intelligit. Quiescat itaque iam & senectutis suæ dies in oculo trēsi- gat, illudque multis. Qui quæ vult dicit, quæ non vult audire.

Non esse diuersa morborum genera Prunam seu ignem Persicum, Carbunculum atque Anthracem, ut multi medicorum hodie putant, sed unum potius eundemque, diuersis hic designari nominibus morbum.

C A P. XVIII.

SUNT non pauci inter recentiores hodie Medici, qui prunam ignemque persicum, carbunculumque, ab anthrace diuersum esse malum putent, differteque ea ratione potissimum anthracē a carbunculo, quod anthrax fiat ex materia maligniore & magis adusta, quam si rea ex qua carbunculus generatur. Hæc nimirum opinio de di- de iis tamen diuersis, tanquam morbis differtentibus, capitibus egerunt. Ex horum sine numero Valescus exiit, homo utrum tempora ferebant non indoctus, qui in tan- tum tamen desipuit, ut nomini Græco Latinam daret derivationem, anthracem ni- mirum ab antro, id est foveæ, deducens, quod foveam scilicet faciat, non intelligens F. Græcam esse dictionem, neque aliud nisi id quod Latini carbunculum nominant, significare. Cur autem boni illi viri in hunc errorem, ut inter anthracem atque carbun- culum seu prunam differtentiam statuerēt, lapsi sint, Arabes, quorum lectioni nimis additi fuerunt, occasione dederunt. Inter hos namque Rhazes in libro *Divisione cap. 123.* de igne

Montui po-
strema an-
notatio re-
sultat.

Locum Ga-
leni expli-
cat.

Tinelm.

Valescus
persicu-
m.

hi etiam cellaturam, nisi tamen aliud quid obſtet ex iis, quæ venam incidi veſent. Paulus quoque Ægineta haud ſecus medendum carbunculo, loco prædicto docet: dicens: *Medendum itaque iſſiſſi, niſi omnino perpuſilli ſint: ſanguinis ſcilia vena detractio, ad animi uſque deliquium auferendo.* Idem ſane remedium quod prædicti auctores Auicenna prunæ igniq; perſico accommodandum docet iis verbis: *Necceſſaria eſt phlebotomia ut euacuetur ſanguis cholericus, & quando ægritudo eſt timorofa, tunc neceſſarium eſt iſſam appropinquare ſyncope.* Quæ verba, quoad venæ ſectiõnem attinet, pulchre cum Galeni & Pauli ſententia quadrant: variant autem multum ſi ad cauſam carbunculi, quam latenter hic Auicenna inſinuat iis verbis, & euacuetur ſanguis cholericus, reſpexeris: neq; enim a bili carbunculum Galenus in ſecundo ad Glauconem fieri ait, ſed a ſanguine craſſo, hæc ſtento a ſeruente, id quod & Paulus docet, dum generari carbunculum inquit, cum reſerbuert ſanguis, copioſiore & atra bile abundans. Porro ſi pruna a bile ſua generatur, vt Auicenna ſomniat, quomodo hic curatiõnis modus ſi quæ alibi ſcribit, conueniat non video. Paſſim enim ſanguinem bilis eſſe frenum clamat, & Canone primo cauendum eſſe admonet, ne immodica ſanguinis miſſione ægum ad humorum bilioſorum ebullitionem perducamus. Quapropter iuxta huius in aliis locis placita, in morbo ex bili ſanguine bilioſo procreato, venæ ſectio non competit, vel ſaltem non tanta, quæ ad animi defectum perducatur. Hinc falſum in vniuerſum ſit oportet quod dixit Auicenna, prunam ex ſanguine bilioſo generari, cum potius ex craſſo, ſæculentoq; ſeu melancholico fiat. Id quod Auicenna quoque ſibi ipſi contradicens, *Fen. 3. Canon. 4. tractat. 1. cap. 1.* fatetur, ſic ſcribens: *Ac vero ex ſanguine craſſo malo ſunt ſpecies exiturarum malarum. Nam ſicuius malitia vehemens ſit, & ipſius aduſto, proueniet eryſipela, & veniet combuſtio & craſſa, & deterior ea eſt igni perſeius.* Ceterum non eſſe diuerſum carbunculum a pruna, teſtantur & reliqua, quæ de illius curatione Græci tradunt. Galenus namque *14. therap.* ſic de illo inquit: *Quia etiam ſcarificare eiſmodi tumores poſſit ſanguinis miſſionem, alienum non ſit. Sumo autem inſiſſiones medicoribus altiores, propter inſiſtantiam humoris craſſitudinem. Quem ſecutus Paulus ita ait: Poſt vero ſanguinis vena miſſionem, ſcarificationibus incumbere altioribus neque alienum fuerit neque aſurdum, ob humoris craſſitudinem.* De prunæ autem curatione Auicenn. in hunc modum: *Et forte eſt neceſſe & proprie in pruna facere ſcalpellationem profundam, ut egrediatur ſanguis malus conſtrictus in ea qui eſt in natura venæ.* Et non fiat illud quando materia eſt ucluiſ ad choleram. Ex quibus iterum innotefcit, carbunculum a pruna non diſſerre. Animaduertendum autem raro admodum fieri vt Auicenn. veritatem ſincere doceat, ſemper enim adtexere ſomnia ſolitus eſt, id quod vbi factum fuit, mox hunc in ſcopulum impigſſe certum eſt. Exemplo erit nobis hæc locus, in quo ſane pulchre cum Galeno & Paulo ſibi conuenit a binitio, in fine autem dum ait, Et non fiat illud quando materia eſt decluiſ ad choleram, iterum ad priorem reſpicit errorem, putatq; prunam ex bili ſua poſſe procreari, id quod paulo ante conſutauimus. Adeoque merito bonis omnibus ſuſpectus eſſe debet Auicenna, quod ſere nunquam non falſa veris permiſceat, quæ nemo niſi acri iudicio prædius ſit diſcernere queat. Et mirum certe admodum eſt tam timidum in carbunculo fuiſſe Auicenn. vt dum materia declinaret ad choleram, profundam ſcarificationem prohiberet, cum tamen capite ante hoc texto, de cura formicæ, ex Galeni ſententia exſtirpare formicam cum aliquo quod ſit ſicut embuba, & extremitas pennæ aut alterius rei, cuius extremitas ſit acuta, quâ poſſibile ſit deglutire formicam, docuerit. Quæ tamen exſtirpatio formicæ ſi diligenter inſpiciatur, multo eſſe quam ſcarificatio violentior deprehenderetur. Quare ſi hanc timuit Auicenn. quando materia erat decluiſ ad choleram, multo magis tale aliquid facere formidare debuit in morbo cuius materia non tantum ad bilem decluiſ, ſed mera bilis, vt ipſe putat, exiſtit. Errata autem hoc loco Auicenn. falſoq; Galenum citat, qui id præſidii non ad carbunculum, ſed myrmecias pories, vt ſequenti capite dicemus, accommodauit. Sed vt ad nauſeam uſq; eſtendamus prunam ſeignè perſicum a anthrace carbunculoque non diſſerre, in alia quæ in Auicenn. de prunæ curatione ſequuntur, cum iis quæ Galenus & Paulus de carbunculi medela ſcribunt, conſe-

Pruna ex
ſanguine
craſſo fit.

Auicennæ
doctrina
ſæpe ſyn-
cra.

conſe-

- A** *ἡ μύρμηξ ὅς ἐστι τὸ πρὸς ἡμῶν ἔχον τὴν τιμὴν ἀναστρέφει τῇ μερμηρίᾳ τοιαῦτα τὰ ἄνθρωποι. καὶ ὁ ἄνθρωπος ὅστις διὰ τὸν τοιοῦτον αἵματι εἶσθαι τὸ πρὸς ἡμῶν ἔχον τὴν τιμὴν ἀναστρέφει τῇ μερμηρίᾳ τοιαῦτα τὰ ἄνθρωποι. καὶ ὁ ἄνθρωπος ὅστις διὰ τὸν τοιοῦτον αἵματι εἶσθαι τὸ πρὸς ἡμῶν ἔχον τὴν τιμὴν ἀναστρέφει τῇ μερμηρίᾳ τοιαῦτα τὰ ἄνθρωποι.* Quod est: *Aequè autem et valente aliqua penna circulo myrmecia imposita, ipsam educimus. Debet porro penna fistula esse myrmecia et fistulæ par, ut eam undaque prorsus constringat, quæ postea circumacta, ac simul deorsum impulsâ, celeritate ita myrmeciam cum ipsâ radice totam educet. Hunc sane modum curandi myrmeciam ipsemet etiam Auic. docet Fen. 7. Can. 4. tract. 3. cap. 13. nec tamen ad Gal. auctore refert. Sed sic solet Galenum citare Auicem. ut illum, ubi maxime opus sit, prætermittat, ubi vero reticere, citet. Neque mirum, eiusmodi n. fere omnia sunt Persico confusionem peperit Auic. neque n. quid sit ignis Persicus, aut quæ ex causâ procreatus, ex illius scriptis satis sciri potest. Interdum namque illum ex sanguine crasso & melancholico generari scribit, ut Fen. 3. Can. 4. tract. 1. cap. 1. ubi sic ait: *Ἄν τις ἀπὸ τοῦ crasso malo sitis species existaturum malarum: nam si eius malitia vehemens fuerit & ipsius adustio, promouet erysipela, & eveniet combustio & crusta, & deterior est ignis Persicus.* Aliquando ex bile flava originem ducere insinuat, ut capite 16. ubi ita de curatione prunæ scribit: *Ἀπὸ τῆς φλεβοτονίας, ὅς ἐκacuatur sanguis cholericus.* Per id enim, quod ait, sanguis cholericus, latet iter innuis, prunæ causâ esse bilem flavam. Ad hæc igne Persicum nunc idem morbi genus, ut sane est, cum pruna facit, veluti Fen. 2. Can. 4. tract. 1. cap. 9. ubi in hunc modum scribit: *Hæc duo nomina absoluti sunt super omnem pustulam corrosivam, vesicantem, adurentem, facientem accidere escibari, quæ sitit accidere combustio & cancrium.* Interdum autem diuersum etiam a pruna esse tradit, ut facit capite eodẽ, dum ita inquit: *Ignis Persicus vehementius cholericus, & pruna vehementius melancholica.* Nonnunquam etiam ipsum ad formicæ corrosivâ transfert, sicut cum eodem loco ait: *Et quandoque absolutur nomen ignis Persici de illis super quod est illis pustula de genere formicæ, comestiva adurent, vesicans, in qua est aliquid ambulans.* Interdum vero cum formica miliari confundit, veluti cum capite iam citato sic inquit: *Et quandoque sunt cum formica speciebz & miliarium mala febres vehementius caliditate perniciosa.* Quibus verbis satis indicat, iuxta suam sententiã ignem Persicum & formicâ miliarẽ parum aut nihil differre. Proinde parum referre existimat, utrũ ignis Persici vel formicæ miliaris signa manifestet. Evidentissimum itaque igne Persicum Auic. nõ satis cogitum fuisse, neque n. alias tã ambigua de illo scriptis. Id quod probe expendat cupio nostri seculi Medici, ut tandem intelligere possint, quantum in Auic. libris sit tenebrarum, quantæ etiam nõ admodum eruditis errandi illic occasiones occurrant: vix enim pagina, in qua homo hic sibi recte constet, & non ex diametro pugnantia scribat, ut hoc nomine mirari satis non queam, qui factum sit, ut illum antea cæcis Medici principem suum statuerint. Atque conueniebat forte, ut cæcis militibus dux cæcus obtingeret.*

Auicennam perperam omnibus Bubonibus indiscriminatim remedia reprimenda adhibere, cum hi tantum qui ab humoribus non malignis ortum habent, conueniant.

CAP. XX.

- N** E ex ignotis sermo noster procedat, animaduertendum Althohoin Auicennæ esse *Althohoin* id, quod Græcis *Βουβών* dicitur, id quod in primis testantur verba eiusdem, quæ scribit quod, Fen. 3. Can. 4. tract. 1. cap. 17. ita dicens: *Antiquissimi antiquorum nominauerunt eam nomen, quod translatum est in Arabicum Althohoin, omne apostema existens in membris glandinosa carnis, aut alibi. Quemadmodum n. Auic. althohoin glandularum esse phlegmone docet, ita etiam Gal. 1. ad Glau. bubonem, sicut nimirum inquit. *Ἰν ᾧ ἔστι μὲν βουβὼν, ὃ τὸ φlegmon αἰσθῆται, ὃς ἐστὶν ὁ βουβὼν, ὃς ἐστὶν ὁ φlegmon.* quod est: Sunt quidem bubo, phyma, & phlegmon glandularum seu partium laxarum vitia. Bubo sane phlegmone. Quinetiã Paulus lib. 4. capite 22. scribit, *bubonem glandularum adenumque vitium esse.* Constat autem antiquos Græcos; omnium quod*
- F** generum præter naturam tumores in quacunque corporis parte factos bubones vocasse. Paulatim deinde ad certa aliqua genera contracta vox fuit, priuatimque dicti bubones; qui aut offensa propinqua parte aut viceribus aliis, aut doloribus, sine periculo in glandulis excitantur, aut qui in febribus pestilentiis præsentis periculo in inguinibus, alis, colloque ingruere solent. Cũ itaque satis etiam dictis manifestum sit *Althohoin* Auic. nihil aliud esse,

nifi id, quod Græci bubonē nominant, certum eſt, eundem errare cum *cap. 18.* iam citati A
 loci, ubi de curatione peſtilentialium bubonum agit: ſequenti enim capite, cuius titu-
 lus eſt, *de poſſematibus accidentibus in glandulis*, tradit cutam bubonum non peſtilentia-
 lium, ſic ſcribens: *Althobain vero ipſam & quod currit curſu eius de ſe, quæ nominata ſunt,*
curetur in principio cum eis, quæ conſtringunt & inſurgunt cum ſpongia inſuſa in aqua & aceto, aut
in oleo roſarum, aut oleo de pomis, & arbore myſticæ, aut oleo de myrto, iſta ſunt in principio.
 Paulus ſiquidem multo aliter, quam Auicenna, iuxta duplicem bubonem, ſuam cu-
 rationem diſtinxit. In primo enim, qui ex humoribus non malignis oritur, refrige-
 rantibus atque adſtringentibus medicamentis utitur. In ſecundo veto, in quo humo-
 res venenati ſunt, refrigerantibus & reprimentia remedia plane negligit. Sed verba B
 eius ſubiiciamus: *Verum priores bubones inter initia ſtatim, quemadmodum quævis phlegme-*
ne, præſiſſis refrigerantibus & adſtringentibus auertuntur, veluti ſpongia ex poſſa impoſita, vel
lana ex vino, & oleo acerbo, vel roſæto, vel melino, vel lentisſimo, vel myrtilimo imbuta. Porro
 in febribus, vel in humorum malignitate, auerſanda ac ſugienda ſunt, refrigerantia
 & reprimentia, ne ruſus retruſa in profundum deſcendant materia, ſed a diſcutiendi
 facultate præditis conſectum auſpicandum eſt. Sic Galenus libro 14. *ther. meth.* ubi cat-
 bunculi curationem tradit, refrigerantia & valde reprimentia cauenda eſſe monet.
ἡ δὲ τῶν πυλῶν καὶ πύλων ἵνα μὴ τὴν φλεγμὴν τῶν πυλῶν, τὴν δὲ φλεγμὴν τῶν πυλῶν ἡ δὲ τῶν πυλῶν τῶν πυλῶν,
πύλῶν τῶν πυλῶν, ἡ δὲ τῶν πυλῶν τῶν πυλῶν, ἡ δὲ τῶν πυλῶν τῶν πυλῶν, ἡ δὲ τῶν πυλῶν τῶν πυλῶν,
ἡ δὲ τῶν πυλῶν τῶν πυλῶν, ἡ δὲ τῶν πυλῶν τῶν πυλῶν, ἡ δὲ τῶν πυλῶν τῶν πυλῶν, quod ē:
Imponi autem ſibi laborant particula, quod ad inflammationem ſpectat refrigerantia diſiderat. C
Cæterum propter humorum craſſitudinem, atque etiam maliſiam, nec fluxionem auertere poteris. Et ſi
quando id feceris, aliud quippiam, quod in alto ſit corpore offendet. Ita & noſtræ ætatis Medici in
 vniuerſum omnes bubonibus peſtiferis nullo pacto refrigerantia reprimentiaque me-
 dicamenta, ſed calida potius & digerentia diſcutientiæ adhibent, intelligentes con-
 tractis præſidiis ad interiora penitus humorum impetum verti. Mirum igitur eſt, cur
 Auicenn. præceptum id quod *Fen. 1. Can. 1. doct. 1. cap. 1.* inculcat, neglexerit, quo mo-
 net, omniſus phlegmonibus adhibenda eſſe ab initio quæ refrigerare atque reprimere
 poſſint medicamenta, demtis iis, quæ ſunt de materiis, ita enim loquitur: quas princi-
 palia membra expellunt. Quis eſt autem qui neſciat bubones peſtilentes a membris D
 principatum in corpore habentibus emergere? Neque enim temere Hippoc. 2. *peri.*
6. epid. 4. ait: *αἱ ἀνταίαι, αἵτε βυβῶνες, αἵτινες πρὸ τῶν μελῶν ἐκέρχονται.* hoc eſt: *Abſceſſus, velu-*
ti bubones, ſigna ſunt eorum membrorum a quibus ſuppuſulant. Si quidem qui a cerebro emer-
 gunt, in collo apparent, qui vero a corde, ſubalis, quemadmodum ii qui ab hepate, in
 inguinibus. Proinde nunquam huſ reprimentia ac refrigerantia medicamenta adapta-
 re licebit, quod alias ad ea inembra, quæ in alto ſunt conſtituta, quæque principatum
 gerunt in corpore, humores maligni derrudantur, quod non ſine magno ægri pericu-
 lo, imo certiffima morte fieri ſolet. Hoc iterum ſatis liquet, Auicennam ſua ſere om-
 nia vtcunque ſine omni iudicio & delectu corraſſiſſe, quando omnibus etiam diſtis
 conſiſt, ea remedia, quæ bubonibus a non malignis humoribus ortis debentur, peſtife-
 ris adhibuiſſe, adeo vt eius Canon merito confuliffimum chaos dici poſſit. E

*Cenam non in vniuerſum, ut ſere omnes noſtra ætatis Medici docent, prandio minorem eſſe
 debere, ſed ut plurimum pleniorē.*

CAP. XXI.

Nemo eſt, qui hodie medendi methodum præſcribentium libros vel a limine ſalu-
 tauit, qui neſciat vulgatum atque tritum hoc illis eſſe decretum, vt nunquam non
 prandio cœna minor ſit. Quantum vero aberrant, facile deprehendit qui reſtaltius
 expendit. Cœnam enim in omnibus, demtis iis, qui morbis nocturnis & etatibus F
 ſeu deſtillationibus affliguntur, prandio pleniorē eſſe conuenit. Qui enim iam no-
 minatis corripiuntur morbis, horum cœna omnino modica ſit, tenuis, ſicca, ac præter
 aliorum morem, noctemque præueniens oportet, vt ingruentibus ſcilicet morbis, na-
 tura ab omnibus aliis muniis libera, vnius morbi concoctioni operam nauare queat.
 Sunt & qui conſueuerunt minus in cœna ciborum aſſumere, quam in prandio, horum

certe

- A** certe consuetudo non temere etiam immutanda est. *in quo in modis hinc ostenditur, ut ait Hippoc. 2. Aphor. 50. ubi dicitur: In aetate senectutis immutanda sunt.* hoc est: *Quia enim ex longo tempore consueverunt, esse deteriora fieri, insuescit minime molestare solent.* Cur autem in aliis omnibus plenior cena salubrior sit, multa in causa sunt. Primum autem omnium noctis innox accessio, dens frigiditas, quæ extrinsecus circumstant calorem nativum in profundum secedere, & hoc nomine fortius fieri cogit, ita ut necessario ciborum tum melior fiat concoctio. Et certe idem potest noctis frigiditas, quod alias anni tempus hybernium, aut regio frigida potest. Horum enim unumquodque calorem nativum adaugere potest. Testatur Hipp. qui lib. 6. epid. 10. 6. sic inquit, *in hyeme ventres hyeme & vere natura calidissimi esse astringit.* In 1. aph. 15. quoque ventres hyeme & vere natura calidissimi esse astringit. Deinceps est somnus, qui cenam sublequitur, hic enim mirum in modum concoctionem adjuvat, ut si quis in somno non manducet, ut testatur Hipp. 6. epid. 10. 5. aph. 29. id est: *Sanguis enim in somno ad interiora magis refugit.* Cum itaque sanguis, cumque eo calor nativus per somnum ad interiora secedat, quid mirum si calor auctus fortius concoctionem ciborum efficiat? Hinc rectissime Hipp. lib. 6. epid. 10. 5. aph. 10. dixit: *in somno visceribus prodest.* Somnum quoque optime cibum concoquere testatur Galenus libro primo de Symp. causis ita scribens: *visceribus ut eo facilius cibum concoquant.*
- C** quis dormit, animalis facultas quiescere, naturalis vero validius agere videtur. Cuius rei confirmatio ex eo facies, tum quod ipsi qui tum laboraverint, post somnum robustiores evadit, idque maxime, cum a modico cibo somnum admittimus, tum etiam quod per somnum cibum optime concoquitur, non solum in ventriculo, ut amicitiam per ventris corporis habemus. Cui subscribit quoque Paulus Aeg. lib. 1. cap. 97. dicens: *Somnus est, in malum siccitatem quies, ab utroque humore cerebrum ad faciem proveniens: hunc qui ite capessit, multa consequuntur commodum, cibos enim conficit, humores digerit.* Quod autem hac ratione plenior cena esse debeat, testatur Gal. vel quisquis tandem eius libri auctor fuit, in lib. de dissolutione continua, in hanc sententiam scribens: *Antiqui cenam prandio præferunt, præcipientes plus ciborum in cena sumendum esse, ob calorem circa interiora aggregationem noctis frigiditatem, & per somnum factam. Color namque in somno ad interiora corporis accenditur, eademque calefacti, perinde ut in vigilia contrarium plane accidit. Id quod Hippocrates etiam epid. 6. 10. 4. aph. 12. his verbis indicavit: in nocte in vigilia diutius in somno, non in vigilia diutius in somno, quod est: Plane vigilans calorem circa exteriora, frigidior vero circa interiora. Dormiens contra.* In cuius aphorismi explicatione nonnulla etiam in nostris commenda. his produximus, quæ ad institutum facere possunt. Sed hic reclamabunt quidam, pleniorque cenam ideo damnabunt, quod pleno ventriculo ingrata sit quies, atque adeo somnus minus conveniens. His ita responsum volo: *Nemo est tam sine sensu communis, qui neque inter cenam & somnum aliquid temporis interuenire debere, neque quemadmodum in bruto, nullum aliam nisi vorandi ac mox dormiendi visum ducem esse, quum omnium Medicorum consensu consilium sit, ut inter cenam & somnum aut hora aut amplius intersit.* Neque etiam est, ut plenior cenam quis eam esse putet, quæ multa ingeruntur tanta voracitate, ut vix spirare liceat, & periculum sit, ne vel crepant, qui ita seie replent, sed frugalem potius, talem tamen, in qua plus quam in prandio assumitur ciborum. Quod si tamen hic parum peccatum fuerit, melius certe id quod admittitur est in cena, quam in prandio teritur, quod somnus post cenam non diu subsequens, facilius delictum quam vigilia quæ prandium concomitat, corrigat. In somno enim, ut diximus, calor interiora petit, & quæ illi sunt, cibis concoquendis solus vacat. Interdum vero ad exteriora protrahitur, neque ita quæ intus sunt perspicere potest, adeo ut verissime dixerit Hippocrates 2. vict. acut. 59. *in vigilia in somno quæ intus sunt, non in somno videntur.* hoc est: Vigilia vehementer eruditatem in concoctionem quæ ciborum tum potius efficit. Porro ut cenam prandio plenior esse oporteat & hæc ratio est, quod rata admodum existat corporis facultas, quæ paulo liberalius prandium spatio vel quinque vel sex horarum, quod fere inter prandium & cenam interit, conficere possit. Quantum autem incommodi adfert, si quis nondum plane concoctio eo, quæ prius ingestum fuit, aliud ingerat

hinc manifestum est: morbum enim facit *τὸν ἀπὸ τῆς τροφῆς παρὰ τὴν φύσιν*, ut ait Hipp. 1. aph. 17. *οἷον* τὸ τοῦτο *τίσις* *πολλὸν* id est: *Ἐπὶ cibum prater naturam plus ingestum est*, hic morbum facit. Et si quis denuo obiecerit, utcumque somnum a cena differam⁹, tamē quando fieri nō possit, quin ad somnū cōuerſus, & materia tū ad interiora tēdat, caput impleat: huic Gal. quidē respondēbit, qui lib. 4. aph. 67. ita scribit. *ἡ μὲν γὰρ τροφή κατὰ τὴν φύσιν κατὰ τὴν φύσιν τὴν ἀρχαίαν, οὗτο αὖ τοῦτο παρασκευαίει ὁ δὲ σπασμὸς αὐτὴν παρακίπει* *αὐτὴν βαρύνει* *καὶ ἐκβαλεῖ*. *καὶ εἰ σπασμὸς διαλείπῃ* *διακρίνῃ* *αὐτὴν ἀπὸ τῆς τροφῆς, τότε καὶ ἐκπίπτει καὶ τὸ βάρος τῆς τροφῆς χρεταίνεται ὑπὸ τῆς τροφῆς* *καὶ αὐτὴν τῆς τροφῆς ἀπὸ τῆς φύσεως ἐκπίπτει* *καὶ τὸ βάρος τῆς τροφῆς ἐκπίπτει*. hoc ē: *Et quidē sicuti a cibo ad somnū cōuerſus impletur caput, sic in plethorici affectib; somni primum repletur aggrauatū cerebrū. Et somni videlicet semper nocet, quatenus ad profundū & viscera materia cōfluit, nisi colectionis ratione plus afferent utilitatis, quam sit damnum, quod ex motu ad interiora consequitur.* Et hæc ad vulgarem multique communem errorem explodendum sufficiunt, quod alibi plura etiam eade re dixerimus.

Pulcem ex avena confectam, non sine magno errore & periculo agri, a nostra aetatis Medicis febricitantibus, ac alijs quibuscumque morbis correptis, exhiberi.

Cap. XXII.

Auenam ex auena puluem, *auenatum* hodie passim nominant, non tantum in febribus, sed omnibus ferme morbis a nostrę tempestatis medicis dati notius est, quã ut multis demonstrari debeat: nihil enim æque in ore habent, atq; hoc, datur illi auenatum, cui patum aceri commixtum sit. Et dispeream si hodie in alio Medico rum esse reputetur, qui non mox ascitus ad ægtum auenæ pulvem comedendâ præstibat, præsertim si febris. eiusmodi æger correptus fuisse. Quantum a recta victus ratione, atq; adeo medendi methodo aberrant, facile iudicabû, qui auenæ tẽperamentum atq; facultatẽ expendit. Quod enim ad temperamẽti rationẽ attinet, euidentissimũ est eius pulsẽsum febricitantibus non competere: eis enim Hippocrate teste. 1. aph. 16. victus humidus confert: auena vero non tantum sicca, sed calida quoq; existit, adeo vt hoc nomine veteres eius puluem ad cohibendam aluum etiam viũ sunt. Testis est Diosc. qui li. 2. cap. 104. ita scribit: αλευς· Άνα τρι βήμων σίτου καυθέντων κνισίν, l. Ex pulue auenae alium siccatur. Cui subiicit Paulus Ægineta li. 1. ca. 79. his verbis: Avena calida est, & siccandi vim habet, exigni alimentis est. Et lib. 7. in hunc modum: Avena similem hordeo vim obtinet, desiccans autẽ, & mediocriter sine mortificatione digerit. Adstringit quoq; nonnihil, quod si, vt ventris diarrhœas persanet. Quæ sane verba desumpta sunt ex libro sexto Gal. de simp. med. fac. ubi ita scribit: Αλευς εν μέρει τον άμεινον, και αν φερμας ημελων εν δολωσιν κρηνησενται ανακλυων· γαρ ελαιον εν σφραγιδι αυτου εν αλειου. Εν γ αλεως ημελων αλευς το κρηνη, εν γαρυφαλις ληξαι, δε τα επι της αρτης παρεια διαβλησην ακυλουν. hoc est: Avena vinum ex leguminibus est, verum vt medicamentum similem hordeo vim habet. Nam istum desiccans & digerit mediocriter, & sine morsu. Temperiem autem habet paulo calidiorẽ, ac nonnihil adstrictiuam obtinet, vt ventris profusum iuuat. Calefacere etiam auenam in libro primo de alimentis facultatib. Galenus testatur in hunc modum, το ειδησθαι· Γενεσις του ειδησ του αυτου καυθεντος εν αλειου εν μέρει τον άμεινον, και αν φερμας ημελων εν δολωσιν κρηνησενται ανακλυων· γαρ ελαιον εν σφραγιδι αυτου εν αλειου· απροσφυτον. Θεωρησαι· ο ιανος μετρησι κρηνης εν δολωσιν κρηνησενται ανακλυων· quod est: Hoc semine in Asia per frequens est, & possimum in Asia qua Pergamo superiacet, ubi & typha & elya vberissime qđ proueniunt. Iumentaria magis pabulum quã hominũ nisi vitig, aliquando extrema fame hoc quoq; seminũ in panes corrogare copellat. Multũ calefacit, & minus quoq; corpus enutrit. Ex quibus omnib. satis liquet, auenam febricitantium nullo pacto cõuenire, primum quod calefaciat, dein ceptũ aq̃ ventrẽ cohibeat, quãdò nihil æque illis obũt, ac nõ semper apertam habere aluum. Quid multa? cum contraria contrariis curentur, non potest febricitantium exhiberi commodè pulũ auenæ: quod illi scilicet calidũ & sicca sit, atque adeo febris naturæ per-similis. Et quid opus est eiusmodi legumine ægtos in cibo viũ, quum, Galen. teste, iumentorum magis pabulũ, quam hominum existat. Minius quoq; scribit li. 8. ca. 17. quod frumenti vitium fit, ideoq; latenter Germaniz populos notat, ac de barbarie incultar, quod auenę puluem edant, neq; ipsa pulve uiuant. Hinc antiqui tantum extrinsecus eius farinam aut panem illinebant, & rarissime nisi ad sistendam aluum intra corpus adhibebãt.

Id

Et alijs quibusdam hunc fecerit, qui anasomen exactissime conscripserunt, ac posterius legendam reliquerunt, non est, cur de eius partis ignorantia quæ se excusare queat. Adigant illos ad accuratissime anatomica discenda multoties etiam eru ditorum virorum, hoc in parte commissa errata, quorum aliqua hoc tertio libro attingimus, ut saltem ex his reliqua etiam exposcari discant, atque ad alieno periculo prædicationis fiant. Id quod accidit, si non modo ex laborum inlectione agidos, verum etiam sedula inspectione, & oculata fide, cuiusq. corporis humani partiæ speciem accuratè perdidicerint. Sed de laudibus anatomæ plura in nostra Epitome de fabrica humani corporis præfatione produximus. Quam ut in singulis sequentibus paradoxis iudicandis & legendis confidant studiosi hortor. In ea enim singula, quæ ad anatomem & corporis dissectionem attinent, accuratius diligenter & copiosius tractauimus.

Sex tantum numero esse intestina, idemq. a Cornelio Celso, Auisenna, ac alijs quamplurimis, falso pyren (cu portomarinu vulgo vocatum, inter intestina connumerari.

CAP. I.

VT eo clarius veritatē studiosi in eum, quem diximus errorem, magni etiam nomi-
nis viros incidisse agnoscant, operæ pretium me facturum arbitrat⁹ sum, si omnīū
eorum, præsertim qui ceteris non nihil præstare visi sunt, verba ordine subiicerem, pri-
mūq; Celsi, quivnus hodie inter Latinos Medicos nobis exstat, sententiam deopte-
rem. Is lib. 4. cap. 1. in hunc modum de pyloro scribit: *Inde ima ventriculi pars paululum in
dexteriores partem conversa, in summum intestinum continuatur. Hanc iuncturam venter Græci vo-*
cant, quoniam porta modo in inferiores partes ea, qua excrescit sumus, emittit. Ab ea ieiunum in-
testinum incipit. Quibus utiq; postrems verbis Celsus evidenter admodum innuit, pylo-
rum esse primum intestinum, atq; adeo a duodeno nihil differre. Si enim ab ima illa par-
te ventriculi mox ieiunum incipit intestinum, a duodeno, quod proximum ante ieiunū
est intestinum, nihil differat necesse est. Eius sententiæ fuit quoq; Auic. ipse, quemad-
modum verba eius, quæ scribit Fen. 16. Can. 3. tract. 1. caps. aperte monstrant, ubi sic ait:
Et intestinum duodenum continuatum est fundo stomachi, & habet orificium sequens stomachum, &
nominatur portonarium. Quibus verbis abunde liquet, Auicennam portonarium a duode-
no non distinguere, nam ait duodenum fundo stomachi esse continuatum, ita vt iuxta
huius sententiam inter stomachum & duodenum plane nihil differt. Auicennā sequitur
Valescus lib. 4. cap. 22. ita de intestinorum dissectione disserens: *Sunt ergo tria intestina*
tenuia, & ista sunt superiora. Primum vocatur portonarium sive duodenum. Vbi Valescus quoq;
idem duodenum cum portonario facit, & inter intestinalia connumerat. Id quod facit et
Ioannes Matthæus de Gradi in suo super nomen Raziū librum commentarijs cap. 11. dicens:
Primum intestinum dicitur duodenum, quia est longum, extensum longitudine duodecim digitorum
in transverso, & huius intestini orificium primum terminatum ad stomachum, ut ad fundum eius,
dicitur portonarium. In quib. liquido apparet Matthæum haud aliter quam Auicen porto-
narium facere partem duodeni, eius scil. orificium. In eadem opinione hæret Alexan.
Benedictus, Celsum in hoc, vt alius multis, imitatus, qui li. 2. sua anatomes esp. 8. ita inquit:
Hinc (ieiunum intelligit) demum ea pars iunctura alligata est a media fere ventriculi parte, parvam
in dexteriorem partem conversa, venter Græci vocant, quoniam porta modo in inferiores partes, qua
excrescit sumus emittit, ceteriq; intestinum arctum. Ad hanc portam, sibi nactus peritum vult.
Eadem de causa hac duodecim digitorum mensuram continet. Ex quibus verbis bis lapsum esse
Alexandrum constat. Primum quod pylorom a duodeno non distinguit, sed inter inte-
stina connumerat. Deinceps quod pylorom nomen suum apud Græcos idēo sortitum
esse asserit, quoniam portæ modo per partes inferiores ea qua excrescit sumus, emittit,
Neque enī in hunc finem intestinalia præsertim tenuia, a natura facta sunt, vt per ea ex-
crementa alui inferioris emitantur, sed potius vt sint in forma deductiois alimen-
ti, vel eiusq; in chylon versum est in venas. Testis ē Gale. li. 4. de usu partu. c. 17. sic scribens:
ἔν τῳ αὐτῷ τὰς τρεῖς σπειρίματων εἰς τὸ σπασμοειδὲς ὑπερμελὲς ἀφ' ἐξου, ἀλλὰ τὴν πύλον οὗ ποιεῖται διὰ καλὰς ἀνακαταστάσεως
τοῦ αἵματος ὡς ἐν ἱστανίλει, σχηματίζον τὴν ὑπερμελὲς ὑπερμελὲς τοῦ μαινοῦ τῶν ζώων ἀπομυκτικὴν αὐτῶν τῶν
ἐξέρχοντο ἐκ ἀνωτέρω κατωτέρω δυνάμει. ἑστὶ τούτῳ οἷον ἐκ ἀνώτερου εἰς εἰς τὴν πύλον καλὰ καὶ τὴν πύλον αὐτῆς
ἐστὶν ἄνεμος. Διὸ τὸν 5 τὸν σπασμοειδὲς τὸν ὑπερμελὲς τὸν σπασμοειδὲς ζώντι γινώσκοντες, τὸν τῶν πύλων δὲ ἐκ
σπασμοειδὲς τὴν γαστρὸς τὰς γαστροὺς, οἷον μὴ τολοῦν σπασμοειδὲς μὴ δὲ μὴ ἀνακαταστήσει τὰς ἰστανίνας τὰς ζώων τὰς γαστροὺς ὑπερμελὲς
τοῦ ζώου, ὑπερμελὲς τῶν ζώων ἂν ἂν ὑπερμελὲς αὐτῶν, ὑπερμελὲς 5 ἀνακαταστήσει. id est: quod autem neq. gratia de-
lationis superflua animi proferunt, neque cancellatoris, sed ut totum id quod in chylon inchoante in

**Alexandri
Benedicti
geminus
lapis.**

電話費 =

[illegible]

Carpus
dicitur ab
errore vis-
dicare non
potest.

Galenus
dicitur libri
diligenter
perustan-
di.

intestinum pertransit ad partem remotiorem innolucatur, & pars innoluta ex intestino dicitur ie-
inum. Itaque sole clarius, Razem ac Mundinum hallucinatos esse, quod ieiunum circum-
uolutionibus plane destitutum scripserint. Neque Mundinum suum Carpus ille Bono-
nienfis ab errore vindicare potest, dicens, id intestini parte superiore effectum, inferiore ve-
ro implicitum. Nam rectum in vniuersum Mundinus stare ait. Razes etiam rectum esse
sicut vltimum intestinum, quod tam superiore quam inferiore parte anfractibus caret,
esse asserit. Ita pauci Arabum & recentiorum fuerunt, qui anatomica recte tradiderunt, libros
velim studiosos, vt Galeni & aliorum, qui nostra ætate anatomem illustrarunt, libros
diligenter perlustrarent. Et certe nulla alia causa factum est, vt totin anatome hodie cõ-
mitterantur errata, nisi quod Græcorum veterum libris prioris seculi Medici caruerint,
quos hodie renascentibus vndique bonis auctoribus, Dei benignitate, Vesalius & alii
farcire conati sunt. Vinam autem omnia veterum anatomica haberemus, ita tenim a-
liorum opera facilius careremus. Quam multa vero horum perierint, ex libro Galeni,
quem de proprijs libris scripsit, sciri potest.

Ad ileon suæ tenuis intestinum non plures pertingere venas quam ad vllum aliud intestino-
rum, id quod amen Mundinus præter veritatem asserit.

CAP. V.

Mundinus de ileo inter cetera sic scribit: Ad ipsum perueniunt plures venæ mesaraicæ,
quam ad aliquod aliud intestinum. Mundini sententiæ subscribit Carpus, qui de ileo
in eam scribit modum: In isto intestino sunt plures mesaraicæ, quam in aliquo alio propter suam
longitudinem. Sed quantum a vero deuiauerit uterque, facile deprehender, qui veterum,
Galenim maxime, ea de re sententiam paulo diligentius excussit, tum enim ad intesti-
num, quod ieiunum nominant, multo plures quam ad ileon venire venas intelligit. Is
enim h. 6. admin. anat. ita scribit: τοῦτο τὸ ἐν τῷ κοιλίῳ τῷ κατὰ τὴν ἰσθμὸν τοῦ ἡπατος τὸν κατὰ τὴν ἰσθμὸν τοῦ ἡπατος τὸν κατὰ τὴν ἰσθμὸν τοῦ ἡπατος
ἡ τῶν πλεονάζοντων, ἡ τῶν πλεονάζοντων, ἡ τῶν πλεονάζοντων, ἡ τῶν πλεονάζοντων. id est: In de tenui intestinum est, substan-
tia huic simile. Differt autem, quod neque vacuum reperiatur, neque tot vasculis scatet. Quibus verbis
aperte admodum testatur Galenus, ieiunum vasorum multitudinem vincere ileon, quod
non tot sicut ieiunum vasculis scatet. Id quod confirmat libro quinto de usu partium, sic dicens
ἡ τῶν πλεονάζοντων ἡ τῶν πλεονάζοντων ἡ τῶν πλεονάζοντων ἡ τῶν πλεονάζοντων ἡ τῶν πλεονάζοντων ἡ τῶν πλεονάζοντων ἡ τῶν πλεονάζοντων
ἡ τῶν πλεονάζοντων, ἡ τῶν πλεονάζοντων ἡ τῶν πλεονάζοντων ἡ τῶν πλεονάζοντων ἡ τῶν πλεονάζοντων ἡ τῶν πλεονάζοντων ἡ τῶν πλεονάζοντων ἡ τῶν πλεονάζοντων
quod est: Primum omnium intestinum ieiunum
suscipit in chylum versum & concoctum in ventriculo cibum. Situs autem eius est prope hepar, vasa-
rum vero multorum sunt in eo. Sic & lib. 6. ther. meth. cap. 4. ieiunum multo plures habe-
re venas innuit, dum ita ait: ἡ τῶν πλεονάζοντων ἡ τῶν πλεονάζοντων ἡ τῶν πλεονάζοντων ἡ τῶν πλεονάζοντων ἡ τῶν πλεονάζοντων ἡ τῶν πλεονάζοντων ἡ τῶν πλεονάζοντων
ἡ τῶν πλεονάζοντων, ἡ τῶν πλεονάζοντων ἡ τῶν πλεονάζοντων ἡ τῶν πλεονάζοντων ἡ τῶν πλεονάζοντων ἡ τῶν πλεονάζοντων ἡ τῶν πλεονάζοντων ἡ τῶν πλεονάζοντων
quidam intestina facilia sanata sunt, cõtrario difficultia qua tenuia sunt. Ieiunum tamẽ omnino incur-
abile est, in ppter multitudinẽ magnitudinẽ ὃ vasorum, quod iunica eius præ tenui nõ mouet. Au-
ctor deniq; librorũ de iunementis membrorum lib. 6. cap. 2. idem astruit, dicens: Intestinum
ieiunum est propinquum hepatis, ac pertingunt ad ipsum multarum venarum ora. Et bilis flena de-
fluit per suos meatus in primum, quod super ipsum est. Et quia istud propinquissimum hepatis inter o-
mnia membra, quando hepar caruerit cibo, & fuerit vacuum ab eo, capiet eum ex propinquiori sibi
loco, scilicet, ab intestino ieiuno, & a venis cum attractione. Sed nemo apertius Mundini erro-
rem confutat quam Auic. qui Fen. 16. Can. 3. tract. 1. cap. 1. in eam scribit sententiam: Et
nominatur hoc intestinum ieiunum, quoniam ipsum inuenitur secundum plurimum vacuum & in-
animum, & causa in hoc est connexio duarum rerum, quarum una est, quoniam illud quod attrahitur
ad ipsum de multitudine chylis, velociter separatur ab eo, portio namq; eius attrahitur ad hepar, quo-
niam plures venarum mesaraicarum continuas sunt huic intestino, quoniam hoc intestinum est p-
propinquum hepatis, quam alia intestina. Et non est in aliquo intestinum de ramis mesaraicæ, quamquam
est in eo. Ex quibus omnibus abunde liquet, & testium multitudine, rationeq; ipsa, de er-
rore conuictos esse & Mundinum & huius inter pretem Carpum. Ieiunum enim inte-
stinum cum iecori valde vicinum sit, fieri non potest quin vasorum ad ipsum pertingen-
tium multitudo reliqua omnia vincat intestina.

Stercora seu alia excrementa in ventriculo non generari, vt Auicenna ac alij nonnulli hunc se-
quentes sentire videntur.

CAP. VI.

Auic.

errare coelo, quod venas vrinam fectus in vtero efferentes ad ſuminiſ cutem finiri do-
 ceat, cum oon per veas, ſed meatum potius, qui in medio venarum & arretiarum ſi-
 tus, in veſicam ſectus perringat. Et ſi venę ad ſuminiſ cutem deſinentes vrinā efferrent,
 unde, rogo, hæ veoz ſuminiſ vrinā haurirētian ex emulgentib. tales venę in ſum eo vri-
 nā traducerent, q. nunquam compertum eſt: Et ſi ſic etā haberet, qua oro, vi aquoſus il-
 le humor a languioe, quem ſimul cōmixtum emulgentes deſerunt, ſecet ocretur: Fru-
 ſtra certe ſic reoum conſtitutus vſus eſſet, qui eius rei gratia, vt lib. 4. de vſu partiū cor-
 poris humani teſtatur Gāl. facti ſunt, quo aquoſam ſuperfluitatē attrahant, nec vlla alia
 pars eſt, cui hæ facultas ſecernēdi aquoſum humorē a ſanguine inſita ſit, quā renibus.
 Si itaque non ex emulgentib. vrinam ſuminiſ venę hauriunt, tom ex renibus haoriaot
 necelle eſt, & plures tonc meatus vrinarij, *hæc vterq.* Græci vocaot, quam vnus ex ſiogu-
 lis reoibus emergent, quod falſum tamen eſſe conſpecta renum ſtructura, & ſua ipſius
 Mundioid eadere decreta teſtantur. Quod ſi ergo nec ex renibus vrinam hauriūt, ex
 meatibus vrinariis hauriant oportet. Inierunt itaque multa hæ ſeminiſ venę pertu-
 ſis in multa foramina vtereris, quod nec vnquam viſum eſt. Neque enim natura com-
 mittit, vt tot foraminibus exitioſo periculo adſcitas vtereris pertundat. Si autem oc-
 que ex vtereris ſeu meatibus vrinariis vrinam hauriunt, igitur ex veſica, & ſic quoque
 in idem periculum hominem natura cōiiceret, quod ex crebra vaſorum inſertiooe at-
 que perforatiooe veſicę ſibi immineret. Eſto autē, hoc periculum a natura neglectum
 ſit, quo, per ſuperos oro, tot venatum ora vrinam deferentur, forte etiā alantoida tam
 crebro perforabunt, quod tamen cooſilium a natura alieniſſimum exiſtit, quæ diſper-
 ſa vaſa ad vnum inſtituta ſi oem, omoia circa corandem io membrum aliquod ingreſ-
 ſum, io oſculum vnum ſemper colligit vnique, veluti in porta iecoris, & io inuolucro
 exteriori ſectum io vtero complectenti, videre licet. Errar itaque Mundioid, multiſ-
 que ſecum erradi ocaſio fuit, quod venas ad ſuminiſ extimam cutem perringeotes
 vrinam ſectus io vtero deliteſcentis eſſeſſe docuerit, cum per meatum potius peculia-
 rem ad iembranam alantoida nominatam efferatur, illicque vſque ad parturitionis
 tempus detineatur, quemadmodum pluribus forte quam oporteat verbis demonſtra-
 uimus. Prolixius autem hanc rem tractare placuit, partim quod pauci ſi othodie, qui
 vere de ea ſcripſerint, partim etiam vt oommonefacerem ſtudioſos, ne temere Mun-
 dioid aliiſque eius ſarinx auctoribus credereot, ſed ex Galeoo, taoquam optimo eius
 rei artiſce, diſſectioois noritiam hautirent, oon neglecta tamen crebra partium cor-
 poris inſpectiooe, oculataque fide, ſine qua auctorum lectio parum aur nihil ſerme pro-
 derit. Exquiſitorem membranatum ſectum inuoluentum tractatiooem in Inſtit. noſt.
 lib. 1. ſect. 3. cap. 13. ſtudioſi reperient.

*Vterum non habere ſeptem ſinus ſeu cellulas, vt Mundinus præter omniem verita-
 tem aſſertit ſed duos tantum, idque in homine.*

CAPVT IX.

Mundinus in anatome vteri ſic ſcribit: *Figura matricis eſt quadrangularis cum quadam
 rotunditate, habens collum longum in parte inferiori. Per talem figuram habet diſtinctionem
 ſeptem cellularum:* Et paulo poſt: *Concavitas vterei habet ſeptem cellulas, tres in parte dextra,
 & tres in parte ſiniſtra, & vnam in ſummitate, vel in medio eius. Et iſta cellula non ſunt, niſi qua-
 dam concavitates in matrice exiſtentes, in quibus poteſt ſperma coagulari.* Mundinum ſequitur
 Valeſcus libro ſexto, cap. nono, in eum modum ſcribens: *Quamvis matrix non habeat niſi
 vnam concavitatem, tamen ſecundum longum iū qualibet medietate eius reperiuntur tres cellule;
 & vna in medio, & ſie ſunt in ea ſeptem cellula. Quæ ſæpe ſeotectoria quam erronea ſit, facile
 deprehendet, qui oculis vterum humanoū intueri voluerit, quique ea, quæ veteres
 de huius ſinibus tradidero, expendere curauerit: de aliorum eoiū animaltoū vtero
 nobis hic contentio non eſt, vt quam plures quam duos habere ſinus probe ſciamus.
 In homioe vero oon eſſe niſi duos ſinus, teſtatur Hippocrates in libro de natura ſectus,
 ita dicens: *Διότι οὗτος ὁ ὄντις ἀνθρώπου ὁ ὕπερθε αἰ μέρη αὐτοῦ οὗτος ὁ ἀπὸ τοῦ ὀπίσθεν
 ὀπίσθεν**

ariciū cornus. *Quae pars in dextrum torquetur masculina est, quae in sinistram semina.* Quapropter enidentissimum est aberrare Mundinum, huncque sequentes sophistas, quibus septem in vtero cellulae placent, ternis in dextra, sinistraq; constitutis, vna tantum in meditullio composita, quod totidem sint in vnoquoque animali quorū mammarū. Nihil refert autem, si unus, cellulae, siue concauitates dices, nam omnibus iisdem significatur, vt ex Mundini verbis abunde liquet. Ceterum de vteri finibus, & vniuersa eiusdem historia & fabrica clarius & vetius in Epitome nostra de fabrica humani corporis tractauimus, ad quam nunc, vt in ceteris omnibus anatomicis paradoxis, lector vt recurat, hortor.

Septum transversum, quod Graeci diaphragma nominant, non prorsus carne carere, quemadmodum Alexander Benedictus, Plinius in hoc secutus, sentire videtur.

CAPVT. X.

PLinius lib. 11. cap. 37. de diaphragmate in hunc modum scribit: *Extā homini ab inferiorē viscerum parte separantur membranae, quae praecordia appellant, quae cordi praetenduntur, quod Graeci phrenas appellantur.* Omnia quidem principalia viscera, membranarū propriae, ac velut vaginis inclusit praebens natura. In hac sunt & peculiaris causa vicinitas alius, ne cibis supprimeretur animus. Huic certe referunt accepto subtilitas mentis, ideo nulla est cicatrix, sed nervosa exilitas. Quem secutus est Alexander Benedictus, lib. 3. suae anatomiae cap. 3. ita de diaphragmate scribens: *Septum transversum sub pulmone collocatum est, cinctum alii appellant, veteres quoniam cordi praetenduntur praecordia dixerunt, diaphragma alii.* Plato vero phrenas seu prudentiae participes mentemque coniunctas, vnde quidam mentis subtilitatem accipi putauere, ideo ei nulla caro est, sed nervosa exilitas. Errant autem vtrique duplici nomine, primum quod diaphragmati nullam prorsus inesse carnem tradunt: secundo quod eidem mentis subtilitatem acceptam referri dicunt, quod tamen falsum esse Aristoteles, & omnes Peripatetici contendunt. Quod ad primum attinet, diaphragmati scilicet carnem nullam inesse, cum Galeni Medici omnium doctissimi, ac in dissectionibus membrorum exercitissimi placitis pugnat, qui lib. 7. de vsum partium corporis humani septum transversum musculum esse tradit iis verbis: *τὸν περὶ τὴν πύλιν τῆς κοιλίας πύλιν κεν. id est: Phrenon quidem substantia propria musculi est. Si itaque musculus est, carnem habere necesse erit, nam hoc ipsum propria natura cuiusque ratio, cum musculus aliud nihil sit, nisi caro nervi intexto.* Id quod testatur Galenus lib. 1. de vsum partium corporis humani, ita scribens: *ἐν τῷ διὰ τῆς κοιλίας πύλιν τῆς κοιλίας πύλιν κεν, ὅτι τὸ ἀπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς κοιλίας πύλιν τῆς κοιλίας πύλιν κεν, ὅτι τὸ ἀπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς κοιλίας πύλιν τῆς κοιλίας πύλιν κεν.* hoc est: Quoniam vero nulla caro ex seipsa sensum acquirit, & ob id dum erat instrumentum apprehensivum insensibili regi particula nervorum ad totas manus desuper venientium, non partem portionemque naturae, sed carnes ipsas derivavit. Sed cum hoc falsum esset, musculi mox carnes fuerunt. Clarius autem lib. 2. idipsum indicat, ubi in eum modum scribit: *ἐν τῷ διὰ τῆς κοιλίας πύλιν τῆς κοιλίας πύλιν κεν, ὅτι τὸ ἀπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς κοιλίας πύλιν τῆς κοιλίας πύλιν κεν.* quod est: Quod vero carnes musculorum partes sunt, ab omnibus fere qui in dissectionibus periti fuerant, quemadmodum & a nobis in libris de motibus ipsorum dictum est. Et paulo post: *τὸ διὰ τῆς κοιλίας πύλιν τῆς κοιλίας πύλιν κεν, ὅτι τὸ ἀπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς κοιλίας πύλιν τῆς κοιλίας πύλιν κεν.* hoc est: Id vero quod confessum est, & apparet simul in resectionibus, ad praesentia sufficit, nempe carnes in musculorum substantia contineri. In libro denique 2. de temperamento Galenus carnem perpetuo mulculi esse partem scribit. Verba eius haec: *τὸ διὰ τῆς κοιλίας πύλιν τῆς κοιλίας πύλιν κεν, ὅτι τὸ ἀπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς κοιλίας πύλιν τῆς κοιλίας πύλιν κεν.* hoc est: Prima quidem quae propria caro appellatur, quā nusquam in corpore per se invenies, sed est perpetua musculi pars. Inter Arabes etiam Avic. Fem. 1. Com. 1. doct. 3. Sum. 2. c. 1. musculum carnē habere testatur, dum ita scribit: *Musculus est membrum ex nervo & ligamento, & carū villis, & carne impleto, & panniculo cooperiente compositum.* Razes quoque lib. 1. c. 3. idem docet iis verbis: *Musculus interq; ex carne, & nervo & ligamento componi dicimus.* Inter recentiores enī Mundinus in sua anatome diaphragma non ex omni parte carne carere iis verbis ostendit. Tertium panniculum est diaphragma, qui etiam dici potest musculus, cuius situs est in thorace, in fine pectoris, & costarum, alius existit in parte anteriore quā posteriore. Nam quāvis ad eius partē carnosam, est cōtinuum cum costis, nōb. costarū mensurā. Ex quib. sane omnib. satis monstratū est, diaphragma seu septum transversum, antiqui phrenas appellaverunt, esse carnosum, aliqua scilicet. eius parte,

vocum multis errandi occasionem præbeant. Discant igitur moneo veritatis studiosi propria rebus suis adhibere vocabula, ita enim citra difficultatem quod expetunt ad-
discant, eademque facilitate reliquos post docebunt.

*Cerebrum naturam aduersus cordis calorem non esse molitam, veluti Alexander
Benedictus in hoc fecit, putat.*

CAPVT XVII.

Alexandri sententia habetur lib. 4. cap. 3. sua anatomes, vbi inter cetera de cerebro
sic scribit: *Cerebrum omnium frigidissimum est pro cordis temperamento. solet enim natura
semper modis contra cuiusvis exuberantiam auxilium per contrarietatem rei aduersa, vt excessum
alterum altero compescat. In vniuerso enim corpore frigiditas ad temperandum naturalem calorem
a natura data est, quod tactu percipitur & ratione intelligitur, sanguinis enim nihil habet.*
Quibus sane verbis alid non innuit, nisi quod cerebrum gratia caloris, qui circa cor
est, a natura factum opinetur: secutus in hoc Aristotelis erroneam sententiam, quam
prodit lib. 8. de par. animalium, cap. 7. sic scribens: *ι μὲν γὰρ ἐν ἐκείνῳ ἀποχρηται τὸν ἐν τῷ σπλά-
χνῳ μένον. αὐτὸς δὲ ὁμοιομεταστατός ἐστι τοῦ ἐν τῷ σπλάχνῳ μένοντος, ὅτι αὐτὸς ἐν τῷ σπλάχνῳ
μενόμενος ἐστὶν ἐν τῷ σπλάχνῳ μένοντος. διὰ τούτων τὰ αἵματα ἐν τῷ σπλάχνῳ μένοντα τὰ ἐν τῷ
ἐν τῷ σπλάχνῳ μένοντος. διὰ τούτων τὰ αἵματα ἐν τῷ σπλάχνῳ μένοντα τὰ ἐν τῷ σπλάχνῳ μένοντος.*
hoc est: Cere-
brum omnium partium corporis frigidissimum est, solet enim natura semper emoliri contra cuiusvis
exsuperantiam auxilium per contrarietatem rei aduersa, vt excessum alterius altero compen-
set, & moderetur. Idcirco aduersus cordis sedem & calorem, cerebrum natura molita est. Et ea
de causa pars ipsa animalibus inuenta est, naturam obtinens aqua & terra communem. Quicquid
eius rem cerebrum omnia sanguine prædita habent, ex ceteris nullum fere nisi per proportionem, vt
polypum partum enim caloris obtinent omnes id genus propter sanguinis priuationem. Cerebrum igitur
calorem feroremque cordis moderatur, & temperiem offert. Erroneam autem esse vtriusque
sententiam vel iustus maxime cerebri satis demonstrat: cum enim locus alterius parti
alteranti proximus sit oportet, fieri non potest, vt ex tanto intervallo, præsertim densis
ac raris duorum ossium septimentis interpositis, frigiditatem suâ cerebrum ad cor per-
fundat. Id quod iustus docet Galenus lib. 8. de vsu partium corporis humani in eum modum
scribens: *τὸν ἐν τῷ σπλάχνῳ μένοντα τὸν ἐν τῷ σπλάχνῳ μένοντα τὸν ἐν τῷ σπλάχνῳ μένοντα.*
Legendū
tunc videtur
est.

Simile

- A** Simile enim est hoc placitum, ac si diceretur, gratia cordis factus esse calcaneus. Neque putes quin me gratia derisionis ita dicere, nam si diligenter contenderis, citius a calcaneis ad cor aliqua pervenies refrigeratio, quam a cerebro. Licet enim longius locari videantur in hominibus, non tamen in omnibus animalibus, sed neque duobus ossium sepeis velut tutis muris prohiberentur. In solis namque infernis partibus non est ossifusus thorax, sed membranosum ac musculosum corpus, septum transversum vocatum, ibi locatum est, ad frigiditatem immittendum promptissimum. At vero neque minus frigidos invenies, utique calcaneos quam cerebrum, hoc enim etsi nihil est, continuus tamen motus sufficiens est excalfacere: ut interem amittam multitudinem & magnitudinem venarum & arteriarum quæ in eo sunt, quibus nulla est calidior in corpore animalis particula. Sed & quia cooperitur duobus membranis, ac præter hæc esse durissimo, densissimo, & crassissimo.
- B** Hæc enim quod id quod in basi cins iacet, per quod omnino refrigerantis ad cor via ablata est, non enim visque per cacumen hoc caliditatem, quæ in eo est, necessario angustans, viam frigiditatis ad cor impossibilem, & quæ inveniri haud queat, operabuntur. Ex quibus sane verbis farisliquet, obremotam a corde positionem, itemque ob alia, quæ obstant, fieri non posse, ut cerebrum cordis caliditatem moderetur. Et quid attinet cor a cerebro refrigerari, cum id abunde possit respiratio, quæ quidem frigidum aerem inspirat, ferventesque fumos halitusque expirat? Mitum autem est, Aristotelem Hippocratis & vere de respiratione alibi sentientem, hoc loci quod alias recte dixit, oblitum esse. Sed diceret forte quispiam, aerem cerebro multo esse calidior, proinde quum parcius, quam convenit, cor ab eo refrigeretur, auxilio egere, quod a cerebro, vt pote frigidiori, præstetur. Huic cum Galeno respondemus, ita loqui aut sentire nullos, nisi quæ excedentia veritatem loquuntur, aut ea quæ apparent, ignorant. Cerebrum enim nunquam non aere calidius multo esse invenitur, si fractum alicuius caput manu contrectemus. Et qui fieri posset, vt aer cerebro calidior esset, cum incisus cranium aut huius membranis citissime festinemus, sum meque eadem, ne perfrigeretur ab ambiente aere cerebrum? Quod si itaq; aer cerebro calidior esset, nequaquam ab eo refrigeraretur, cuius tamen contrarium, æstate etiam ipsa vbi omnium maxime calet aer, experitur. Porro cum omni calido ad sublimē sit impetus, cor cerebrū, quod sibi superpositum est, magis calefaciet, quam cerebrum cor. Quid multa? monstro siquidem simile erit, si cerebrum longissima sane & calidissima, per quod multos in mediis obices, in frigidare potest, proxima autem & minus calida, sibi que eongenita ac applicata, veluti est membrana tenuis, vt ille ait, veritas autem odium pariat. Neq; est quod spe luci in eum scribendi campum me diuersione quispiam temere suspicetur, quando probe expertus sim, quantam inde annis aliquot & rerum & fortunarum iacturam fecerim. Dum n. omnes alii ampliandæ rei familiaris ac dignitatis ratione habita, vt summis honoribus afficiantur, & quam ditissimi evadant student, huncq; solum sibi rerum agendarū scopum proponunt, vnus ego in Germania fere indagandæ veritati, posthabitis omnibus, operam nauans, præter multorum odia, ac rei familiaris tenuitatem & inopiam ipsam nihil exspecto. Neq; interim tamē in hoc campo pugnare pigebit, modo aliquid inde ad studiosos comoditas perveniat. Poinde mordeat, sugillant, vulneret, dilacerent etiam, nunquam tamen dum viam in acie pro veritate stare detrectabo. Vltima deniq; experiri potius quam signa turpiter deferere mecum constitui. Quare laborē hunc nostrū boni consulas, & si non per omnia tibi satisfactum fuerit, conatum saltem quæso, quando in magnis

PERORATIO.

- E** Hæc habui studiose Lector, quæ in præsentiarum de paradoxis Medicinæ disferem, nulla siquidem gloriæ cupiditate ductus, nec vllis liuoris stimulis agitur, sed tantum veritatis amore huc pertractus. Quid enim gloriæ ex aliorū sugillatione sperarem, vnde plus odii ac inuidiæ quam laudis venari liceat? Fieri n. non potest quin obsequium amicos, vt ille ait, veritas autem odium pariat. Neq; est quod spe luci in eum scribendi campum me diuersione quispiam temere suspicetur, quando probe expertus sim, quantam inde annis aliquot & rerum & fortunarum iacturam fecerim. Dum n. omnes alii ampliandæ rei familiaris ac dignitatis ratione habita, vt summis honoribus afficiantur, & quam ditissimi evadant student, huncq; solum sibi rerum agendarū scopum proponunt, vnus ego in Germania fere indagandæ veritati, posthabitis omnibus, operam nauans, præter multorum odia, ac rei familiaris tenuitatem & inopiam ipsam nihil exspecto. Neq; interim tamē in hoc campo pugnare pigebit, modo aliquid inde ad studiosos comoditas perveniat. Poinde mordeat, sugillant, vulneret, dilacerent etiam, nunquam tamen dum viam in acie pro veritate stare detrectabo. Vltima deniq; experiri potius quam signa turpiter deferere mecum constitui. Quare laborē hunc nostrū boni consulas, & si non per omnia tibi satisfactum fuerit, conatum saltem quæso, quando in magnis

442 Operum Leonhard. Fuchſii Pars III.

& voluiſſe ſarſit, donec meliora obtingant probato. Spero enim futuros poſt hac mul-
 tos, qui & eruditione & dicendi facultate nos longe ſuperabunt. Hi itaque ea quæ a no-
 bis omiſſa, aut non pro dignitate tractata ſunt, in lucem proferent, maiorique dicendi
 copia illuſtrabunt. Cuius rei euidentiffimum nobis exemplum nuper præbuere viri e-
 ruditiſſimi, Petrus Franciſcus Paulus, & Leonardus Grachinus, quorum opuscula Ara-
 bes atque barbaros Medicos ſuis depingentia coloribus, dum paradoxâ hæc noſtra ab-
 ſoluiffemus, typographorum opera in lucem prodierunt: in quibus certe multa ſunt,
 quæ his, quæ hic docuimus, fidem facere poſſunt. Multa denique quæ nos prodere di-
 ſtulimus, iam pridem tamen muſtrauimus, veluti eſt aquarum deſtillatarum comine-
 tum, quod ſane vt inutile, ac præter omnem rationem excogitatû, multis iam annis ne-
 gleximus, parum curantes quantum a multis noſtra tempeſtatis Medicis probe-
 tur, admireturque. Sunt & plura alia, quæ viri iam nominati in ſtudioſorum gratiam illis
 docuerunt, quæ ad exactam medendi rationem probe cognoscendam nõ parum mo-
 menti afferunt. Quapropter & erudita illa opuscula omnibus modis tibi commenda-
 ta eſſe velim. Et faxint ſuperi, vt ex hac noua Academia multi indices eius-
 modi libelli prodeant. Tu vale, & conatum noſtrum
 æqui bonique facito.

Aquarum
deſtillatarum
ſtrata.

FINIS.

INDEX



AD 146 10 60

INDEX

[illegible]

IN OPERA FVCHSII.

Pomeum a. 118. fusib. Pomeorum diffusi-
onis hippodiae ipsi oculis adhibendū
1.14

Pore acidus ad **Cerbingera** 1.16. idē 1.116
Pores Martialis 1.116

Foramina capitis & maxillae inferioris
1.122. uodum & aeris in gressu cauli in-
scilla ib. & pag. seqq. 1.122. & tot. foramen
cutum 1.122. foramen secundum par spī-
nalis medullae transmissum 1.124

foramina capitis 1.124
foramina oculi emittenda parata 1.124
foramina oculos in latera transmissum
ratio 1.124

forma corporis & partium quid 1.126
formatio quid 1.126

forma & virtus quid a. 118
formatus vide **facultas**

formata 1.126. curatōis signa & curatio
ibid.

formicae quibus medicamentis tollitur 1.124
formicae quibus medicamentis
soluit 1.124

fractura 1.124. fractura quid 1.124. eius diffi-
cultas ib. simpliciter edipendi ib. caute
1.124. figura ibid. curatio ib. fractura per
transmissum quomodo curanda 1.124. offra
facta reduciendi modus 1.124. in modum
difficilius cauta ibid. arget quomodo
colla cadenda ib. diffinitio quando temen-
da ib. offium extractio haud frangenda
1.124. nec est fracti & felle mōti
ib. deligantur modus 1.124. **fractura** cur
adhibenda 1.124. repugnans fractura in fi-
ctura **curatōis** 1.124. fracturae
dū interdum hoc loco permittantur 1.124.
fractura quomodo in fracturam violente ad-
hibenda 1.124. fracturam in longitudo-
nem curatio 1.124

fragaria 1.124
Fraxosici Alcaedii repetitio repella 1.124
Francisci Valeriani de curae opinio falsa
revela & explosa 1.124

fraxio cornu 1.124
fraxio medicamentorum quid 1.124

fraxio preparatio 1.124. eius diffinitio ib.
dura, mollis, medicosa 1.124. multa, pau-
ca, medicata ib. fraxio apothecarum qua-
ritate debet 1.124. medicos repetitio
1.124

Friderici Fuchsi liber contra Scheggium de
causa morbi comos 1.124

frigida quando exhibenda 1.124. eius inco-
mmoda ib. quibus non exhibenda ib.

frigida quando exhibenda 1.124
frigida oculus non adhibenda 1.124

frigidi effectus 1.124
froncus voluntarius motu **perditur** 1.124. si o-
tus medicamentum substantia ib. froncus li-
benter foris 1.124. in fronte scissurae
transfertur non contineat ib. froncus cum
cur depulsi 1.124

fructus quando deperendi 1.124. quid 1.124.
fructus caute deperendi reuocati 1.124
Fuchsius ab Argenti repetitio reprobatio
1.124

facus vide **ceruina**
facus vide **ceruina**

facus vide **ceruina**
facus vide **ceruina**

facus vide **ceruina**
facus vide **ceruina**

facus vide **ceruina**
facus vide **ceruina**

facus vide **ceruina**
facus vide **ceruina**

facus vide **ceruina**
facus vide **ceruina**

facus vide **ceruina**
facus vide **ceruina**

facus vide **ceruina**
facus vide **ceruina**

Galbanum 1.124. **Galea** 1.124
Galeos amareum periculis 1.124 non fe-
cat opprobrium venam in plenitudine 1.124.
de terra Lemnia 1.124. in Lemnos na-
tigit 1.124. **Galea** Caspica 1.124. **gale-**
nos non est auctor libri de defensionibus
inferis 1.124. neo est auctor totius ducio-
rib. Medicorum Coryphae ibid. **Galei**
veritas translatio qualis 1.124. **Galeus** & di-
scilio ubi venam fecit 1.124. defensus 1.124
1.124. **Galeus** ouit mannam Arabiam 1.124

Galeus caplae in **Disco** cordis dogmata 1.124
1.124

Galeus ventriculos cordis recte intellexit 1.124
1.124

Galei loca explicata 1.124
Galenus in compositione medicamentorum imi-
tandus 1.124. ab imitia Argenti defensus
1.124. 1.124. 1.124. **Galeus** simus 1.124. & quā
bilio & deceptio 1.124. **Galeus** ab initio
1.124. 1.124. **Galeus** reliquus 1.124

Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124
Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124

Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124
Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124

Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124
Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124

Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124
Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124

Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124
Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124

Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124
Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124

Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124
Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124

Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124
Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124

Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124
Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124

Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124
Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124

Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124
Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124

Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124
Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124

Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124
Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124

Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124
Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124

Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124
Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124

Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124
Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124

Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124
Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124

Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124
Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124

Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124
Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124

Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124
Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124

Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124
Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124

Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124
Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124

Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124
Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124

Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124
Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124

Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124
Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124

Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124
Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124

Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124
Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124

Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124
Galenus a pugnacia vindicatus 1.124
Galenus ab imitia vindicatus 1.124

Genitium videt 1.124
genitum a. 124

genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124

genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124

genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124

genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124

genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124

genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124

genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124

genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124

genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124

genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124

genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124

genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124

genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124

genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124

genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124

genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124

genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124

genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124

genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124

genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124

genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124

genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124

genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124

genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124

genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124

genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124

genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124

genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124

genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124

genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124

genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124
genitum a. 124

INDEX

[illegible]

quod tenuissimum [1.33.7](#)
 Medicamentum s.b. [1.33.10](#) i. tra. s
 moro lras quid [1.40.2](#)
 morphes [1.40.2](#)
 mortuus [1.18.1](#)
 Morbus acutus humorum abundantia medicamentis [1.42.2](#). M. Mutus animantium duplex [1.42.2](#) b. venenatus canis venenatus signa [1.42.2](#) b. taboiti canis probatio [1.42.2](#) curatio m. c. canis taboiti [1.42.2](#).
 Morbus magis medicamentis congruus [1.42.6](#) f. & [12.7](#)
 morbus quomodo plures morbi merere debent [1.42.11](#)
 Morbus circa iudicium aores [1.43.1](#) b. c. eorum, qui circa iudicium morbois iudicia [1.43.1](#) b. morbois [1.43.1](#) b. [1.43.6](#)
 morbus dies et hora, vt primo fecunda [1.43.1](#) f. & [1.43.6](#)
 morbus mureos, pusio, pudor [1.46.1](#) b. c. def. morus p. [1.46.1](#) b. c. morus [1.46.1](#) c.
 morbus [1.46.1](#)
 morus quid [1.46.1](#) b. c. ad hoc affligit [1.46.1](#) b. morus dies [1.50.6](#)
 mucaginis vel mucilaginis extractio [1.90.6](#) moro [1.90.6](#) [1.91.6](#)
 mucatum [1.90.6](#)
 mucago vt [1.90.6](#) [1.91.6](#) b. quid [1.91.6](#)
 mucus [1.90.6](#) [1.91.6](#)
 mulier grauidi, limmas obstruit repleat catenata abortiri. q. c. mulieres sepe zeni habent [1.44.6](#) c. mulierum frigidiore sepe repleat [1.44.6](#) c. catenatae sepe [1.44.6](#) c.
 mulierum [1.44.6](#)
 Murea quid [1.44.6](#). Raris ibid. artificialis ibid. etiam in Rhaz. artificialis [1.44.6](#) f.

[illegible]

Myrica **1.177** c. 40 f. cinasvis parum rucus
1.181 a. myrica officinarum **1.182** (la)le **2.1**
 a. vera caucum **1.182**
 myrica p. **1.182**
 myrica **1.182** b. c. formos **1.182**
 myrica **1.182**
 myrica **1.182** d. myrica & myrica **1.182**


[illegible]

Nicolaus Myrtilus a Fochlo connotus 1.12.
Nicolaus Leonicensis 4. 118. error 4. 119.
locus refinitus 1.119. 2. 161. 3. 167. 4. 168.
locus & *Semiotis* error 1.114. 2. Myrtilus
elliptica codices et abundi 1.161. 3. codex e
maculatus 1. 113. 2. 115. codices homi de
pusati 1. 114. 2. Myrtilus *locus capensis* 1.
 119. 2. 164. 3. 179. 4.

AOI 1461060







1

H.36.

18



Digitized by Google

